

**წიგნი**

**მეცნიერებათა**

**შეფასება:**

**აკაკი გამყრელიძე  
ნანა ნიკოლაიშვილი**

**თბილისი  
მერანი-3  
1999**

56. 14-3  
612.810381  
3 198

## ს ა რ ე ლ ა ქ ი ძ ე ს ა ბ ჭ ი :

- გამყრელიძე შოთა** - საქართველოს სამედიცინო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, პროფესორი საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების პრეზიდენტი
- გრეგოლავა ამირან** - დ. უზნაძის სახ. ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, პროფესორი
- დეკანოსძე თამარ** - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, პროფესორი
- ვასაძე ოთარ** - ჯანდაცვის მართვის ნაციონალური ცენტრის დირექტორი
- მუსტაშვილი შირიან** - საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, პროფესორი
- ნანუა ნანული** - საქართველოს სამედიცინო და სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, პროფესორი

საღიქსიკონო ერთეულების რედაქტორები: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომლები ინგა ჯიბუტი, ნათელა მუზაშვილი, შარინა ოსაძე.



### გ ა მ რ ი ბ ა ზ ო ნ დ ი “ ღ ი ა ს ა ზ რ ბ ა დ რ ი ბ ა - ს ა ქ ა რ ტ ი მ ე ლ ” - ს ს ე ლ მ ე ნ ე ბ ა ი მ

ნაშრომში მოცემულია ფსიქიატრიის დარგში გამოყენებული ტერმინებისა და ცნებების განმარტებანი. ამავე დროს მასში შესულია ისეთი ტერმინები (ნეეროლოგიური, ფსიქოლოგიური, ფილოსოფიური, ფიზიოლოგიური და სხვ.), რომლებიც არ არის სპეციფიკური ფსიქიატრიისათვის, მაგრამ ხშირად გამოიყენება ამ დარგში. ენციკლოპედია განსაზღვრულია ექიმებისა და მეცნიერ თანამშრომლებისათვის, რომლებიც მოღვაწეობენ ფსიქიატრიის, ნეეროლოგიის, ფსიქოლოგიის, პედაგოგიკის, დეფექტოლოგიის, ფილოსოფიისა და იურიდიულ დარგებში.

© ა. გამყრელიძე ნ. ნიკოლაიშვილი

# სარჩევნო

წინასიტყვაობა .....	5
ენციკლოპედიაში გამოყენებული შემოკლებები .....	7
თავი I. გერმინთა და ცნებათა განმარტებები .....	9
თავი II. გერმინოლოგია ორიგინალური დამწერლობით .....	427
თავი III. ძველ ქართულ სამედიცინო წყაროებში მოხსენიებული გამოთქმები ამა თუ იმ ფსიქიატრიულ ცნებითა აღსანიშნავად .....	436
თავი IV. ნარკოტიკული საშუალებების და ნივთიერებების ვარგონული სახელწოდებები .....	438
თავი V. გერმინები, რომლებშიც განხილულია მათი ფსიქონალიზური მნიშვნელობა .....	440
თავი VI. ფსიქიატრიული კლასიკური ბიბლიოგრაფია .....	442
თავი VII. ენციკლოპედიაში მოყვანილ ავტორთა ჩამონათვალი .....	452
გამოყენებული ლიტერატურა .....	465

## წინასიტყვაობა

საქართველოში ფსიქიატრიის განვითარებას თითქმის საუკუნოვანი ისტორია აქვს. მის სათავეებთან იღვწენ ისეთი ცნობილი მეცნიერები, როგორც იყვნენ: ი. ანფიმოვი, მ. ასათიანი, ა. ვოცირიძე, ა. ზურაბაშვილი, მათი თანამშრომლები და მოწაფეები: ი. მენთემაშვილი, ე. გობრონიძე, ა. მაკარიძე, ი. ბეაღაევა, ე. ნაკაშიძე, ვ. იაშვილი, ბ. ნანუაშვილი, ნ. ვეშაპელი, გ. მენგელაია, ა. საენელი, ვ. იაშვილი, ო. ჭითაევა, ე. ჯიმშელიშვილი, ფ. კონტრიძე, მ. მესტიაშვილი, შ. გამყრელიძე, ნ. ჩხეიძე, რ. მესხი. ამ მეცნიერთა გამოკვლევებმა და ფუძემდებლურმა ნაშრომებმა განუშობელი წვლილი შეიტანეს არა მარტო ქართული ფსიქიატრიის განვითარებაში, არამედ ქართული კლინიკური ამროვნების ჩამოყალიბებაში. მიუხედავად ამისა, საბჭოთა პერიოდში, ტოტალიტარული და რუსიფიკაციული ტენდენციების არსებობის ეპოქაში, მეცნიერთა ყურადღების მიღმა დარჩა დარგობრივი გერმინოლოგიის შექმნის უმნიშვნელოვანესი პრობლემა.

ქართული ფსიქიატრიული გერმინოლოგიის ჩამოყალიბებაში დიდი წვლილი მიუძღვის მ. ასათიანის ნაშრომებს "გეგმა და მეთოდია" და "ფსიქონევროზები", ა. ზურაბაშვილის სახელმძღვანელოს ფსიქიატრიაში, განსაკუთრებით მის ზოგად ნაწილს, აგრეთვე 70-იან წლებში ე. ნაკაშიძისა და ბ. სეანის მიერ შედგენილ "ფსიქიატრიის განმარტებით ლექსიკონს".

მეცნიერული ამროვნების თანამედროვე ეტაპზე ფსიქიატრიის შემდგომი განვითარების პროცესში შეიქმნა ცალკეული შეიღვეული დისციპლინები: ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრია, სანამართლო ფსიქიატრია, ნარკოლოგია, ფსიქოფარმაკოლოგია, სექსოლოგია, სუიციდოლოგია და სხვ., რომლებმაც, ერთი მხრივ, განაპირობა ექიმთა ვიწრო სპეციალიზაცია, ხოლო, მეორე მხრივ, წარმოშვა ახალი გერმინები და მოითხოვა უკვე დამკვიდრებულ გერმინთა ახლებური ინტერპრეტაცია.

სწორედ აღნიშნულმა ფაქტმა განსაზღვრა წინამდებარე ნაშრომის შექმნა. გერმინთა მოძიების დროს დიდი დახმარება გაგვიწია უკრაინული ფსიქიატრების ე. ბლეხერის და ი. კრუკის, რუსი ე. ვესკოვის, გერმანელი ქ. მიულერის, ამერიკელების: ა. ფრიდმანის, კ. კაპლანის, ბ. სედოკის, მ. გალანგერის, პერბერგ დ. კლუბერის და სხვათა ნაშრომებმა. უნდა ითქვას, რომ მიზანი ძნელად განსაზღვრული იყო აღმოჩნდა. ხშირ შემთხვევაში ჭირდა ქართული შესაბამისების მოძებნა, რაც ბუნებრივად განაპირობებდა ცნების შესაბამისი ზუსტი გერმინის შექმნას. ამავდროულად ვედილობით სწორედ ის ქართული სალექსიკონო ერთეულები შეგვეჩინა, რომლებიც გაუძღვებდა დროის გამოყდას. ამ მხრივ დიდი დახმარება გაგვიწიეს არნ. ჩიქობაეას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომლებმა ქალბატონებმა: ინგა ჯიბუგმა, მარინე ოსაძემ და ნათელა მუშაშვილმა.

ენციკლოპედია შედგენილია გერმინთა და ცნებათა განმარტებების სახით და ვფიქრობთ, იგი დაინტერესებს არა მარტო ფსიქიატრებს, არამედ ნებისმიერ მკვლევარსა თუ მეცნიერს, რომლებიც ადამიანის სულსა და მის პათოლოგიას შეისწავლიან. იგი დიდ დახმარებას გაუწევს აგრეთვე უმაღლესი სამედიცინო სასწავლებლების სტუდენტებსა და ახალგაზრდა სპეციალისტებს.

წიგნში გერმინები ანბანთრიგზეა გაწყობილი. საჭირო გერმინის მოსაძებნად, პირველ რიგში, ეასათუალისწინებელია ან გერმინის შემოძღვების, ან მისი პირველად აღმწერი ავტორის გვარი, ან ნომოლოგია, ან სინდრომი, რომლის დროსაც გამოვიყინდება

მდგომარეობა, რობელსაც ასახავს გერმინი; მაგ., კორსაკოვის გრიადა, პალეოენაიური ბოლდა. ალკოპოლური ღებრესია. ზოგ შემთხვევაში გერმინები დაწყობილია ძირითადი წამყვანი სინდრომის მიხედვით მის ნაირსახეობებთან ერთად. ასე მაგალითად: პოლუა, ღებრესია, ფობები და სხვ. ზოგიერთ გერმინს შეეუნარჩუნეთ ორიგინალური დამწერლობა. ისინი ცალკე თავად გაუერთიანეთ. ამავე პრინციპითაა მოცემული სარკოტიკული ნივთიერებებისა და საშუალებების ფარგონული სახელწოდებები ინგლისურ ენაზე. ენციკლოპედიაში შეგანილია ფსიქონალიტიკურ ლიტერატურაში დამკვიდრებული ორასზე მეტი გერმინი, რომლის სარჩევაც ცალკე დაერთვის წიგნს. ამავე დროს ცალკე თავებადაა მოცემული ღღევანდელი გერმინოლოგიის შესაბამისი ძველ ქართულ საშუალებებში მოხსენიებული გამოთქმები, კლასიკური ფსიქიატრიული ბიბლიოგრაფიული ჩამონათვალი და ენციკლოპედიაში მოყვანილ აუტორთა სია.

ქართულ ენაზე წარმოდგენილი მოულოდბითა და მინაარსით შედგენილი ნაშრომი, როგორც მეშთ ითქვა, პირველი ცდაა და, ამიგომ მასში, ბუნებრივია, ხარვეშებაა მოსალოდნელი. ღეესიკონზე მუშაობის პროცესში განსაკუთრებული სიძნელები შეეექმნა, ერთი მხრივ, ფსიქიატრიის დარგში დამკვიდრებულ სამეცყელო ენაში გამოყენებულ გერმინთა ქართულ სწორ დამწერლობასთან დაკავშირებით, ხოლო, მეორე მხრივ, ჩვენ თვითონ ვერ აუყლით ზოგად მედიცინაში დამკვიდრებულ გერმინთა (მაგ., კომბინირებული, ფორმირებული და სხვ.) გამოყენებას.

შემდგენლები მადლიერების გრძნობით მიიღებენ ყველა სახის შენიშვნას, რჩევას და გაითვალისწინებენ აღნიშნულ ნაშრომზე შემდგომი მუშაობის დროს. განსაკუთრებული მადლიერების გრძნობით გვსურს გავიხსენოთ ის უღიღესი წელილი, რომელიც ამ ნაშრომის საბოლოო სახით წარმოდგენის საქმეში შეიგანეს: ქალბატონებმა თამარ ღეკანოსიძემ, ნინული ნინუამ, აღისა ცინცაძემ და მარინა ჭავჭავანიძემ, ბაგონებმა აეთანღილ გრიგოლაყამ და ოთარ ვასაძემ, საქართველოს ჭანმრთელობის დაყვის სამინისტროს ჭანდაყვის მართვის ნაყიონალური ცენტრის თანამშრომლებმა, რომლებმაც მნიშვნელოყანა და მრომატყეადი დახმარება გაგვიწიეს. ასევე უღრმეს მადლობას ეუხლით ყველას, ვინც ღილი მოთმინებითა და რულუნებით შეგვიწყო ხელი ჩვენს მუშაობაში. განსაკუთრებით გვსურს აყღნიშნოთ ფონღი “ღია სამოგადოება - საქართველო”-ს წელილი, რომლის დახმარების გარეყეე გაძნეღღებოდა წინამღებარე ნაშრომის გამოყემა.

აკაკი გამყრეღბე, ნანა ნიკოღაიშვილი

## ლექსიკონი გაყოფილი შემოკლები

ანატ.	ანატომიური
არაბ.	არაბული
ა.შ.	ასე შემდეგ
ბერძნ.	ბერძნული
გ	გრამი
გერმ.	გერმანული
ევგ	ელექტროენცეფალოგრამა
	ელექტროენცეფალოგრაფია
ეკგ	ელექტროკარდიოგრამა
	ელექტროკარდიოგრაფია
ექთ	ელექტროკუნჩხვითი თერაპია
ე.წ.	ეგრეთ წოდებული
ე	ეოლტი
ინგლ.	ინგლისური
იტალ.	იტალიური
იხ.	იხილე
კბ	კომპიუტერული გომოგრამა
ლათ.	ლათინური
მა	მილიამერი
მაგ	მაგალითად
მალ.	მალაიური
მგ	მილიგრამი
მღუ	მანიაკალურ-დეპრესიული ფსიქოზი
მ.მ.	მათ შორის
პეგ	პნევმოენცეფალოგრაფია
ეარგ.	ეარგონული
ს.	საკუენე
სანსკრ.	სანსკრიტული
სთ	საათი
სინონ.	სინონიმი
სსკ	საექიმო საექსპერტო კომისია
სხე.	სხვა
სსსკ	საექიმო შრომითი საექსპერტო კომისია
ჯანმო	ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია
ფრანგ.	ფრანგული
შღრ.	შეადარე
ენს	ენცერალური ნერვული სისტემა
ძველებრ.	ძველებრაული
ძე.წ.	ძველი წელთაღრიცხვით
წ.	წელი
წთ	წუთი
წმ	წამი
პოლ.	პოლანდიური





**აბაღის სინტაქსი** - Аббадс синтаксис (Abadid J., 1905). აბუღესის მეცნიერ ბილერი შეწოლა არ იწვევს გყოფილს შეგრძნებას. გვხვდება ზურგის გინის ხმობის და ზოგჯერ პროგრესული დამბლის დროს ლოკომოტორული ატაქსის სიმპტომთა კომპლექსი.

**აბაზისა** - абазия (ბერძნ. ა. უარყოფა, basis - ნახიჯი). ხაბრულის შუუძღვლებმა ქვედა კიდურთა მოგორული ფუნქციის დარღვევის გარეშე აღინიშნება ისტერიის, პიკურინგზური და კუნთთა სპაზმური მდგომარეობის დროს. ხშირად გვხვდება ასტაზია-აბაზური სინდრომის სახით.

**აბაღის სინტაქსი** - аббадс синтаксис (лат. abbatid - გაღაბა). გაუცხოება. პიროვნული იდეოლოგიის სიმპტომი. აღინიშნება შიშოვრების (აუტოზმის ფარგლებში), ფსიქოპათიის დროს, ხსიათის პათოლოგიური განვითარებისას.

**აბაზია-კონსტანტინოპოლის სინდრომი** - Абазия-Константинопольского синдром (Абазия-Константинопольского А.Л., 1966). დაკუნთი ხანძათის ტეკსუტობა. გვხვდება ინსულტის შემდგომ პერიოდში. გამოხატულია მწვეველ აღმოცენებული შყარი ტეკსუტობის სინდრომის სახით.

**აბელიის სინტაქსი** - Абелы синтаксис (Abely P., 1927). აბ. სინტაქსი სარქმისა.

**აბერაია** - аберация (ლათ. aberratio - გაღაბა). აქ: გონებრივი, აქტივქტუალური მოღვაწეობის ნორმადან გადახრა.

**აბეტალიპროტეინეზი** - абеталипротейноз (Bassen H.A., Kornzweil A.L., 1950). შექვიდრებობის რეესისული ანომალიის კომპლექსი; სისხლის მრავლი β-ლიპოპროტეინების არარსებობა, ქოლესტერინისა და ფოსფოლიპიდების მუცელკობის დაქვეითება სისხლში, აკანტოციტოზი, პიგმენტური რეგინიცი, პროგრესირებადი ატაქსია და არეულუქვია, ამაუროზი, გონებრივი ჩამორჩენილობა. სინონ: ბასმ-ბლანსტაბიზის სინდრომი.

**აბიოტრია** - абиотрия (ბერძნ. bioe-სოცოცხლე, troph-კვება). უჯრუდთა ცხოველ ბოჯოელობის ნაადრევი დაქვეითება მათი ფუნქციონირების და ადაპტაციური საშუალებების მოშლის ხარჯზე. ა. განიხილება როგორც ცნს-ის ზოგადი და დაეილების წარმოშობის მიხეტი, როგორცაა: შიშოვრენია, პანგინგონის ქორვა, პიკის, ალკოჰოლის, უაღსონის და პარკინსონის დაეილებები.

**აბსტინენცია** - абстиненция (ლათ. abstinent - დახანა, ჩამორეცხვა, ბერძნ. mania - სწრაფეა, ღლოლეა. აქ: აკუიაგებული მდგომარეობა). აკუიატებული ხელები ხანა, დაკევირებული ოხსესიებთან ან დაბინძურების ბოლით იდეებთან. გვხვდება როგორც ნეერომის ფარგლებში, ასევე შიშოვრენის დროს.

**აბნეა** - абнεια. ფსიქოტრაპეა გერმინი ა გამოიყენება ისეთი მდგომარეობების აღსანიშნავად, როდესაც ირღვევა ატო- ან (და) ალოფსიქიკური თრავტაცია; ამ დროს, ჩვეულებრივ, ლაპარაკია ცნობიერების აბნეიანე. აბ. ცნობიერება.

**აბნეა პრეტერნორალური** - абнεια претернормальная (Stern F., 1930). ცერებრულ-ხსხლძარღვოვანი გენეზის ფსიქოზური სინდრომები. დამახასიათებელია ხანმოკლე გამოვლინება, უპირატესად დაბის საათებში. მრავალჯერადი გამეორებისადმი მიდრეკილება, რუდემენტული და აკიური ხასიათი. მისი პათოგენეზი სხედასხვაა. ზოგჯერ იგი აღმოცენდება თავის გინის სისხლის მიმოქცევის მწვევე მოშლის ან სისხლძარღვოვანი კრამების დროს. ზოგჯერ - ეტარაყერებრულ სისხლძარღვოვან ფაქტორებთან დაკევირებით.

**აბნეა შიშოვრებისა** - абнεια истерическая - psychosis абнεια. აბ. შიშოვრებისა.

**აბნეა ცნობიერებისა** - абнεια сознания - psychosis абнεια. აბ. ცნობიერებისა.

**აბსანს-პურა** - абсансыра (ბერძნ. abs-ნაივი) (Horonok Г.Л., 1972). უაღვებოური აურის ერთ-ერთი ვარიანტი. გამოვლინება ეილესისური გულყრის საწყის ეტაპზე.

**აბსანსი** - абсанс (გრანგ. absans - არარსებობა) (Catael L.F., 1824). ცნობიერების ხანმოკლე (2-20 წმ) აშლა ამავე პერიოდის ანეგიითი. ა. შესაძლოა გამოვლინდეს როგორც ეილესისური ცენტრალიზებული გულყრის აურა ან როგორც გულყრის ეკეივალენტი. გვხვდება მარტივი ან რთული ა-ის სახით. მარტივი ა-ის დროს ადგილი აქვს მხოლოდ ცნობიერების აშლას, როგორც ა-ის შემთხვევაში კი - სხეა თანხლები სიმპტომების გამოვლინებასაც.

**ა. აბტრანსიენსი** - а абстракционизм. დამახასიათებელია აეგომბიგებელი და სტერეოკეპული მომრავიანი და ექსტეხე; გუჩების და ენის, ხელის მგენის სტერეოკეპული მომრავიანი თმისა და განსაცდლის გასწორების სახით.



- ა. ატიპური - ა. атипичный. მარტვი ან რაული ა. ეგზეზ არ აღინიშნება ორხრივი პიკეტალების კომპლექსით, არ გამოიყვება პიკეტონგლიკოლი ან წვეტილი სინათლის გამომიანებელი.
- ბ. პარტიკული - ა. частичный. რაული ა. გამოვლინდება კნთთა გონესის ღეჭუთებით და ამის შედეგად სხეულის რილი ვარდნით.
- ბ. პარტიკული - ა. частичный. რაული ა. გამოვლინდება მარდის შეუკავებლობით.
- ბ. პარტიკული - ა. частичный. მიმდინარეობს ეპსილონოვური ფენომენებით.
- ბ. პარტიკული - ა. частичный. გამოვლინდება ევგეტაციური დარღვევების სახით.
- ბ. პარტიკული - ა. частичный. რაული ა. გამოვლინდება სახის და შედა კულრების მთიკლონით.
- ბ. პარტიკული - ა. частичный. რაული ა. გამოვლინდება ცნობიერების ხანგრძლივი (რამდენაე საათამდე) დაბნელებით.
- ბ. პარტიკული - ა. частичный. პარტიკული ა. ის ვარდნა, რომლის დროსაც ავადმყოფი წინასწარობის აღეუს მიმით მოძრაობს უკან ვადამეული მიხეზებით.
- ბ. პარტიკული - ა. частичный. პარტიკული ა. ის ვარიანტი, ხასიათდება სხეულის უკან გადამხევიო.
- ბ. პარტიკული - ა. частичный. ხასიათდება ცნობიერების არასრული აბლით ამახლება შთალოდ ვუპ-ზე.
- ბ. ტიპური - ა. типичный. მარტვი ან რაული ა. კლინიკურად გამოვლინდება უკარი დასაწყისით და დასასრულით: ქეთთობების ორხრივი სმეტრული ხამამით ან სხეა კლინიკური ფენომენით. ეგზეზეა ორხრივი პიკეტალების კომპლექსები.
- ბ. პარტიკული - ა. частичный. რაული ა. გამოვლინდება კნთთა გონესის აწვეის სახით (თავის უკან გადავლება, თავის კავების მოძრაობა მუეით, იშვითად გორსის უკან გადახვევა).
- პატარატიკული - ანთოზი (ვინაჲ, abnolus - აბნოლის არაე). აღკოპოლამის ხამე, რომლის დროსაც გამოიღვრება აბნოლის არაე. აღკოპოლამის ფორმირება მიმდინარეობს შედარებით სწრაფად, შევეთრადაა გამობაგული ცხსის ორგანულ დახამების ნიშნები, ხშირია ეპილეუსტოროში გულკრითი განვითრევა.
- პატარატიკული - ანთოზი. 1. ადამიანი რომელიც შეგნებულად ან იშვითად ეკავის თავის მისთვის მუეელი ნიეთიერებების (აღკოპოლ. თამბაქო. ნარკოტიკული საშეალებები, ფსიქოტროპული პრეპარატები), ან საკვების მიღებისაგან, ან მოქმედების (სეკუნდური) შესრულებისაგან. 2. ავადმყოფი, რომელიც იმყოფება აბსტინენციურ სმეტროპრობაში (ხე. პატარატიკული).
- პატარატიკული - ანთოზი (ლათ. abnolus - თავმეკავება). ფიზიკურ და ფიზიკურ სინდრომათა ერთობლიობა, გამოიკვლია მუეელი ნიეთიერების ან საკვების მიღების, ან მუეელი ქმედობის (სეკუნდური) შესრულების შეწყვეტით. შეიძლება იყოს სრული ან ნაწილობრივი.
- პატარატიკული ნიეთიერებისტი - ანთიქსიქა ვეხაქსიქა. 1. აღკოპოლური. იხ. პატარატიკული სინდრომი აღკოპოლურად. 2. ნარკოტიკული. იხ. პატარატიკული სინდრომი აღკოპოლურად. 3. გოქსიკოპანიური. იხ. პატარატიკული სინდრომი აღკოპოლურად.
- პატარატიკული სმეშაღური - ანთიქსიქა დეკუსიქა სეკუნდური აქტივობას სიგეაიურად განპირობებული იძულებით ან ნებავულობით, შეგნებულად შეკავება გამოვლინდება გოგალური - სეკუნდური ქმედების სრული აღკვეთით ან პარტიკული სახით, როცა ორგანში მიღწევა სეკუნდური აქტის შემყველი მოქმედებით.
- პატარატიკული სინდრომი აღკოპოლური - ანთიქსიქა დეკუსიქა სეკუნდური აქტივობას სიგეაიურად განპირობებული იძულებით ან ნებავულობით, შეგნებულად შეკავება გამოვლინდება გოგალური - სეკუნდური ქმედების სრული აღკვეთით ან პარტიკული სახით, როცა ორგანში მიღწევა სეკუნდური აქტის შემყველი მოქმედებით.
- პატარატიკული სინდრომი აღკოპოლური - ანთიქსიქა დეკუსიქა სეკუნდური აქტივობას სიგეაიურად განპირობებული იძულებით ან ნებავულობით, შეგნებულად შეკავება გამოვლინდება გოგალური - სეკუნდური ქმედების სრული აღკვეთით ან პარტიკული სახით, როცა ორგანში მიღწევა სეკუნდური აქტის შემყველი მოქმედებით.
- პატარატიკული სინდრომი აღკოპოლური - ანთიქსიქა დეკუსიქა სეკუნდური აქტივობას სიგეაიურად განპირობებული იძულებით ან ნებავულობით, შეგნებულად შეკავება გამოვლინდება გოგალური - სეკუნდური ქმედების სრული აღკვეთით ან პარტიკული სახით, როცა ორგანში მიღწევა სეკუნდური აქტის შემყველი მოქმედებით.
- პატარატიკული სინდრომი აღკოპოლური - ანთიქსიქა დეკუსიქა სეკუნდური აქტივობას სიგეაიურად განპირობებული იძულებით ან ნებავულობით, შეგნებულად შეკავება გამოვლინდება გოგალური - სეკუნდური ქმედების სრული აღკვეთით ან პარტიკული სახით, როცა ორგანში მიღწევა სეკუნდური აქტის შემყველი მოქმედებით.
- პატარატიკული სინდრომი აღკოპოლური - ანთიქსიქა დეკუსიქა სეკუნდური აქტივობას სიგეაიურად განპირობებული იძულებით ან ნებავულობით, შეგნებულად შეკავება გამოვლინდება გოგალური - სეკუნდური ქმედების სრული აღკვეთით ან პარტიკული სახით, როცა ორგანში მიღწევა სეკუნდური აქტის შემყველი მოქმედებით.
- პატარატიკული სინდრომი აღკოპოლური - ანთიქსიქა დეკუსიქა სეკუნდური აქტივობას სიგეაიურად განპირობებული იძულებით ან ნებავულობით, შეგნებულად შეკავება გამოვლინდება გოგალური - სეკუნდური ქმედების სრული აღკვეთით ან პარტიკული სახით, როცა ორგანში მიღწევა სეკუნდური აქტის შემყველი მოქმედებით.



ლორბა და ხედალია. აუღებოფის ასაქე, თანდართულ სიმპტომაციკე - ბოღე, პალეკონასია, ცნობურების ღარღეუა. შ. ჯასესტია. არმევენ ა-ის შემღვე ხახუბს:

- 1. **პანენ(ა)ზიზი** - **ა. апанени**. შელს **პანენ(ი)ზი** (იხ.) სურათში, ხასიათლება არაკოორდინირებული, სკეროტიკული შორლობით. ხშირად ეს არის აგნება საწოლას ფარგლებში.
- 2. **ღანგულ-პამეტიპმერი** - **ა. панистический** (ბერძ. paniceus - ენებთან, განუელი). კატატონური აგნება. ხასიათლება არამოტივირებული, იმპულსური ქვეებით, მალაფარლოვანი, არაბანზობიერული შეგველებით. განდროლი (მარალოგურ, სიმბლერ) ამოიწებებით და გნება-განწყობის არაადექტურული პერიოდით ადგაყებულ ეგნებდგნებლიან მშობითარე-დანეულამდე. აუღებოფის მხიბა ხშირად არ ემობტეუა გასინათქეშების სისაარსს, უკნა-განწყობა - მიშისა, თვალების გამომეგველება - სახის გამომეგველება.
- 3. **ღმირმეშერი** - **ა. аризматический**. აღნიშნება როგორც ენბო, ასევე ფსიქოგენური დეპრესიის მწვერელამდე ენღაერკრა დეპრესიის დროს **ა. დ.** ჩვეულებრივ. აღმოცენდება გამოუვლი ხეელის, შოთოთის, სისოწარკეთის ტარქელსთან დაკამდობით. იგი შესაძლოა გაბღირდეს და იყოს ხარჭიდივი (შეფოტარე ატეტაცია), ან შეიძლება აღმოცენდეს შქარე (მღანჭოღური რატქეს) ან დროს ხშირია სუიციდური ქვეებით. ფსოტგენული, პირველ რიგში, მტურად **ა. დ.** ვამორრევა დემონსტრაციულობით, თეგადღურობით, მისი გამოვლენება დამოკლებულია გარემოსპისუფარე ქეტიანზე. ამ შემთხვევებში, როცა ფსიქოგენური დეპრესია იღებს ეიტალურ ხახებს («გეტალაზღება», «ფიღეგაზღება»), **ა. დ.** მოკლებულია დემონსტრაციულობას.
- 4. **მამოწმეშერი** - **ა. аномалический**. აღნიშნება ზანდესტემა მდგომარეობებ და დაფორაობებ დროს. იგი ხშირად მქეველ აღმოცენდება და მთავრდება ძალით, შეზღოში ანგნით. ხშირია აგრესულ-დამანგრეველი შოქღებები. წყვეტლია ხაგოვანი ბოღეითი განცდები, მემზარავი პალეკონასიები და მიშება.
- 5. **პამეტიპი** - **ა. апанени** (ბერძ. paniceus - აგნება, გლანთანება). ხასიათლება უამრო დაშანერეველი და აუკოარესიული შოქღების ეპიზოდებით. ხშირად აღნიშნება ოღეოფრენაობა დროს.
- 6. **მამტარპერი** - **ა. атактический**. მამღნარეობს ეშტაზმა, ატეტაცება, გადჭარხებული ბენდიერების განდროს, შოკური და პანტომიმური გამოვლინებით. აუღებოფის შოქრობა არაგნებრებით, უტარებულა.
- 7. **მამტარპერი** - **ა. атактический**. ხშირად აღნიშნება კატატონური ანელოების დროს და მამღნარეობის უკყარი, იმპულსური არამოტივირებული ავთექების ფორმით აგრესულ-დამანგრეველი შოქღებით, ნეგატივობით.
- 8. **მამტარპერი** - **ა. апанени** (ლათ. paniceus - აგნება, აღელება, გლანთანება). იმპულსურ-აგრესიული გენდესიებით მიღნარევი აგნება ოღეოფრენებზე.
- 9. **პატარპერი** - **ა. атактический**. ხასიათლება უმზნო მანერული შოქრობით, ნეგატივისტური გამოვლენებით, შიარობით სკეროტიკით, შეგველებითი აგნებით (ერობიერაცია, დაკეპმირებელი მეგველება), იმპულსური ქვეებით. ამ დროს შეიძლება აღნიშნოს დახეულობა, პათეტიკური მართებები, არამოტივირებული ეგნება-განწყობა. აუღებოფის უამრო-მოსულელი ქეტიის დროს ლამარავი კატატონური-მეჭფრენული აგნე.
- 10. **მორღეგინებელი** - **ა. ауретический**. გამოირჩევა აუღებოფის შოქრობითი აქების გარეგნული მოწესრეებლობით, თანმდღერეობით და დასრულებლობით, მიუხედავად შოგორესის იქქარეხისა და გენდერებისა ასეთი **ა. ხშირია მათოღოფური აგექტის დროს.**
- 11. **მამამალერი** - **ა. аномалический**. ხასიათლება გნება-განწყობის აწევათ, შოქრობებისა და შეგველების აქქარებით, ასოციაციანა ხწრავი მიზნარეობით, **მამამალერი** **პამეტიპი** (იხ.), მიშისა და გესების გამოსახელებით. შიშინებოვანი გამოვლებების დროს იგი შეიძლება იყოს ქოსური, მოუქსინიებელი. **ა. მ. ს.** მოკვერე აიღებენ გერმანთან ფსიქომოტორული აგნება, რაც არამართებულია. იხ. **მამამალერი** **მამამალერი**.
- 12. **მამამალერი** - **ა. аномалический**. ელნიშება მეგველებით სფეროში მრავალსიგევაობით, ვერბიგერაციით, შეგველებითი დაკეპმირებლობით, შიშინების სიმპტომით, **მამამალერი** **პამეტიპი** (იხ.).
- 13. **მამამალერი** - **ა. аномалический**. ხასიათლება მეგნისტი შოქრობითი ავთეობით.
- 14. **მამამალერი** - **ა. аномалический**. აღმოცენდება ღრმაგაბრუებათ ეგნებზე, კომპაგური მდგომარეობის მღეარზე, ხასიათლება უწესრიგო, არაკოორდინირებული შოქრობითი საწოლას ფარგლებში.
- 15. **მამამალერი** - **ა. аномалический**. აღნიშნება ეგნებზე მღერეგულ სეგევაებში, აგაგრევი ავეტურ-შოკურ ხასიათს, ელნიშება პანსური ქვეებით, გაჯანგებელი, არამანდასახული გაქევეით. სინონ. **ა. პანმერი**.
- 16. **მამამალერი** - **ა. аномалический**. კლანტეკრა ზანდრობა, რომლის დროსაც ნორმალური ფსიქიკური ფუნქციონების ცვლილების გამოვლენებას თან ახლავს შოგორული გაატერება. ასეთი **ა. შეიძლება იყოს ავეტური, ან-ღოთი, პალეკონასიური, ან წარმოიშება ცნობიერების შეცდენის ან ღრმა უკუსტგობის ფონზე. ამოგო **ა. ფოს** ეკოლოგიკურ დროს ხშირად გამოიწვევება ის გერმია, რომელიც ასახება არსებულ ფსიქოპათოლოგურ დარღვევებს.**
- 17. **მამამალერი** - **ა. аномалический**. ხასიათლება უწესრიგო მოქმედებებით, რითმული შოქრობებით. ამ დროს ხშირია გარემომყოფა შიშართ წინააღმდეგობის გაწევა, აგრესიული ქევეები.
- 18. **მამამალერი** - **а. аномалический**. აღნიშნება პეტიტორული სინდრომის დროს და გამოირჩევა აუღებოფის უამრო ქვეებით. არამოტივირებული ემოციური გამოვლინებებით, სახის მანჭით და **ა. მ. (იხ. მამამალერი ტრამალე მამამალერი სანდრობა)** ამ შემთხვევებში, როდესაც მეზოიდინულითან ერთად სახიგა ბავშური ქვევა (ქრობითი სიკეების გაშოუნება), ღამარკობენ პეტიტორული-მეგნადურ **ა. მამამალერი**.
- 19. **მამამალერი** - **а. аномалический**. მიღნარეობს შოგორესის შეცდენის გამოვლინებით შეგველების იარემიქოთი **ა. მ. აქვს ქოსური, მეიერარე და უწევი ხასიათი, რაც წამავს პიერკანტების მეგველების არარეობის ეკოპ ასეთ აგნებას უწოდებენ იმუნებში. მიზნარეობა შედარებით ხშირია.**

**პამეტიპი** - **а. апанени** (ლათ. paniceus - თაგის გინის ხეველები). თაგის გინის ხეველების თანდაყოლილი არარეობა. **პამეტიპი** - **а. апанени** (ბერძ. **а.** - უარყოფა, ღათ. **მამამალერი** - **ენა**). ენის უქონლობა. ერთობ იშვიათი თანდაყოლილი

ანოზალია. მიუხედავად ასეთი პათოლოგიისა, პირის ღრუს სხვა კუნთების და განსაკუთრებით ქვედა ტუჩის გაფარჯიშების შედეგად შესაძლებელია მეტყველების (ბანაგი) უნარის მიწვევა.

ბმლ-პლბმცმპ - аггллмлмлмл (ლათ. agglutination - შეწყვეტა). სხედასხვა ანრთა და სიყვანათა ფრამენტების შეერთება. აღინიშნება მიზოფრენის ღროს და საუფელად უღვეს ნეოლოგიზმების წარმოქმნას. გამოხატულია აგრეთვე მეტყველების ქერქული დაზიანების დროს პარაფრენების სახით. სინონ: ბმლბმცმპლბმც.

ბმწმწმ - аггллм (ბერძ. α - უარყოფა, βm - შეწყობა). ნათელი ენობიერების ფონზე გრმობითი ანალიზირებისს სერიფერული ნაწილის დაზიანების გარეშე წარმოშობილი საგანთა, მოვლენათა, საკუთარი სხეულის ნაწილთა აღქმბ სრული ან ნაწილობრფო დარღვევა გრვლება უპირატესად მარცხენა ჰემისფეროს თხემისა და თხემ-ეკვა-საფეთქლის მიღამოს დაზიანების დროს.

ბ. ბმწმწმპმ - a. agyulm. გამოვლინება ნაწმობი ხმების და ხმაურის, შესიკალური მოციეების, სიყვების დაზიანების დარღვევით. გოგალურ აქუსციკურ ანონისას უწოლებზ სულიერ სიყრეს. სინონ: ჰმწმწმ ბმწმწმპ.

ბ. ბმწმწმპმ - a. agyulm. ავადმყოფის შიგრ ნაწმობი გემოს შერვისს უნარის დაკარგვა.

ბ. ბმმბპმსპ - a. agyulm. ავადმყოფი ვერ ახერხებს ხაკუთარი ან გამოშკველვისს თითების დასახელებას. შუღის დასბმბმ-შმღმღმრბმ სმღმღმრბმ (მბ) შეზადვლბობაში.

ბ. ბმღმღმღმღმღმ (პ)ბმბპმ - a. agyulm (Lissauer H., 1889). ნათელი ენობიერების და შენარწუნებელი მხედვლობის ფონზე ავადმყოფი მოშლილი აქუს მხედვლობის სინთბ-ანალიზის უნარი (Lissauer H., 1889). არჩევის შემღრ სახეებს: 1. აბერეკეფიული, ავადმყოფი ვერ არჩევს გამოსახულებას, ვერ აღქენამს მის ელემენტებს მთლბანობაში; 2. ასოციაციური, ავადმყოფი არჩევს საგანთა გამოსახულებთ სგრუქურას, შავრამ ვერ დახელებთ მას; 3. სხეულობრიფი, გამოვლინება შაკრფების (საგანთა ცალკეობა აღქმბ), შაკრფისის (საგანთა შემქირფულად აღქმბ) და შეგამორფისის (საგანთა კონტურების აღქმბის მოშლა) სახით. ტობტლურ ბ. მ-ს უწოლებზ ძელდერ ხმრბმავეს. აქვე ერთიანდება აღქმშავ - ასობა შეყნობის დარღვევის ხარჯზე (იხ. ბმწმწმპ).

ბ. სმამბზმ - a. agyulm (Bodamer J., 1947). ნაწმობი ადამიანის სხვის შეყნობის უნარის დაკარგვა როგორც უშუალოდ შერვისას, ასევე ფოგოსურათებზე. სინონ: ბმწმწმპმწმპ, ბმწმწმპმ სმამბზმ.

ბ. სმწმწმ - a. agyulm (Paterson A., Zangwill O., 1945). ობიექტი ანონის ფონზე. დარღვეულია სიყრფობრიფი ორიენტაციია და საგანთა განვლბებისა და მათ შორის მანძილის აღქმბ, გრვლება ენის თხემ-ეკვისს ლოკალიზაციის ორიგანული დგზიანების დროს. სინონ: ბმწმწმპმწმ-წმბპმბმბმ ბმწმწმპ, სმამბზმბმბმ სმამბზმპ.

ბ. სმწმწმწმწმ - a. agyulm (ფრანგ. simule - ერთდროულად, ლათ. simul - ერთად, ერთდროულად). (Poppelstein W., 1923; Wolpert J., 1924). მიუხედავად იმისა, რომ ავადმყოფი შენარწუნებელი აქუს ელემენტი საგნების ობიექტების, სურათების შეყნობის უნარი, მას დაკარგული აქუს მათი თანმიმდევრობითი და სიგუაყური გაერთიანების შესაძლებლობა. ნაზობატელი დომინანტური ჰემისფეროს ქუვის წინა არეების დაზიანების დროს.

ბ. სმწმწმ - a. agyulm. იხ. ბ. ბმწმწმპმ.

ბ. ბმბმბმწმ - a. agyulm. გამოხატულია საგანთა მილიანიობის შეხებით აღქმბის დაკარგვა, თუმცა შენარწუნებელი ფორმის, მასის და გემუარტარის აღქმბა. განსხეადება ანქელფორმობობა (ობიექტის გემუარტარის მისი მასისა და გემუარტარის შეყნობის დარღვევა) და ამორფონობობობა (ობიექტის ფორმის აღქმბის დარღვევა). სინონ: ბმბმბმწმ სმამბზმპმ ბმწმწმპ.

ბ. ბმმბმბმბმ - a. agyulm. გამოხატება გეოფილის შერმწმების დაკარგვით.

ბ. ბმწმწმბმ - a. agyulm. საგანთა და ნეთიერებობა ენოსეთი შეყნობის უნარის დაკარგვა.

ბ. ცაღმბმბმბმ სმწმწმბმ - a. agyulm (Hobbes G., 1919; Brain W., 1941). არაყერბალურ ცაღმბმბმბმბმბმ (ობიექტი, ცაღმბმბმ, აქუსციკური) შარცხმწმწმწმფი აღქმბის მოშლა. გამოხატულია შარცხმბ ჰემისფეროს თხემ-ეკვისს დაზიანების დროს. შერის აბრქსულ-დამწმბრთი სინდრომის სგრუქურაში.

ბმწმწმ - аггллм ორგანიზმის დაყეთი შეზადვლებელი ძალების დაზიანებრებელი აქციობობა, რაყ უშუალოდ წინ უსწრებს კლინიკურ სიყვლად.

ბმწმწმ-ბმბმბმწმბმბმ - аггллм-аггллм-аггллм (ბერძ. ბმბ-საწინააღმდეგო, აგმ-ბმბობა) ნეთიერებობა, რომლებიც იწვევის ისეთივე ენექტს როგორც სხვა ნეთიერებობა და ამავე დროს ეწინააღმდეგება ამ ნეთიერებობის სხვა აგონისტების მოქმედებას. სინონ: ბმწმწმბმბმბმ ბმწმწმბმ.

ბმწმწმბმ - аггллм (ბერძ. agnostos - მეგოქე, მოყვლი). 1. კუნთებობ-აგონისტობ, რომლებიც დებლობს მონაწილეობას ერთფერობან მობრბობაში. 2. ფარმაციოლოგიაში ნეთიერებობები, რომლებიც მოქმედებს საყვაციურ რექტებობებზე და იწვევის ერთმანეთის მსგავს ბიოლოგიურ ენექტს, უმეტესად მსგავსულირებებს, იშვიათად - დამორკუნებულს.

ბმრბმბმბმ - аггллм (ლათ. agere - დაბმბმბ, გუარესება). ავადმყოფის შიგრ არსებული დაავადების დაბმბმბმბმულად წარმოქმნა. ა. შეიძლება იყოს აქტიური, პასიური და პათოლოგიაური, აგრეთვე გაცნობებრებელი ან გაყვსობებრებელი.

ბმრბმბმბმბმ - аггллм (ბერძ. agnathos - კითხვა, წერა). ტრამბიკულად გამოართლი შეცველებების დარღვევა. არჩევის: 1. ა. აზარესულად, რომლის დროსაც არღვევა მეცველებად და წერა. გამოხატულია სენსორული ავამბის დროს; 2. ა. ემბმბმბმბმ, რომელიც შევის ნაწილობრიფი მოგორულად ავამბის სგრუქურაში. ამ დროს გამოხატულია მეცველებების გაღარბება, კტულფრფული სტილით მეცველებობა (ფარფონობობობა). ავადმყოფი მეცველებს მბრთლად არსებითი სახედობით. გრვლება დომინანტური ჰემისფეროს ქერქის შულ-საფეთქლის მბლამს დაზიანებისას. მსგავს. მოვლენები ვითარდება მიზოფრენის დროს და ხსიათდება არამდგრადობით და ეპრობეკლობით.

ბმრბმბმ - аггллм (ბერძ. grapho - წერა). ინტელექტის დაქვიეთობისა და მემო კიდურებში კოორდინაციის დარღვევის გარეშე წერბს უნარბს დაკარგვბ. განასხეადებზ ავამბიურ, აბრქსულ, კონტრუქტუალ, მოგორულ ვარიანტებს.

ბმრბმბმ - аггллм (ლათ. aggressio - თავდასხმბ, შეწრა, ძაღალბობა). ინდვიდობა განწვიობა ან ქეღობობა, მიზმართული ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური მიანის მიყენბებისაკენ. ა. შეიძლება გამოვლინდეს ინდივიდობარტი ან კოლექტიური ქუვის სახით. შეიძლება მიმართული იყოს სხვისაკენ (პეტროფარგვობა) ან საკუთარი თვისაკენ (ატკთარგვობა). კარტე ჰორნი (K. Horney), რომელმაც ფსიქოლოგიაში შემოიღებნა გერმინი ბ, თვლიდა, რომ იგი არის უსიქოლოგიური თავდაყვის ერთ-ერთი ექენმბმ. არ არის საეადლებული ა. მიმართული იყოს პირდაპირ გამბმბმბმბმბმ. კ. ჰორნბს





**აბტონარობისმი** - аутономия (გერმ. Autonomie). ფსიქოანალიზში: 1. ისეთი სექსუალური ქცევა, რომლის დროსაც სექსუალური საბოძენება მიიღება მხოლოდ საკუთარი სხეულის ნაწილების საშუალებით, ყოველგვარი გარე დახმობის გარეშე. მაგ. მასტურბაციის დროს; 2. მოუწყობებელი ინფანტილური სექსუალური ქცელობა, რომლის დროსაც გამოხატულია ნაწილობრივი დტოლვა ერთი რომელიმე ორგანოს ან რომელიმე ეროგენური ზონის მიმართ. დახმობილება მიიღება მანძივს, ყოველგვარი გარე დახმობის გარეშე. სინონ: **აბტონარობა**, **აბტონარობისმი**, **აბტონარობისმი**.

**აბტონარობისმი** - аутономия (ბერძნ: αυτο-თვით. ნიძი - ეტი, გამოძახილი) (Stenak E.). ავადმყოფის მიერ საკუთარი სხეულის, ფრანგის, შიძობების მრავალგვარი შეხანეური გამოერება. სტერეოტიპის გამოვლინება. აღნიშნება ძირითადად კატატორიული მიმოერინის დროს. აბტონარობა აბტონარობა და აბტონარობა.

**აბტონარობისმი** - аутономия (ლათ. viscera - შინეულობა, ბერძნ. kōpōn - ეუერობა, თვალვალის ვალეულება) (Парацоди В. 1965). ერე აბტონარობა, პრეკორეული ორგანობის შინე. პალეონიციოპია სიხეულობა, დინამიკობობ. სეხეულობა შინეულობის დედირობა. ავადმყოფობა აბტონარობის საკუთარ სხეულს რედიეუერად, თითქოს მათთან არიან კოუბალი არსებობა, უხე სხეულები, რომლებიც არლეუენ მინანგინ ორგანობის მოქმელებს. მოკერე მინანგინ დრეუბი წარმოადგენს დამატაკული მოუენების ადგილს (ყუხელი მუეულები, ფილეუები ჩოუელია კაბალი). შეუერი ფახედა არ არსებობს, დამასიათებელია პალეონიციო სურათების სწრეფი ცლეა. დაავადების მიძინარობაში აბტონარობისკოპიული პალეონიციები იყელება ჰეიმარობი შეეელობობით პალეონიციობით. აბტონარობა და აბტონარობა განხეივებით, ორეულის შეერნება არ არის გამოხატული. აბტონარობა მოუერინისა და თვის ტეხის ენეუადობის კაბით მიძინარე ორგანული დამანების დროს.

**აბტონარობისმი** - аутономия (ლათ. viscera - კანტრაცია, დასაქრეობა, ფილეულობა, დინამიკობობა, აბტონარობისმი რედიეუერ სექტებებში (მეორე ხეულები სათესლეების და აბტონარობის სათესლეების და სასქესო მისი მოცილება). მოკერე გეულება პარანოლიდი მიმოერინის დროს სასქესო სეურობის და კეუერებული უიეუერესად მძიმე ხოლეით გრეების არსებობისას.

**აბტონარობისმი** - аутономия (ბერძნ. αυτονομία - თვითწარმოქმნა). ცალკეულ ორგანობა და სისტემების ფუნქციებს შეხრელება უნებლიე, აბტონარობა, გრეგანი ხილეუი იმპულსების გარეშე გრძობების, მოქმელების, აბტონარობის, წარმოგეების, წარმოგეების და სხეულისა სხობი.

**აბტონარობისმი** - ა. აბტონარობა (ლათ. autotonia - მოძრაობა). ცნობიერება ხინდესობი შეუელის მდგომარეობა. სასათობა ხანგრძლიე პერიოდის განმავლობაში მოძრაობით და მოქმელებით აბტონარობის შესრულებით, გარეგნულად მოქმელებული, მიმანდასახული მოქმელებებით, შეხეგობი აბტონარობით. გეულება ებლეუსური გულკრის შეხეგობი პერიოდში ან ებლეუსური ეკეუადობის სხობი. **ა. შეხეგობი (1939)** მიერ აბტონარობა ებლეუსური ავადმყოფის გამოვლინების თვისებურებში.

**აბტონარობისმი** - ა. აბტონარობა (ლათ. ad - თან, ხიძი - გერტიანობა). ფსიქიკობა აბტონარობის სახე შეხეგობის განმავალი სხეულები პათოლოგიური მოუენების მიხედვით აბტონარობის, შესსეების და ინტეგრების სხეულებში. მსგეესი პათოლოგიური მოუენების, ავადმყოფის აბტონარობა, აბტონარობის სხეულები, გარეშე შეხეგობის შეეეობა (აბტონარობა, აბტონარობა). გამოხატება, ნაბალეე მოგონებები და სხეუ. შედის კანდისკულერაბობის სინდრომის სტრუქტურაში.

**აბტონარობისმი** - ა. აბტონარობა. ფსიქიკობა აბტონარობის სახე, გამოხატული ავადმყოფისათვის ებლეუსული, გარეშე შეხეგობის წარმოშობი ებტონარობის სახით.

**აბტონარობისმი** - ა. კანტრაცია. გამოვლინება პათოლოგიური შინეულობის კრიტიკის სრული მოსაბობის ფონზე. აბტონარობის კანტრაციური შეხეგობის და კატატორიული აბტონარობის დროს. ეკანდისკული შეხეგობა გამოვლინდება ებლეუსულ-დამანგრეეული ებტონარობით.

**აბტონარობისმი** - ა. აბტონარობა (ბერძნ. idea - წარმოგენა, აბტონარობა). იხ. **აბტონარობისმი** **აბტონარობისმი**.

**აბტონარობისმი** - ა. აბტონარობა. ხასიათობა მოქმელებით სეურობა გამოხატული აბტონარობით. სინონ: **აბტონარობისმი**, **აბტონარობისმი**, **აბტონარობისმი**.

**აბტონარობისმი** - ა. აბტონარობა (ლათ. vis - ძირი). წილეობა რეეუეების გეულები, ნორმობა დამასიათებელია ეილე ხეულები აბტონარობის. ო. ო. რეეუე პათოლოგიური რეეუეების, გამოქმედა ხელები პირის კუბის, ნიკაის, ცხვირის სერვის, ხელების შერინილი გეულობით (იხ. **აბტონარობისმი**, **აბტონარობისმი**, **აბტონარობისმი**, **აბტონარობისმი**). მის საეუებლად ელეუს კორტეუს-სეკორეიული კეუერების დაწეეება. გეულება სენილეური კეუასესტობის და ებტონარობის დამდის დროს.

**აბტონარობისმი** - ა. აბტონარობა. ფსიქიკობა აბტონარობის სახე, მიძინარე სენსეობათიური შეხეგობით.

**აბტონარობისმი** - ა. აბტონარობა. გამოხატება ფსიქიკობა ბროტების, აბტონარობის, წარმოგეების, შეხეგობის და მისწრაფების, მოქმელების წარმოშობის გეულები. თან დეეუს დარწმობა, თითქოს მთელი უსიქიკობა ებტონარობა გარეშე მალს. წარმოგეების კანდისკულერაბობის სინდრომის ძირითად ელეუებას.

**აბტონარობისმი**, **აბტონარობისმი** **აბტონარობისმი** - аутономия (ლათ. vis - ძირი). წილეობა რეეუეების გეულები, ნორმობა დამასიათებელია ეილე ხეულები აბტონარობის დროს. ხათილე ცნობიერების ფონზე ეერბალეუ პალეონიციო თან ერეობის ფსიქიკური ავადმყოფისათვის დამასიათებელია კანტრაცია კანტრაციური ებტონარობის მიხედვით. გახინდობის ფინანგინ, ისრია მოხეუება ან შეეუება, ნაბალეე აბტონარობა, აბტონარობა გეულები სიქრეუები, აბტონარობა გეულები, ებტონარობა განხეივება, გარეშე ხათილე წარმოშობილი სინდრომი და მოქმელები შეხეგობის ბოლეობი ილეების გარეშე.

**აბტონარობისმი** - ა. აბტონარობა. კანტრაცია. გამოვლინება დროს ავადმყოფის მიერ მიმანდასახული რთული გარეგნულად მოქმელებული ებტონარობის წარმოგენა.

**აბტონარობისმი** - аутономия (ბერძნ. αυτονομία - გარდაეუენება). ავადმყოფის თვითაქმა სხეულები აბტონარობის, ებტონარობის, გარდაეუენების სხობი (მერ: მოდგა ინტეგრაციური ფსიქიკობა და ფრეგოლის ხანტონარობა). სიქრეუება პარანოლიდი მიმოერინის და მოეუადობის ასეუი განეუადობელი ბოლეობი ფსიქიკობის დროს.

**აბტონარობისმი** - аутономия (ბერძნ. vis - ძირი, თორიქ - ფონობა, ორია - შეეუელობა). საკუთარი სხეულის ფრეგინის ან ნიძის დამანგრეული აბტონარობა. შესახებ აბტონარობის მდგომარეობა ან დარდაეუება, ებტონარობა

ხსიათს (ხშირად ჩაიძინებს ღრს). ა. ტოტალური - ხსიათდება საკუთარი სხეულის ევლილებების შეგრძნებით, აღქმა გადაღებულად (მეკროსოპია) ან შემყრებულად (მეკროსოპია) ა. პარცალური - ხსიათდება სხეულის ცალკეული ნაწილების მიმის ევლიების შეგრძნებით. შესაძლოა ერთდროულად სხეულის ნაწილის ან ერთი რომელიმე ნაწილის ცალიებელი, მეორის - შემყრებელი აღქმა. ხშირად აღმოუჩენება თვალის დახვევისას და ქრება თვალის გახელისას. იხ. ხსენებთ ხმამს კვლა.

**აბსორბანტიზმი** - абсорбационизм (ბერძნ. autos-თვით, აბსორბ-სახელი). აბსორბირება აფაზის სახე, გამოვლინება სახელების წარმოშობის გაძნელებით.

**აბსორბანტიზმი** - аусрбационизм (ლათ. observatio - დაკვირვება). თვითდაკვირვება, საკუთარი სხეულისადმი, მისი ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებებისადმი აწვეული ყურადღება ავადმყოფური გამოვლენების ძიების მიზნით. შესაძლოა იგი აღსმორთოფობის ან დისმორფოზისის სიმპტომი იყოს. გვხვდება (განსაკუთრებით საწყის სტადიაზე) ნიკოტინურილი ნევროზის და განვითარების დროს.

**აბსორბანტიზმი** - аустроориентационизм (ლათ. oriente - აღმოსავლეთი). საკუთარ პიროვნებაში ორიენტირება. შტრ.: ალორეზიზმი ორიენტაციას. სინონ.: აბსორბანტიზმი ორიენტაციასში.

**აბსორბანტიზმი** - аутопластический абсорбизм - аутопластический - аутопластический (გერმ. Autoplastisch-Alloplastisch). ფსიქიანალიზში: გამოიყენება ფსიქოლოგიური ევლის თეორიაში შეგუების რეაქციის ორი გიკის აღსანიშნავად: 1. მხოლოდ ორიგინალის შევლა; 2. ვარგობის შევლა.

**აბსორბანტიზმი** - ауторелаксация (ლათ. relax - ელეწება). ავტოგენური ვარჯიშის მეთოდი, რომელიც მდგომარეობს ჩონჩხის კუნთების მოღწებაში. იხ. შულცის მეთოდი აბსორბანტიზმი პარკოზისში.

**აბსორბანტიზმი** - аутоцензура (გერმ. cenzur - საღიზმა), სექსობრივი გაუკუღმარების სახე, საკუთარი თავისადმი მზარბოული საღიზმა. ხამოხიზმის გამოვლინება. იხ. პარკოზისში.

**აბსორბანტიზმი** - аномализм (ბერძნ. anabiosis - ნიშანი, სიმბოლო). ანამეტიკური პალეონტაციების ეარიანტი; გამოვლინება აქტალური აზრებისა და განცლების სიმბოლო წარმოშობის სახით.

**აბსორბანტიზმი** - аутоаузия (გერმ. skopos - ევტრები) (Férs Ch., 1891). სხეულის სქების აზლის ფორმა, მიეკუთვნება სომატურ-ფსიქიკურ დებუზიანალიზაციას. ხსიათდება საკუთარი თავის სიერეში დაწახით, რითაც განსხვავდება მენინგერ-დერმეტიკალის შიგნისკონსტრუქციისგან, რომლის დროსაც ავადმყოფის მიერ ორეული აღიქმება საკუთარ სხეულში. განსხვავდება აგრეთვე იქცის გარეუბნისაგან - ფსევდოაგიტაციის კონსტრუქციისგან. ავადმყოფი უნიკიან აგრეთვე საკუთარი სხეულის სიმბის დაკარგვის, სიერეში ფრენის, ვარდის შეგრძნებას. ვხვდება თავის გინის თხემ-ქუეის მსაღმის ორგანული დაზიანების, აგრეთვე ევსიხილური დაზიანების დაზიანების დროს.

**აბსორბანტიზმი** - аутоаузия (ბერძნ. topos - ადგილი, გნოზა - ცოდნა, სწავლება) (Pick A., 1908). საკუთარი სხეულის მოღაანობის ან ცალკეულ ნაწილთა თანაფარდობის წარმოღვნის დაარდვევა. ავადმყოფებს არ ძალუბთ საკუთარი სხეულის მღებარეობის სწორად აღქმა, ეერ ცნობენ და ამიგომ არ შეუვლიათ სხეულის ნაწილთა ჩუენება, განსაკუთრებით დაზიანებულ მზარბს. ცნობილია ა-ის სხვადასხვა ვარიანტები - ა. სხეულის ნახეერისა, თითებისა, ორისისა და ა.მ., მარჯვენა-მარბუხისა გარბევის უნარის დაკარგვა. დაზიანებისთებლია თავის გვინის სუბლომინატური კემისფერის ქერქის დაზიანებისათვის.

**აბსორბანტიზმი** - аутоаузия (ბერძნ. physis - სიყვარული). იხ. ნარკოზისში.

**აბსორბანტიზმი** - аутоаузия (ბერძნ. autochthoni - ადგილობრივი, იქ დაბადებული). ფსიქიანალიზში: გარე ფაქტორებისგან, მოვლენებისაგან დამოუკიდებლად აღმოუჩენული. მატე, ავტოტონური იდეები (Wernicke C., 1906), აზრები, რომლებიც ავადმყოფიში აღმოუჩენდება რეალური ობიექტის, სტრუქტურების გარეშე და ავადმყოფის მიერ განიხილება როგორც ფსიქიკური, უბეჭვად პარზობრივი ან გლეჟიატური შემოქმედებით შექმნილია, მითაცონებულა. ა. აზრი ავადმყოფის მიერ აღიქმება როგორც უცხო, მისთვის გაცუებარი მოვლენა. ფსიქიკური ავტომატიზმის კანდენციკ-კლერანზის ხანდრობის გამოვლინება.

**აზნაში** - азфия (ბერძნ. asphes - ნათელი). გაურკვეველი გამოთქმით შეტყუელება.

**აზროვნებისაზნი** - аэоооооооо (ბერძნ. zoo - სიყუბელი, aspena - სათესელ სითბე). სპერმაგომოიდების მრდასრული ფორმების არარსებობა სპერმაში.

**აზრები აპიპტაბიზმი** - азыи азыоооооо. აკვალტბული მდგომარეობის (ობსესიების) სახე აღმოუჩენდება ავადმყოფის სურვილისაგან დამოუკიდებლად, ავადმყოფის მიერ აღიქმება როგორც ავადმყოფური, არასპირტი. მათი დათრეუნის შეუბლებლობა აისახება ავადმყოფის ბუნება-განწყობაზე, იწვევს მის დეპრიმირებას.

**აზრები ბაპიპტაბი** - азыи убоаооооо. ანქანებული აზროვნების, იდეალთა უბრბობის გამოვლინება. აღინიშნება მანიაკალური მდგომარეობის დროს.

**აზრები კონტრასტი** - азыи контрасти. აკვალტბული აზრების სახე, გამოირჩევა რეალურ სიტუაციისთან შეუსაბამობით, რაც გამოირიყვას მათ განზობრივებებს.

**აზრები ნაპალადი** - азыи алаааааа. ვარგება შემოქმედების შედეგად აღმოუჩენებული ავადმყოფისათვის უცხო აზრები, ხშირად ვლინდება წარბეული აზრების ჩანაცვლებით. სიმპტომი შეღის კანდინსიკ-კლერანზის სინდრომის სტრუქტურაში. სინონ.: პალეონტაციისში ფიქსიზმი, პალეონტაციისში აბსტრაქტული ძალგაზრბისა. აზრები უბრბობაში.

**აზრები სალანკლავი** - азыи хуаааа. აზრები, რომელიც ეწანადმდეგება პირბეგების მორალურ-ეოიკურ დაყენებებს, მის შეხედულებებს, მსოულმხედულობას, ახლოლებითან დამოკიდებულებას და ა.მ. ავადმყოფი მძიმედ განიხილან მათ არსებობას.

**აზრები სუბილერა** - азыи суаааааааа. აზრები თვითმკვლელობის შესახებ, შეღის მღირებული ან ბოღითი სინდრომის სტრუქტურაში. ას. შეიძლება აღნიშნუბოღურ ფსიქიკურად უანმრთელ პირებს შექმნილ გამსოვულ სიტუაციისთან დაკეშირებით.

**აზრები უბრბობაში** - азыи азыааааа. იხ. აზრები ნაპალადიში.

**აზრები წარბეული** - азыи отаааа. ავადმყოფის განცდა, თითქოს ვარგედან შემოქმედებთ მისი აზრები შეიყვალა სხვა, მთაცონებული აზრებთა. სიმპტომი შეღის კანდენციკ-კლერანზის ხანდრობის სტრუქტურაში.





- ა. დირემისტული - მ. деремистическое. იხ. ა. ქაბაძე შპრ.
- ბ. მსურბული - მ. мурбинское ამროვნების სახე, რომელიც უმყარება ოხიეგის თვისებების და არსებულა კანონზომიერებების აღმოჩენა. შის ნავალითა შექნაურებაში ფუნდამენტური გამოკვლევა.
- ბ. მსპალსარინენ-მომტვეპმომი - м. маллшио-дештенишо ამროვნების სახე, ამოყანის გადაწყვეტა ხელა სიკვაციის რეალური ფიზიკური გადაშეშეშებით, ოხიეგის თვისებების ამრობებით. ამასთან ერთად აღაიხანს აგრეოვე ხასიათებს შპალსარინენ-მომტვეპმომი (იხ.) და მტტმშარ-ლშმშარ (იხ.) აზროვნება.
- ბ. მსპალსარინენ-სატმშარ - м. маллшар-ინარიшо ამროვნების სახე, დაკავშირებული სიკვაციის და შასში მიმდინარე ცელილებს სატოგან წარმოდგენათა.
- ბ. მანშინი - м. муса (ძველი რომაული მითოლოგიით, იანსი - დროის, დასაწყისის და დასასრულის ერთიანობის წინააღმდეგო მხარეს მიმართული ორსახიანი ღმერთება). ურთავრთბა წინააღმდეგო, ურთავრთბამოშრთბაე ამრების, ცნებების, სახეების ერთდროული გამოყენება. რატენგრებს (Rothenberg A., 1971) მიხედვით, დამახასიათებელია შემოქმედებითი აზროვნებათაგან.
- ბ. მინტრული - м. минтрос. აზროვნება და დიდგეგას ხანდრთბებს უგუო, რომელთა ძირითადი ნიშნბა უსიქიური პროცესების არასაკმარისი აღნიშნბა. ა. ს. მკეკელიძე ა. ბლანტი, ა. პერსევერცოული და ა. სტრეოტაძე.
- ბ. მინტრული - м. минтрос. იხ. ა. ს. მკეკელიძე.
- ბ. მინტრული - м. минтрос. მტტმშარ (იხ.) დამყარებული ამროვნების სახე, ხასიათდება სწრაფი მიმდინარეობით, მინიმალური შუკლეობით და გააზრებით.
- ბ. მტტმშარ - м. катитиническое. იხ. ა. ს. მკეკელიძე.
- ბ. მტტმშარ - м. катитиническое (ბერბ. kaitiniche - სულით დაეება). ამროვნება, რომელიც გამოწვეულია წარმოდგენების აუქტერად დაგვირთული კომპლექსებით (იხ. მტტმშარ, მტტმშარ მტტმშარ). აღინიშნება პარანოული განხილვების დროს. სინონ: მანარბს მტტმშარ (მტტმშარ) აზროვნება.
- ბ. მტტმშარ - м. конкретное. აზროვნება, რომელიც უყრდნობა კონკრეტულ ცნებებს. პათოლოგიურია იმ შემთხვევაში, როცა უსიქიური მოქმედება შემოიფარგლება მხოლოდ კონკრეტული ცნებების წარმოდგენით და არ წარმოადგენს აბსტრაქტული ამროვნებისაკენ მიმავალი გზის ეტაპს. ამ შემთხვევაში იგულისხმება კუკუსტგობა.
- ბ. მანარბს - м. манарбное. არქაული აზროვნების სახე. დამახასიათებელია ფანტაზიები, ცრუწმენითი წარმოდგენები რაღაც შეგნებრივ მაგიურ ძალებზე.
- ბ. მანარბს - м. манарбное. ხასიათდება ავადმყოფის ცნობიერებაში მისთვის უცხო მინარბის ამრების უნებელი აღმოყენებით. აღინიშნება კანდალ-კულდრამბის ხანდრთბის სტრუქტურაში.
- ბ. მანარბს - м. манарбное. დამახასიათებელია ყურადღების მიმწვდომლად გამოხატობა არასაკმარისი, უნებლებათა არსებობიერება და აზროვნებითი პროცესის მიზნის უმწვდომ ცვლა. აღინიშნება როგორც მოგიერთი უსიქიური პათოლოგიის (მღვთის მანიაკალური ფაზა იდეათა ურთობითა), ასევე თავის გეინის მოგიერთი ორგანული დაავადების (პანტრეტონის ჭირვა) დროს.
- ბ. მანარბს - м. мандрос. აზროვნების გასლეჩილბის სახე. ავადმყოფი თითქოს თავის არიდებს საკუთარ ამრებს, მათგან გაუსოხებელია. უსიქიური ავადმყოფობის გამოიწვევბა.
- ბ. მანარბს - м. манарбное (ბერბ. paralogos - უგურია). აზროვნება დეჟაქტური თავის წინაპარობაში, მტიკებებში, მოგიერთი მიმტმობრივ თანაფარობაში. წარმოადგენს იმდროულ ლოგიკას-საკმარისი ინტელექტუალურ-მსჯელობითი მრავლებების პროცესში. პათოლოგიური მიდრეკილება პარალოგიზმბსადმი. მანარბს - არასწორი, არც განსკო. ლოგიკური მართლბა დასკვნება, რომელიც დაშეშებულია უნებლიეთ და წარმოადგენს ლოგიკის კანონების და წესების დარღვევის შედეგს (Комарков Н.И. 1975). ა.პ. ავადმყოფებში აიხსნება ამროვნების ორი ობიექტის იდენტიფიკაციის პარტიკული კანონების შესაბამისად მათი ნიშნების ნაწილობრივ დამთხვევისას (Domarus E., 1923, 1924, 1927; Зиниц К., 1973, 1988). აღინიშნება მიმოფრენის და ამროვნების პარანოული განხილვების დროს.
- ბ. მანარბს - м. мандрос. აზროვნების სახე, ხასიათდება ავადმყოფის ცნობიერებაში რამე ამრებზე, წარმოდგენებზე, ობიექტებზე, სიკვებზე ან ფრაზებზე მხედრებისადმი მიდრეკილებით სიკვაციის და მოქმედების მიზნის შეცლის მიხედვად. აღინიშნება თავის გეინის უბეში ორგანული პათოლოგიის ფარგლებში (გამოხატული ცერებრული ათროსკლეროზი, მოხუცებულობითი კუკუსტგობა, ლუკამიერის დაავადება, პიკის დაავადება).
- ბ. მანარბს - м. манарбное. ამროვნების სახე, რომლის დროსაც ისახება მისანი, გამოშეშებულია ამ მიზნის განხორციელების ცვლა და ეტბე. ხშირად ახსტრესებთ თორთულ აზროვნება.
- ბ. მანარბს - м. манарбное. აზროვნება, რომელიც უყრდნობა პრინციპულ, კონკრეტულ მსჯელობას არასაკმარისი განხორციელების, აბსტრაქციების, დარბიბი ლოგიკური ოპერაციების დროს. დამახასიათებელია ოლიგოფრენიისათვის.
- ბ. მანარბს - м. мандрос (ფრანგ. mandros - მსჯელობა). დამახასიათებელია უსაგო, უნაყოფი, იმპრობობისადმი მიდრეკილება, რომელიც უმყარება ზრდებზე ფორმალურ ანალითაგან. გამოხატობა რეალურ სიკვაციისათვის შეუსაბამო, არააღქმებური ბრბობით, მრავალსიკვანიანობით და მსჯელობის ხანდაზრებით. ამროვნებითი მოქმედების გზიანი გადაღის უკანა ოლბზე, ხოლო წინ გამოიღის გუნდნება განსჯისადმი. მიმოფრენის დროს რეზონანობობა გამარობებელია დაავადებისათვის დამახასიათებელი თავისებურებით პაროენულ-მოცაყეაურ სეფროში. იგი აგრეთვე აღინიშნება ეპილეპსიის, ოლიგოფრენიის და თავის გეინის რიცხვითი დაავადების დროს, სადაც უმეტესად ადარებს კომპლესიურ ხასიათს და მიმდინარეობს ინტელექტუალური უკმარისობის ფორმზე.
- ბ. მანარბს - м. мандрос. აზროვნება უყრდნობა ავადმყოფისათვის პაროენულად მნიშვნელოვან რთულ ხანდაზრდულ ხანდაზრდულ და ცნებებს, რომლებზე ხშირად გარემომცხოვრობის გაკუტბარაა. გამიორჩევა ნიშნობიერული თავისებურებით და ამათავს ავადმყოფის აუტისტურ პოზიციას.
- ბ. მანარბს - м. мандрос. აზროვნების სახე, ამროვნებითი ოპერაციებში გამოიყენა ცნებები და ლოგიკური კონსტრუქციები. ფუნქციონირებს ენის ბაზაზე და წარმოადგენს ამროვნების ისტორიულ და ობიექტიურ განვითარებას ფელაზე გეანდულ კტაბ.



სტიმულის გენერაციის დარღვევის შედეგი, რომელიც უორმირდება თავის გენიში შინაგანი ორგანოებიდან და ეკრემხად მძლვბული სიგნალების საუძვედმე (Port A.. 1975). ცნება **თანმე** შემოიღებულა მონაკოვის და შერის (Monakow, Moorg) შიერ ვ.წ. **ანსტრანტების მატრაციის** აღსანიშნავად ვირომ გაერთიანა ცნება **თანმე** და **თანმა** და გამოყო **თანმაშაურის სისტემა**, რომელიც, როგორც იგი თვლის, შეესაბამება ანსტრეტურ არანეიბივის, უსიქონალუიკოსების გატებით, ან წმინდა ინსტრეტურ აქტიუობას, ტრადიციული უსიქოლოგიით, თრშულა საწრისი თრშოიადებს შრეცითი მოსიხონილების (მიმშილა, თავდაუეა, გამრეალება) დაქმარყოფილებს დინმიქურ ტენდენტის, თანშური - აწვეეს საუეთიქური აუეტქური მდგომარეობას, სასიამონროს ან უსიამონროს. ცნება ახლსაა აბათიანობა.

**პალმომრეაზია** - **Альцистония** (ბერძნ. *Alcidia* - სასქესო ორგანოები). ხეჭუქადურს **ანსტრეტის** ავადმყოფური გამრეალება. უმეტესად გამოვლინდება მოხუცებულობითა ტქუასესტობის, ინელოუესური და ათეროსკლეროზული ეცილოლოგიის ფიქიქური აშლილობის დროს. სინონ.: **სატრმეაზიზმი**, **ნაშომრეაზია**.

**პიანსამის პირმრეაზი** **პიანსამარი** **ბაშუვანისათმის** - **Айзенка личностный типологический анализ** (Eysenck S., 1969). 7 წლის ასაკის შემოთ ბავშვთა გამოსაკევეად აბაგირებული კითხვარი. შედგება 60 კითხვისაგან. სასხებების ინტერპრეტაცია ხდება ინტრო- და ექსტროვერსიის, ნეეროტიზმის და ცრუობის შესაბამის.

**პიანსამის-შამბელპირმრეაზი** **ოსტრომარკო** **დმარკო** - **Айзенка-Миллигелберга истерическая депрессия** (Eisenman G., 1967; Spielherg U., 1968). იხ. **მეპრმრეაზი** **ოსტრომარკო**.

**პასტოვის** - **акатизия** (ბერძნ. *kathisis* - დასმა, დაჯდომა) (Hashkovec L., 1901). გარკვეულ პოზიში (შელომარე, შწოლიარე ან სხვ. მდგომარეობა) დიდ ხნის განმავლობაში ვარჩების შეუძლებლობა. ა ვებულება თავის გენის დროს რეგულური უორმაციის დაშინების დროს. შულის ექსტრაპირამილული ორგანული ან ნეიროლესიური სინდრომების შემადგენლობაში. ვებულება ე.წ. მთუქვენარი **ფეხების ხანდრომის** (იხ. **მობტაპ-მარმის სინდრომი**), **ტუპკანეულის**, **ტურპულერციის** და **დესკანეულის** სახით.

**პ. შომეპანსამი** - **а. психиял**. ნეაროლესიური თერაპიის შეწყვეტის შემდეგ განვითარებულია, გამოიხატება საერთო მოქვენობის ფუნქციონირებაში მომრეგული მომრეგობით. ნელა სასრულის დროს აღმოცენდება უსიამონროს შეგრძობები კანსა და ეუნთხვში, შინაგანი მოუსვენრობა და ეუნთთა დაჭიმულობა.

**პ. უმარკოვის** - **а. оцелашажения**. ნეაროლესიური თერაპიით გამოწვეული ექსტრაპირამილული დარღვევები. აკათიზის და ტუპკანეულის სგადიდან პარკინსონიზმზე გადასვლის დროს წამოიზება ავადმყოფისათვის მტანკველი მდგომარეობა. გამოიხატება სიარული და მოძრაობის დაუძვეელი მოთხივნილებით, რომელიც ეერ რეაქციადება პარკინსონული რიგილობის გამო.

**პასირეა** - **ახარეა** (ბერძნ. *καρος* - დროულად, თავის დროზე). აკეადატებული, თავშემაწყნელება, მოშახიერებული სტერეოტიკული შინაშრთა ვებულება პიკის და ავადების, ეთილმური ენცეფალიტის ქრონიკულ სგადიანში, პანენცერონის ქორის და პარკინსონიზმის დროს, ნეაროლესიური პრეპარატებით შეკრნალობის გართულების შედეგად.

**პასლქეა** - **кальциемия** (ლათ. *calcium* - თვლა) (Henschen S. E., 1919). არათმეტყუელი თერაპიების წარმოების შეუძლებლობა აის დროს შენარჩუნებული ციფრების რაგეტიკური ამოცრების და მათი კარნახის დაწრის უნარი. ვებულება მარცხენა პეისლეროს თხემის წილის კეროინი დაშინების დროს. არჩევენ **პარგელად** ა-ს (Berger H., 1924), რომელიც არსებობს თავისთავად, სხვა უნაღებსა ტურქული ფუნქციების დარღვევის გარეშე, და შორადეს, როცა მასთან ერთად აღინიშნება მესხიონების დაქვეითება, ავამიური სინდრომები და გამახალული პერსექურაციული დარღვევები.

**პასტაშის** - **акваталезия** (ბერძნ. *akataleisis* - ცოლდა). ავადმყოფის შიერ შისამი შინაშრთაშეწყვეტლებს გაუფხვრობა. ვებულება მწვეუე უსიქოშური მდგომარეობის ან გამოხატული სენსორული ავამიის დროს.

**პასტაშრეა** - **акатапафия** (ბერძნ. *akatapsia* - ჩაწერა). წყრას უნარას დარღვევა, რომლის დროსაც ორღვეა სიგვამი მარყულების ან წინადადებაში სიგვეების თანმიმღეობობა. გამოხატულია შეხლის წილის ორგანული დაშინების დროს.

**პასტაშრეა** - **акатаფазия** (ბერძნ. *kataphasia* - მტკიცება, თანშობა). ექსპრესიული მტყუენილების დარღვევა, გამოიხატება ავრამატიზმით და სინტაქური შეგვევების ორგანიზაციის დარღვევით. ვებულება ამბიცილობის დროს.

**პასტაშრეა** **სინდრომი** **შარსულსა** - **Аккерманна синдром прощания** (Аккерманн В.Л. 1936). ვებულება მიმოგრენიის უარებობით აღმოცენებული ვანგსატიქურ-კონფაზულაციური ბოღების დროს. ხასითდება უსიქურ პროყესების პარალელში, შიქოთენებისა და გაუქენების ფუნქციების არსებობით. ავადმყოფის პროლექციებში გამოხატვლილია აწმოს განხედა და იგი მამართლავა წარსულისაკენ. გამოვლინდება მსოი სიმპტომებით, როგორცაა: **სუვეე არსებულობა**, **ფეოშენი**, **ცრე ცნობა**, **არეულის აღქმა**, **პარანეულები**, **პრენების ფეოშენი** (რომლის დროსაც დროის ვარედა მოძრაობის წრეზე და შედმიად იყვლება აწმე და წარსულად). ბოღეთი ეახლთ კონსტრუქციის ხდება ავადმყოფის ბიოგრაფიის დაშინების ხარჯზე. ბიძიად ახლავს ეთიარა და ბიღეთი შეგალმინიური გენდენეობა.

**პასტაშრეა** **შენეოშე** **მიმშინეპანია** - **Аккерманна феномен прищания** (Аккерманн В.Л. 1936). იხ. **მიმშინეპანის უენეოშე**.

**პასტაშრეა** **შეპნეულობა** - **наблюдение сознания**. იხ. **შეპნე პამრეობი**.

**პასტაშრეა** **შეპნეობი** **შეპნეობი** - **наблюдение сознания**. მდგომარეობები, რომლის დროსაც გრძნობები, პრენები, შიხები, შიგონებები, მიშილკობები, მოძრაობითი აქტები აღმოყვლება ავადმყოფის ნება-სურვილის გარეშე, თან ახლავს მათ შინაშრთ პროციკული დამოკიდებულება და მათი ავადმყოფური წარმოშობის განხედა. შეხულებდა აშისა, რის ავადმყოფი გრძნობა ა.შ.ის უმართებლობას, უჭირს მათ წინააღმდეგ ბრძოლა და, თუ კი ახერხებს გაღართეს, ეს ხდება სხვა აკეივებთან აქების ხარჯზე. არჩევენ ა.შ.ს, რომელიც წყვეს აუეტქურ დაძაბულობას (იხ. **შეპნე პამრეობი**). **პასტაშრეა** **შეპნეობი** **შეპნეობი**. **პასტაშრეა** **შეპნეობი** **შეპნეობი**. **პასტაშრეა** **შეპნეობი** **შეპნეობი** და აუეტქურად ინდიფერენტულ მდგომარეობებს, მავ, **პრენება** **პასტაშრეა** (იხ.), სიგვეების და გერმინების აკეივებულს განხედა, აკეივებულს თვლა და ა.შ.



**პირიქმანობა** - акромегалия (ბერძ. akron - ქვედა, მეგალია - დიდი). სხეულის ღისტალურს (მეტეწები, გერეწები) და წაბილული ნაწილების (ჩიკატი, ენა, სხერი და წარბებდა ღილვაკები) არაპროპორციული გადიდება ან გამაჭვლეტება. ამავე დროს აღიქვამს კანის გაუხეხებას და ღანაოჭებას, კი პერაბიროზს და თანაბნ საფარველის შრის დარღვევას. გვხვდება პიკოვილის ღანაინების (ჟირკვლეობის ნაწილის ეოზოფილური ადენომა) დროს.

**პირიქარისობა** - акропозезия (ბერძ. parathesis - ყრუ შეგრძნება). ქილურთა ღისტალურ ნაწილებში უსამაოგო შეგრძნებების აღმოცენება ძირითადად გვხვდება სისხლძარღვთა ანერვიაციის დარღვევის დროს. შის ადამიყურებაში სნიმენელეონება შინაგანი (ფარისებრი და თორქვლმედა ჟარკვლების დააეალებები) და გარეგანი (ნესტი, სისხე, სიყიე) უაქტორები.

**პირიქმანობა** - акрометрия (ბერძ. amsthesis - გრძობა, შეგრძნება) ქილურთა კანს აწვეული შეგრძნებლობა. გეხვლება ისტერიის დროს.

**პირიქმანობა** - акроцефия (ბერძ. kephale - თავი). თავის ქალას განვითარების ანომალია. ყოუკესებრთ თავის ქალა.

**პირიქმანობის დიპლომატიკა** - акроцефалотомия (ბერძ. akros - მაღალი, kephale - თავი, tom - ვრთად, daktilos - თითი) (Apert E., 1906). დამახასიათებელია "ქოქმანობა" თავის ქალა შეზრტყეული კეუთი და წინ წაყოწული ნუბლის შიდასოთი, მეთარისებური სახე, ყრის ნივრების დეფორმაცია, ვგზოთაღში, კიპერტელორმში, უნაგირა სეცირი, მოგჯერ რხილად და მანარის სასის შეუზოყებლობა, მედა ყბის განვითარებლობა, ქვედაყბის პრივიდაგინში, მხედა და ქვედა ქილურებზე სინაქტიკა ძელებს ჩათრევათ, მოგჯერ რამუნებში თოთასთიის ერიო ფრხილის განვითარებით. მუღვეულობის ნერვების აგრუობა, შინაგანი ორგანოების ანომალია. თვალის შამპირავებელი ანერვიაციის დარღვევა. გონებრივი ჩამორხნილობა მსუბუქი გუბლოთიდან დილოთამდე ფეხქორტანული სინდრომი; შიგ შემოხევათი ინტელექტის პათოლოგია არ აღინიშნება. ა. თანდაყოლილი მემქილრეობით დააეალება (გადაყევის დემონანტური გიპი). მიუქოთენება განვითარებას ანომალიაგუბს. სინონ.: პამრთ სინდრომი.

**პირიქმანობა** - акрогалия (ბერძ. cymosis - ცისყერი). სხეულის წარბილული ნაწილების ხალურუგ (მაგ.: სხირის) აღკოპოლიშის და სხვა სომატური დააეალებების დროს.

**პირიქმანობა** - акрогения (ბერძ. hydra - თუღი). ხელის და ფეხისგულების ჳარბოფელაანობა. გეხვლება ნეფროზების, აღკოპოლიშის, ნარკოზინიების დროს და კონსტიტუტორ ასთენიურ პირუნებებში.

**პიპსინობა** - акынотия (ლათ. acin - ნემსი, notum - წერტილი). ჩანური ხელხუნი მედყანბ მეთოდი თანამეფოვე შილოთიკიპი. წარმოადგენს რეულეფიოთერაპიის ერთ-ერთ მეთოდს და დამატებითი ფიზიოლოგურად აქტიური წერტილების ვალბინიანებაზე კლასიკურად ჩანური მეთოდით ვალიბინიანება ხდება ოქროს, ჳედაგინის ან უნაგევი ფილადის გეხვებით. თანამეფოვე მელიცინამი გეხვება ელექტრული და ღამერული შილოთიკიპიებში.

**პლაგია** - алагия (ბერძ. halia - ღაანარაქი) (Delius, 1757). შეეყეულების შეუბლებლობა ან დევექტი სენება და ინტელექტის შენარჩუნების ფონზე არჩევენ შოტონულ და სემბარულ ა. ს.

**პლაგიატის სინდრომი** - Алагия-Касперца-Дента-Вилсона синдром (Allan J., Casworth D.C., Dent C.E., Wilson V.K., 1958). ოღოფორტების ფონმა. დამახასიათებელია ამინაყოფრია. მემქილრეობით დააეალება დაღეუბის ავტოპორტრუეყსული გიპიოთ.

**პლაგატრია** - алаготия (Johnstone F.A.C., 1967). გამოსიანება ნამქურნალები ან ნაოქურნალები აეადმეყოლის შიგ მქურნალები ექმის ფეჯნა და წამლებს გამოხალეთი (ანაღვეფორი, ნარკოტეკული, დრე არმეხვად პათოლოგურ სიმპტომათა სინდრლეით. გეხვდება ფსიქოპათებში, რომელთაც აქვთ შიღრეიკლება მელიკამენგების შიღებისაღში.

**პლაგინობა** - алаготия (ლათ. alax - თერი). კანის, თმების და თვალბების ფურადი გარისის ჳეგმენტის თანდაყოლილი არარებობა.

**პლაგინობის პრეპინობა** - Алаготия преципиальная алаготия (Albrecht F., 1914) იხ. პლაგინობა პრეპინობა.

**პლაგინობის სინდრომი** - алаготический синдром (ბერძ. alagos - გიოილის შეგრძნება, sindros - ყოყულთეური, rheo - ღენა). შოგალი სისხტით და თავის გიევილით შინდინარე მტკენული შეხინტრეყება.

**პლაგინობა** - алагия (ბერძ. lagene - ღლოლეა, მიხილეობა, ავბოყობა) (Schrenk - Notzling, 1899). გერმინი აერიოინიანა აქტოტის ა-ს ხაფიანში და ბერტრანში სხით და პასურ ა-ხ შაზიანში სხით. ჳეყსაღური პერგრება, რომლის დროსაც სეყსაღური აგნება და დამეყოფილება შიღწევა ან შოლოდ პარგნოროსისაღში გიევილის შიეწნებით (მტკენობა) ან პაგრნიროსისაღ მუეწნებულ გიევილით (პასიური).

**პლაგინობის სინდრომი** - алагический синдром (ბერძ. halimianis - წარმოსახვა) (Van Rossum L., 1934). ამაგდინული კოლერის ფაგტოზური გიევილება. იხ. შანტობა პაუბტანტელომა. სინონ.: შანტობა ტიპინობა.

**პლაგია** - алагия. სახის, კისრის, გულმკერდის კანზე შეხტრებას გარამაგელი შეგრძნება, გამოწეული კანის სისხლძარღვთა გუაროთობით. დამახასიათებელია კლმაქისთეს.

**პლაგინობის შინდინობა** - алаготический синдром (ბერძ. alagotia - გაღაგანიით სნიმენელეობის მინიება). გეხვდება შინოფრენის დროს. აეადმეყოფები რეაღურ და წარმოსახვით შეგრძნებებს აძღვევენ შოღვით აქტრანტეყებას.

**პლაგინობის გარეგანობა** - алаготическая пера (Nelsner C.). ნეოლოგისშეგბის ხმარების განსაყოფილებული ფორმა. შიღლენათა შესახებ ვალმეყეული აზრი გამოხიანება სეუთეიკური გამოთქმით - ვრთი საგყით ან ბტარია თანწყობით. გეხვდება შინოფრენის დროს.

**პლაგინობის სემინობა** - алаготический синдром (Аластия слуховые галлюцинации (Ablenstiel H., 1960). იხ. აკუსტოგალია სემინობა კლასიკოსი.

**პლაგინობის შინდინობა** - алаготический синдром (ბერძ. alos - სხვა, ღესი - შიქვლება). გერმინი გამოიყენება ფსიქიკური ტრანტის მითრ წარმოსახვით სენსიბელზაციური მღეომარეობის აღნიშვნისათვის. იხ. პლაგინობა სემინობა. პლაგინობის სემინობა - лаги и галлюцинации. სეჭობრივი აქტის დამამთავრებელი სგადია - სეყსაღური მოქვლება, რიქელიე გამოხიანებას სეყოფილებას და ხალღეებებს პარგნოროსის შიამარ. სინონ.: ნანგინობა (გერმ. Nachspiel).













გამოიხსენებინა მადის დაქვეითებით, გულისრევით, ბოყინით, უსამოვნო გემოთი, გვიძლით უიგავსარეოების მიღებოთ. მისემ შემოხვეუთად აღინიშნება დღინება უზომზე, ვასტროსკოპით - დიდი რაოდენობით ღორწო, ქვეტევინი და ეროსიები.

**ალკოჰოლური ღვრამაღაცა** - *alkoholная дряжда*. მღვრამარეობა, რომელიც ეთარღება თანდათან და გამოსაგლებს აღწეს ალკოჰოლის III სადღადში. **ფხლანს** (*С.ЖИУИ*) მისევეთ, ახასიათებს მუშღვი თვისებები: ეთიოკური ვახუშება ორხაერი და სამოკალერბი დამოკლებულების გასაღებები, დაკარგეთ, კრიაკის დაქვეითება; ვარრელება, ინიციატივის და შრომისწარმოანობის მოგალი დაქვეითება, სიტგამგური შრომის უნარის დაკარგვა, «ფორმალური» თვისებების, პირველ რიგში, შესიერების გაუარესება. არჩევენ ა.ჟის სხვადასხვა გ.ჟის.

**ა. ლ. ანკურბანობი** - *ა. ლ. ა. анокурбания* დამახასიათებელია ზოგუნდა, პასიურობა, მისწრაფების დაქვეითება, ინიციატივის და ინტერესების დაკარგვა. შთოხვის ზვეულ მსმელა წრეში კ არან რაოგური პასურია მოწმებები. აქტიურობას აქუნენ მხოლოდ ალკოჰოლური სასმელის მოპოვების საქორობის დროს. ცხოვრობენ პარანიაკულად.

**ა. ლ. დემოკრატიზმისაღმად სიჟურბანობი** - *а. л. демократизма противники*. პირიუნელი ეყლიღებების აი ეგაჟზე ნველიორებას განიდიის აღნიშნული პიროვნებისათვის დამახასიათებელი ფსიქოპათოური ხაზები. რაც გამოვლინდება მხოლოდ გარკვეულ კომპონენტების სახით; ამგომ უეჭველად დაკარაჟია პიროვნების მზაიკრობაზე. ნველებრთე აღინიშნება ისეთი თვისებები, როგორც არის უხუში ცინიში, შეუკლებელი ატენჯილობა აგრესული მოქედებები, ზგატკო შენივნები, მვაწხებებელი გვჯახლობა, მიღრეკება გარემომყოფთა დამყორებისაკენ, მზადობა, პირვერობა, ქვევარობა, ყრუობა. ხშირად დისფორებიც და ღრმა, დათრეკული გუნება-განწყობა.

**ა. ლ. მრედიკული პიფორიტი** - *а. л. хронической аффекции* დამახასიათებელია უზრუნველი გუნება-განწყობა, ცარემომყოფთა და საკუარი თავის მიმართ სტიკის მნიშვნელები დაქვეითება. **ბლოლერი** (*E. Müller*) მიხედვით, მან აწიდაფიუფები შეუქლებელია აქედრათ სიმაჟის, თავმეყარგობის, დარსნის გრმნობა. ასეთ პიროვნებებს არ განაჩნით საიდუმლოებები, ერთხანირი გულახილობით დაპარაკობის როგორც ჩვეულებრივ, უმნიშვნელი უაქგებზე. ასევე საკუარი და ხხვის ცხოვრების განსაკუთრებულ ინგიურ მზარეებზე. საჯრობზე ხუშრობის გონით. მათ ყველაზე მეტორად აქეთ გამოხაგული ე.წ. **ალკოჰოლური მზარე** (*об.*) შეგაკელება მახლონრია, ხუშრობა სტერეოტიპული ხასიათის.

**ალკოჰოლური დემორიტი** - *alkoholный депрессив*. იხ. **დემორიტი** *ალკოჰოლური*.

**ალკოჰოლური დემორიტიის სტადიები** - *alkoholного депрессии стадии*. I - ფსიქომის წინამორბედი სტადია. პრედელირიები: II - ფსიქომის დამძიმების და სომატურ-ნევროლოგიური დარღვევების გამოვლინის სტადია (ანთიზრების დელირიული შეყვლა, შიშის აფექტი, ფსიქომოგორული აგზნება); III - ეთარღება დელირიუმის ანაკოლისამეფო მიმდინარეობის დროს. გამოხატება ფსიქომოგორული აგზნების თანდათანობითი ჩაქორობით, გემერაგურის მავებით, აღინაშით, სოპორული და ზოგჯერ კომამოზური მღვრამარეობების განვითარებით; IV - გერმინალური - ფსიქომიდან გამოსვლა - პოსტდელირიული ასთენით ან აქინეური კომით.

**ალკოჰოლური დემორიტი** - *alkoholная депрессия*. დეპრესიული მღვრამარეობები ამოცენლება აეგოქონრულ ან რეაქტიულად ახსტინციის პერიოდში და რჩება მისი გელის მუშღვავი. სხვა შემთხვევებში ყელის დელირიულ და პალყუნაყურ სინდრომებს, გამოვლინდება დისფორიული დემრესიების და მოვლიანი, შერთიანი ან იპოზინტრიული დემრესიების სახით, იშვიათად ვიგავთი კომპონენტებით. ყურადღებას იპრობს სუიციდური აზრების სხშირე და შენეობა. ხანგრძლიობა 1-2 კვირიდან 1 თვემდე; ჟაღებში გრძელდება რამდენიმე თვე და შეგი.

**ალკოჰოლური მზარე** *ალკოჰოლური* - *alkoholная аффекция* (გერმ. *ambition* - მანასაბი, ნავილი) (*Jones K.L., Smith D.W., 1973*). მსმელი დეცების მიერ ვაჩენილ მავტობა მათილოგა. გამოიხატება პრე-და პოსტნაგალური ფსიქური და ფსიქიკური განვითარების ჩამორჩენით, ჟალა-ხახის სიმახინეუებით (მეკოვრებალია, მოვლე და ეფორი თვალის ნარღვეები უპოკეტი, მელ და ქვედა ცხის პიპოლანია, მელის ხახა, მიკრინგება). ასევე გუნდება სახსრების ანომალია, ხელისგულების ნაოჭების გასაღებები, თანდაყოლილი გელის მავტობა, ვარათა სასქესო ორგანოების ანომალიები, კანძარულ ჰემანგიომები, ნავილი მოგონების დამიანება, გონგინგური ჩამორჩენილობა, რომლის გამოხატულება ხშირად კორეაქციაშია ალკოჰოლიზაციის ხარისხთან (*Куньяковская Л.С.*).

**ალკოჰოლური მსტერეოლოგია** - *alkoholная астероология*. წერილ ნაწლებებში გამოხატული არასპეციფიკური ანთებითი პროცესები. შეუქლებელია ლეგირიციავა ჩვეულებრივი კოლიგისგან.

**ალკოჰოლური მსტერეოლოგია** - *alkoholные астероологии*. აღნიშნული გერმინით გამოიყოფა ის სტრუქტურული ფსიქოზები, რომლებიც უპირატესად გამოვლინება აქციოლომბის III სტადიაში. კლინიკურ მსტერეოლოგიაში ფსიქოზურ ამდლობებთან ერთად წაშენი ადგილი უჭირავს სომატურ და ნევროლოგიურ დარღვევებს. მიმდინარეობს ან მძიმე დელირიული სინდრომებით, ან გაზრების სხვადასხვა სიღრმით, ან სხვადასხვა ორგანული ფსიქოზინდრომებით. ენეყუდოქათათების პათოგენებში აღსანიშნავია ნვითიერებათა ყელის, პირველ რიგში, ეტიამინების ხაღმანის დარღვევა, მგ. B<sub>1</sub> -ის პიპოვამინობი, რომელიც ორეტიმში ასრულებს კო-ენზიმის როლს. დეიქლის ალკოჰოლური დამიანება და თიამინის შერთვის მოშლა აწვეუს B<sub>1</sub> ვიგამინის პიპოვიგამინობს, რომელიც თანდათავად არის ნახშირწყლოვანი ყელის დარღვევის მიზეზი, ეს უკანასკნელი კი აუცილებელია როგორც ვინის ინტერეტიკული რესურსი. ალკოჰოლოზმის დროს ირვევა აგრეთვე ვიგამინი B<sub>6</sub> (პირილიქსინი) და ვიგამინი PP (ნიკოტინის მავა) ყელა. ა.ჟ. იოფა მწვავე და ქრონიკულ ფორმებად.

**ა. მ. შვანში** - *а. м. Шванш* (*Gayel Ch.J.A., 1875; Wernicke C., 1881*). ალკოჰოლური ენეყუდოქათათის ხშირი ვარიანტი ეთარღება წრევე დელირიული სინდრომის (პრეოლოგია ან მესიკრებელი) მუშღვ დასწყისში დამახასიათებელი ძვალანობის ან ატენების პერიოდში. წყვედელი ბოლოთი და პალყუნაყური ცანღები, ამნებური ლემორინგირების მიუღებუბა სწრაფად მავჯლის უმსურს სასუტეზი აზროქცია, დენამბა. დასწყისებში - პიკრინგები. ეპილეფსორიული ცუქორები. ძვლანობის ფორმა - ატენების ეპილეფსიური დარღვევი გაისს პალყუნაყობით ნევროლოგიურად - ნეოროვევატორი მოშდოლბობის, მუშღვლობის მოგარული კოორდინაციის დარღვევები, არამუშღვი ენთოთანი პიპერგონია. უპრობულად პიპოგონია, მუნხივალური ნინებები ცყვის ენთების რიგოლების სახით, კლერია უნებლიე ნორმალხა, პათოლოგური რეველაციები, ცრებეჯური დარღვევები დაახასიათებელია სიმპტომა გრადად ცნობარების ამაღ (გარკეობა), აგაქცია და ოფთალმოლოგია არაიშვიათად ლეგალური გამოხაგალი. ხშირად ფორმდება კრანზიმორული ორგანული ფსიქოსინდრომი, მათ შორის კოპოკევის სინდრომი. შიროლოგიურად - წერტილოვანი სისხლჩაქეუვები და სისხლჭარბობა ყელის უკრედთა ჩამრდა მტემეყუდაღიანის



აღიარებულია, ყუბაშვილი (ს. ყუბაშვილი) ნიშანი, კუნთოვანი ბიპოტორია, მოგვიერ ესტოპოლური დარღვევები. ესთიქოს მხრივ - აღინიშნება სხვადასხვა სიმძიმის ორგანული დარღვევები ასეთივენი მდგომარეობით. დაავადება ეთიპირება მუცუნიედად-ახასიათებს სებალეური მიმდინარეობა. ალკოჰოლიზაციის შეწყვეტა იწვევს რებისობს ღიაფრით მთლბა დასახე ჰეპათო, რომელზე უღინიშნება *chroma malaris* კალიერი, IV პარტეის გაგანთერბი, ნაბრბის დარბის და ნაწინალბის ვარბისება.

3. შ. შრონიძეშვილი, პედაგოგის სპინაშიტი - ა. ა. ხრონიცხასა с картиной пеллагрн (Сониншваси А.А., 1912; Jolliffe N., 1940; 1942; Mears A.R., 1942; Blankenhorn M., 1949). დაავადების გამოწვევდა ვიტამინ PP და B კომპლექსის ნეუროტიკი. დაავადების დასაბუთი აღინიშნება ნერვოსისმაგვირი სიმპტომები, ვ.წ. "გადარღვი ნერვოსიზაია" თავის კოიელით, თავბრუსხვევით, გამბინიანებლობით, ადეილად დალილობით, ძილის დარღვევით, პარესოფიებით. თან ახლავს განზომადიგი, გასკრიგი, ენგრატიგი, ჟადარაით. ესთიქური აშლილობიდან დაბაბასიათებელა დერვისული გუნება-განწყობა იპოთიფირებული და სუიციდური აშრებით. გიპურა კანის ცელელები, მოწითალი, შირხო-შიუქოსისური ფერის ანთებითი სიმეტრიულად განდავებული კრები ჟურ ხელების და უბების შურგისმხრივ ზღაპარებზე, მუდგოში სიბისა და კისრის მიღაბობი. მანიფესტური ესთიქომები შობინარეობს დელირაციად სინდრომობა, რომელიდა სერ უკვერამი აიბინიშნება ვერბადღური პალეოპათოციები. II შროულთი ობის დროს ადწირილია პიდეალები, ესთიქომები, მიმდინარეობდა ამენიური სურათით, პათოური სგვორით, რომელიც ადწვედა პალეურ სინდრომს, ორადერი აეგობარბმებით, გატების რეულეწით, პირამიდული სისგების დაბინიანბს შინებით, სასტიკური პარეზებით. გამოსავალ მდგომარეობაში ეთიპირება ორგანულად ასობდა რეგრადიფიებული მიმდინარეობით. სიკვლიდიანობის შემთხვევები იშვიათია. სინონ: პალეოპათოლოგია პალაბრა, ჟადარბის პალეოპათოლოგია (პედაგოგის სპინაშიტი).

4. შ. შრონიძეშვილი, რბრბობაშვილი ნეპროტიტი - ა. ა. ხრონიცხასა с ретропеллагрнн шевитом (Vleser S., 1965). გუნება როგორე დამოკიდებლად, ასევე სხვა გუნებალოპათიიხან ერთად. გამოწვეულია ვიტამინ B2 დეფიციტით. უღინიშნება ცენტრალური ან ცენტრალურ-ნაბირა მუდგელობის დარღვევა უერო წითელ, მწიანე და თორი ფერზე, გამბაბგლია მუდგელობის ნერვის დარღობის ხიგემპორადური ვაგერბრბობადა. ნეუროლოგიურად - პარესთეზიბი და კოიელი კოლერბში, აგაქსია, არამდინარეობა. მბიმე მუბთხვევებში შეიძლება ვანოთარბეს კოლერთა დაშლა. ესთიქური სიმპტომები უღინიშნება ღისფროით და ასთენიით. მსხუბე მუბთხვევებში - ამბლიოპია ნერვოლოგიური სიმპტომების ვარგებ, რომელიც შეკრბლობის 1-5 თვის განმავლობაში რეკურირება. მბიმე მუბთხვევებში დაავადება მიმდინარეობს წლების მანბილზე. სინონ: პალეოპათოლოგია პეპეპეპეპე, პეპეპეპე (პედაგოგის სპინაშიტი) პალეოპათოლოგია რბრბობაშვილი ნეპროტიტი.

5. შ. შრონიძეშვილი, შვიდწინარბობაშვილი სხინიტი - ა. ა. ხრონიცხასა в виде псевдоопиума. აღნიშნებით ძირითადად მბაბუბებს საშელო და ხანმამესულ ასაბში, ეთიპირება როგორე მბიმე დელარირბის და ენგეფილბობის ფონზე, ასევე მუცნიედად, გამბაბგლია ალკოჰოლური დემენციის ფონზე. ესთიქური აშლილობები და ნერვოლოგიური დარღვევები მოგვარბონბს პორტერსელი დაშლის დემენციურ ან ექსანსისურ ფორბას. მოგვიერ გუნებაშვილი შვიდწინარბობაშვილი დერვისული დერვისული და კოტორხის ბოგებს ელმუნტბებს საბით. პარია მუბსიგების გამბაბგლია დარღვევები. ნეუროლოგიურად - თითების, ენის, მიმბიკური კუნთების ტრემორი, დიპარია, მუცნიბის სიმპტომი (იხ.), ნეუროპათიბი, მყეს-ბუალთა რეულეებსების მუეკა. მუეკე ესთიქური ეპიზოლის მუცნიე გინეითარბულ მუბთხვევებს ბქებს გუნებაში რეგრადიფიკაციისასკენ, ბოლო სხვა მუბთხვევებში, და განსაკუთრებით მბინი, როეა სახებუა აგრბიული პროცესებოპორტრადიფიკაციისასკენ.

6. შ. შრონიძეშვილი, ხიდიბის ცენტრალური ნეპროტიტი - ა. ა. ხრონიცხასა с центральннм некродом миста (Adams R., 1959). დაავადება იწვებს თანდათანობით. ესთიქური აშლილობები გამოვლენება ამბიარბის სტუმბობის საბით, ევტროლიკური აბინიანება, ვარბისიან განდგომილობებით. მიუხედავად მერბინიზაციის მენარბინებისა, ავადმყოფბა არ რეავიგრბენ კოიელზე ნეუროლოგიური სიმპტომები ერთ მუბთხვევაში არ აღინიშნება, სხვა მუბთხვევაში გამბაბგლია სახის ნერვის პარეზი, თვლის მამბობრბებელი და ბულბური დარღვევები, არაიშვიათად ეთიპირება ღუნე დაშლა ცენტრალური მუეკის რეგრადიფიკაციისასკენ. სინონ: ხიდიბის ცენტრალური ნეპროტიტი.

პალეოპათოლოგია შრონბა - პალეოპათოლოგია შრონბა მუეკე ეტიპირება, გამოწვეულია ალკოჰოლის ესთიქოპოლი რბმებდებით. ალკოჰოლი ენს-ბი რბმებდებს შემბაკეებლად. შედარებით მსხუბე მუბთხვევებში გამბაბგლია ოიპოპოლოგიური აბინიანება და ევტეგატორი სიმპტომები. შეაკეებს დარღვევებს თან სლევს სხვადასხვა ნეუროლოგიური დარღვევები და ესთიქური ურბეციების დარღვევა კომბატორ მდგომარბობამდე. ალკოჰოლის ოიპობა იწვევს თრბბას, რომლის სიღრმე და სურბათის თავისებურება დაეკემრბებელია რიგ ფაქტორებზე. აბამინბის ბიოლოგიურ თავისებურებებზე, მიღების ალკოჰოლის სახებე (სასმელში სირბის მუცნიეობის პროეგნბე და მბინი სხვა ბიოლოგიურად აქტიური ნეითორბების მუეკელობაზე), მიღებულ საყუბის რაილენობასა და თავისებურებებზე, ალკოჰოლის მიღებისამდე განწყობაზე. პათოლოგისტიკური მომენტების არბობაზე და სხვ. არჩევენ ფიზიოლოგიურ ალკოჰოლურ თრბბას (იხ. პალეოპათოლოგია შრონბა) შრონბა შრონბა შრონბა შრონბა, პათოლოგიურ ალკოჰოლურ თრბბას (იხ. პალეოპათოლოგია შრონბა) შრონბა შრონბა შრონბა შრონბა, და მუეკელ ალკოჰოლურ თრბბას (იხ. პალეოპათოლოგია შრონბა) შრონბა შრონბა შრონბა შრონბა.

- 1. პათოლოგია შრონბა - ა. ა. ხრონიცხასა ესთიქური რბმებდების მუეკე გრანბიგული დარღვევა ცნობიერების ბინდისებური მუეკლით. ცხებება იშვიათად, არა ბქებს გუნებაში განმეორებისაში. უმეკესად აღმოყვებება პათოლოგიურ ნიადაგზე ეთიპირება ალკოჰოლის მციერ ღობების მთლბობისანეუ, თუმეკ ადწირილია მისი განვითარების მუბთხვევები ფიზიოლოგიური ალკოჰოლის თრბბის დროსაყ. არჩევენ ეთიქესიოლურ და პარანოლურ ვარიანტებს.
- 2. შ. შ. შრონიძეშვილი, შრონბა - ა. ა. ხრონიცხასა ეთიპირება უერად, მუეკე მოგორული აბინიანებით, რომელბაყ თან ახლავს შიბის, მრისსანების, მუბინიანების უაფეგი აგრეთებ და დაბმარბებელი რბმებდებით. მუეკეუდება წყიდელი, ავადმყოფობელი ან სურბით არ აღინიშნება. აბინიანება, აგრესიული ქსელბა და აფექტი არ პროპოცირბდება ვარგე ეტიპირებით. აღინიშნება ვარგეში ღრმა დელორინგაციია. სინამელიას გაეუკლბარბებული აქშა განსაკუთრებით აგრესიულ მომენტებს. უერად და არამოგვიერებლად გამოვლენება. აღწერილ მდგომარბობას თან სლევს ფიზიკურა-პოლენბა, აღინიშნება, ვარღვბაყი გრმბინარბე ძილში. გადაბინილ მუეკეობისა მთლიანად აბინიანებულია.
- 3. შ. შ. შრონიძეშვილი - ა. ა. ხრონიცხასა ასევე მუბთხვევებში ცნობიერების აბინიანება თან ახლავს პალეოპათოლოგიური აშლილობები. მათი შინარსი, როგორე წყის, აგარბებს ავადმყოფისათვის მუეკეწინებელ და შეკარბის

ხასიათს და თან ერთვება შიშის განრისხების, სამხედროების მოლოდინის არსებული აუქტი. შეგვეყვება და ამ პერიოდში არსებული მიზანმიმართული მოქმედებები გარემოს ავადასუფრეობა აღქმის შედეგია. აღვიღო აქვს რაიკარეუროდადვიცი, ასევე ავრეკული ხასიათის ქმედებები. მდგომარეობა თანდება ვეკრება და გადასის ბერბობისორ რადი, სრული ან პარკიადვირი ანხელობა.

**ბ. თ. შხეცოლიშვიტი შიშაშეშ - ა. ა. ჟეხილიშვიტი შხეცოლი** შხეცოლი თრობის დროის ხასხეში აღკოპოლის კონენგრაციის შეყვებაში 03-15 წ. აღმოუკლებს სიბის შეგრძნება, კისის და დორწოვანის პიპერეშია, უღლის ასტერება, შადის შიშაშეცხება გუნება-განწყობის გორი იქვეს ზადა. უღინდება სიშხევისა და ქმაოფილების, ვხსკეკური კოშტორის შეგრძნება. სუბიექტს უხდება დამარასისა და მოქმედებების სურვილი. შეგვეყვება სიშხევისა და გუნება-განწყობის შეიძლება უზნიშნელი შიშის გარე შეყვალის გამო შეყვალის გამოხიზნებაშია, შირინობით, შხეცოლი კი კვდა აღკრუნება საწყის განწყობა გარკვეული დროის შემდეგ აქტიურა და აწეული შდგომარეობა იყვლება ჩართულობით. განგრევილობით. შირინობის ნედლება, შაველობის დადლოობა. შხეცხა ბილის სურვილი. თრობის გრძელდება რამდენიმე ხასის, ახენიხა არ ახასიათებს.

**ბ. თ. შ. შიშაშეშ - ა. ა. ჟ. შხეცოლი** შიშე თრობის დროის ხასხეში აღკოპოლის შეყვებაში 3-5 წ. თრობის სურათისათვის დინამიკობილები სხვადასხვა საღრმის ცნობილებების შეყვება განგრევილობის კონგრაციის მდგომარეობაზე შესახებუდა ადვილი პიშინეს უხელუფლორებულ განგრევიობის უზნიშნე შარდეს და დუეკაციას თრობის გულის საწყის პერიოდში - ავადობა, დინამობა, რამდენიმე დღის განხელოობაში გამოხატულია ახასიათა, უხეცხევი აღკრუნება შეიძლება თან დაერთოს უღლიხა და ახორეკია, თრობის შთელი პერიოდ ახენიზებულია - ნარკოტიკული ახენიხა.

**ბ. თ. შ. შიშაშეშ - ა. ა. ჟ. შხეცოლი** შიშე საშელო ხიშიშის თრობის დროის ხასხეში აღკოპოლის კონენგრაციის შეყვებაში 12-25 წ. კონენგრად - შირინობის დესკორინობის შეყვებაში დინამობის, შეყვებაში დინამობის, ხსახხელი (სუბიქტი აღქმის დაქვეითების ხარკზე), ასოკაციური პროცესები შენედეუდა (გამხედეუდა საჭირო სიყვების შიშაშეცხა), შირინად ურთიდაივიეც უხადებების ამ ახრის გამოვობა. ურადების გადართვა განხედეუდა, ხეცხა შირინად გარკვეული რაოდენობით, შიშაშეცხა სიყვების აღქმა გართლებულია. კრიტიკა რეორეუ საკეთარი, ასევე გარკვეული შიშეცხა მოქმედებების შიშართ დაქვეითებულია. ეს უკანასკნელი ხელს უწყობს კონფლიქტური სიგუაციების შექმნას, რომელიც თავისთავად რთულდება საკეთარი შესაძლებლობების გადაფხედეუდა, ადვილად წარმოქმნილი სურვილებისა და შირინადებების განხედეულობით. შიშაშეცხა - დარბილი. სიშხეარის დგომარეობის მოსკრევი ღრმა ბილი. გამოხატულია თრობის ნაწილობრივი ახენიხა. თრობიდან 6-8-12 ხს შიშეცხა გამოხატულია მოღუნება, სხეულში დამგრევილობის შეგრძნება, პირის ხიშიშად. წყურვილი, უხადიზონი შეგრძნებები გულის, დეხლის და კვლის არბი.

**ბ. თ. შიშაშეშ - ა. ა. ჟ. შხეცოლი** - ა. ა. ჟ. შხეცოლი უხიშობის თრობის სურათის შეყვება. ამ დროს ამ აუქვება გარკვეული სიშხეცხა აღმოუენების თანხმევიობა, ამ სიშხეცხა რომელიც უკვირე დუბლებს განსაკუთრებულ გამოხატულებას შედეღებრივ გუნება აღკოპილიზმის II სტადიაში, ზოლი ამ შეხებეცხეში, რაყა ჩართულია გარკვეული პიოპიასიგა (უსიქიპაოთა, ვსიქიქური ავადებების დუნედი შიშინარე უორიშეში). შესახებუდა გამოვლინდეს I სტადიაში.

**ბ. თ. შ. შიშაშეშ - ა. ა. ჟ. შხეცოლი** - ა. ა. ჟ. შხეცოლი საწყის პერიოდის ეფორიის ამ ხანმოკლე, ამ საერთოდ არ აღინიშნება. გამოხატულია დორევიობა გუნება-განწყობა - შირინახეობით, შიშეციანი სასოწარკვეთილებით, შირინ სურვილი. დემოგორეული შეკეცხა ხანმოკლეა და შიდე რუდეკირდება. ასეთი თრობის დროს შირინი სუყვიდება.

**ბ. თ. შ. შიშაშეშ - ა. ა. ჟ. შხეცოლი** - ა. ა. ჟ. შხეცოლი სიშხეარის პერიოდში გამოხატულია გარკვეული ხანმოკლეობა, უწყვილებება, შირინობა, ბოლშინობა სიშხეარზე. შედარებით მსუბუქ შეხიშევიება ავადმყოფობის აწყებაში შინაარსობრივად ერთეფროვან სახეაში, რომელიც გარემოშიყოფთა უკანაყოფლების მიხედეად, არ ექვემდებარება სურეკებსა. უხეციოდება და უხიდათონი სახეარის შიშართულია ახლოხელებისაღმს. გამოხატულია მოუხენირობა, უღლიხა.

**ბ. თ. შ. შიშაშეშ - ა. ა. ჟ. შხეცოლი** - ა. ა. ჟ. შხეცოლი ეფორიის ხანმოკლე პერიოდის შემდეგ შირინი შიშის გამო წარმოიქმნება გლობალურად, უხეციოდება და რსხვის მდგომარეობა შესახაში მოქმედებით და გამოვლინებით. ასეთი ეფორიისთვის ხანმოკლეა, იყვლება დახედეულობა და განგრევიობით, აქვს გუნენკია განგრევიობისაში.

**ბ. თ. შ. შიშაშეშ - ა. ა. ჟ. შხეცოლი** - ა. ა. ჟ. შხეცოლი სიშხეარის დროს უღინდება ე.წ. ხელოვნურად შექმნილი აუქტიური მდგომარეობა (სიშხეარის ც.წ.) ხსახხელი ურახეობით, დუდამაყით, რომელიც შინაარსში იტისპიყვების დონეებისთვის იქნება საკეთარი ასეთი შედეგად გადაფხედეუდა ცელის თვითარდაღების გამოქმნები; ავადმყოფობის ილიობის თვის წარმოადგენს არა უხრალი დონეება, არამედ ხედეუდები და გიმბეცება. შირინად ადვილი აქვს შოგორეული რეაქციის; ასტანია-ახასია, ხედეების ვუნენეცხა, შირინობის განხიზნება შირინობით უხახხელებზე, ისტერიკი გუნერების ან "სრე სიყვლის" რედექსი. ავადმყოფები არამიშხეათად ეწევიან სურევიური უხახხეების დემოსკირებებს.

**ბ. თ. შ. შიშაშეშ - ა. ა. ჟ. შხეცოლი** - ა. ა. ჟ. შხეცოლი წარმოიშობა აწეული გუნება-განწყობის უორნე უხეციოდა ამ განკრობითი მდგომარეობით. თან ახლავს შინეცხეცხა, ზეშევირი ქვეცხა, უღლილი უხრინობით, ახორევირებული სიყვით, შიშედელობა (პირველ რიგში სიყვალურის) განგრევიობა.

**ბ. თ. შ. შიშაშეშ - ა. ა. ჟ. შხეცოლი** - ა. ა. ჟ. შხეცოლი ასეთი თრობის დროს უხეცხეცხა ვეცხეცხა კატათიში ვრად განხიზნებულია დამარბობის, განკეთების, გარემოშიყოფთა შიშართ უღლილობის, შოგორე დამოკიდებულების არახსიკანგებელი დლეტი. შეიძლება ადვილი პიშინეცხა ვერხეცხე უღლიხის.

**კალენდარი შიშაშეშ - ა. ა. ჟ. შხეცოლი** - ა. ა. ჟ. შხეცოლი გამოყვებულია შოკოლიუმში შეგებოდური პროცესების დარღვევით, უგრძნებების აქტიულობის დაქვეითებით და ავად სიშხის დარღვევით. შინეცხეცხა ურეცხეცხა თიამინის დეფიციტს. რეგენერაციურად - გულის საღეღრმი გაღებულია. ე.წ. შე QT-ინტერვალი უგრძელდება, აღინიშნება ST-სეგმენტის დეპრესია, აგრეთვე პათოლოგიურად შიშელი, იორეპიზანი ისოულიქტრული ან, ვარეფიტი T-ქობი.

**აღკვეთვითი მონიტორინგის პროგრამა** - აღკვეთის მაღალი დონის მიღების შემდეგ კუთვნილი განვითარებული დისტრირიქციული პროგრამები განაპირობებს მწვავე ნეკროზებს. ქრონიკული აღკვეთითი ინტენსივობის დროს კუთვნილი დისტრირიქციული ცენტრები თანდათან შეკუმშვას, თან ახლავს გაცივლი, მუშაობა და შეზღუდვი ატროფიები. ძირითადი წიაღისეული მხრის სარტყლის, სხეულის, და მუცლის, ზოგჯერ კიდურთა დისტრირიქციული ნაწილის კუთვნილი.

**აღკვეთვითი პროგრამის განხორციელების პროგრამა** - აღკვეთის პროგრამის განხორციელება კომპლექსი დასაწყისში ასევე მწვავე აღკვეთითი პროგრამის (იხ. აღკვეთის პროგრამის პროგრამა) შემდგომში აუქციური შედეგების მიხედვით იყვლება, ჩნდება დათრგუნვილობა და შვითება. მიზის აუქციი ან არ ელბინება. ან იმეითად, აღკვეთილად აღმოჩნდება. ზოდიტი გამოზთთევაებში შეიშნება სისხლმეტიაციის ელემენტები. შვეთებად აქტივობა ის პირები, რომლებთანაც ავადმყოფს ადრე შეიძლება უპროფიტი დროს ელემენტები, დევიის მიმეობად - მისი წარსულში არასწორი გამოზთთევაებები და შოქებები. ქვევა ვარეგულად თითქმის მოწესრიგებულია. ავადმყოფები ამჟირებენ კონტაქტებს, თხოვენ ახლობლებს, გააცივლი ნეველ მარმრუებზე. აღკვეთის მისიასა ამწვავებს მიიხს აუქციებს, ზოდიტი იღვებს, არასწორ ქვევას. ასეთი უსეომი შეიძლება გავრძელებს რამდენიმე თევისს აღკვეთის შემზრთევაში დებლობს რეკვილეუ ხასიათს.

**აღკვეთვითი პროგრამის პროგრამა** - აღკვეთის პროგრამის განხორციელება ძირითადად აღკვეთის ეტაპებში, იმეითად - **რეპრეზენტაციის** (იხ.) დროს. პროგრამში, თე კე ასეთი შემზრთევა, გამოხატულია ბოდიტი განწყობა, ვერხალური იღვები და შვითება. ჩველებრივ, ესეომი იყვება მწვავედ, ავადმყოფს უეთარდება მკოციე ამრი, რომ მას უპროფიენ თხოვრი განაღვებებს. გარემომყოფებს აღკვეთის პროგრამის, რომლებშიც უეთათევაებენ მის ყოველ მიმისს, ვესეს, ქვევას, თითოეულ სიტყვას და ურჩაბს, გარეშოში მომდარი აღკვეთის პროგრამე ამ თეთათეთთან უშეალოდ დაქეშირებულია. ისინი ხუდავენ შესაძლო თეთამშხმელებს სხეადსხეა აბრალით, დანიტი, პისტრეტიტი, ჩამოსარბობი თოიტი და სხე. უეთლავერი ეს აღკვეთება მათი ერთმანითან გალაპარაკებტი (ვერხალური იღვები). შვეთების ან სრუდად უწრებები არაბის, ან ავადმყოფს ექმნებთ გრძნობა, რომ ისინი უკე ნანახი ასეთი. ასეთ მწვავე ხატოვან ზოდეას ყოველთვის თან ახლავს მწვავე შვითის და შვითების განსლები. ავადმყოფები სხეად იპულსური. ცლიობები დობობონ, გვიქვენ, არაშეთათად შიში იმუნება ბოდიტი, რომ ავადმყოფები მიხადან ნაკლებიარ სიყოფილისათვის სამში ქმელებს, ხეზიან შობრავი გრძანარტიკადან, ნახევერადმიმელები გარბიან უპროფიელ ავადმყოფს. შეუძლიათ მიიყენონ სხეულის შიში დამიანახა, რომ იმეკვენ უფრო ადვილი სიკვდილობს. სხეა შემზრთევაებში ან თეთადეის მიზნით ანბორციელებენ თეთამშხმას, ან გარბიან დამბრისტრეკულე რეგნირებში სამეველად, სხეადის და დამის საათებში შეიძლება განკვირავს დელიური სიმკომები და ვერხალური ქალეისიკები. ესეომის ხანგრძლივობა რამდენიმე დღიდან რამდენიმე კვირამდეა. სინონ: **რეპრეზენტაციული პროგრამის პროგრამა**.

**ბ. ბ. პეპროვი** - ა. ე. ი. ანთროპოლოგიის ფსიქოლოგიური უმეტესად ეთიარდება დრეული სხე პერიოდში, ნისეამ მდგომარეობაში. კლინიკური სურათი ისეთივეა; როგორც **შეკვეთილი პროგრამის პროგრამის** დროს (იხ.), მაცრამ გამოხატულია ნაკლები ინტენსივობით და ხანგრძლივობა არ აღემატება 1-3 საათს.

**ბ. ბ. რეპრეზენტაციული** - ა. ე. ი. ა. ანთროპოლოგიის მწვავე აღკვეთითი პროგრამის განხორციელების მწვაველად საღამოს და დამის საათებში ზოგჯერ წარმოიქმნება დღის საათებში არსებულ ბოდიტი იღვებით თემბგურად და ქეშირებული შვედელობით იღვები და ქალეისიკები, სხე შემზრთევაებში - სენსორული ამბლობებით, რომლებიც არ არის დაქეშირებული ბოდიტი ესეომთან. შე, შიროფსიული და (ან) სენსორული შვედელობით ქალეისიკები, რომლებიც ამ პერიოდისათვის კლინიკური სურათიდან გამოდევნან ბოდიტი ამბლობებს. დღის საათში ბოდიტი იღვები კვდაე იღვებს დომინირებულ ხასიათს. ესეომის კლინიკის გამარტივება ხდება დელირული ამბლობების რედექციის ხარეზე.

**ბ. ბ. შიშიტორი** - ა. ე. ი. ა. ანთროპოლოგიის ანთროპოლოგიის დეგნაცია შიშიტორი ფსიქოლოგიის კლინიკურ სურათში წარმოიშობა წყვეტილი, არამყარი, ადვილად რედექციებად ესეომური ავტომატებში განხორციელების უფროზის, შვედელობით და სმენითი ფეველოპალიეისიკების და შენიშნის სახით. ზოგჯერ შესაძლებელია ვერამწეველად განვითარდეს ბემოქმელების ბოდიტი იღვები.

**აღკვეთვითი შიშიტორის მძიმეინარობის ტიპები** - აღკვეთის პროგრამის განხორციელების დროს აღკვეთის მწვავედ ან სისხლმეტიაციის მიუხედავად, არჩევებს შიშიტორის სამ ტიპს: ურთქრადეა, გამოხატულია მწვავე დელირული, პალეისიკური ან ბოდიტი ესეომების სახით; რედექციული, გამოხატულია მწვავე დელირული, პალეისიკური ან ბოდიტი ესეომების სახით, ცხოვრებაში გადაიგანება რამდენჯერმე და აქვს გენდენციის სინდრომატა გრანდოსორიაციისადმი შვედევი თანმომდეგობით: დელირული - ვერხალური პალეისიკური - ბოდიტი ესეომი; გახანგრძლივებული, გამოხატულია ვერხალური პალეისიკობით და ბოდიტი შიშიტორი ფსიქოლოგიის სახით და მიუხედავად მწვავე დასწყისისა, თავიდანვე აქვს გენდენციის გახანგრძლივებული და ქრონიკული შიშიტორისადმი (Mopanos G.B., Hatanu H.H., 1980; ავტორული, 1983).

**აღკვეთვითი რეპრეზენტაციის (პროგრამის) ბოდეპ** - აღკვეთის პროგრამის განხორციელებით პროგრამული ხატების შატარებულ შატებს, იმეითად აღკვეთის რეკვილეუის ფონზე. ექვიანობის იღვები თეთამპირეველად აგარებს ეისოდურ ხასიათს შოლოდ სომტირალის და ახსენების ფონზე. ავადმყოფისათვის დახასიათებულია უბეზობა, თეთმეკუთვებლობა. შირიანობა, შეუდელებთან წვეცვენ ინგებურ დამოკიდებულებას. აღბანული ესეომური ვატორი წარმოდგენს წრეპირობას ექვიანობის გვირგვინებად იღვების წარმოხალბობად, რომლებიც აღმოცენდება უკე ე.წ. ნათელ პერიოდებში. ექვიანობის იღვების გაძლიერება ან შესუსტება დაავადების ამ ეტაპზე დელირულია რეკვილეუ და ესეომური რეკვილეუ გახატება საბაბათს. ამ პერიოდში ავადმყოფისათვის დახასიათებულია დისფორული აუქციე. ისინი სისხლმეკუთვურად აქტივობებზე შეუდელების გამყოფების, აძოლებენ შათ აღბარონ დალაბის ფაქტი, მისი მიხეგება, ჰირდებთან პატეხას და ა.შ. დაავადების პროგრესირებისათვის ერთად ჩნდება ბოდიტი დარწმუნებულად დღისათვის შესაბნე. რასაც თან სდევს შესაბაბის ბოდიტი ექვიე; ეს უკანასკნელი გამოიხატება სხეადსხეა სახის (შემზრთევაებში ქლოობითი. ამავე დროს აღმოცენდება ანრა კონტეკული სავყარული ნიშანები. შემდგომში ესეომი შეიძლება განვითარდეს სხეადსხეა შიშიტორულით, დარწმუნ მონოტონური, შიშობს რეკვილეუტიული ხასიათი. ავადმყოფს იჩიანია, რომ შეუდელად დღიდან დღი ხანია, რომ შეუდელები მისი არ არიან





აქვს ერთეულ დელორულ ჩართვებს, ხოლო პალეონომის განუთარების შექრებაზე – გამილ დელორულ სიმპტომებს. მუხებზეა იმისა, რომ ევრხალური პალეონომი წარმოადგენს ფიქციონის წამებან სიმპტომს, გარკვეულ პერიოდში დელორულას ჩართვებზე შეიძლება მიიღოს დომინირებული სახე. ფიქციონის გამოთვლება ამ სახეულებზეა უკვე ხდება დაბნის სათაობზე. წარმოიშობა შიოფიური და სხვა შინაარსის შედეგობებით პალეონომი, რომლებზეა ავარებს სიმპტომები ხასიათის და რთულდება გაცეცხური და თერმული პალეონომიებით. შიშის აქტივს ცვლის ევოლირია. შინაარსობით აქვსება გამოხატება საქმიანი ფუნქსიით ან «დასაქმებულობის ბოლოვით». დელორული სიმპტომის გარმახვებასთან ერთად წარმოქმნება ფანგასიური შინაარსის სენსიტივური პალეონომი, რომლებზეა ავარებს ითავს შინაარსივლად ადრეხმან. ამ დროის დასაბარებებზე დელორულ-დომინირულ მდგომარეობებზე. შინაარსობით აქვსება ცხობინდება ავტონების და შეკუების ცვალებადობით, ბეჭტური ანალოგია - დერქსიით. კლინიკურა სურათის გამარტება ხდება დელორული სინდრომების რეალურიების ხარხზე.

ბ. ბ. შუშაპე. რეპროდუქციული სისტემის - ა. რ. ციქრაძე. გერმანული პალეონომი ავარებს ნაელებად ინტენსიურ ხასიათს. პალეონომიებში დომინირებს დაბადანპალეონომი შინაარსი, ხოლო ავალსიკოთა ცამონათქვამებში - თვალმარტობებს, თვალმარტობებს და თვალმარტობებს დეკვება არ არის გამოხატული ან ფრამენტულია. ევნება-განწყობა დაქვეითებული, სეუდანა სასოწარკვეთილების ელფერი. თვალმარტობა ფიქციონური შეკვება, რომელი ხანდახან აქვს სუბსტუორულ დონეს. დელორული სიმპტომების რეალურილება პალეონომი-ბოლოითი ანალოგობების შედეგში.

ბ. ბ. შუშაპე. სტრუქტურული პალეონომი - ა. რ. ციქრაძე. ციქრაძე. ინტენსიურ, პოლიეოკლურ, სენსიტივური დერქსიული შინაარსის გერმანული პალეონომი თან სდევს რამდენიმე წუთთან 1-2 სთ-ში გარეგარებული დელორული შეკვება. ავალსიკოთა არ რეალურებზე გარშემო მომდარებ. მასუბან არ შორისებულობით. ან იქვითბტრეკ რეალურებზე გაცეცხურების, შიშის ან სასოწარკვეთილების ცამონატეული მიმიკით. სამკურნალი პროეცტურებს არ ეწინააღმდეგებთან, მაგრამ უმთვლელურად დარჩენილან, არიან უმორაარი. პერიოდულად შესაძლებელია ადგილი პერიოდული ფიქციონური ავტონების. სტუორული მდგომარეობები რეალურილება პალეონომის ინტენსიობის კლუბსთან დაკავშირებით.

ბ. ბ. შუშაპე. უსიმპტომო აქტივობის - ა. რ. ციქრაძე. ციქრაძე. ავალსიკოთა უსიმპტომო ავტონობის გამოვლინდება განსილობის ფინობის და ე. წ. «დაქრებული» სახით. შიშის ინტენსიობის შავებს თან სდევს «ბინარობი» ხებების წარმოშობა. ინიიათად ხებზე ლოკალიზება სხეულის სხვადასხვა ადგილებში ან სახეზე გვევს ესეულპალეონომიებთან. შედეგში შეიძლება აღმოცენდეს ნაბადდევი ანრები შენგისის ფორმით ან მოგვარ ადგილებზე გადაშობას სიმპტომის სახით. უთარდება შემოქმედების ფინობი და შემოქმედების ბოდა. ინიიათად მდგომარეობა აქვს სენსორულ ავტონობისებზე. ფიქციური ავტონობისებზე ყუელთის დაკავშირებულია ევრხალურ პალეონომთან - იმპერატული და მაკომპერტობადი პალეონომიების ავტონობისებთან. ევრხალური პალეონომის შესუტება იწვევს ფიქციური ავტონობისებების რეალურიებას. პალეონომის სტრუქტურაში მოგვარ ადგილი აქვს დელორულ და ინეორიოდულ ჩართვებსაც. უკვანეთარების ევამზე უკანსენებლად რეალურიდება ევრხალური პალეონომი.

ბ. ბ. შუშაპე. უსიმპტომო - ა. რ. ციქრაძე. ციქრაძე. დაბინების წარმოშობა აკომბება ერთეულ სიკვებით ან ფრამების ფონების სახით. გაცილებასა პალეონომიები ქრება. ავტორი უორი ავტონობა შიოთის კომპონენტი. დადავების მიმართ კრიტიკა შენარჩუნებულია. ფიქციონის ხანგრძლიობა ამ ავტონობა რამდენიმე დღეს, რას შემდეგ შეიძლება ჩამთავრდეს ან განეითარდეს სხვა რომელიმე ფორმის პალეონომის სახით.

ბ. ბ. შუშაპე. გერმანული - ა. რ. ციქრაძე. ციქრაძე. გერმანული პალეონომი თვალმარტობა ბოლოვით კომპონენტი, ანსიკის სახეულებების და განსიგორმირება სენსორულ დარღვევებში. წარმოიშობა დამოკიდებულების ბოლოვით ილდე. შიოთისა და შიშის მრეველი აქტივის ფინზე ავტონობა ევრხალური ილდეობი, რომელიც მოგვარ აქვს ილდეობურულ პალეონომის ინტენსიობას. გამოხატულია ავტონობის დარღვევა სიმპტომების გართობა ხშირად დაკავშირებულია ავალსიკოთის ავტონობისებზე შეკვებასთან. ფიქციონის უკვანეთარება იწყება სენსორული, პირველ რიგში, ილდეობური ანალოგობების გამოხატობა, ავტორი ნორმალბიაციით, რას შემდეგ ქრება ბოლოვით ანრები.

ბ. ბ. შუშაპე. რეპროდუქციული - ა. რ. ციქრაძე. ციქრაძე. კლინიკური სურათი იწყება სხვადასხვა შინაარსის გერმანული პალეონომი-ბოლოვით, მომარობით აქვსებით, რომელსაც თან ერთვის შიშისა და შიოთის ავტონი შენგობში პალეონომიების შინაარსის მიუხედავად, დეკვება აქტივობა და მოქმედობით ავტონობის, აღინიშნება დარღვეობა, რომელიც აქვს გამოხატული სეუდანა ავალსიკოთა არიან ნაკლებობითა, უნიკობით, არ ავლენენ ინტენსივობის გარეობაში. მოგვარ მდგომარეობა აქვს სენსორული. ნაკლებობის რეალურიების მიუხედავად, ავალსიკოთა ცამონათქვამებთან ირკვევა შიოთის, შიშის არსებობა, განპირობებული დენისა და ფიქციური გამარტობის ილდეობით, რომელიც ინტენსიობის შავება ჯერ იწყებს დაბანპალეობის ილდეობის, ხოლო შემდეგ თვითშინადავების ილდეობის წარმოშობას. ფიქციონი რეალურიდება თანდათანობით, პირველ რიგში, ავტორი ნორმალბიაციით.

ბ. ბ. შუშაპე. რეპროდუქციული - ა. რ. ციქრაძე. ციქრაძე. კლინიკური სურათი იწყება სხვადასხვა შინაარსის გერმანული პალეონომი-ბოლოვით, მომარობით აქვსებით, რომელსაც თან ერთვის შიშისა და შიოთის ავტონი შენგობში პალეონომიების შინაარსის მიუხედავად, დეკვება აქტივობა და მოქმედობით ავტონობის, აღინიშნება დარღვეობა, რომელიც აქვს გამოხატული სეუდანა ავალსიკოთა არიან ნაკლებობითა, უნიკობით, არ ავლენენ ინტენსივობის გარეობაში. მოგვარ მდგომარეობა აქვს სენსორული. ნაკლებობის რეალურიების მიუხედავად, ავალსიკოთა ცამონათქვამებთან ირკვევა შიოთის, შიშის არსებობა, განპირობებული დენისა და ფიქციური გამარტობის ილდეობით, რომელიც ინტენსიობის შავება ჯერ იწყებს დაბანპალეობის ილდეობის, ხოლო შემდეგ თვითშინადავების ილდეობის წარმოშობას. ფიქციონი რეალურიდება თანდათანობით, პირველ რიგში, ავტორი ნორმალბიაციით.

ბ. ბ. შუშაპე. რეპროდუქციული - ა. რ. ციქრაძე. ციქრაძე. კლინიკური სურათი იწყება სხვადასხვა შინაარსის გერმანული პალეონომი-ბოლოვით, მომარობით აქვსებით, რომელსაც თან ერთვის შიშისა და შიოთის ავტონი შენგობში პალეონომიების შინაარსის მიუხედავად, დეკვება აქტივობა და მოქმედობით ავტონობის, აღინიშნება დარღვეობა, რომელიც აქვს გამოხატული სეუდანა ავალსიკოთა არიან ნაკლებობითა, უნიკობით, არ ავლენენ ინტენსივობის გარეობაში. მოგვარ მდგომარეობა აქვს სენსორული. ნაკლებობის რეალურიების მიუხედავად, ავალსიკოთა ცამონათქვამებთან ირკვევა შიოთის, შიშის არსებობა, განპირობებული დენისა და ფიქციური გამარტობის ილდეობით, რომელიც ინტენსიობის შავება ჯერ იწყებს დაბანპალეობის ილდეობის, ხოლო შემდეგ თვითშინადავების ილდეობის წარმოშობას. ფიქციონი რეალურიდება თანდათანობით, პირველ რიგში, ავტორი ნორმალბიაციით.

ბ. ბ. შუშაპე. რეპროდუქციული - ა. რ. ციქრაძე. ციქრაძე. კლინიკური სურათი იწყება სხვადასხვა შინაარსის გერმანული პალეონომი-ბოლოვით, მომარობით აქვსებით, რომელსაც თან ერთვის შიშისა და შიოთის ავტონი შენგობში პალეონომიების შინაარსის მიუხედავად, დეკვება აქტივობა და მოქმედობით ავტონობის, აღინიშნება დარღვეობა, რომელიც აქვს გამოხატული სეუდანა ავალსიკოთა არიან ნაკლებობითა, უნიკობით, არ ავლენენ ინტენსივობის გარეობაში. მოგვარ მდგომარეობა აქვს სენსორული. ნაკლებობის რეალურიების მიუხედავად, ავალსიკოთა ცამონათქვამებთან ირკვევა შიოთის, შიშის არსებობა, განპირობებული დენისა და ფიქციური გამარტობის ილდეობით, რომელიც ინტენსიობის შავება ჯერ იწყებს დაბანპალეობის ილდეობის, ხოლო შემდეგ თვითშინადავების ილდეობის წარმოშობას. ფიქციონი რეალურიდება თანდათანობით, პირველ რიგში, ავტორი ნორმალბიაციით.





წერალებს» და პიროვნული «ჩაყარვების» არსებობაზე (ანუ სუიციდენტის ბიოგრაფიაში საკეისრო მონებების), სტრანჯულ (სონდლიტორ) სიტუაციურ დატვირთვაზე. პიროვნებისა და გარემოს ურთიერთობის დარღვევა შესაძლოა ადრეულდროს როგორც პიროვნული, ასევე უახლოესი სოციალური გარემოსთვის არსებული ცვლილებების ხარჯზე (მაგ. ოპიზმი). აღნიშნულ-ფსიქოლოგიურ ასპექტზე სუიციდური ტენდენციის განხილვას კონცეფსია ითვალისწინებს რისკფაქტორების ურთიერთქმედებას სამ ძირითად დონეზე - ფსიქოპათოლოგიურ, ინდივიდუალურ-პიროვნულ და სოციალურ-გარემოებით დინამიკაზე; იგი მისაღებად სუიციდის შექმნიშის გაგებისათვის როგორც უსიქოზებით და პათოლოგიურ ფსიქიკურ ანალიზებით დაავადებულებზე, ასევე პრაქტიკულად ჯანმრთელ პირებზე.

**აპროქსიმაცია** - **аппроксимация** (ლათ. **approximare** - სასიაშვირო, მხარული) (**Russ B.**). მღერის მანათაქვეური ფაზის აღმნიშვნული ერთ-ერთი უჭველები ტერმინი. მხიარული მანაა, რომელიც ხასიათდება გარემოსაღმი განსტროსითი დამოკიდებუებით.

**აპროქსიმაცია** - **аппроксимация** (ბერძნ. **πρῶσις** - თუ, მთავარ, **πίσις** - ღება). თფურას არარსებობა არაუპირეს ექესი თვის განბაქლობაში. გებულება ენოგებური ფსიქოზების დროს, ფსიქოგენიის შედეგად, აგრეთვე ენოკირინული ფსიქოსინდრომის დროს.

**აპროქსიმაცია** - **аппроксимация** (ლათ. **mens** - ქუა, აპროქინება, აპრი) (**Melbert Th., 1881**). ცნობაერების აშლები ხინდრომი. ძირითადი ნიშები - აღკლში. დროში და საკეთარი პიროგებებში სრული დებორტინაცია, დაუკავშირებული აპროქინება, აწველი გებუტლობა, აპროქინება, არაბრუვა და ქალუცინაციის არსებობა, წყველით ბოღითი განცლები, დანებულობა. მიმები, არაადკეპტურა უსოიერობა. ზოგჯერ ხანგრძლივი მოუკებრობა (ჩვეულებრივ, საწოლის ფარგლებში). არს გამოსაღლის შედეგ - ანებია. ვითარდება მამიე ხანგრძლივი, ორგანიზმის გამოშვიტავი სობაგური დაბადების დროს. განსაკუთრებული ვარანგების ხასით გამოყოფენ პადლუტინბტორ (ხატოგანი ქალუცინაციური განულები) და კატატორნორ (გამობაგული შიძრაობით - ნებით დარღვევები) ა.ს. აგორმა პირველად უწოდა მწეავე ქალუცინაციური ანებია და შემდგომში, 1890 წ. შემოღო ცნება ა., რომლის საბღრეები მნიშვნელოვნად გააფართოვა, განიხილავდა როგორც დამოკიდებელ ფსიქოს.

**აპროქსიმაცია** - **аппроксимация** (ბერძნ. **πίσις** - მისუგება). შიშავის დარღვევა; გებულება ხასის ნერვის დამიანების, პარკინსონიზმის, კატანორი სტეპორის, ნეოროლეუსიური სინდრომის, იდიოგის და ა.შ. დროს. პარკინსონიზმის დროს ა. - ემოციური რეაქციების მოგორული კომპონენტების ერთ-ერთი გამოვლენებაა და შეღის ზოგადი აქსენების სინდრომი. ა. გებულება თავის გენის შეღის წდლის ორგანული დამიანებისას ("შებღის სინდრომი"), შიეთითეს ემოციური სფეროს დარღვევებზე.

**აპროქსიმაცია** - **аппроксимация** (ბერძნ. **πίσις** - კუნთი, **σίνტონ** - ძალა). კუნთოგანი ხახუტებ გებულება ცნსის ორგანული დაავების და ნეიროზის (ასეგინორი, ისტერული) დროს.

**აპროქსიმაციური ნიშები** - **аппроксимационные признаки** განმუხრუტება შიღწევა კოეცინის (10% -იანი 2 მლ) ხსნარის და 20-30 წუთის შემდეგ ნატრიუმის ანიგლის (2%-იანი - 20 მლ ოენით ან 5%-იანი - 5-10 მლ ხსნარს კუნთებში) ხსნარის შეეცინი, ხშირად კოეცინი და ნატრიუმის ანიგალი შეესეეთი ევენბი ერთდროულად. გამოიყენება სტეპორული მღგომარებობის (კატანორიზი და რეაქტული) დიაგნოსტიკის მიზნით; განმუხრუტების პეროქსიმი ავადმყოფი ხდება კოგაქტისათვის ხელმისაწვდომი, რაც ექიმს აძლევს საშუალებას, ჩაწვდეს მის ავადმყოფურ განულებს. განმუხრუტების მღგომარებობა გადღის ბღმე. სინონ: პარკინსონი-აპროქსიმაცია.

**აპროქსიმაცია** - **аппроксимация** (ბერძნ. **πίσις** - გახსენება). შეხსეებებს არარსებობა, ადრე შიღებულები კოდნის შენახვისა და კოეცინების უნარის დაკარგვა.

**ა. აპროქსიმაციური** - **а. апроксимационная** (ბერძნ. **πίσις** - თეთონ, **βυρῖος** - ძილი)(**Young C.**). ფუნქციური ა., რომელიც ხასიათდება დეიწყებით დეიღვენის შედეგად.

**ა. ანტროპომორფული** - **а. антропоморфный** (ლათ. **antropus** - ადრე, მანაზე, **μορφή** - სიარული). ერუელდება იმ პეროქსიკურ რომელიც დგება უშუალო ცნობიერების აშღის ან ხევა ავადმყოფური მღგომარებობის შემდეგ.

**ა. ანტროპომორფული** - **а. антропоморфный** (ლათ. **antropus** - შემღებ, **μορφή**). ანტროგრაფული და რეტროგრაფული ა.ის ერთობლიობა.

**ა. დინამიზმი** - **а. динамизм** (ბერძნ. **δυναμις** - ძალა) (**Charcot J.M., 1892**). ფუნქციურა, უშეესად აბტრეული ორგანიზმის ა., რომლის დროსაც ავადმყოფს დეიწყებული ახსენდება პიპსორ მღგომარებობაში. საწინააღმდეგოა წარბაული ა.ისა, რომლის დროსაც დეიწყებღლის განსენება არ ხდება განიროზის მღგომარებობაში.

**ა. ეპისიქსიზმი** - **а. эпихизм** (ლათ. **epichizma** - პარკინსონიზმი).

**ა. ეპოქსიზმი** - **а. эпихизм**. ივეულებრივ, აღმოცენდება შიკური მღგომარებობების დროს წარსულის ხანგრძლივი პეროქსი - თებები, წვეები, ზოგჯერ შიღე ცხოვრება - მოუღებრება მესიერების სრული დაკარგვის შედეგად.

**ა. ინფანტილიზმი** - **а. инфантилизм** (გერმ. **infantile Amnesie**). ფსიქოანალიზში ანებობა გამოვლენება სიყოფისლის პირველ წვეზის უბეტების დამავლით. ფრთღე (Freud S.) მიიჩნევს, რომ ეს არ არის ბავშვის ურქიური შეუღებლობის მიმები, არაბებ ანგატორი ა. აღმოცენდება ბიემვეური სექსუალობის განღვენის შედეგად და ერუელდება ადრეული ცხოვრების ყველა ურქიამზე.

**ა. კატანომიზმი** - **а. катамизм** (ბერძნ. **καταμυση** - სულით დაქცება). ა. მხოლოდ განსაღრულ, პირიგენებისათვის შიშნელოვან შოუღვენება და პირობებზე.

**ა. კარინატიზმი** - **а. каринализм**. იხ. აპროქსიმაცია ლატანოზია.

**ა. კონტრადიქციური** - **а. контрарный** (ლათ. **contra** - ერთობლივად, **μορφή** - სიარული). ა. დროის იმ პერიოდზე, რობული შეესაბამება ცნობიერების აშღის ან ხევა ავადმყოფურ ფსიქიურ მღგომარებობას.

**ა. ლატანოზია** - **а. латанозия** (ლათ. **latans** - ღრმული, ორმი). კონტრადიქციური ა.ის შერბილული ვარიანტი, რომლის დროსაც შესიერების დარღვევები აგარებს ხერულე ხასიათს. ივეულებრივ, გებულება ცნობიერების არარბა შეუღლის (მაგ. ლდირაუმის. ონიგროლის) და ისტერიის დროს. სინონ: ა. ნაშოლოზონიზმი, ა. მარკინატი.

**ა. ნაშოლოზონიზმი** - **а. латанозия**. იხ. ა. ლატანოზია.

**ა. ნეპატომიზმი** - **а. непатомизм**. განპირობებულია ავადმყოფის მინაგანი წინააღმდეგობით, წარმოსახვის ცალკეული ურქების, შიყენების, პირების და ა.შ. შესაძლოა იყოს ნეგატოიზმის, აუტანზის გამოვლინება.

- ა. პერიოდიკალი - а. периодическая, დროის შემოვარდნულ შედეგებსში არაერთჯერადად განმეორებული ა. სინონ.: ა. პერიოდული.
- ბ. პოსტპოსიტივიზმი - а. постпозитивизм, აღმოცენდება მოვლენებში და წარმოდგენებში პოსტპიპოზიტივიზმი მთავრობების შედეგად.
- გ. პრეპროგრესიზმი - а. предрогрессизм, ერეკლეება მოგვიანებით მიღებული ცოდნის მარტივად აღრე მიდებულისკენ, რამის კანონის შესაბამისად.
- დ. რეტარდირიზმი - а. ретардиризм, კონკრეტული ა-ის ვარიანტი, რომელიც დგება არა მამინე, შეუვლილი სპონტივობის ან ფსიქიკური ანალიზობიდან გამოვლენისთანავე, არამედ გარკვეული დროის შემდეგ.
- ე. რეტროგრადიზმი - а. ретроградизм (ლათ. retro-უკან gradior - სიარული), მოყოფის პერიოდს, რომელიც წინ უსწრებს რეტროგრადიზმს ან ფსიქიკური მდგომარეობის მანიფესტაციას.
- ვ. რეტროგრადიზმი ბერიკრალიზმი - а. ретроградная ретроградия (Бехтерев В.М., 1900). ხასიათდება მეტეისმავიარად აღმოცენებული რეტროგრადული ა-ის მდგომარეობით (რეტროპეტროტი - ბეტეტრეტეს ტრანსპროლოთი). დაშლისათებულა სრული ორიენტაციის დროში, ადვილსა და საკუთარ პიროვნებში. ავადმყოფი უჩივის მძიმე განცდის, უზნარისა, ადვილია მენსიერებისა, რაც მას გადახდა მეტეამფლ რამენიშ საათის წინ (ლდე-ღამის განმავლობაში). მეტეის შემდეგ - განცდილიდან დაკავშირებით ა. აღწერილია თავის გონის ორგანული დამინების დროს (ინსულტის გადაცემის მოგვიანებით პერიოდში) და თავის გენეზით განიხილება როგორც ექილუენიფორმული.
- ზ. ტრანსფორმულიზმი გლიზალურიზმი - а. трансформация гонизализм (Bender M.B., 1956; Fischer C.M., Adams B.D., 1958). დამახასიათებელია გარდამავალი სრული ა, რომელიც მოიცავს წინა დღის ან კვირის მოვლენებს. ანენივიური დარღვევის რეკურენცია ხდება რადენიმე საათის განმავლობაში. დაავადების გამოვლენების დასაწყისის განსვენების მიმდინარე მენსიერების სრულ აღდგენად რჩება გამოვარდნები. მეულებრივ გუბდუბა ერთჯერადად მიმზემბი უცნობია, ვარაუდობენ თავის გონის ქსოვილს დოკალურ გარდამავალ მემქმის სისხლის მიმოქცევის განნიგორულ მოქმდათან დაკავშირებით, პირველ რიგში, ბაზილარული არტერიის ავში.
- ჩ. შიშინიტიზმი - а. шизоинизм, ხასიათდება მიმზდარის დამახსოვრების მეუძებლობით. შავ, ავადმყოფს ეუბნებიან მოსახერის სახელს, შემდეგ აღკვეენ რამე უკრადლებს გადამგან კითხვას და მამინევე კითხვებიან სახელს. როგორც წესი, ავადმყოფი ამტკიცებს, რომ მისთვის სახელი არ უთქვამთ.

**აქრონომიები ტრანსფორმულიზმი ბერიკრალიზმი - а. трансформация ретроградная аномалия.** გუბდება 45-70 წლის ასაკის პირებში და გრძელდება რამდენიმე საათიდან რამდენიმე დღემდე. განხილება როგორც არაექილუენიური ევრებსრულ-ვასკულარული მეტეები, რომელიც განაპირობებს ლიბური სტრუქტურების მოქმედების დარღვევებს (Frank L.K., 1981; Жмуров В.А., 1988).

**ამოკი - амок (მალ. амок - ყოფიანი, შიგნი). შწკავე ფსიქოზი,** რომელიც აღწერილია მალაის კუნძულების აზიოციენებში. დისფორიის პერიოდის შემდეგ მოცუერ მის გარემოც, ვითარდება ცნობიერების ბინდისებრი ანალიზობა ავრესიულ-დამხარვევად მოქმედებით, შემდეგში ანენიფი. კრებულამს მიხედვით, ა. წარმოადგენს ექილუენიური წრის ფსიქოზი. შიშკოვსკა (F.M.Ishkovskaya, 1935) თვლიდა, რომ ა. დუფენიფორ-გუქლოშიური პროპორციის გამოვლენება, დამახასიათებელია გლიზროდიფიზიის (ვადეფსოდიფი); ბლანგი აუქტეს დგროუება, მისი სტამი და აუექტური ექსპლოზური განვითრება.

**ამორფიზმიზმი - а. аморфизм (ბერძ. ამორფიზიზი)** აგნოზიის სახე, რომლის დროსაც დაკარგულია ობიექტის ფორმის აღქმა.

**ამიტრობა - а. амитроба,** რომლის დროსაც სუბიექტი ობიექტს მიაკუთვნებს ერთ-ერთ მისთვის უკვე ნაცნულ და ფსიქონებულ კლასს ან კატეგორიას. აღნიშნულ პროცესის უმნიშვნელოაქვის მიმეტიკა ობიექტის აღწერილობის პერსექტიური შედარება მენსიერებაში არსებულ ევალონთან.

**ამიტრობა ცრუ - а. амитроба ложная (Raggen F.W., 1837).** აღდგენილი დროი აბოცნობას დაწერივა ანუ ამა თუ იმ ობიექტის, როგორც კონკრეტულად ინაცნობის ან «უცნობის», შეცოდებით ანუცნობა მათი სწორი კატეგორიაციის დროს. ა-ის მიეკუთვნება აღმასივობით ან უარყოფითი არიულის სიმპტომები კამგრას სინდრომის ფარგლებში, ფრეგოლის სიმპტომში, კურბონის და გუსკის ინტერმეტამოროზის ბოღება. გუბდება მთავად ფსიქიკური დაავადების დროს, თუქი, შიგვირით მათგანის სტრუქტურაში იტენს სპეციფიკურ ხასებს, შავ, სიმეცრა და შვილირო კემიშირი ბოღესთან და ფსიქიკური აგნოზიციზმის მოვლენებით მიმოფრენიის დროს; ეპიბოღერება შწკავე ეგნოციენ-პროგანული ფსიქომების დროს; მზარდი პროგრულიენცობა სენილური ემეციის დროს (Краутов В.Н., 1976). სინონ.: ცრუ ცნობა.

**ამტავარის ტპტიცი ინტელექტის სტრუქტურისმი - А. Амтатары тест структуры интелекта (Amthauer R., 1953).** ატკლექტის გამოკლექის ერთ-ერთი ფსიქომეტრული ტუბტი მიმართულია ურბადური ინტელექტის (ინტექტიური ანტიენება, კომბინატორიკა, მსუჯელობის ფორმირება), საანგარიშო-მათემატიკური უნარის, სიერციბორივი აღქმისა და ამოცნობის მასალის დამახსოვრების შენარუნების გამოსაკლექად. შედგება ცხრა, სუბტესისაგან. ინტელექტის დონის შეუახების გარდა ხდება მისი სტრუქტურის დახასიათება ცალკეულ სუბტესტის წარმავებით მსერულების მიხედვით. გამოციეება 13-61 წლის ასაკის პირთა გამოსაკლექად. ყოლი საბჭოთა კავშირში ადამციენიული იყო ობიექტის, სეირდის, ტომის მიერ (Х.И.Линднер Ю.Л.Савар Ю.Л.Тонин, 1974).

**ამჟსება - а. а. музика (ბერძ. μουσική - მუსიკალური) (Stahlhuth, 1871).** მუსიკის (ყოკალური ან ინსტრუმენტული) გაცეების და მსერულების, ნოტების წრის და კითხვის უნარის დარღვევა. ნორმალ რწყებისსქენი აგნოზიზა. ა-ზე დასაყარი შეიძლება იმ შემთხვევაში. თუქი ეს უნარი ადრე ახასიათებდა ავადმყოფს არიქენ შიტორულ და სენამორულ ა-ს. სენამორული ა-ის დროს მუსიკის აქმა დაწერილია, თუქი, მსერულების უნარი შედარებით შენარუნების (ლდე-ღამის განმავლობაში) 22-ე ევლის (ბრდლმანის მიხედვით) დახასიათებას. შიტორული (ყოკალური) ა-ის დროს კი ავადრეულია მუსიკალური ნაწარების მსერულების უნარი მისი აღქმის უნარის შენარუნების ფონზე, დაკავშირებულია 45-ე ევლის დამინებასთან. ა. განსხვავდება ატკლექული დახასიათებისაგან, რომლის დროსაც მეუძლებელია მუსიკალური ინსტრუმენტზე დაქრა.

**ამჟსებაშინიზმი - а. а. а. музика.** ნოტივებებზე, მასციფილირებლად მოქმედების ცს-ში ა-ის უკუფიდან პირიელი პროპარატი სინთეტირებული იქნა 1887 წ., მაგრამ 1932-მდე არ იყენებდნენ როგორც ვარმაკოლოგიურ საშუალებას.

თავდაპირველად იბინი გამოიყენეს ანალგორების სახით სურღოსა და ასომის წინააღმდეგ 1937 წ. დამზადებულ ერთა დახვედვაზე, რომელიც გამოიყენებოდა ნარკოლევისის და პოსტენევიკალიტორი პარკინსონიზმის, ასევე ღებრების და ფსიქონერვტიკული პოტენციების დაქვეითების სასწრაფოდ. 70-იან წლებში აღნიშნულია პირი გამოკვლეული ნარკოპანის მრ.ა. რის შედეგზეც, ერთი მხრივ, შეიზღუდა პისი სამედიცინო მოხმარება, ხოლო, მეორე მხრივ, გაიზარდა არალეგალური წარმოება და მოხმარება. ამჟამად, ცნობილია აის რიგის 500-ზე მეტი პრეპარატი, რომელთაგან ყველაზე ხშირად გვხვდება ამფეტამინები (Amphetamine, Angorex, Astedin, Benepac, Catalip, Dipen, Indafen, Oracem, Fenamin, და სხვ.), ლექარიაშეფარებები (Adipan, Buntril, Codexin, Dextridex, Elastinon, Maxilvan, Themoil და სხვ.), შეგამეფარებები (Ambar, Bustaid, Cidin, Desoxydip, Eplisindrome, Methedriae, Normudine, Oxyfed, Stomamine, Perrivin და სხვ.). ვარკოელი დასახელება *«wits», «vica»*.

**ამპროლიუმის** - *amprolium* (ბერძნ. *amphi* - ირველი, *prolium* - მხარეს, *lymos* - ხასიათი, სული) (Hellpach W., 1919). შერეული აფექტი. ცირკულარული ფსიქოზის დროს ურთიერთსაწინააღმდეგო აფექტური მდგომარეობების ერთდროულად აღსრულება, რომელიც გრძელდება განსაზღვრული დროის განსაზღვრებაში, მოგვიერ კი განაპაროებს მოუღ ლინიკურ სურათს. **მამბარამპროლიუმის** *მამბარამპროლიუმის*. გერმანი **«ა»** გამოიყენება სხვა მნიშვნელობითაც, აფექტური სიმპტომების ინტენსივობის ცვალებადობაში მიზნობრივ ფსიქოქერო-სტეროიდულ დეპრესიის დასაინტენსივად (Blitzstein, 1936).

**ანალკურში პრეპარატები** - **აპროპოპიკაი** *propoxyphene* (ბერძნ. *anabolos* - აღმართი) **სამკურნალო პრეპარატი**, ხელს უწყობს ორგანიზმში ცილის სინთეზის სტიმულირებას, იწვევს მადის დაზოგინებას, უნებოციან მასის და მთელი სხეულის გაზრდას, აუზოპოსებს ავადმყოფის მთავარ მდგომარეობას, ამკარებს ძვლების კალციფიკაციას. მათი დანიშნვისას ავადმყოფის საკვები რაციონი უნდა შეიცავდეს ცილების, იხმების, ნახშირწყლების, ვიტამინების, მინერალური ნივთიერების გარკვეულ რაოდენობას. აღნიშნება კატექსური მდგომარეობის, სხეულისგან გრძელად გრძელის ასეთების დროს. არჩევენ **ანალკურში** (კალიუმის ოროგატი და სხვ.) და **სტროლი** (ნერობოლი, რეგამოლია, ფერობოლი და სხვ.)-ს. უკანასკნელი სტროლიდების სინთეზური წარმოებულებია, რომელთაც გააანიათ ამორფული და ანალკურ აქტივობა მინიმალურად გამოხატული ანტიოგენური უწყვეტია. სინონ: **ანალკურში**.

**ანალკურში ტამპროლი** - *analgesin tamprolium*. ტკივილზე შეგრძობებს დაკარგვა გკივილის მგრძობილებლის გამოვარდნისთან ერთად. გვხვდება მურგის გენის ხმობის დროს.

**ანალკურში პენალკურში** - *analgesin penalkurium* (გოტლანდ ა., 1936). პირობური შემოქმედება საშობიარო გკივილების გავსებების მიხედვით.

**ანალკურში პრეპარატები** - **აპროპოპიკაი** *propoxyphene* (ბერძნ. *anabolos* - აღმართი) **ტკივილშემოქმედებელი** სამკურნალო ნივთიერებათა ჯგუფი, ისევე ნარკოტიკულად არაანარკოტიკულად ა.პ.-ად. ნარკოტიკულია ის პრეპარატები, რომლებსაც რომე წინააღმდეგობა მოქმედებს ოპიოიდურ ნარკოტიკებზე. მოქმედების მიხედვით არჩევენ: **ფენალკურში** - მორფინი, კოლინი, პრომედოლი, პიდროპროფინი, ლევიპროფინი, სუპილინი, ლექარიაშეფარებები, ფენალკურში, MST, დელიდროკოლინი და სხვ. **ფენალკურში-ტკივილშემოქმედებელი** - პერკოლინი, გლუბინი, ბუკოლინი, ნალბუფინი, ნალირფინი, სტალიფი; ანტიგონისტები - ნალიქსონი, ნარკინი, ბუკინორფინი და გრამადოლი (გრამადოლინი) (ეს უკანასკნელი წარმოადგენს აგონისტის მოქმედების შერეული შედეგის მიხედვით). ა.პ.-ის მეორე (ანანარკოტიკული) **ჯგუფი წარმოადგენს** **შემდეგი ძირითადი ქვეჯგუფები**: სალიცილატები (აუცილებელია მათი შეფარება, სალიცილატი, დიდუნიბალი); **პ-ამინოფენოლის წარმოებულები** (პარაქეტამოლი); პირამიდის წარმოებულები (ფენანტინი, მეგამბოლი); ანტიანოლის მეთვის წარმოებულები (მურენამის მეთავი, ულფენამის მეთავი, ნოფუმის მეთავი); პროპიონის მეთავის წარმოებულები (იხუპროფინი). ნარკოტიკული ა.პ.-ის დამზადებაში უნდა იქნას გვირგვინი გვირგვინი მოქმედება და ე.წ. მიკროვის ეფექტის წარმოშობა. ისინი დაზოგინებულ მოქმედებს ცნს-ზე. გარდა ანალკურში თვისებებისა, აგონისტის საძილად და ხეივლის საწინააღმდეგო თვისებას (თერგინის სუბტილის ცენტრი), ცილის გუნება-განწყობას ანანარკოტიკული ა.პ. აგარებს ძირითად და სხვა სხვა თვისებას: ანალკურში, ანთებისწინააღმდეგოს და სიყბისდაძვევს. მათი ანალკურში მოქმედება განხორციელდება უპირატესად პერიფერიულ ნერვულ სისტემაზე მოქმედებით, ვიდრე ცენტრალურზე.

**ანალკურში პრეპარატები** - *analgesin propoxyphene* (ბერძნ. *anabolos* - აღმართი) - **გამაძლიერებელი, აღმართი, სამკურნალო პრეპარატი**, იწვევს ცნს-ის მოქმედების სტიმულირებას სასუნთქი და სისხლძარღვითი მამობრავებელი ცენტრების აფექტის მომატების ხარველი (პროპოლი, ქუფერი, კორდამინი, ბემგრიდი, ციციგონი, ლომბინი და სხვ.).

**ანალკურში ტამპროლი** - *analgesin tamprolium* (ბერძნ. *amphi* - ირველი, *prolium* - მხარეს, *lymos* - ხასიათი, სული) **სამკურნალო პრეპარატი**, იწვევს ცნს-ის მოქმედების სტიმულირებას სასუნთქი და სისხლძარღვითი მამობრავებელი ცენტრების აფექტის მომატების ხარველი (პროპოლი, ქუფერი, კორდამინი, ბემგრიდი, ციციგონი, ლომბინი და სხვ.).

**ანალკურში პენალკურში** - *analgesin penalkurium* (ბერძნ. *anabolos* - აღმართი) **ტკივილშემოქმედებელი** სამკურნალო პრეპარატი, იწვევს ცნს-ის მოქმედების სტიმულირებას სასუნთქი და სისხლძარღვითი მამობრავებელი ცენტრების აფექტის მომატების ხარველი (პროპოლი, ქუფერი, კორდამინი, ბემგრიდი, ციციგონი, ლომბინი და სხვ.).

**ანალკურში ტრამპროლი** - *analgesin tramprolium* (ბერძნ. *anabolos* - აღმართი) **ტკივილშემოქმედებელი** სამკურნალო პრეპარატი, იწვევს ცნს-ის მოქმედების სტიმულირებას სასუნთქი და სისხლძარღვითი მამობრავებელი ცენტრების აფექტის მომატების ხარველი (პროპოლი, ქუფერი, კორდამინი, ბემგრიდი, ციციგონი, ლომბინი და სხვ.).

**ანალოგიზმი** - аналогия (ლათ. analogus - უკანა გასაყალი) ორალური კონტაქტი ანუსთან შექმნილი ავზების და დაქმარების მიხედვით.

**ანალური შაზა** - анальный фим (ლათ. anus - უკანა გასაყალი). ფსიქოანალიზში: სექსობრივი ღვინის (ღიმი-ღის) განვითარების ფაზა, როცა ძირითადი ეროტიკული მიზნები ღვინისგან დაიკარგებულ ვიყოფის. შეესაბამება 1-3 წლის ასაკს და ცუდად არღვრება ფაზა. ანალური შაზა (სწორი ნაწლავის და ანუსის ღვინით), ფროიდის (Freud S.) მიხედვით, შემდგომში კარგავს თავის ეროტიკურ მნიშვნელობას გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა უორმირება სექსობრივი გაუქმობით (პისიუქსუალაზია). იხ. სტაბილური ანალიზი.

**ანალიზი** - анализ (ანგლ. analysis). ფსიქოანალიზში: გერმანი ენაზე ყველა იმ შემდგომად, იმპულსის, პიროვნული ნიშნების ფსიქიკურ ორგანიზაციას, რომლებიც წარმოშობილი ფსიქოსექსუალური განვითარების ანალიზში შაზა (იხ.) დროს. ანალური კონტაქტი გულისხმობს სექსუალურ სიახლოვებას ანალურ ფუნქციებში (შეხება, დაყრდნობა, შეკავება, გამოშვება და სხვა). ფსიქოანალიზის მიმდევრები ხასიათის ისეთ თვისებებს, როგორცაა: აკრებლობა, უსუსობა, სიყვარული, დაუპირისპირებლობა, გამრღობი ამხივადღებობა, შობიერი სიბუნჯე, მისხანება და სხვა-სხვაობისში, განიხილენ ანალური ხასიათის ნიშნებად.

**ანალიზი** - анализ (ბერძნ. analyein - მოკონება). მისი დაავადების განვითარების, გარემოს შესახებ ცნობებს ერობლობა, რომელიც მიღებულია ავადმყოფის (ფსიქოტურია ა.) და მისი გარემომცველი პირების (ობიექტურია ა.) გამოკითხვით. არღვენ ახ: ფსიქიატრიულ (ფსიქიკური განვითარების თავისებურებაში, პიროვნების პირობობა ხანში, შეწყვიდრობა, ინტერესების და გატაცების წრე, სსაქველ პროცესში მოსწრება, მანე რივეების არსებობა და ა.შ.). სსიკავადებს (საყოველთაო პირობები, სიყვარული, სიყვარულში დახასიათება, ურთიერთობა კონტექტიში, სსიკავადებაში); ფარმაკოლოგიის (ავადმყოფის მიერ მიღებული მედიკამენტები და მათი ეფექტრობა, გვერდითი მოვლენები, მოფიერთი პრეპარატის მიმართ აუტანლობა); ენდოკრინოლოგიის (ავადმყოფის სასიკურებელი ადგილის, ინფექციური დაავადების შესახებ ცნობები). ფსიქიატრიულ ანალიზში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება დაავადების, ცხოვრების, შეწყვიდრობის, თქმურ და ა.შ. ახ.

**ანანტიზმი** - ананизм (ბერძნ. ananasis - იძულება) (Domas G., 1897). მოვლენა, გამოწვეულია აკვიატებული იდეების ატროფიკურად, მათი დომინირებით ავადმყოფის ფსიქიკაში და გავრცელებით შობილობით სვეროს, აკვიატებული რეაქციების წარმოქმნით. აკვიატებული მდგომარეობა სახე გამოიხატება სიკვდილურად არადეკლარირებულ განვლებით და მოქმედებებით, მაგ. ხელების აკვიატება ხანში. აღნიშნება მშობოთარე-იქნეულ, ინერტულ, კედანტურ პირებში, ხშირად აკვიატებულ მდგომარეობაში ნევროზის და ფსიქოპათიის ფარგლებში. სინონ: ინსანიზმი.

**ანანტიზმი** - ананизм (Klein E., 1921). გერმანი გამოიყენება ხანგრძლივ და ტიპის აღსანიშნავად, რომელსაც აქვს მიკროვილება აკვიატებული ანტიზმი და მოქმედებისაღმე, ანანტიზმისაღმე. აკვიატებულ მდგომარეობაში ერთ-ერთი უორმა.

**ანარქიზმი** - анархизм (ბერძნ. anarchos - დაწარეხება და წარმოქმნა). დანარქიზებული, არკიკლადური მეტყველებების დარღვევა. მიმართული მეტყველების გატაცება და წერის უნარი ამ დროს არ ირღვევა. წარმოადგენს არკიკლადიაში შიანადე ანარქიის (კუნთები, ნერვები) აღსანიშნების შედეგს. ცხელება ხელებური და ფსიქიკობუნური დასხლის დროს.

**ანასტროფი** - анастрофия (ბერძნ. anastrophos - გაღობობა, ძირს დაყება). იხ. ტრეფი უსუსობისაღმე და სტაბილური ანალიზი.

**ანატროფი** - анатрофия (ბერძნ. anathro - ადგილი, ადგობლობა) (Courbois P.). 1. ფსიქიკური ანალიზობა, უვითარებათ გარკვეული დროის შემდეგ იმ პირებს, რომლებიც მოკვლეული არიან მათთვის ახელ გარემოს: უხო ქვეყანაში, ახალ განსტავებულ გარემოში მოხვედრისას, სადაც უფირი მეტყება: 2. ცხოვრების ახალ პირობებთან შეგუება გახველება. ცხელება ევროგურ დეპრესიის დროს. შორ: შიანტიზმი შიანტიზმი.

**ანაფილასია** - анафилактический приступ (ბერძნ. phylaxis - დაცვა). ძველი ფსიქოპათოლოგიური სიმტროფის დაბრუნება პირველად არსებული ავადმყოფური მდგომარეობის გამოწვევის შედეგი ფსიქიკების შემოქმედების შედეგად. პირველად ფსიქიკების აღნიშნავენ როგორც მასინახილიმებელ ფაქტორს, მეორადს - როგორც გამაქტივებულს. გერმანი გამოიყენება ფსიქოანალიზში, განსაკუთრებით, ფსიქოსმატიური დაავადებების შეკვლევის დროს. მაგ. ფსიქოანალიტიკოსი ბროქელს ასომის პირველად მიიჩნეა ახლოდრო, საყვარელი დაშინის დაკარგვის შიში (ხეშეხიან ახლოს დასწრში მდებ) ეს მოვლენები განიხილება როგორც მასინახილიმებელი ფაქტორი. გამაქტივებელი ფაქტორი კი არის სიყვარულის დაკარგვის შიში - კოლს შექარა, დატოვის ავადმყოფი (Combell R.J., 1981). სინონ: შიანტიზმი შიანტიზმი, პრეპარატი შიანტიზმი.

**ანაფილასიკური** - анафилактический (ბერძნ. anaphylaxis - განვლეობა). გარე ხამყარადან გამოყოფა, მიღრეკილება პირირილი ადგილისაღმე, აღსანიშნებთან კონტაქტის აცილებისაღმე. ცხელება ვანატიკურად შორწყუნებში. ფსიქიკური პათოლოგიის დროს - დეპრესიულ ავადმყოფებში, შიშიურნილი ავადმომის ფარგლებში, შიშიოლური ფსიქოპათიის დროს, შიშიე ფსიქოგენების შემდეგ. სინონ: შიანტიზმი შიანტიზმი.

**ანაზია** - ананазия. პაშიშის ერთ-ერთი სახეობა შუაშიერი გარგონელ დასახლება. იხ. ტრანსპარაქსიანობა. ანბოცვანობის განვითარების სსიკავადებაში ანალიზში შიანტიზმი ანალიზში შიანტიზმი (ბერძნ. anaglysis - სისხლძარღვი, - შიანტიზმი - სისხლის აღნიშნება დეპრესიული, ერთად - სისხლძარღვიანი სისხლის) (Sturge W.A., 1879; Weber F.P., 1992; Krabbe K., 1934). თანდაყოლილი მათოლოგია, აღსანიშნება თავის გენის და სპერმა ნერვს. სასიკავადე სახეზე და თავზე ანგიომები (ხშირად სპერმა ნერვის ინერვიაციის გასწვრივ), თანდაყოლილი გლავიკოზი, ენდოკრინოლოგიული გლავიკოზი. ფსიქიკური შიანტი - სხვადასხვა ხარისხის გონებრივი ჩამორღობა, გამოიხატება ცხელება, ფსიქიკობუნობა, ხელებისაღმე მიღრეკილება, ბლმინობა, აფექტური არამედიკალიზა, ცრუობა, სუსილური ანტიზმი. დაავადება ხშირად ელენდება ერთი თქაბის რამდენიმე წეწრში, რაც საშუალებას იძლევა. განიხილებოდეს როგორც შექვიდრობითი პათოლოგია ავტოსიმურ-დომინანტური გადაყვების დრო. სინონ: ხეშეხიანტიზმი და სხვა-სხვაობისში. ანბოცვანობის სსიკავადებაში ანალიზში შიანტიზმი.

**ანბოცვანობის სახეობები** - ананализы (Moale A.C. 1933). თავის გენის სისხლძარღვიანი სისხლის რეგულაციის სახეობები გამოიყვლება შიშიოლური გენის სისხლძარღვიანი (არტერიებში - კარკისანგიოგრაფია;



უენამი - ფლავორაია) ინდოევრონული საკონგრასკო ნივთიერების შეყვანის გზით. იმდებუა თავის გენში  
ათლოლოკური პროტეინის ხასიათის, დაბინების ცოპიკის, გენის სისხლმარების ანევირიუმებს და ორიზიზიზების,  
კოლაგენური სისხლის მამოქვეის მდგომარეობის გამოვლენის საშუალებას.

**ანეროზიზმი** - ანარიაზი (ბერძ. ანგი-ჰემინია, phrasia-მეყველება). სახალხოდ გამოხლეების აკვატებელი შიში  
ხმარად გვხვდება ფსიქოსტენიური პირებში, განსაკუთრებით აკვატებულ მდგომარეობათა ნერვოზის დროს, უდინდება  
სოკლებმა და ფრამებში ხმოვნების, ორამბი ხმოვნების და ცხვირისსიერი ბევრების ჩართებით. (აბ, ეუ, ენუ, ანტ, აპ.პ).

**ანეროზიზმი** - ანარიაზი (ბერძ. aneros-შახკაყი). იხ. ნიშნებისა.

**ანეროზიზმი** - ანარიაზი (ბერძ. ანერ, aneros-შახკაყიან და მოკიდებულებით, phasia-შეყვეება, შესუნება). **ანეროზიზმი**  
ანალოგიური ცნება, გამოვლენება მამაკაცებში სექსობრივი ფუნქციის შეწყვეტის პერიოდის აღსანიშნავად. ავტორის  
(Ch. Bardenheer, 1975) მიხედვით, ა-ის ნაკლებად ხასურელია გამოვლენებულ იქნას გერმინი მამაკაცის კლამაში. ა.  
მამაკაცებში უფრო ადრე ედება, რომელ ქალებში, კრძელდება საკმაოდ ხანგრძლივად და არ ელბულის კრძიკულ  
ხასიათს. ავტორი მიუთითებს, რომ კოპულაციის პირმშობების უმეტესობის დასოვლელ ფუნქციის დაქვეითება იწყება  
დაახლოებით 30 წლის ასაკში, მავრამ მამდინარობს იმდებუა ნება, რომ სექსობრივი აქტის შესრულებისათვის  
აუცილებლად პარონულად აქტივობა მამაკაცთა გამრავლებსამი შენარუნება 60 წლამდე და მტე ხანს. ასევე ნება  
ხდება ლიბიდოს ჩაჭობა, რომელიც კომპლენარობს მერყეობით. ა-ის დადგომასთან დაკავშირებულ პირობულ  
რეაქციები სხვადასხვაა - მშვიდლან, შიშინსაკურსულიმთავური მოქმედების გამოვლენებლად სექსობრივი ქვეის  
შეკურ ცდობებამდე (ავტოლია, მთერწლოვანი გოგონების გარჯნა და სხვ). უმრავლეს შემთხვევაში მამაკაცების  
დემოქსი მნიშვნელურად არ აისახება ფსიქიკას და ქვეებზე ქალებთან მედარებით, ნაკლებად გვხვდება ინფლუკური  
ლეროზიება.

**ანეროზიზმი** - ანარიაზი (ბერძ. aneros - მეულება, ხასიათი) (Cartman B. 1949). **ანეროზიზმი** ვადანტება, ხასიათდება  
ემოციური შეკავების უკმარისობით და ანთიკური ქვეით (ნარკისმში, ეგოცენტრულობა). გოკური ფსიქოტერაპიული  
შეკრძებისადმი მყოფი დაქვემდებარება. აღინიშნება ფსიქოპათიური პროვინებებს.

**ანეროზიზმი** - ანარიაზი (ბერძ. aneros - თავის გენი). თავის გენის სრული ან ნაწილობრივი განუვიოარებლობა,  
როგორც ანომალია.

**ანეროზიზმი** - ანარიაზი (ბერძ. aneros - მუშაობა, შემოქმედება, მოქმედება) (Mayer A., 1908). **ანეროზიზმი** რეაქციების  
სახე, შეესაბამება შექმნილ დევეტს. იხ. მამრის პრეპროვინები.

**ანეროზიზმი** - ანარიაზი (ბერძ. aneros - მუშაობა, მოქმედება). აქტიური მოქმედება უნარის (ფსიქიკური, მოგორული,  
მეკეულებით) დაქვეითება, მოსაობა. ხმარად გვხვდება ლეროზიული ანდრობის დროს (დერკება და ანეროზიზმი).

**ანეროზიზმი** - ანარიაზი (ბერძ. aneros-მეყველება, ცრმობა). ტემპერატურული, ტიპოლოგი და აპ.  
ტერმობილობის არანებობა. გვხვდება ნერვების, გამგარი გენის და თავის გენის სენსორული მონების დამანებისას  
სიგნალის დროს ადარებს უნეტყურ ხასიათს - ანესთეზიის მდგომარეობა კანზე არ შეესაბამება ნერვაციის მონებს.

**ა. ანეროზიზმი** - ანარიაზი გარდაამალი მოტიკურული შეკავება გარემოზე აუქტიური რეაქციის გარეშე, რომელიც  
დაპოვდება შევეე ფსიქიკური ან ფიზიკური გრამების შემდეგ. გოკური მდგომარეობა - ბელუსი გოგონარი და მტე  
(Biele E., 1901) - ფსიქოტენური სეკუორის პარინანგი, რომელიც აღმოცენდება ნერვულ სისხლმამე უმთიერესი, მოკური  
რეაქციების მემოქმედების შედეგად (დერკილია იაპონიაში მოქმედების დროს). დამანასათებულა აუქტიური  
გამოვლენის გამოთიბე - შესარების, თანარინების, შემრწუნების, ჟოპანზე მრწუნის ცრმობის უქონლობა. ანეროზიზმის  
სიხსუბუკის სხეიქტიური მეტრებება გოკური ფსიქოტენური სეკუორისაგან განსხვავებით, ცნობიერება არ იყვლება,  
მეტრარობიდან გამოსვლის შემდეგ ანებება არ არის. სინონ: შიში ხიშინსაკურსული, ანეროზიზმი სეკუორის.

**ა. ანეროზიზმი** - ანარიაზი (ბერძ. aneros-მეყველება, ცრმობა). ანეროზიზმი ხიშინსაკურსული, გარემოცოვებისადმი  
გრამობებს დაკარგვა, რაც ავადმყოფისათვის მძიმედ გლახაგანია. აღინიშნება უკიდურესად ღრმა დეპრესიების,  
ძირითადად ენოტერების, დროს.

**ანეროზიზმი** - ანარიაზი (ბერძ. aneros - ადამიანი, ანისი - დამლა, დანაწევრება) (Mitschauer O.L.).  
ფსიქოტერაპიული მეთოდი, რომელიც დაუნებებლია ავადმყოფის შინაგან საშაროში არსებულ თავისებურებათა  
ანალიზში, მის დამოკიდებულებებზე გარემოცოვულ საშაროსთან, ეყრდნობა ფილოსოფიასა და ფსიქოლოგიაში  
ფუნდამენტოვიერ და ეტნიტენიკულად გარემოცოვულ კონფიციებს.

**ანეროზიზმი** - ანარიაზი (ბერძ. ideas - აზრი, წარმოდგენა). განსახლერული პირის ან საგნის ამრობრივი სახით ნებითი  
წარმოსახვის შეუცდებლობა. დაბახსიათებელია დერესიების დროს შეკავებული ამროვნებისათვის.

**ანეროზიზმი** - ანარიაზი (ბერძ. ideas - დაეალება, ვიხის - ცოდნა, შემყვება). არსებული დოგადებებს  
შეუცდებლობა. გვხვდება მოგიურთი ფიქციის (მეგ. მიმოფრენა) და თავის გენის ორგანოდ დაბინების როგორც  
ლიუზურა (შემდგომში ჰუკასუსტობის გამოვლენებით, მეგ. პროგრესული და მტე), ასევე კეროვიანი დაბინების  
(ანტონის შემტომი, ბაბინსკის შემტომი, ანტონ-ბაბინსკის სინდრომი) დროს.

**ანეროზიზმი** - ანარიაზი (ბერძ. anemias - გაღებრა). სორმიდან გაღებრა. შეკავებება სხვადასხვაგვარ მდგომარეობებს,  
პროციების, ფორმირების, მეგ, პიროვნების ანომალია - ფსიქოპათიის განსახლერება.

**ანეროზიზმი** - ანარიაზი (ბერძ. anomyas - უსახელი). ავადმყოფის შიერ საკეთიარ სახელზე უარის თქმა მოკვიერ იმ  
უტკვის უარყოფა, რომ მას აქვს რაიმე სახელი. ხმარად გვხვდება მიმოფრენის დროს, მოკვიერ თავის გენის  
რეაქტივი დაბინებით გამოწვეულ ღრმა ჰუკასუსტობის დროს. შესაძლოა ადარებდეს განწყობით ხასიათს.

**ანეროზიზმი** - ანარიაზი (ბერძ. anomyas - უარა). ანონიზური წერილების წერისადმი შათოლოგიური  
შირკეილება. გვხვდება ფსიქოპათიური პროვინებში.  
**ანეროზიზმი** - ანარიაზი. განუცხადებელი. მეგ, მეურნეობა ინდივიდისა, რომელიც არ განუცხადებია საპასოროგო  
ინ-ნაკები.

**ანეროზიზმი** - ანარიაზი (ბერძ. anemias - ვენებით ანთებელი). სექსობრივი აქტის დროს ორგანობის არანებობა.

**ანეროზიზმი** - ანარიაზი (ბერძ. anemias - ჭამის სურული, მალა). ჭამის სურულად (დგოვლის) დაქვეითება ან სრული გაქრობა.

**ანორექსია გრძელვადიანი** - анорексия хроническая ფსიქიკური ანორექსიის სინდრომი. ეითარდება ხარისხულ ასაკში, მეტწილში არასაკმარისადა შესწავლილი ვარუდობენ, რომ აის დროს საკმარისად არ არის გამოხატული გენეტიკური ინფორმაციის ცენტრალური აქტმა, რომელიც იძლევა ორგანიზმს ენერგეტიკულ და ეკვიბო მითბობისუნარიან სივსაღს. ზღურველს, შერჯს და ლოურჯის (Blundelle J. D., Berg J.H., Lawrence J.K., 1988) მიხედვით, ა.მ. არ არის მარტივ სანდამშობობის მიზეზი, არამედ ხშირად ავთვისებიანი სიმინეების არსებობის ერთ-ერთი მარევებელია.

**ანორექსია ნერვული** - анорексия нервного. შადს არანსებობა, აღმოცენდება ნერვობების დროს თავის გინის ქერტის გაღებნებასთან დაკავშირებით.

**ანორექსია შიმშილი** - анорексия истинная (Lasegue E. Ch., 1873). საეჭობ შიდებს კატეგორიული უარყოფა. ეითარდება შეუტრგავლ ასაკში, უმარდავლად გოგონებში. მოგვარ წარმოადგენს დამორფოფობური აშლობობებს შედებს. უშეტებად გვხვდება მოზარდთა და ახალგაზრდა ასაკის მიმორენის და უხეტრგავლი პერიოდის ანორექსიული ფსიქომების დროს (Лихач А. Е., 1979). სინონ: ნერვული ანორექსია, ნერვული-შიმშილი ანორექსია, სტეროიდი ანორექსია.

**ანორექსია** - анорексия (ბერძნ. ანორ- ცნობს). ცნობს არანსებობა. შესაბლად იყოს ცნობის ანალიზატორის პერიფერიული ნაწილის დამანების შედეგი, მაგრამ გვხვდება ფსიქიკური დაავადებების დროსაც - ნერვობების (განსაკუთრებით სისტიკური), თავის გინის ორგანულ დაღიანების დროს. უკანასკლ შემთხვევაში აგარებს ლატერალურ ხასიათს. ცნობის დაქვეითება დამახასიათებელია მოხუცებულობით ასაკისთვის.

**ანორექსია** - анорексия (ბერძნ. ან - უარყოფა, οσγειν - ვანებადი). ფანებადს არანსებობა სასუნთქი არების ნარევეში არტერიულ სისხლში ან ქსოვილებში. შატ. ცერტებრული ანორექსია. სინონ: შატრება, შანებადს შემხლად შანებადს შატრებაში.

**ანორექსიის ბიოლოგიური თეორია** - анорексия биологическая теория ამოთხი (Анохин П.К., 1949). ეშობებს ვანებადს დარეგანს კონტრუფობს ტრილში. ეშობების ოგორ და ფილოგენეზში აღმოცენდება მითბობილებითა ფორმირებასთან კავშირში. დაკუმპოლიზებულ მითბობილებებს შეესაბამება უარყოფითი ენერგინი, დაკუმპოლიზებულს - დადებითი. ეშობური გამოვლენების განსტყობება წარმოებს უნტიკური სისტემების მოქმედების შექმნიშვით და მომარობის აქტეპორებით. უკუაურენგაციის სანგადავლის მომარობის აქტეპორთან დაშობების შემთხვევაში აღმოცენდება დაღიანობა ეშობების, თუ ეს სანგადავლა არ ეშობება მომარობის აქტეპორის - უარყოფითი. ასეთი სახის კანონზომიერება ვრცელდება არა მარტო ბიოლოგიურ, არამედ სოციალურად განპირობებულ მითბობილებებზე. ეშობების წარმოშობის დიდი მნიშვნელობა ენობება მოქმედებითა შედეგების შევსებას შათ დაშობარებაშიც, რაც პავლოვის მიხედვით, შეესაბამება ნებისმიერ პირობებთან რეფლექსურ აქტს როგორც წინასწარმეტყველურს, მოშვადი მოქმედების შესრულებამში.

**ანორექსიის გრძელვადიანი ფუნქციონირების სისტემა** - Анорексия комплексная функциональной системы (Анохин П.К., 1935). ნებისმიერი ცესხადი ორგანიზმის მოღებობასა და მისთვის დამახასიათებელ ქვეით აქტებში აღნიშნავენ უკუაურენგაციის გებებს, რომლებიც მოქმედების შედეგობს ინფორმაციის შატარებალია. უნტიკური სისტემების მოქმედება ადაპირებულია, შინადასახულია და შათ ახსნაში შინიშნელობას იტენს შინის კატეგორია. უნტიკური სისტემების მოქმედებში არრევენ შედეგი სავადებს: აურენგული სინთეზი, ვადარეველებების შიღება, აქტეპოთის მოქმედება ან შისაღების შედეგების აურენგული მოღებების ფორმებია, ეურენგული ატენება, უკუაურენგაცია და შიღებელი შედეგების შედარება. კლასიკურ მოღებს წარმოადგენს ინტელექტუალური მოქმედება.

**ანტაბუს** - антабус ალკოჰოლის ანტიკორექტივი გამოყენებული პრეპარატი. საეჭვად უღებს სენსიბილიზაციის პროცესს, რომდს დროსაც ითრგუნება ალკოჰოლის დამიღრეილება და შის შიღება ხდება ფსიქურად შეუღებელი. ა. გაღვება ახდენს ორგანიზმში ალკოჰოლის ცლაზე, ხელს უწყობს ისეთი შადღებლის პროლეტის დაგროვებას, როგორცაა აქტეპალი. აქტეპალიდის მოშატება იწვევს მისზე, სონტურ-ფსიქიკურ ძერებს (გაწრელება, წამობურება სახეზე და სხეულის შედა ნაწილებში, გულმურღში შეშობის შეგრძნება, შიში, შეოთვა და ა.შ.). აის ზელომობის შემთხვევაში შიშიდება აღმოცენდეს შწავე ეგზოგენური ფსიქოზები. აით შერნალობა წარმოებს როგორც ალკოჰოლთან შექვარებულად (ანტაბუს-ალკოჰოლური სინდრომი), ასევე შის ვარეზე. სინონ: ტბტ უნაშ.

**ანტაბუს-ალკოჰოლური სინდრომი** - антабусалкогольный синдром. ვარდება შილოდ ანგახებით შერნაობის ქერის ეშობება ავადმყოფის დღეით იძლევა ანტაბუსი, შ-წ საათის შემდეგ ალკოჰოლი. შერნაობის ქერს შიოცავს 10 სინჯს. ვანბანრეღებულ რეაქციის შემთხვევაში (ეურეტატორი შიშლილობა, ხანგრძლივი არტერიული შიშლილობა) შისი კუარება ხდება ენება შეთიღების ლურჯის სხნარის შექვანი. ამ შეთიღით ხდება ალკოჰოლზე ორგანიზმის უარყოფით-რეფლექსური რეაქციის განსტყობება.

**ანტანდრესტი** - антадрестин (ბერძნ. ანტი - საწინააღმდეგო, დრესტი - ბრბობა). ნეტებრება, რომელიც რეექტორებზე მოქმედებისას არ იწვევს ისეთვე ბიოლოგიურ ეფეტს, როგორცაც სხვა ნივთიერება და ამცირებს ან ეწინააღმდეგება ამ ნივთიერების ეფეტს. თუ ა-ბი მოქმედებს იმვე რეექტორებზე, რომელზეც ეს ნივთიერება ან შისი ავონის გები, დაპარაკო კონტრეტულ ა-ბზე, ხოლო იმ შემთხვევაში, როცა ა. მოქმედებს მოღვეულის სხვა ნაწილებზე, დაპარაკო არაკონტრეტულ ა-ბზე.

**ანტიდეპრესიული პრეპარატები** - антидепрессивные (ბერძნ. ანტი - საწინააღმდეგო, депрессия, depressum - დათრუნება). ფსიქოტროპული პრეპარატების კლასი, რომელსაც აქვს დაქვეითებული გუნება-აანწყობის - დეპრესიის საშკორელო თვისება. ა-ის თერაპიულ მოქმედებას უკავშირებენ ნერვული იმპულსების გადაცემაში შინაწილ შეღვარებოთა ცესდას. შინოპინორექსიის (შაო-ს) ინიბიტორება ახდენს უერმენტ შაო-ს აქტივობის დაქვეითებას ან შინოპინების (იხ. შინოპინიზმი, დოპამინი, სინაპტინი და ა.შ.) სინაფსურ წარმოაქმნებში უკუმპოციების ბლოკირებას. რადგან აღნიშნული შინოპინოთა კონტენტაცია თავის გინის სხვადასხვა უნებში სხვადასხვა, ანტიდეპრესანტების თერაპიული აქტივობა დაშობილებულია იმაზე, თუ თავის გინის რომელ უნტიკურ უბანშია შევადილი ნერვოტელატორების კონტენტაცია. გრყოკლური ანტიდეპრესანტების უნადავლებია ადრენურული აქტივობის შატარებელია, თუმცა, შოგიერთი სეროტონინრეგული აქტივობითაც არის აღტრებული. ანდრენურული ანტიდეპრესანტოთა თერაპიული ეფეტის ბიოცილებელია ადრენალიზური და ნორადრენალიზური შეღვარებობის სინაფსური ნაორლებიდან უკუმპოციების ბლოკირების ხარეზე. უკანასკლ ვლებში შექმნილია ანტიდეპრესანტების

ასლი თაობა ე.წ. **ატლანტიკური ატლანტიკური** კონტინენტის ნორდ-ესტის ნაწილში, სეროციონის უკუბრუნების ბლოკების ან ატლანტიკური მოქმედების (ვლოკეინი, ვლოკეინი, სეროციონი, მელიტონინი, პაროქსეტინი და ა.შ.) და წარმოადგენს ე.წ. მონოკულტურ ნაერთებს. ახასიათებს ერთად, პრაქტიკაში გამოიყენება აკოსი, ჰიქსილი და გერბილი, მონოკულტურ ნაერთებს, რომელთაც ახასიათებს ნორდ-ესტის ნაერთების და ნორდ-ესტის ნაერთების მიმართ გარდაუდებელია. მათ შორის აღსანიშნავი რუსეთში სინთეზირებული პაროქსეტინი, ზეოლი და ინიკანი, რომლებიც ითვლებოდა მოსი ინსტიტუტის, მადრიას ახასიათებს ადგილობრივი მოქმედება და არ ითვლება გოქსიურად შამინი, როგორც მათს ე.წ. არაადგილობრივი ინსტიტუტის იზონიზირება, ნიადაგი, ვლოკეინი, გრანდოქსიპრამინი და ა.შ. შეუთავსებელია გრადიკული ანტიეპილეპტიკებით, შორისის წარმოქმნილებთან, საანესთეზიო და სიმპათოკომპეტენტურ მედიკამენტებთან და ხოლო წლებში აღარ გამოიყენება, რადგან საჭიროებს სპეციალურ კვებით (თამბაქოს გარეშე) დღეისა. მოქმედების სპეციფიკობის მიხედვით, არჩევენ: **სედაციური მოქმედება** (ფეორაქსინი, გრიმეპრამინი, ლექსინი, ატიკოპოლინი, მანსერინი, აფანევი, ვლოკეინი და ა.შ.), **სედაციური მოქმედება** (პაროქსეტინი, ლოქსეტინი, მელიტონინი, დიბენზინი, თიანეფინი, სეროციონი, პაროქსეტინი, პარაქსეტინი, პარაქსეტინი, კლომიპრამინი), **სედაციური მოქმედება** (ვილოქსინი, ინიკანი, ზეოლი, ცეფალინი, თიანეფინი, სეროციონი, სეროციონი, დენიპრამინი, ვლოქსეტინი, ანტიეპილეპტიკური, გოქსიურები, ინდოქსინი, სინდოფენი, ნიადაგი, იპროპროპილი, გრანდოქსიპრამინი, ვლოკეინი) ა.შ. დეპრესიის ფსიქოპათოლოგიური სტრუქტურა განსაზღვრავს ანტიეპილეპტიკების არჩევანის მოქმედების სედეციური მოხვედრით. მაგ, შოთხიანი ლექსინის დროს ეფექტური სედაციური მოქმედების ა.შ. შინა და ავტოგენის სინდრომის მიმდინარე დეპრესიის დროს - მანსერინი სედაციური მოქმედების ა.შ. ხოლო შეკავებით მიმდინარე დეპრესიის დროს - მანსერინი სედაციური მოქმედების ა.შ.

**ანტიდეპრესიული პრეპარატები - антидепрессанты** (ლათ. convulsio - კრუნჩხვა) კრუნჩხვანადაა გამოიყენება **მოქმედება** პრეპარატები, გამოიყენება სხვადასხვა ენების კრუნჩხვების კუპირებისათვის (ეპილეფსია, ეპილეფსია, ინტოქსიკაცია, გრანდოქსი). მათი მოქმედების საფუძველია ცნს-ის აგნების შესუტება ან შეკავების გაძლიერება. მოცილი ა.შ. განაწილა სიმონიკური პეტიკოზები (ხარბიკურებები, ქლორბუტოლი, ქლორბუტოლი, მოცილი მოქმედების ამ თვისების (ქლორბუტოლი, ქლორბუტოლი, დიფენი, გრანდოქსინი, ვლოკეინი). მოც პარაბიკურბუტოლი, რომელსაც არა აქვს საბილ მოქმედების ატეოლო, იყენებენ დღის განმავლობაში (გენმინალი). აკოსი კრუნჩხვანადაა კარბაქსინი (ვიდენსინი, გერბილი), რომლის ეფექტურობის სპექტრში წამყვანია ანტიკონვულსიური, ანტიეპილეპტიკული, ანტიეპილეპტიკული და ნორმოთიმური ატიკოპოლინი შერწყმა. ანტიკონვულსიური მოქმედება განაწილა ვალპროის მთავან წარმოქმნილებს და მართლებს: ა.შ. ვალპროის კალციუმის (კონვულსიური) და ნატიკოზის (დეკაპინი, კონვულსიური, კლოქსეტინი და ა.შ.); ვალპროის წარმოქმნილებს განსხვავდება სხვა დანარჩენი ანტიეპილეფსიური მედიკამენტებისაგან იმით, რომ წარმოადგენს ამოკონა ნაერთებს. მათ ანტიკონვულსიური მექანიზმში იტვლისსხვა თვის გენმინ განაწილებოდა კონვულსიური აწევის ეფექტი, ისინი აწყობენ ამ უკანასკნელს ანტიეპილეფსიურ მედიკამენტებთან და ნეოსიბურ სხეულში. ანტიკონვულსიური ატიკოპოლინი ახასიათებს ატიკოპოლინი მოცილი გრანდოქსინი, განსაკუთრებით ხეზნოლიამინის წარმოქმნილებს (კლორბუტოლი, ნორბუტოლი) და ა.შ.

**ანტიფორმალური - антиформалины** (გერმ. formalin - ფორმალინი). **მომდინარეობა** თანამედროვე ფსიქოატრიაში, უარყოფს ფსიქიკური დაავადების, როგორც დამოკიდებული ფორმის, ობიექტურ არსებობას. აის მიმდევრები არსებობს გამოდან ერთიან ფსიქიკის თეორიიდან, სარგებლობენ რა ნორმოლოგიური ქონსიკის მოცილი ნეოლოგიური მხარეებით. არსებითად წარმოადგენენ ფსიქიკურ-გენმინიკაციისებს.

**ანტიფორმალური - антиформалины** (გერმ. feuchte - ჰალოქსიტი) (Hilsefeld M). **შეზღუდვა** სხეულსა რომელსაც ირჩევენ დღევანდელ ჰომოსეკსუალთა თეორიის პერვესიულობის გასწორების დიპარტამენტსა და სხვადასხვა: ატიკონს არ მოსწონს ქალის ფუნქცია, ურადილებს ატიკონს ფუნქცია ფუნქცია, რაც მასში იწვევს მიღებს და ამრიგად, იდეალური ქალის ძირება ხდება განუორიცილებელი, ეს ეს მას ახლავს საფუძველს, გლობალის ურადილება და აღიარება მამაკაცის მოხმობილებლა.

**ანტიფორმალური - антиформалины** (გერმ. psyché - სული, isten - მკურნალობა). **მომდინარეობა** თანამედროვე ამერიკულ და ევროპულ ფსიქოატრიაში, რომელიც ატიკონს ფსიქიკურ დაავადებათა გაავიციების უმართებულობას საერთო სიზმარულ დაავადებებთან. აის მიმდევრები სარგებლობენ იმით, რომ ე.წ. ენდოგენური დაავადების ეპილოგი, პათოგენეზი და სპეციფიკური მორფოლოგიური ცვლილებები დღევანდელ არ არის დადგინდი. აქედან გამომდინარე, უძლიერ დაავტკიონ, რომ ეს საერთოდ არ არის დაავადება და ფსიქიკურად შეუძლია პერსონის იტვლითი პოსიტივიზაცია და მალდგანებით მკურნალობა გაუმართლებელია. 60-70-იან წლებში მათ ბრძოლა გამოუხადეს ნორმოლოგიებს და მიიწინააღმდეგებენ, რომ ფსიქიკური დაავადების გამოშვება მხოლოდ სოციალური და პოლიტიკური მიზეზებია, რის გამოც მოთხოვნებნი იტვლითი მკურნალობის და ე.წ. შეზღუდული ღირსებისთვის გაქვეყნება და სოციალურ-რეაბილიტაციური მეთოდების ფართო გამოყენებას. იმედიდებენ რა ფსიქოლოგულ პრეპარატს ე.წ. გერბილი მოცილიების ამოცილების ფაქტს, კატეგორიულად უარყოფენ მთავან მკურნალობის გამოყენებას. შეუძლებელი იმისა, რომ ა. არ იქნა განმარტული მსოფლიო ფსიქიკურად საზოგადოების მიერ მისი რადიკალიზმის გამო, მან მარცხი შეასრულა დაღებით როლი ფსიქოატრიაში სოციალური რეაბილიტაციის, პაროქსეტინის თაყსიურების და ფსიქიკური დამმარების უმანითობის თვალაზრისა.

**ანტიფორმალური პრეპარატები - антиформалины** (გერმ. psyché - სული). სინონიმი გერმინისა წყაროფსიკური **პრეპარატები**, ატიკონი კეთდება მათ ანტიფორმალური თვისებებზე. უარყოფს გენმინი, აკოს-ის ქვეშ იტვლისსხვა ნორმოლოგიური პრეპარატები, პრეპარატ რეგში, გამოიყენება ანტიფორმალური მოქმედებით, მსგავსი მედიკამენტების ეფექტური სინდრომი-გერბილი ატიკონს, თუკი ეს სინდრომი წამყვანია ფსიქიკის კლინიკაში, განაპირობებს მთელი ფსიქიკის რეაბილიტაციის და ავტოგენური მდგომარეობიდან მთლიან გამოშვებას. ატიკონი მედიკამენტები პირინოლიდ ნიადაგი ანტიფორმალური და ასეთების: პოლოქსეტინი, გრიფულპერინილი (გრისივილი), გრიფულპერინი (გრიფულპინი), თიანეფინი (მედიკალი), ვლოკეინი (ლოქსეტინი) და ა.შ.

**ანტიფორმალური - антиформалины** (ლათ. municipium - მოცილითა წინასწარმეტყველება). **ფსიქოლოგიაში**: მოქმედებათა მედიკის ამოცილების უნარი რეალურ განსიორიცილებამდე ან აღქმამდე (წინასწარი ასახეა), მოშავალი ზოცილიებისაგან მიმდევრად ცხოვრებისეული გამოცილების საფუძველზე. გერმინმა შეიძინა რამდენიმე

ვანსხევებული კლინიკურ-ბიოლოგიური მნიშვნელობა. მაგ, ფსიქიატრიულ ცენტრებში მიმოყრენის მაგალითზე ა-ის ფუნქციის ქვეშ ივლისებება იპროვესის დამიშვება: მექეიდრულად დატვირთულ იუჯებში ბავშვებში მიმოყრენის მანიფესტირება ხდება უფრო ადრე, ვიდრე მათ შობილში და მიმდინარეობს გაყიდვებით მიმედ (შეგუთაა ეახშირება, რეზისის გაუარესება) (Моджаленко В. А. 1989).

**ანტიტ-ბაბინიციდი სინდრომი** - Антон-Бабинского синдром (Антоа G., 1899, Babinski J., 1914) პეუსოტატივანოზია, აღოზოტოზია ან სოპიტოტოზია და რეკლუა, საკუთარი ნაკის (პეზი დალეია) აღქმის უნარის უქროლობა. აღინიშნება ელი გენის ქერქის მარჯვენა თხემის მიდამოს დაზიანებისას (იხ. ბაბინიციდი სინდრომი).

**ანტიტის სინდრომი** - Антон синдром (Anton G., 1893-1899). **ს პალეოცანატურა თრულახ სინდრომი** (ალ-ტურ-გოს) ავტორის მიერ აღწერილია ავადმყოფმა, რომელსაც აღნაშნებულა თავის გენის მარჯვენაბირივი კროიანი დაზიანება, ნახა მის გერადით შროლარე თრულე. **2. ანოზოტოზია სინდრომი** თავის გენის კროიანი ირვანული დაზიანებისას. ანოზოტოზია გამოხატულია კიდრთა დაზიანებით, ცენტრალური წარმოშობის სიყრულია და სიბრძავეთ (აბასთან ერთად აღინიშნება პალეოცანაცომა). დამახასიათებელია ეკომენსაციურა ხასიათის კონტრულაციები. მელის აღტორ-ბახმესხის სინდრომის სრულეკრავაში. **3. მუხამე ( სხვახ ) სულახ სინდრომი**. აღინიშნება სინდრონი პროკუსთი დიტი გენის თხემის წილას ორმხირვი დაზიანებისას.

**ანგიოტონის პერიოდული სინდრომი** - Ангитон периодическая болезнь (Ангитон Я.А. 1898) ცოკლოთომის ერთ-ერთი პირველი აღწერა. ხაზგანხილია ერთი და იგივე ავადმყოფებში დეპრესიის და ეგზალტაციის მდგომარეობების მონაცემებით, ავადმყოფი დარღვევების გამოვლენების შესაძლებლობა, რამაც შეიძლება მიადწოს ფსიქოზის ხარისხს.

**ანჰიოტონიზმი** - ангиотонизм ზუნოზახ სახე, რომლის დროსაც დაკარგულია ობიექტის გექსტურის, მისი მასისა და ტემპერატურის შეგრძნება.

**ანჰიოტონია** - ангиотония (გერმ. Anästhesie-სინამოვნება, განცხრომა, ნეგარება). სინამოვნების, ნეგარების, სინარულის გრძობას დაკარგვა. **დეკრინალაზიაცახ სინდრომი**. უმეტესად გეხედება დეპრესიის, განსაკუთრებით, ენდოგენურის, სოგეერ მიმიე ნეკროზების და მიზოტრენიის დროს.

**აპატი** - апатия (გერმ. апатия - უგრძობლობა). ემოციურ-ნებათა სეკრეა აშდელობა, დამახასიათებელია ემოციური გამოვლინების უნარის დაკარგვა, მოღრება, საკუთარი თავისა და აბოლოებისადმი, მოვლენებისადმი ვანერეკლობა, სასიყოსლო სურულახის დაკარგვა, უმოქმედობა. ა-ის აბულისთან შერწყმისას ლაპარაკებან აპათურ-აბულურ სინდრომაზე. მელის მიმოყრენის ძირითადი სინამოვნების ჯეუფში (ემოციური სინდრომი). გეხედება აგრეთვე ოპიის გინას, განსაკუთრებით შებლას ზონის ორგანული დაზიანების დროს, შეიძლება ახასიათებელი გარდაზავილი ხასიათი ფსიქოგენების დროს. სინონ: აპათია, აპათიზმი, აპროზია.

**აპატიზმი სინდრომი** - апатический синдром იხ. ბრუნოვი აპატიზმი სინდრომი.

**აპერის სინდრომი** - Апер синдром (გერმ. Apert E., 1906). იხ. პარაფურია სინდრომი.

**აპერეზია** - аперезия (ლათ. aperere - აღქმა). ადამიანის ფსიქიკის თეხება, გამოზაგავს სანებისა და მოვლენების აღქმის დამოკიდებულებას მოცემული სხეიქტის წინა გამოვილიებაზე, მის ინიციელებაზე, პიროუნულ თავისებურებებზე. სინამოვნების აღქმა არ არის ასოური პროკუსა. ა-ის უნარი სავალეებას აბლესად აღმანის, ატეორად აშენის სინამოვნის ფსიქიკური მოვლა დეკრემინირებულად ჩამოყალიბებული და მოცემული ინიციელისათვის დამახასიათებელი პირველად თავისებურებებით. ა-ის ენება ფართოდ გამოიყენება სამედიცინო ფსიქოლოგიაში, ეკროლ, პათოფსიქოლოგიაში.

**აპროპრიუმი** - апроприум იხ. ბრუნოვი სინდრომი ბრუნოვი სინდრომი.

**აპროპრიუმი** - апроприумтерация (Случевский И.Ф., 1933). ადკოპოლზახ შერნალაობახ ბრობოტრულეკურა მეთოდი, რომლის დროსაც მთავარ როლს ასრულებს აპროპრიუს მიღებაზე ლეზიების პირობითი რევექტის ჩამოყალიბება ლეზიების გამოწვევის თვისების შერნე აპროპრიუსის ადკოპოლის შეუქანის შედეგ.

**აპროპრიუმი** - апроприум (გერმ. aporhain - შესვლა). იხ. ბრუნოვი სინდრომი ბრუნოვი სინდრომი.

**აპროპრიუმი** - апроприум (გერმ. präzis - მოქმედება). ნებათა, მიზანდასახული მოქმედების და შობრახების დარღვევა მათ შემადგენელი ელემენტარული მოძრაობითი აქტების შენარჩუნების პირობებში. აღინიშნება თავის გენის ქერქის ორგანული დაზიანების დროს. **ღამქანახ (H. Lerschman, 1920)** მიხედვით, გამოყოფენ ა-ის ორ ძირითად ფორმას: **სეკატარული** - საჭირო მოქმედების სახის დადრევეა; **2. შობრული** - მოქმედების განხორციელების საშუალებას დარღვევა. **შობრული** ა, თავის მხრივ, იყოფა **დეკატეკურ** (ნებათა მოძრაობების დარღვევა მოძრაობის მიზნის და შესაბამისი ინიციეციის დსოციაციის შედეგად) და **კროკეტურ** (წარსული გამოყლივებით ჩამოყალიბებული ხელის და არტეკლავიურა აპარატის მოძრაობის რეველი სქემების დარღვევა).

**ბ. აპროპრიუმი** - апроприумი ხასიათდება სურვილებისა და დლოვის უკმაობითობით.

**ბ. აპროპრიუმი** - апроприумი დარღვეულია სინდრონი ნებათა მოქმედების შესრულება მაშინ, როცა მიზანით მოქმედება შეიხლება.

**ბ. ბოქანალური** - а. binocular (Brown G. W., 1972). ელანება მეფერებოთ რთული საგნობრივი მოქმედების შესრულებისას, რომლებიც მოითხოვს ორივე შუდა კიდურის შევლელულ მოქმედებას. ცოკე თითოეულს კიდურს მოქმედება არ არის დარღვეული. არ არსებობს განსხვავება კონვერგული ან პირობითი, სინოპლური მოქმედების შესრულებისას (Степанов П., Райчев Р., 1980).

**ბ. თანდაყოლილი ნაყოფისრევი ტოპალის მამოქრავებელი** - а. врожденная аномалия глазодвигательная. იხ. ბრუნოვი სინდრომი.

**ბ. სინდრომი** - а. инертариял (Kleist K., 1907). სიყოსლის მანბოლზე ხანგრძლივი პრაქტიკით ჩამოყალიბებული რთული და ნატივი მოძრაობების დარღვევა. მსგავსი დარღვევები გამოვლინდება ერთ-ერთ რამდენიმე კიდურში ან მხოლოდ მის ხაწალში. აღინიშნება დიდი გენის ქერქის პრემოტორული ზონის ორგანული დაზიანებისას. სინონ: **ბ. პრემოტორული**.

**ბ. სინდრომი** - а. инесетивная (Lerschman H., 1905, Hellberonnet K., 1905). აპროპრიუს ფორმა, დამახასიათებელია კიდურების მოძრაობათა კინეზოური და კინესთეზური სახის დაკარგვა. ავადმყოფებს არ შეუძლიათ, მარ, ხელის

კაცების ან თითების ჩვეული ძალით მოძრაობა, არასწორად მიმართავენ ამ მოძრაობას, ავი ხდება უხეში, არასაკმარისად დიფერენცირებული აღინიშნება დამინების ლოკალიზაციისას წინა და ცენტრალური ხეულებების დაზიანება. ლამბინას აკროკანუზური მოტორული ამრავლები ურნა. სინონ: *პიკლუ-ინსენსიტივიტი პარკლი* (A.Jurjaguerra J., Heccea H., 1949). ახლოს არის ანკრეციკულ ა-თან.

**ბ. ქონსტრუქციული** - a. конструкторная (Krolis M.B., 1933; Kleist K., 1934). კონსტრუქციული მოქმედებების აგების, აწყობის, ხატვის უნარის დარღვევის სიმკაცითა კომპლექსი. მინდება იმ მოძრაობათა და მოქმედებთა ურთმები, რომლის სპეციფიკალი სივრცითი აქტის უნარი. აღინიშნება ღონისძიებური შემსუფრუის ქერქის ქვედა თვისისა და თხუ-ქვის მისაღის დამინებისას.

**ბ. პარკლიზაციული** - a. парализаторная (Pick A., 1905). ამრავლები სახე, დამახასიათებელია მოძრაობით სფეროში გამოხატული პერსპექტიული კინეზოციხე. აღინიშნება დიდი გუნის ქერქის შუბლის წლის, პრემოგორული მონის დამინებისას. შა-ის ხავეულებია ცენტრული სქემის აშლა, მოძრაობის აქტის აღნიშვნის და რთული მოძრაობითი ჩვეების დარღვევა (Sjyvan A.P., 1949, 1962).

**ბ. ჩაიბნობა** - a. апааааа (Brain W.R., 1941). განისაზრის ჩაემის შეუძლებლობა. ამრავლები დარღვევის სახე, რომელიც აღინიშნება შარჯენა შემსუფრუის ქერქის უანა არეების უროვანი დამინებისას. დაკავშირებულია კონსტრუქციული პრეპუსის დარღვევებთან. შეის უკუანს და შანგვილს ამრავლები-აგროზანტ ხანდრითა შემადგენლობაში.

**პარკლიზაციული** - a. парализаторная (ბერძნ. paraktis - უმოქმელო, უსარგებლო, კინოზ-შეუძლებელი). ამრავლები, ძირითადად კონსტრუქციულის შემსუფრუის აგროზანტია, რეოლოგიური მკვლევართი მიერ განიხილება როგორც მათი პათოლოგიური ერთანობის დამადგურებელი (Schlesinger B., 1928; Cronby A.E., 1934). დურაბი მხედვით (Sjyvan A.P., 1937), ამ შემთხვევებში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სივრცითი ორიენტირების დარღვევები (ხეგრეთა ა.-ა.). ისინი გვედებება როგორც ღონისძიებური, ასევე სუბლომბანტური შემსუფრუების ქერქის თხუ-ქვის მისაღების დამინებისას. ა-ა-ის მიუღება ორი რთული კლინიკური სინდრომის საუბეგელია. 1) *პარკლიზაციული* (Heccea H., 1956) (ახ). აღინიშნება თავის გუნის ორგანული დამინებისას კერის ლოკალიზაციით შარჯენა შემსუფრუში (განაიარა და კუთხის ხეულები, საგვეთქლის მუღა ხეულები უანა წარლი). დამახასიათებელია ცალმხარეი (პარკლიზაციული) სივრცითი აგროზია, კომპლურ-კონსტრუქციული დარღვევები, ჩაემის აპარატია (ახ. *პარკლიზაციული*). კომპლურული წარმოდგენების და ცნებების დარღვევა, შემსუფრუისაგროზია, დამღვევია, აკადვევია. 2) *ხანგვილი* (Zandwilt O.L., 1950) (ახ). თავის გუნის მარცხენა შემსუფრუის დამინებისას აღმოცენებულ-სიმკაცითა ერთანობა: 1. მხედვლობითი სივრცის მარცხენა ნახურის ორიენტირება არე ცალმხარეული სივრცითი აგროზია; 2. კონსტრუქციული ამრავლება; 3. კომპლურული მესივრების დარღვევა და სივრცითი დეზორიენტირება; 4. ჩაემის აპარატია; 5. ოკლომბანტური დარღვევები და მხედვლობითი კოორდინაციის დეფექტები.

**პარკლიზაციული** - a. паралич (ბერძნ. paresis - ურღებელი) (Guys Y., 1887). აქტიური ფრადლები კონსტრუქციის დარღვევა. თავდაპირველად დაპარაკობდნენ ურადლების ფუნქციის მოღმად ხავეულებში, რომელთაც აღნიშნებოდათ სივრცის ლოკალიზაციის გარსების ერთიკული დაკავლება. დღეისათვის გერმინს აქვს უფრო ფართო მნიშვნელობა და გამოიყენება აქტიური ურადლების დარღვევათა აღსანიშნავად მათი გამოშვევი მოძებების მიხედვად.

**პარკლიზაციული** - a. паралич (ბერძნ. paralysis - ჩერხელით დაპარაკის უნარის დაკარგვა. აღინიშნება ისტერიის დროს, მხრად აგროზიასთან ერთად.

**პარკლიზაციული** - a. апаааа (ლათ. agilis - მოძრაობაში მოყვანა). აგუნება, მოძრაობითი მოუხვეწრობა, მოძრაობის დაოკებელი სურვილი. ხშირად თან ერთვის მონისა და შფოვის აქტები. გვხვდება ალკოჰოლური დელირიუმის, კანკალიონური მიმოფრენის და უნდოებური (აქტივირებული) დეპრესიის დროს.

**პარკლიზაციული** - a. апаааа (ბერძნ. aphasis - ანკრეციკული, რთულიდასარკვევი შეტყვევება). გვხვდება მხედველებითი ატანების დროს. სინონ: *პარკლიზაციული*.

**პარკლიზაციული შერობა** - a. паралич (ლათ. paralysis - გათანახებელი). ცალკეული ფსიქიკური გამოვლენების შესაბამისად არსებულ სივრცეისათან. შატ, ემოციური არაადექვივეტრობა მიმოფრენის დროს. ახ. *პარკლიზაციული შერობა* (ბერძნ. aphasis - ანკრეციკული, რთულიდასარკვევი შეტყვევება). გვხვდება მხედველებითი ემოციურობა. სინონ: *პარკლიზაციული*.

**პარკლიზაციული** - a. паралич (ლათ. paralysis - გათანახებელი). ცალკეული ფსიქიკური გამოვლენების შესაბამისად არსებულ სივრცეისათან. შატ, ემოციური არაადექვივეტრობა მიმოფრენის დროს. ახ. *პარკლიზაციული შერობა* (ბერძნ. aphasis - ანკრეციკული, რთულიდასარკვევი შეტყვევება). გვხვდება მხედველებითი ემოციურობა. სინონ: *პარკლიზაციული*.

**პარკლიზაციული** - a. паралич (ლათ. paralysis - გათანახებელი). ცალკეული ფსიქიკური გამოვლენების შესაბამისად არსებულ სივრცეისათან. შატ, ემოციური არაადექვივეტრობა მიმოფრენის დროს. ახ. *პარკლიზაციული შერობა* (ბერძნ. aphasis - ანკრეციკული, რთულიდასარკვევი შეტყვევება). გვხვდება მხედველებითი ემოციურობა. სინონ: *პარკლიზაციული*.

**პარკლიზაციული** - a. паралич (ბერძნ. aphasis - ანკრეციკული, რთულიდასარკვევი შეტყვევება). გვხვდება მხედველებითი ემოციურობა. სინონ: *პარკლიზაციული*.

**პარკლიზაციული** - a. паралич (ბერძნ. aphasis - ანკრეციკული, რთულიდასარკვევი შეტყვევება). გვხვდება მხედველებითი ემოციურობა. სინონ: *პარკლიზაციული*.

იხველით, არარეაგირებელი ობიექტები ელინდება კალმის შევლომის, უნებურად თქმის, მესხიერებას შევლომის ან სიმშრის სახით. ფროიდის მიმდევრების მიხედვით, ა. იძულება მუცლივ ანტაგონიზმში ცნობიერთან, არ ექვემდებარება რაიმე ფსიქოლოგიურ ან ფსიქოლოგიურ კანონებს და შეუხობადია იმდენად, რამდენადაც შესაძლებელია მისი სიმსაბურთო გამოვლინების შეფასება, რომელიც ძირითადად გამომდინარეობს ადამიანის ფსიქიკის განვითარებასა და ფორმირებაზე სექსუალური ფაქტორის დომინირებული როლის ჩინებულობიდან. ფსიქიანალიტიკურ თეორიებში ათან აიგივედ გერმინებს ქვეტანობურ, ქვესტანობურება.

**პრემპლ რუბინარტსონის სინდრომი** - Apraxia Postrema - Apraxia Postrema (Argyll Robertson D., 1869). დამახასიათებელია სინათლეზე გუგის რეაქციის შესუსტება ან არარსებობა აკომოდაციისა და კონვერგენციის რეაქციის შენარჩუნების პირობებში, შიში, ანთოპორია, გუგის დეფორმაცია. გუგის შრზე ცვლილებები, ჩვეულებრივ ორბორთია. დღეობის განმავლობაში გუგის შიში არ იყვლება. გუგები არ რეაგირებს აგრესიის, პილოკარინის და კოკაინის შევანაზე. ჩამოთვლილი სიმპტომებიდან ზოგიერთის არარსებობისას დაპარაკობენ არგაიდ როზერტსონის არასრულ სინდრომზე. ყველაზე ხშირად აღინიშნება თავის ტვინის ორგანული შეტარულუსური დაავადებებს - ზურგის ტვინის ხშობა, პროგრესული დამბლა - დროს.

**პრემპლ აბადი** - Apraxia. გერმანი მთავრდება აბადი (Abadie J., 1930) მიერ იპოქონდრიისაღმი წინაეანწყობის აღსანიშნავად, არგანი - მოღიერის კომპლქსი ცერუ-ავიდეშეყოფა პერსონატი.

**პრეტერპიქსი** - apraxia (ბერძნ. αραξ - დიფუზულობა, ქვემოქმედება) (Proust A.H. 1908). ფსიქოთერაპიის სახე, რომელიც დროსაც ფსიქოტერაპიის მიმდევრებთან მართლდება მართლად შიშობადებს წარმოადგენს ავადმყოფის პიროვნების სოციალურ-ფსიქიკური გარდაქმნებისად სწრაფა.

**პრეზუმიზმი** - apudologia (ბერძნ. reflex - არეკლბა). რეფლექსების გამოვარდნა, არარსებობა, განპირობებული რეფლექსური რგოლის მოღიანობის დარღვევით ან ვერეული სისტემის მალდა მდგომი ნაწილების შემაკავებელი გაუღების შეკავებით. ვერეულების მიხედვით ა. შეიძლება იყოს ტრატალური (დოფუზური) და დოქალური; პრაქსების სიმყარის მიხედვით - სტატორანული და ვარდამავალი (ბეიროლიანობიური). სტატორანული ა. აღინიშნება რეფლექსური რგოლის დარღვევისას ნებისმიერ დონეზე, ვარდამავალი ა. - თავის გეინის სტრუქტურების სხვადასხვა შეკავების დროს.

**პრემპიქსი** - apraxia (ბერძნ. πρῆξις - რითმი) (Magnan V., 1883) შედეგელობის არეში მოხვედრილი საგნების გადათვლა, აკეთებელი ანგარიში. აღინიშნება აკეთებელი მდგომარეობათა ნეუროზისა და ფსიქოპათიის დროს.

**პროცედურის მდგომარეობის სინდრომი** - პროცედურის სინდრომი. ს. შარტონის მიერ აღინიშნა.

**პროცედურის მდგომარეობის სინდრომი** - პროცედურის სინდრომი (Arnold O.H., 1966). ს. შარტონის მიერ აღინიშნა.

**პროცედურის მდგომარეობის სინდრომი** - პროცედურის სინდრომი (Arnold O.H., 1966). ს. შარტონის მიერ აღინიშნა.

**პროცედურის მდგომარეობის სინდრომი** - პროცედურის სინდრომი (Arnold O.H., 1966). ს. შარტონის მიერ აღინიშნა.

**პროცედურის მდგომარეობის სინდრომი** - პროცედურის სინდრომი (Arnold O.H., 1966). ს. შარტონის მიერ აღინიშნა.

**პროცედურის მდგომარეობის სინდრომი** - პროცედურის სინდრომი (Arnold O.H., 1966). ს. შარტონის მიერ აღინიშნა.

**პროცედურის მდგომარეობის სინდრომი** - პროცედურის სინდრომი (Arnold O.H., 1966). ს. შარტონის მიერ აღინიშნა.

**პროცედურის მდგომარეობის სინდრომი** - პროცედურის სინდრომი (Arnold O.H., 1966). ს. შარტონის მიერ აღინიშნა.

**პროცედურის მდგომარეობის სინდრომი** - პროცედურის სინდრომი (Arnold O.H., 1966). ს. შარტონის მიერ აღინიშნა.

**პროცედურის მდგომარეობის სინდრომი** - პროცედურის სინდრომი (Arnold O.H., 1966). ს. შარტონის მიერ აღინიშნა.

**პროცედურის მდგომარეობის სინდრომი** - პროცედურის სინდრომი (Arnold O.H., 1966). ს. შარტონის მიერ აღინიშნა.

**პროცედურის მდგომარეობის სინდრომი** - პროცედურის სინდრომი (Arnold O.H., 1966). ს. შარტონის მიერ აღინიშნა.

**პროცედურის მდგომარეობის სინდრომი** - პროცედურის სინდრომი (Arnold O.H., 1966). ს. შარტონის მიერ აღინიშნა.

ა. **სიმონი პინეტი** - **პინეტი** (Simon Th.). დახვეწილი ექსპერიმენტული-ფსიქოლოგიური გამოკვლევების ტესტით, რომელიც მოწოდებულია ექიმების მიერ. დგინდება ბავშვის გონებრივი განვითარების დონე სიბავშვობის პერიოდის მდგომარეობის მიხედვით.

ბ. **ბინეტი** - **ბინეტი** (Binet A., Simon Th.). დახვეწილი ექსპერიმენტული-ფსიქოლოგიური გამოკვლევების ტესტით, რომელიც მოწოდებულია ექიმების მიერ. დგინდება ბავშვის გონებრივი განვითარების დონე სიბავშვობის პერიოდის მდგომარეობის მიხედვით.

სსსსს - **სსსსს** (სსსსს). გამოიხატება მაგნიტის უნარით, სხვადასხვა აღქმადი მატერიალით წარმოქმნილი სხვა ობიექტების თვისებებით. სტრუქტურულად თავისებურებები და ერთიერილი მატერიალები. ორგანიზმის დონეზე და არის პროცესი, რომელიც დამოკიდებულია გამოიხატების მოქმედებაზე გამოწვეული რეაქციით ანუ შეგრძობებით, რომელიც ასახავს ობიექტის სხვის. ა. ლოკატორი ამბობს და შემოქმედებითი ფანტაზიის სახით იძლევა შემოქმედებითი პროცესის არა მარტო ასახვის, არამედ გაერყვების საშუალებას.

სსსსს - **სსსსს** (ბერძ. *σπασμα* - ნიშანი). 1. პირობითი ნიშნების გატების დარღვევა. სინონ.: **სსსსსსს**; 2. ხაგის, გადახატვის უნარის დარღვევა.

სსსსსსს - **სსსსსსს** (ლათ. *sexualis* - სქესობრივი). ხეშუადღური ინტერესების არარსებობა. სინონ.: **სსსსსსსსს**.

სსსსსსს - **სსსსსსს** (ბერძ. *asbestia* - უღონობა, სისუსტე). ფსიქოპათოლოგიური მდგომარეობა, დაზიანებულია სისუსტე. აღვივება დაღია, ემოციური დაზიანება, ჰიპერუსთებივი, ძილის დარღვევა. გამოხატულების მხედველი არჩევენ ა-ს **სსსსსსსსსსს** და **სსსსსსსსსსს**, ხოლო მათი გამოწვეული ეგოლოგიური ფაქტორების მიხედვით, **სსსსსსსსსსსსს**, **სსსსსსსსსსსსს**, **სსსსსსსსსსსსს**, **სსსსსსსსსსსსს**, **სსსსსსსსსსსსს** (ლათ. *fixatio* - დაღლილობა, გამოწვეული დაღლივით). ორგანული ფსიქოსინდრომის ფარგლებში გამოყოფენ ა-ს **სსსსსსსსსსსსს** (ეგრებრანტინა). გამოყოფილია აგრეთვე ა. **სსსსსსსსსსსსს** [პეროლოგი სისუსტე, (*Asbestia* M., 1898)], თუცა, შემდგომში გამოკვლევებში აჩვენა, რომ აღნიშნულ შემთხვევებში საუბარი იყო ციკლოთიმიაზე. ავადმყოფებს არაშედავად აღნიშნულია სუბლერსიის და ეგზალტაციის მდგომარეობათა მრავალეობა, აგრეთვე ავადმყოფური დარღვევების მრავალეობა განვლილი ფსიქოპათოლოგიის ხარისხით.

ბ. **სსსსსსსსს** - **სსსსსსსსს** (ლათ. *visus* - ხსოვნობა) (*Visus* H.A., 1956). დაზიანებულია მართლად **სსსსსსსსსსსსს** და განხილვება როგორც მინუს-სიმამომატიის გამოვლენება. ფსიქოპათოლოგიურად აქვს ბევრი საერთო ფაქტორი ემოციური სინდრომებთან. ნიშანდრომის გამოვლენის და დავიკრების ნიშნების გარეშე, გამოწვეულია ასპონგანობით, მოქმედების სურვილის არარსებობით. ამავე დროს გაუგებარია გრესიტიური კომპონენტი. დაზიანებულია პრობლემატიულობა, ფსიქოლოგიური არამოტივაციულობა, დიფერენცია და კავშირი სხეულთან. გენერაციისთან, ინსტინქტების და სიყოფილიანობა დღეობის მექანიზმების რეაქციების, სურვილების არარსებობა. ამათი. მერქში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ქერქემა წარმონაქმნების სისუსტეს.

ბ. **სსსსსსსსსსს** - **სსსსსსსსსსს** (*Visus* C.J., 1960). სინდრომი, რომელიც აღმოცენდება ნეოლოგიურად **სსსსსსსსსსსსს** პერქემატიულობის მექანიზმების დროს როგორც გართულების ერთ-ერთი სახე. არჩევენ აგრეთვე, მექანიზმების სურვილის დაცვებისთანავე, და მოგვიანებით, რომელიც ერთდროულად სურვილის დონეზე და სურვილის დონეზე მექანიზმების დროს. მექანიზმების ა-ის ანალოგი ვითარების მის სტრუქტურაში ასეთივე გამოვლენებულთან ერთად პარკინსონის მსგავსი მოძრაობით დარღვევების არსებობას (*Visus* H.A., 1970).

ბ. **სსსსსსსსს** - **სსსსსსსსს** (*Sillier* B., 1907). კონტაქტური ა-ის სიმამომატიის ერთობლიობა: შიდალი განი, დეკოროზური აინგაობა, ეფორი გულმკერდი, მოძრაობა X ნეონ, სუსტად განთავსებული მუსკულატურა, კანის სიფერქციულობისა და მოძრაობების, აწვივის ფორმის გელო, წერტილი აირგა, სსსსსსსსსსსსს, შევადრებულა მყოფის, კრამოდ, შეყვების, ხრცლის სისუსტე. ფსიქიკის მრავ - აწვეული განიზიანებლობა, ბელივად დაღია. სინონ.: **სსსსსსსსს**, **სსსსსსსსს**, **სსსსსსსსს**.

ბ. **სსსსსსსსსსს** - **სსსსსსსსსსს** (ბერძ. *ψυχή* - გე, *σπασμα* - ძალი) (*Psychospasmodia* A.J., 1949). აქტუური შეკვების დარღვევის შედეგად კლინიკურად ჰარბობს თავშეუკავებლობა, განიზიანებლობა, არასაკმარისი თვითკონტროლი.

ბ. **სსსსსსსსსსს** - **სსსსსსსსსსს** აგზების შესუსტებასთან დაკავშირებით წინა ქლანსეა გამოყოფის, განიზიანებული სუსტების მოვლენები.

სსსსსსსსს - **სსსსსსსსს** (*Kretschmer* E.). საკუთარი მართლად უნიშვნელობის ვანკდა-ასპონგობა მასპობობა და სიმორცხე შესაძლებელია შევადრებულ ან დაზიანებას მის საწინააღმდეგო სინთური განვლება. აღნიშნავს განიზიანებულ დაზიანებულია ერთ-ერთი ცხოველებისეული ასეთივერი ან სინთური განწყობა, რითაც განიზიანებულია პაროქების, ობიექტის გარე განიზიანებულზე რეაქციის დონიზირებული გეია.

სსსსსსსსს - **სსსსსსსსს** ფრანგულ ფსიქოპათოლოგიაში გამოყენებული ტერმინი, აღნიშნავს ფსიქიკურ დაავადებებს, რომლის დროსაც ხანმოკლე ფსიქიკური სისუსტის (სპონგია) მდგომარეობებს მოსდევს აგზების პერიოდები (შპქსთეფორია ან შანააკლეურა).

სსსსსსსსს - **სსსსსსსსს** (ბერძ. *ψυχολογία* - ნიშანი) (*Psychologia* A., 1870). პირობითი ნიშნების აღქმისა და მათი სწორად გამოყენების უნარის დაკარგვა. შოტორულ ა-ს მიეკუთვნება აგრეთვე, ეოკალური და ინსტრუმენტული აწვივა. ნოვების წერის უნარის დარღვევა (თუ კი ეს მოქმედება ავადმყოფისათვის ადრე შედგისაწველობი იყო), ესკეზითა და შიშით სარგებლობის არყოფნა. ხეშობრულ ა-ს მიეკუთვნება აგაზია, ალექსია, სენსორული აგზია, ეფრებისა და შიშობის გატების დარღვევა. ა-ის დროს აღნიშნება მხოლოდ პირობითი ნიშნების აღქმის დარღვევა. ამით იგი განსხვავდება აგზიანობისა და აპროქიანობისაგან.

სსსსსსსსს - **სსსსსსსსს** - **სსსსსსსსს** (*Psychologia* H.A., 1960). სინდრომი, რომელიც აღმოცენდება ნეოლოგიური ანტილომი).

სსსსსსსსს - **სსსსსსსსს** (ლათ. *schizis* - ხედიერული ანტილომი). პირიანობითი უნარის დარღვევა, რომლის დროსაც მოვლება ცნობათა ნორმალური ასოციაცია. შეტყვევება და აზრების ატარება ფრანგულულ სხვაობის. ეფრებისა და ემოციური, ეკუთვსეობის ან ცნობიერების ამღის სინდრომების დროს.

ასინინგმა - ასინინგ (ხერმ. synergia - თანხვენილი მოქმედება) (Habinski J., 1899). შეთანხმებულ მოძრაობათა დარღვევა. მაგ, ავადმყოფი ვერ დგება მწოლიარე მდგომარეობიდან ხელის დახმარების გარეშე. ნათების დაშინების სიმპტომი. სინონ: მოსინინგმა.

ასინინგია - ასინინგია (ლათ. asynonia - ძილი). უხელობა, ძილის დარღვევა. ელანდება ჩაძინების გაძნელებით, წყევდილი ძილით, დაბთი ხშირი გაღვიძებით, ჩედაპირული ძილით, ჩადარევი გამოღვიძების შემდეგ ხელახალი ჩაძინების შეუძლებლობით. სინონ: პირინინგია, მოსინინგია, მოსინინგია.

ასინინგოვანიზმური ასპერტოზური სინდრომი - ასინინგოვანიზმური სინდრომი - ასინინგოვანიზმური სინდრომი გვხვდება ძალიან იშვიათად ენცეფალიტების დროს. ვარაუდობენ, რომ მისი აღმოცენება დაკავშირებულია შემენცეფალიტის და თანამდებო რევოლუტური ფორმაციის გაღვიძანებასთან. დაშინასათხებელია: გამოხატული მოვადე უსიქოლოგიური აგნება, აოტოიდური, გიქსიმატური, ქორეოფორმული მოძრაობები და მოკლონიური შეტოვებები; უძილობა რამდენიმე დღის განმავლობაში; შესაძლებელია განვითარდეს დელირიუმისმაგვარი შევებები; პიქურესტოზია.

უიღვიძური ენცეფალიტის დროს უხელობა შეიძლება გადაიღოს სიმბოლენიანით. დაეალება მოარელება დეგადურად. ასინინგოვანიზმური ასპერტოზური სინდრომი - ასინინგოვანიზმური სინდრომი (ფრ. asynonia - სპეციალურად შეჩვეული შეტოვებები; უძილობა, რომელთა შედეგად ელანდება პარენქორების მოგერთი ფუნოგი პური ხაზების შვავისების გენენციები (ლაპარაკია რუახებზე, სადეკ ეროტური შევლედე ავად უსიქოლოგიად, კერძოდ, მიმოგრებით). ასინინგოვანიზმური ასინინგოვანიზმური ასპერტოზური სინდრომი რამდენიმე წინათ უსიქოლოგიის მინიჭება (დედებითი ასინინგოვანიზმური ასპერტოზური სინდრომი), რაც ანაპირობებს პანენქოვად (ქორეჩინებაში თანახარ ჩარევა) გადახრას (პანენქოვ-შემთხვევითი შევლები). სინონ: შინინგოვანიზმური სინდრომი.

ასინინგოვანიზმი - ასინინგოვანიზმი (ლათ. asynonia - შეტოვება). ორი ან რამდენიმე უსიქოლოგიური პროცესის (შეგონება, წარმოდგენა, აზრი, მეოცია, მოძრაობა და სხვ) შეტოვება ფორმა, ვამოხატება იმით, რომ ერთ-ერთის აღმოცენება წვეკეს მეორის ან რამდენიმეს გაჩენას. რამდენიმე უსიქოლოგიური პროცესის შორის ასოციაციური კავშირების მოვლება ჯერ კიდევ ცნობილი იყო პლაგონისა და არის გოტელებით. არის გოტელები არჩევა ა-ის სან სანეს მოსამოლოების, შვავისების და კონტრასტების მიხედვით. მაგლოვად დაადგნა, რომ-ის უნილოლოგიურ სუბსტრატს წარმოადგენს დროებითი პირობითი კავშირები, იგი განიხილავდა ა-ის როგორც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ცნებას უსიქოლოგიის და მასში ხელადა უსიქოლოგიური მოვლენების უნილოლოგიური პროცესებთან თანაფარობის შესაძლებლობას. არჩევენ-ა-ის დროსა და სიქოლოგიის ცროიაზობის (წერილი-მარკა, დედა-საუშეზე), შვავისების (მაქარი-თოლოვი, თეთიშინინგოვანიზმი), კონტრასტის (ეროლი-შეგონა, დედა-საუშეზე), სიქოვანების (ჯერი-შერი), დეგოკური-ა-ის მოძრაობის (სამარო, სიქოლოგი-განგონება) მიხედვით. ა-ის ანალიზზე დაშვარებული ადამიანის უსიქოლოგიური გამოკვლევის მთელი რიგი მეთოდები. (იხ. ასინინგოვანიზმი და ასინინგოვანიზმი).

ასინინგოვანიზმი ასინინგოვანიზმი - ასინინგოვანიზმი ასინინგოვანიზმი (ლათ. asynonia - მიერთება) (Jung C., 1906). უნებს მიერ გამოყენებული პროცესული უსიქოლოგიური უსიქოლოგიური შეტოვება ავადმყოფის კომპლექსების გასახსნელად გამოკვლევის პროცესში სასახლო სიგევიერი რეაქციების დატენკური პერიოდის განხატვრებით და გამოსაკვლევი პირისათვის არაინდიფერენტული აუტოგოტივური ხასიათის სიგევიერი გამბლიანებლის მოწოდებით. სიგევიერი ექსპერიმენტის დედა გამოქმედი იყო ადრე. უსიქოლოგიის ა.ე. გამოყენებულ იყო პათოლოგიური (Иванов-Смоленский А.Г., 1928; Чистов А.С., 1939; Гакель Л.В., 1953) ან პათოლოგიური (Землянский Е.В., 1962; Рубинштейн С.Л., 1970; Елизаров Е.М., 1971) მონაცემების ინტერპრეტაციით, პათოლოგიური ა.ე. გამოყენება ასინინგოვანიზმი პროცესების მიღწერების ანალიზისთვის ასოციაციების ხასიათის და მათი აღმოცენების სიქოვანების მიხედვით; აგრეთვე იძლევა გამოსაკვლევი პირის მოგერთი პიროვნული თვისების შესწავლის საშუალებას. ცნობილია ა-ის მრავალი ვარიანტი, დამოკიდებული განმარტების ხასიათის და სასახლო რეაქციის უნარის წინაწარ განსაზღვრულობაზე (იხ. ასინინგოვანიზმი და ასინინგოვანიზმი).

ასინინგოვანიზმი სინდრომი - ასინინგოვანიზმი (Asperger E., 1944). იხ. ასინინგოვანიზმი და ასინინგოვანიზმი.

ასინინგოვანიზმი - ასინინგოვანიზმი (გერმ. asynonia - გლომა). საყრდენის გარეშე დგომის უნარის დაკარგვა. გვხვდება ცნის ორგანული დაშინების დროს.

ასინინგოვანიზმი - ასინინგოვანიზმი (Block P., 1888). საბარეობა და დგომის შეუძლებლობა საწოლში კიდრთა მოძრაობის სივარების და ძალის შენარჩუნების ფონზე. განიხილება როგორც აინენების გამოვლენება (შარკოს მიერ აღწერილი ა-ა-გან განსხვავებით). ისტერიის სიმპტომი. საჭიროა დიფერენციალური თვისების გინის ორგანული დაშინების დროს შუბლის ატაქსიასთან. ა-ა-ის ატაქსიური ფორმის დროს (Charcot J.M., 1888) მოძრაობის კოორდინაციის უღლის ქორეოფორმული უნებლიე მოძრაობანა.

ასინინგოვანიზმი - ასინინგოვანიზმი (გერმ. asynonia - მყარი, მოკლობითი, სივრცითი, ცნობის - შემეცნება). აგნობა ერთ-ერთი ვარიანტი, რომლის დროსაც დარღვეულია გაქვილები ადქმა. ავადმყოფს არ შეუძლია ხელის შეხებით საცნის ფორმის განსაზღვრა. აღინიშნება ქერქის თემის წილის დაშინების დროს და აინენება სივრცითი შთაბეჭდილებების შეტოვების (Denny-Brow D., 1958). ცალკეულ შეხებით შეტოვებით სინთეზური დეუქტით (Лурья А.Р., 1973). სინონ: ასინინგოვანიზმი ტანტოლური (Wernicke C., 1894) ასინინგოვანიზმი (Nielsen J.M., 1946).

ასინინგოვანიზმი სინდრომი ასინინგოვანიზმი - ასინინგოვანიზმი ასინინგოვანიზმი (Asperger E., 1944). იხ. ასინინგოვანიზმი და ასინინგოვანიზმი.

ასინინგოვანიზმი და ასინინგოვანიზმი - ასინინგოვანიზმი (Asperger E., 1958) მრავალკლონიური პროცესული დეკოვანიცული დაშინების გამოვლენა ცნობილების დარღვევით, პიროვნული კვანძების, ნეეოლოგიური სიმპტომის გამოვლენა დაშინების მრავლობითი კეროვანი ხასიათით: მონო- და პეხი პარეზები, აგრადია, ალექსია, დიზარტოზია, კეხინოლოგია, პეხი პიქურესტოზია. მიმდინარეობა მწვადად, მთავრდება სიქელოლოგიური რამდენიმე კვირამ ან თვეში. პათოლოგანოგოვირად - სისხლ-დარღვევას სისეგებასთან დაკავშირებული მრავლობითი დაშინების კერების გინის ათორ და რუხ ნეოტიერებებში, ბირთვებში, გინის დეროსა და ნათემში. გიქოლოგია უცნობია, არსებობს აზრი დაკავლების ურუსული ხასიათის შესახებ.





აპრა - აყი (ბერძ. aura - ნიავი). ელექტური გულრმა მიამწყვდებულ; ელინება მოტირული, სენსორული, ევგედიკური ან ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომები. წარმოადგენს ფოკალური ეპილეფსიური გულყრის გამხელურებას ან-ელემტო ენერგოლიბიაციით ან მის გარეშე (მაგ, საფუძლის გულყრას). უპირატესი სიმამტიკის-მხედვით არჩევენ ა.ს. აქუტაქურას (სანებას), გვეტატაურს, გეტატულურს (თაბერსხევეა). გამტარებას, გეპტარებას, ზიარაბობას (მოგორულს), შვედგელობას, კარდალურს, ენსეობს, ფსეპურას (მაგ, ენსემენტი ეპვე ნანახა და ანახათდე ნანახათ), ფსეპოსენორულს, შეტყველებთამატირატებულს (შვეველების უეპარი შერეურა), ხენატურას (განსხრობის ან დარღს შერტებას საფუძელს გულყრის საჭისხე), ემუბატატარულს (კუბის არეში უსინოფორ მატარება - ტყეფი, ბუჟუბა და ა.შ.). აის ერთ-ერთი ვარიანტია აბსანა-ურა (Бисапокоб ГЛ 1972), რომლის დროსაც აურის სახით ელინდება კლინიკურად და სუბელინიკურად გამხატული აბსანსი, რეისტრირდება ელექტროენეფალოგრაფიულად.

ა. პრირტრაპირაპაპალი მემარნიპალიტბითი - a. protargirivaniya yuxtaseniya (Konstorum CH. 1940). როული ელექტისური აურის სახე, რომლის დროსაც ავადმყოფის სხეულის ზოგერთ ნაწილში არსებული პერმანენტული პირთეიბიტი გულყრის წინ ძლიერდება და ხდება შტეინეული. ამ დროს ავადმყოფი განილიან ელექტორილების დარგების შერტებას, ერთდროულად აღმოყენდება დარღს და განტრეელობის გრძობა, გულსრეულის შერტება. უშუალოდ გულყრას წინ უსწრებს სნებითი პალეურაქია (ჩუვეე ვეველავერი დამატარა). ამ დროს ავადმყოფი განილდს ენთ-სახსროვანი მგრანტელობის მომღს შერტებას, მაგ, ხელის გბადარება. ზოგჯერ ავადმყოფი აბერებს ხელის შერეურ მბარეს გადარგებით გულყრის თაიდან აყილებს.

ა. შაბტინტენალშტაქაქური - a. psychosensitizatsiya (Fennel W. 1929). აურს ხახვ, უევესად გებეება ფსიქომოტირული გულყრების და ქეთონის ძილისმბაგარი შლომარეობის დროს. ავადმყოფს აქვს "უკვე ნანახბ", "უკვე ფორნახბ", მგრანტირალიბეურ განყლებ. აღინიშნება მკრო და შერეოსუბე, განხილდება რიგორე უნისების სხეულის დამბანების სიმამტირ.

აპრტაპა - აყთა (ბერძ. autos - თითღი) (Bleuler E. 1911). ხანაქვლუბაქ განყლებ, შინაგან განყლებ, შიშიორენის დროს არსებულ აუექტორ-ოქლექტებზე ფრატება. ა-ის ქვეე იგულისხმება ავადმყოფის ურთიერთობის შვესად დაშამბანებთან, საკუთარ თავში ჩაქვეტ, გარე სამყაროსაგან გამოყოფა, გარშემოცემებთან უნოყური კონტაქტის დაქარება. ძირითადად გებეება შიშიორენის და შიშიოდური ფსიქოპათიის დროს, თუქვა, აქწარილდა ისტერიული წარსის ფსიქოპათიურ პიროვნებებზე რყნებვის დროს, ფსიქურად ქანშროვლებზე ცხოვრების განსამდგურე ქერიოდში, როყა ლოტიკური გბადის უქანა პლანსე, მაგ, ფანგამორ ბაქეებში გამოილიების უქონლობის დრო.

ა. ბანაშბა - a. Kanner L. 1943). დამახასიათებელია შვევეტ ნიშნებ: 1) სიყოფილის პირველი წებებან წაბებანდან პიროტირობის უნარის დარღვევა; 2) გარე სამყაროსაგან უკრეურესი გამბეება გამილიბანებლთა იგნორირებით, შინამ, სანამ ეს (გამილიბანებლ) არ გებეება ავადმყოფურ; 3) ბაქემის ხელში აყენისას მზადყოფნის კობის მიღების უქმარობა; 4) შვევეტლების საყოფიანყოფ საშუალებად გამოყენების უქმარობა; 5) კარგი მექანიკური შესხერება; 6) ექოლადება; 7) გამბეებებლ სიყვებეს პირდაპირი მნიშვნელობით ხმარება; 8) პირის ნაყიბანხელის დაუკრებარებული გამბეებება; 9) სიყოფილის პირველ წელს საჭმლის შონელების დარღვევა; 10) ხმამაღალი ბტერების და შიშიორეობების შიშიორე შიში არქულ ასაკში; 11) ბტერების და შიშიორების შონეობის გამოგორეუნი გებორობა; 12) გარემოს შვეტის შიში (იხ. ბანაშბის შერტება მბანაშბა); 13) სპონტანური აქვებობის ურთიერება; 14) არასათამაშო საგნებით შონეობური მექანიკური თამაში; 15) კარგი ინტელექტის შთახევილება ცალკეული ჩვეების წარმადყოფნისა და გონიერი გამომყვეტების წყალობით; 16) სახის სეროლოგიური გამომყვეტება, ხაბლის თანდასწრებლთა დაბახება; 17) კარგი ფიზიკური ქანშროვლობა (იხ. ბანაშბის ხმამაშბა). განხილდება როგორე ნომოლოგურად არასაქეფიკური სინდრომი, მისი ერთერთი ვარიანტი შესაბალოა შიქეთონის შიშიორენისა და ჩველებრის, წინ უსწრებს პრეკის მანიფესტაციას (Pfeiffer M.L., 1971, 1976). ამასთან ერთად, შიშიორული ფსიქოპათიის დროს ბ.ა-ის სინდრომი გამოყოფა როგორე განყნული აუტიზმი, პარაუგისებრი შლომარეობანი - ნევიროული რეაქციების ტიპით, რომელიც განპირობებულა ანტი- და პერიანტაქური განეითარების დროს ეგზოტირის ბაქე გაკლებით გამოყვეტლი განეითარების უთანარეობად და შერეებით (Kahn E.E. 1981). იხ. ბანაშბის ხმამაშბა ბანაშბის აპრტაპა სინონ: ბანაშბის სინდრომი.

ა. ბანაშბისპირი - a. cytopathia (Boyer J.S., Descharrette A., 1980). ბაქეშობა აქუტაშბის შუელება ლენკო-გახტობ ხნდროშობან. ელექტისური გულყრების შერნალობის პრეცეპტი აუტიზმის მოელენები შყირლება და აღინიშნება ინტელექტუალური დროს აღგება. სინონ: ბანაშბისპირის სინდრომი.

აუსტიტური შაბტინტენალშტაქური - аутистическая психопатия детская (Asperger H. 1944). ხასიათდება ინტელექტუალური პრეცეპტის შიდალი განყოფარებთა მოციური ხილარობის ფრნე. გამოილინდება დაახლოებით სიამ წლის ასაკში, განსაკურებლთა შერველ სასოლო წლებში. ბაქეშობა აუტიზმის კანტის სინდრომისაგან ეანსხვავება მოგვიანებით გამოვლინებით, კარგი სოციალური პროგნოზით; ბაქეშის შვევეტება ინარჩუნებს კომუნიკაციურ უნებყდას. ამ დროს შთავარ ფსიქიკურ დევექტად აბპურება თელის ინტეგროსი, წინა ცხოვრებისეული ეპოქილიების გამოყენების უნარის უქმარობას; ეს უქანსენელი ელინდება მბანაშბის წინათგრანობის უქონლობითა (Линушкин П.Е. 1933), მტილორ კავშირშია თანავანდის უნარის უქმარობისაგან (Литко А.Е. 1977). სინონ: ბანაშბის სინდრომი.

აშაბა - афазия (ბერძ. phasia - ვამა). ცლაქაშ შიშილა, აღინიშნება ყლაპის აქვებში შონაწილ უნებებს და საყლაპვის შედაწილის, ფრთვეტ ცნ-ის ორგანული დამბანების, შერეობების, განსაკურებლთა ისტორის დროს. მასთან, ყლაპვის შესაბალო თან ახლდეს ტყიელის შერტებაები - ა. შტეკეველი.

აშაშბა - афазия (ბერძ. phasia - შვევეტება). შეტყველებლ დარღვევა, აღმოყენება თავის გენის დომინანტური ქეისფერის ქერტის ლოკალური დამბანების დროს. შვევეტებითი აქვის სხედასახვა სახის სისტემური დამბანება. ევანსიკური სისტემიკითი არჩეველ ა-ის შვევეტ სახეებს:

ა. ანეშბისპირი - a. amnesicкая (Troussseau A. 1864; Bateman. 1898). სიმამტირა კომალექტი, ხასილდება საჭირო სიყვების სიტყვის შვედეტლობით, საგნების დასახებლის განქლებით, თუქვა, ამ საგნებზე და შათ თავისი უნებებზე წარმოდება შენახულია. აღინიშნება დომინანტური ქეისფერის თებ-ბაქეთელის და თებ-ყვის შიდაშობის დამბანების დროს.

ბ. შოტონი - ა. BROOKS (Brooks P., 1861). სიმპტომა კომპლექსი, ხასიათდება უპირატესად ექსტრემული პეტეხელების მოშლით. შედარებულად სიგვეების წარმოქმნა, თუმცა, მეტეველების პერიფერული აპარატის ორგანული დაზიანების ნიშნები არ არის. მეტეველებისათვის დამახასიათებელია აგრამატიზმი («ტელეგრაფული» ხტაღი). სარეაქციული სიგვეის სტრუქტურის დარღვევით, კონტამინაციები. აღინიშნება ღომინანტური ეპისთერის შეზღუდული ქვედა ხველის უკანა შესაშლის (ბროკის ცენტრი) დაზიანების დროს.

ბ. სმბატიძე - ა. CAZEMAJA (Cazemaja H., 1926). სიმპტომა კომპლექსი, ხასიათდება ენაბიკულად როული ურამების აზრის ვაგების სიგვეების შორის დამოკიდებულებას (რომელიც გამოიხატება ურემიის, შემადგენელი კონსტრუქციის, თანდებულების, შედარებითი კონსტრუქციის სპეკულაციით) დარღვევებით. აღინიშნება ღომინანტური ეპისთერის თხემ-საფეთქლის სიმდგრამე დაზიანების დროს.

ბ. სმბატიძე - ა. WERNICKE (Wernicke C., 1874). დამახასიათებელია სტრუქტურული მნიშვნელობის ცვლებების უზარის დარღვევა სხვის დაზიანების გარეშე ექსტრემული მეტეველების შედარებითი მენარინება, პრაქტიკულიდან ლოგორეაქტივ-პარაფიზიები - ევრამები და ლიგეალური. მსგავსი სტრუქტურის გარჩევის განხილვა. აღინიშნება ღომინანტური ეპისთერის საფეთქლის ზედა ხველის უკანა ნაწილის დაზიანების დროს.

ბ. ტრანსპორტის - ა. LICHTHEIM (Lichtheim L., 1885). თავდაპირველად განხილულია როგორც დამოუკიდებელი ფორმა ბროკის და ვერნიკის ცენტრებსა და გვეების ცენტრის შორის ასოციაციური ცენტრების დარღვევის შედეგი. ამჟამად განიხილება როგორც მოგორული და სენსორული ავანიის დროს მეტეველების ოლიდი დარღვევა გამოყოფილი მეტეველების მენარინებით. ლურჯის (JURYD A.P., 1962) კლასიფიკაციის შესაბამისად, რომელიც დამატებულია უმაღლესი ფსიქიკური ფუნქციის სისტემური ანამიკური ლოკალიზაციის თეორიამ, არჩევენ ათის შემდეგ ფორმებს: 1) აფერენტული. შოტონული (კანტოზური) - წინა-ქანაზე კინეთემური საფუძველზე დამატებული მეტეველებითი შორისობის დარღვევები, არტიკულაციის მოშლილობანი; 2) უფერენტული შოტონული (კანტოზური) - მეტეველების სიმფიზის დარღვევა, მეტეველებითი დეაგომატიზაცია, ერთი არტიკულიდან მეორეზე გადასვლის ცანხვები; 3) დანამიკური - მეტეველებითი პროცესების აქტიური ადგილის დარღვევები; 4) ატუტოკურ-გნატოკურ ხუნორული - დარღვეულია ახლო (ოლიბიური) ზონების გარეშე. უფრო მსიკრის დაზიანების დროს მკვლევარმა მეტეველების ყველა ბერის გარეშე, შესაძლოა მეტეველებითი აქტიური ავანიის მოვლენები; 5) ატუტოკურ-მენტოკურ ხუნორული - ცენტრული დასახელების დარღვევები. ნაჩვენებია სიგვის ევრამული დასახელების განხილვა. კინეთემური ავანიის აღინიშნება დაზიანების გაერელებისას პრეცენარული ქრტიდან ქვედა უნებუნე (სახის, გუნების და უნის კინეთემიის ორგანიზაციის მორეაქტივ მონები), კინეტიკური - პრემორტორული მონის ქვედა ნაწილებში; დანამიკური - შულის წილის კონტრასტული ნაწილში დაზიანების დროს; აქსტოკურ-გნოსტიკური - ქრტიის საფეთქლის მიღამის მორად ნაწილში ლოკალური დაზიანების დროს, აქსტოკურ-მენტოკური სენსორული-ლიდი ცენტრის ქრტიის თხემ-კუთხის მიღამის დაზიანების დროს.

ბ. შანსონი - ა. APHANAS (Aphanas G.). ფსიქოანალიზში: სექსუალური სურვილების გაქრობა.

ბ. შანსონი - ა. APHANAS (Aphanas G.). შტატში აქტიურობა, მძაფრი, ხანგრძლივი და გამოწვევი მისხთან შედარებით არადაეკავებული აქტიური გამოვლინების აღივად აღმოცენებისაღი მიღრეკლება. აღინიშნება ნეგროზის დროს, ფსიქოპათიურ პიროვნებებში, ორგანული ფსიქოსინდრომის ფსიქოსინდრომის გარანტიის დროს.

ბ. შანსონი - ა. BLEULER (Bleuler E., 1906, 1916). ხანგრძლივი აფექტი, რომელიც არ იცვლება ახალი გაყვლების და შთაბეჭდილების შრეშეღებით, აფექტის გაყვრა, მეტეველი სიმპტომი.

ბ. შანსონი - ა. BLEULER (Bleuler E., 1906; Leubuscher P., 1907). ფსიქოგენურად აღმოცენებული ეპილეფსორული გულყვები ფსიქოპათიურ პიროვნებებში, არამედიკალური ორგანული ცენტრული პათოლოგიის დროს (ოლიგოენრია, ცერებრული ათეროსკლეროზი). გულყვები არასოდეს არ აღმოცენდება ენდოგენურად და არ მიღის ეპილეფსორული კუასტობის ჩამოყალიბებამდე. თანამედროვე მედიკატორთა მიერ ა-გ-მედიკაციის ეპილეფსორული რეაქციის.

ბ. შანსონი - ა. BLEULER (ლათ. affectus - სულიერი მდღეობა, ენება; გერმ. Affekt). ფსიქოანალიზში: ყველა ეპილეფსორული მდღეობა და - ხასიათი უსამართლო, გარკვეული-გარკვეული, გამოხატული მოძიერი სულიერი განაღობით ან ძლიერი ენერგოკული განგვირთობით. ზ. ფროიდის მიხედვით, ყოველგვარი ლოკალიზებული ან თვის გამოვლენას ორი ღონით - აფექტით ან წარმოგვენი. აფექტი არის მიზნულობის ენერგიის რაოდენობის ხარისხობრივი გამოხატულება. შოგალი ფსიქოლიტიური ცენტრით, მძაფრი მამდინარეობის დაღებით ან უარყოფითი გონის ხანგრძლივი მდღეობა. უნებდა აღმოცენდება ფსიქოგენურად. მისთვის დამახასიათებელია შევითრი ევრამული გამოვლენები. განარჩევენ ა-ს: სექსუალურ (მაგ. მრსამბნება, სისარული), ათერურს (შიმი, სედა, შუთოდა), შერეულ (შოლონი). ნორმალური რეაქტიუბის შეუძლებლობის შემთხვევაში ეითარება შტატებში ა. ბ. შანსონი - ა. BLEULER (ლათ. affectus - სულიერი მდღეობა, ენება; გერმ. Affekt). ფსიქოანალიზში: ყველა ეპილეფსორული მდღეობა და - ხასიათი უსამართლო, გარკვეული-გარკვეული, გამოხატული მოძიერი სულიერი განაღობით ან ძლიერი ენერგოკული განგვირთობით. ზ. ფროიდის მიხედვით, ყოველგვარი ლოკალიზებული ან თვის გამოვლენას ორი ღონით - აფექტით ან წარმოგვენი. აფექტი არის მიზნულობის ენერგიის რაოდენობის ხარისხობრივი გამოხატულება. შოგალი ფსიქოლიტიური ცენტრით, მძაფრი მამდინარეობის დაღებით ან უარყოფითი გონის ხანგრძლივი მდღეობა. უნებდა აღმოცენდება ფსიქოგენურად. მისთვის დამახასიათებელია შევითრი ევრამული გამოვლენები. განარჩევენ ა-ს: სექსუალურ (მაგ. მრსამბნება, სისარული), ათერურს (შიმი, სედა, შუთოდა), შერეულ (შოლონი). ნორმალური რეაქტიუბის შეუძლებლობის შემთხვევაში ეითარება შტატებში ა.

ბ. შანსონი - ა. BLEULER (ლათ. affectus - სულიერი მდღეობა, ენება; გერმ. Affekt). ფსიქოანალიზში: ყველა ეპილეფსორული მდღეობა და - ხასიათი უსამართლო, გარკვეული-გარკვეული, გამოხატული მოძიერი სულიერი განაღობით ან ძლიერი ენერგოკული განგვირთობით. ზ. ფროიდის მიხედვით, ყოველგვარი ლოკალიზებული ან თვის გამოვლენას ორი ღონით - აფექტით ან წარმოგვენი. აფექტი არის მიზნულობის ენერგიის რაოდენობის ხარისხობრივი გამოხატულება. შოგალი ფსიქოლიტიური ცენტრით, მძაფრი მამდინარეობის დაღებით ან უარყოფითი გონის ხანგრძლივი მდღეობა. უნებდა აღმოცენდება ფსიქოგენურად. მისთვის დამახასიათებელია შევითრი ევრამული გამოვლენები. განარჩევენ ა-ს: სექსუალურ (მაგ. მრსამბნება, სისარული), ათერურს (შიმი, სედა, შუთოდა), შერეულ (შოლონი). ნორმალური რეაქტიუბის შეუძლებლობის შემთხვევაში ეითარება შტატებში ა.

ბ. შანსონი - ა. BLEULER (ლათ. affectus - სულიერი მდღეობა, ენება; გერმ. Affekt). ფსიქოანალიზში: ყველა ეპილეფსორული მდღეობა და - ხასიათი უსამართლო, გარკვეული-გარკვეული, გამოხატული მოძიერი სულიერი განაღობით ან ძლიერი ენერგოკული განგვირთობით. ზ. ფროიდის მიხედვით, ყოველგვარი ლოკალიზებული ან თვის გამოვლენას ორი ღონით - აფექტით ან წარმოგვენი. აფექტი არის მიზნულობის ენერგიის რაოდენობის ხარისხობრივი გამოხატულება. შოგალი ფსიქოლიტიური ცენტრით, მძაფრი მამდინარეობის დაღებით ან უარყოფითი გონის ხანგრძლივი მდღეობა. უნებდა აღმოცენდება ფსიქოგენურად. მისთვის დამახასიათებელია შევითრი ევრამული გამოვლენები. განარჩევენ ა-ს: სექსუალურ (მაგ. მრსამბნება, სისარული), ათერურს (შიმი, სედა, შუთოდა), შერეულ (შოლონი). ნორმალური რეაქტიუბის შეუძლებლობის შემთხვევაში ეითარება შტატებში ა.

აღკომლური პარანოიის დროს იგი ავარებს გაოყებით, შეეღრებული მხერით მიმდინარე ეპიკური რეაქციის სახეს, რომელიც აღმოუვლება ირცელი მომდარი არაშეუღლებრივი მწკავე ცელილებების შეღვად ანუ ჟვარეთი მიმართული განცლების დროს (Storring G., 1939; Пастухова С.П., 1972).

ა. პასორცლმპმპრმ - ა. пастухова. შიეკუნენბაგანაკურებულ ღლომარებას, აღმოყენება მწკავე ესოიყენის შემოყენების შეღვად და ავარებს ხანმოკლე ხასიათს. ამ დროს აღინიშნება ცნობიერების შეეწროება და ყვარადების კონსერვაცია ძირითადად შარკაშვირებულ განცლებზე მიმდინარეობს აუეკტური განგეირთეთით, ხშირად ავარესიულ-დაშანგეიული მოქმედებით. აუეკტური განგეირთეთის მღერმარეობაში ცნობიერების დარღვევა ღრმა, მიმდინარეობს დემორიენგირებით, გაუგებარა შეეყვლებითი პროლექციებით, ჭარბი ვესტეკუდაციით. გამოსაყელი - განურეელობის, უმოქმედობის, შიეგად მოვლების მღერმარეობა, რომელიც იყვლება ძალით. ა.პ.-ის შეღვად აღინიშნება კორგარადული ანგნა. ა.პ. არსებობდა წარმოადგენის მწკავე ესოიყმს და აყვლებულა მიმდინარეობს ცნობიერების შეეყენით. ცნობიერება შემოიფარგლება წარმოადგენების ვეწრე წრით, რომელიც უშუალო კავშირშია პიროვნულად მნიშვნელოვან გამომიანბნებლებთან.

ბ. შიეზმცლმპმპრმ - ა. ფანათიოვა. მიმდინარეობს ცნობიერების შეეწროების, ნებით-მამორბავებულ სუერობს აეგომაგომების და ანხეობის ვარემე. ვიარლება ნაკლებად მწკავედ, ვიდრე ა.პ. და მის მიმდინარეობაში შეუღლებელი ნახების ცელის შემგნება, რაც დამახასიათებელია პასოლოგიურ ა-თვის სინონ: პლმამ სულმამი მღვლმარება.

ფიზიოლოგიურ და პათოლოგიურ აუექტ შორის ძირითადი დიფერენციულ-დამინოსტიკური კრიტერიუმია ცნობიერების შეეყენა, რაც დამახასიათებელია პათოლოგიური ა-თვის (Сербский Б.П.).

ბ. შიეზმცლმპმპრმ პათოლოგიურ ნაღვარებზე - ა. ფანათიოვა და пастухова. შიეზმცლმპმპრმ ხერმესის მიხედვით, აღინიშნება იმ აქორებს, რომელთაც აქვთ არამყარა ნერეული სიგება, და ავრთვედ მერმონბარე, შიეპეღვლები ნერიულ პირებს. იგი წარმოადგენს გარდასავად ფორმას ფიზიოლოგიურ და პათოლოგიურ ა-ებს შორის. მიმდინარეობაში არა შარკა კლინიკური გამოვლინებების, არამედ პათოლოგიური ნიადგის (ესოიკამათა, აღკომლმპმ) ანადლი. ცნობიერების ანდის სიღრმე უნიშნეულა. დამახასიათებელია ა-ის გამოშველენი მინება და გამოვლინების ხარისხი შორის შეუსახამობა. არამივითად ა-ბა შეიძლება მიადწიოს მიმდინარეულ ინგენსიობას და ვახდეს დანაშაულის მიხემა.

აშმპტ-სინდრომი შიეპერცლმპმპრმ - ა. ფანათიოვა და пастухова (Peters U.H., 1969). აღწერილია ხეკოქმეს ემღვებების დროს, ხასიათდება ცელილებებით, რომელთაც სივლება ესოიკამათის აღწერილი გავების ვარგლება. დამახასიათებელია გენბე-განწყობის ხშირი და სწრაფი ცელილება, აუექტური გამოიყვება. აუექტური განგეირთები გენუინური ეპილეფსიის დროს არსებული ექსპლოზიურიობისაგან განსხვავდება ნაკლებ სიმართობა, ხანმოკლეა. აღინიშნება ქვეყანა ურთიერთსაწინააღდეგო გენდენციების თანარსებობა. ექსპლესიური დემენციის მყვეთარი ნიშნები არ ვახდლება. პიროვნების ცელილებები მიმდინარეობს ინჟანგეიულირ ეპილეტრული და იპოქონდრული გიპით. ხშირია სოციალური დემადაკაციის, ანგისოციალური გენდენციების, აღკომლური სასმელების მოღებისადმი მიღრეელება. შიეფრთ შემთხვევაში კლინიკურ სურათში დიდი ეპილეფსიური ევლყრის ექიშრებთან ერთად აღინიშნება გენუინური ეპილეფსიისათვის დამახასიათებელი პიროვნული ცელილებები.

აშმპტ-სინდრომი ინდროსინდრომი - ა. ფანათიოვა და пастухова (ლთ. სინდრომი - შეეყენებლობა). იხ. შიეპმპტ-სინდრომი.

აშმპტ-სინდრომი რამბინება - ა. ფანათიოვა და пастухова (Метран А.А. 1972). არჩევენ აუექტური რეაგირების ხუთ ძირითად გიპს, განარობებულს ნებითი უნქმელების თიესებური მოგვიდაობის: 1) კატათიზირა - გამოხატული აუექტის მღერმარეობაში აღგადი აქვს ქვეყანა, რომელიც ეწინააღმდეგება აღმანბნის ცნობიერების გიერ რეგულაციულ სოციალურ პრაქტიკას ენოსტეკას და პროთიპათიულ პოზიციებს შორის დისოციაციის ვარემე. გაურთა ნეურომული მღერმარეობისა და პიროვნების პათოლოგიური განვითარებისათვის; 2) პოლოთიზირა - ხასიათდება ეპოიკური განწყობის პოლარიზაციით - დეპრესიულ და მანიაკალური, პროთიპათური აუექტურიობის სიგარბით. აღინიშნება აუექტური ესოიყების დროს; 3) პარათიზირა - ხასიათდება ქერქელ-გნოსტიკურ და ქერქევეა - პროკოპათური გრმობებს შორის დისოციაციით, მიღების და პალეუსიაციის შეუსახამობით აუექტური განწყობისადმი, გნოსტიკური გრმობების სიღარიბით და იმპულსური აუექტების ქერქევეა კომპონენტების შეუსახამობის გაყოყვლებით.

აღინიშნება მიმორეგული ესოიყების დროს; 4) გენდოზირა - აუექტის ინერტულობის შეთავსება იმპულსურობასა და შეთქმბლობასთან. მისთვის გიპურა უყვარი დასაყვისი და აუექტური რეაქციის სწრაფი დასასრული. შიანდება აუექტურობის გნოსტიკური კომპონენტები; დაეაღების გაშიღ სეადამი ვინიშნება გნოსტიკურ-შესენსიური დარღვევის ამროვნების არამორეგულირებლობით, ესოიკური პროცესების სიღარიბით. გიპურა აუექტურობის პროთიპათური კომპონენტების გამწკავეება, განსაკუთრებით ბინდისებური ცნობიერების ფონზე. აღინიშნება ექსპლესიის (-ჰემორიგია და სიმპტომური) დროს; 5) დემენციურა - განპირობებულია ინგელექტუალური უნქმის დაღიანების ხასიათით და ხარისხით. დაეაღების საყვის სეადიებში აღინიშნება აუექტური რეაგირების შემოს აღწერილი გავების ელემენტები, რომელიც პროცესის მიმდინარეობისას ღრმადდება და შემდგომში აღინიშნება პრიმატიული იმპულსური მიმილდობების განმეორებება; აუადმეოყის ქვეყანაში სოციალურ-ეთიკური მოგვიება ადგილს უთმობს დაბად, ფიზიოლოგიურ მოთხოვნებებს და პრიმატიულ ღლოლვას.

აშმპტ-სინდრომი სტამპრმ - ა. ფანათიოვა და пастухова (ლთ. სინდრომი - პამპტ-სინდრომი).

აშმპტ-სინდრომი შინდ - ა. ფანათიოვა და пастухова. ძირითადი განწყობილება, განსამღვრავს შიეღვრათი ესოიკური პროცესის მიმდინარეობის ხასიათს. მღ, მღუსი სხვადასხვა ნახებში ა-თით განისაზღვრება მისთვის დამახასიათებელი ცელილებები ამროვნების პროცესში (პოლოთიზირა ამროვნება). სინონ: პლმამპმპმპ.

აშმპტ-სინდრომი ინდროსინდრომი (ინგლ. ანდროსინდრომი - შურთება, შეერთება). აღმანბნის შიეწარება, ფუსი სხვა აღმანბნა საშოგალოებაში. ა-ის გენდენცია შეეღვდობს სუბიექტის პოტენციურად საშიშ სერესულ სიგაყვლებში მოხელერობას. ამ დროს სხვა აღმანბნის საშოგალოება საშეღვდობს ახლებს მას, შიეპმპრის ქვეყანაში ამრონიული ხერბი და რეაქციის ფორმა როლე და საშმე ვითარებაში, ამანთან, აღმანბნებთან საბაოვე ამყრებს შიეოყებს, არბილებს რიყორე ფიზიოლოგიურ, ასევე ფსიქოლოგიურ სტრესის შეღვებებს. ა-ის ბლოკირება იწვევს შარგობის გრმობას, ვრესტრეაციას.

**კრესჩმერის კრესჩმერები** - **Крещмер** (Kreschmer E., 1922) აუქტესის მიმდინარეობის ერთ-ერთი ისინი მენეჯერული თაგისებურება, კანის აღმართება გარე ეპიდემიის სეზონებში გამოწვეული ტრანსპორტის და ეპიდემიის ცვლილების ხისათით და ხარისხით. კრესჩმერის მენეჯერი, ა-ის უნარს გამოიხატება განსაზღვრული კონსტიტუციური ტიპისათვის დახასიათებული ტიპურადგების პროპორციებით.

**კრესჩმერის კრესჩმერები** - **Крещмер** (ბერძნ. კრესჩმ - სპ.). სპ. სპ. დეკარტა, ბერძნით მენეჯერების არარსებობა ჩურჩნული მენეჯერების შენარებისთვის. აღნიშნება ცნობის ორგანული დახასიათების დროს, მაგრამ შესაძლოა იყოს ფსიქოგენული გამოწვეული (ხშირად ინტერვიუდ სესიონების ფარგლებში და ნეეროზების დროს). ასეთი ფსიქოგენური ა. ატარებს უფესიურ, შეტყუალ ხასიათს. დახასიათებულია ბერძნით იოგების არასრული დახასიათება, თუშა აუქტესის დროს შესაძლოა სხის უნარის აღდგენა.

**პრასიზა** - **φραση** (ბერძნ. phrasia - მეტყულება). ფსიქოგენური წარმოშობის მეტყულება სპ. დეკარტა. ისტერიული სინდრომი. ჩვეულებრივ. სრულ შევიწმინა ერთად.

**პარარტრეტიზა** - **παραραρτησις** იხ. **სანსინეტიზმის სინდრომი**.

**პარარტრეტიზმი** - **παραραρτησις** (ბერძნ. artrosis - დრო, genesis - ცოდნა, შეცნობა). განსაზღვრული სავნის ან მოყვლის დროში აღმის შეცნობის დარღვევა. შავ, მრავალჯერ მოსმენილი აღიქმება როგორც ახალი. სინონ: **პარარტრეტიზმი**.

**პარარტრეტიზმი** - **παραραρτησις** (ლათ. acceleratio - დარტარება). უკანასკნელ 100-150 წლის განმავლობაში აღნიშნული ბავშვების და მოზარდების სობატიკური ავთვისარების და ფინოლოგიური მოწიფების აქტარება, რაც უკანასკნელმა შათი სხეულის წონისა და მოძების მოამტებით, აგრეთვე სქესობრივი მოწიფების აღრული ეაღებით.

**პარარტრეტიზმი** - **παραραρτησις** ცოცხლის არსებების ზოგადი შესახათებულა, მათი დინამიკა როგორც გარე საშაროთთან სასიოცხოლო მნიშვნელობის კავშირების გარდაქმნის ან შენარტრეტიზმის წყარო.

**პარარტრეტიზმი-პარარტრეტიზმი** - **παραραρτησις-παραραρτησις** (გერმ. Aktivität-Passivität) ფსიქოანალიზში სულიერი ცხოვრების ძირითადი წინააღმდეგობა. გენების თვალსაზრისით, შას თვლიან პირველად სხვა წინააღმდეგობებს შორის, შავ, შავიკიური და ქალური.

**პარარტრეტიზმი** - **παραραρτησις** (ლათ. accensus - მახული, გამახულიება). აღმანის ფსიქიკური შესახათებულების გამახულიება, გაძლიერება. **ლეონარდის** (Leonhard K., 1964-68) მიერ შემუშავებულ შინა პროცენტის აქტივაციების კონსტრუქცია, რომლის თანახმად, აღნიშნული ფსიქიკის განვითარების ეტაპზე ხდება პროცენტის მოცივრითი თვისების გაქცევა, რაც განსაზღვრული პროცენტის შემთხვევაში იძენს დაღებით ან უარყოფით სხისს. ა პროცენტისათვის წარმოადგენს გარდასაქმნის ნორმისა და პათოლოგიის შორის. არჩევენ ხასიათის და გემპერაქტის ა-ის ათი ეპს: **პარარტრეტიზმი**, **აქტივობა**, **შეფერება**, **ეპოცურება**, **შეფერება**, **ცოდნობა**, **ფინოლოგიური**, **დინამიკური**, **გემპერაქტის**, **დინამიკური**, **დინამიკური** (სხეულოლოგიური), **აქტივობა** ეკ **შავიკიური** **შავიკიური**. პათოლოგიური დემონსტრაციული განსაზღვრავს ისტერიული ფსიქოპათიას, **შეფერება** - ანანსიკური ფსიქოპათიას, **აქტივობა** მეტყულება - პარარტრეტიზმი ფსიქოპათიას, **აქტივობა** - ეპიდემიოლოგიური ფსიქოპათიას და სხვ. **ლექსი** (ЛИКСИ А.Е. 1977) მომართა შორის გამოყოფა ა-ის შემდეგ შიშებს: **პარარტრეტიზმი**, **ცოდნობა**, **დინამიკური**, **დინამიკური**, **დინამიკური** - **შეფერება** და **შეფერება**. სალიანგოციკლო მოწიფებელია შინიშის კითხვით.

**პარარტრეტიზმი** - **παραραρτησις** უმაღლესი ბერძნულიანთა უნარის ობიექტის განსაზღვრული თვისების დახასიათებისა. ხდება პარარტრეტიზმი პერიოდის აღრული ეტაპზე. ცხოველებში უწოდებენ **შავიკიური** (ინგლ. imprint-აღმდეგება). შის საშაროებში ისინი არჩევენ შიშებს, საკუთარი სხეობის წარმოადგენლებს, სქესობრივ პარტნიორებს, ნაყინს აღმდეგებარებს და ა.შ.

**პარარტრეტიზმი** - **παραραρτησις** ცხოვრებისეული გამოცდილების პროცესში მესხიერებაში დაფიქირებული ობიექტის, ამების, ტრანსპორტის აღმოჩენება. წარმოადგენს მესხიერების სტრუქტურის ერთ-ერთი კომპონენტს და შეიძლება იყოს აქტიური, შინადასახულიად გამოწვეული და მასური, არაშინადასახულიად აღმოცენებული. თანდათან განვითარებული ორგანული დაავადების (ყვინძურული ათეროსკლეროზი, ეპიდემიოლოგიური) დროს მესხიერება შესესტების გამო აქტიური აის გაძილება განაპირების დახასიათების უპარისობა. ფსიქოანალიზში **შინადასახულიად აღმდეგება** (Reconstruction) წარმოადგენს ჩარევის მნიშვნელოვან ეპსს, რომლის საშაროებშია შექმნალობის დროს ხდება დევიკული, დათრეული, მაგრამ ფსიქოლოგიურად მნიშვნელოვანი აღრული გამოცდილების ან შის მიერ დატრეული ნაკადების აღდგენა (განსენება). ასეთი ნაკადებები თანდათანობით ჩნდება პროცენტის თვისებულ ასოციაციებში, ტყეაში, სიმბოლოებში და გადაგანის რეაქციებში.

**პარარტრეტიზმი** - **παραραρτησις** შინადასახული მოქმედება ახალ თაობაში საშაროლოგიური-ისტორიული გამოცდილების გადაცემის, შინადასახული და გემპერაქტის შემოქმედების, პროცენტის ფორმირების უბრუნელოუსი, შის საშაროლოგიური ცხოვრებისათვის და წარმოებითი შინადასახულის მომხმადების მიზნით.

**პარარტრეტიზმი** - **παραραρτησις** (ლათ. habitus). გარეგნულად გამოვლენილი სობატიკური თვისებების ერთობლიობა, გაქცევის სხეულის ავტობულება. სინდრომა შის დაპირისპირება ხასიათის თვისებურებებთან (იხ. **შინადასახული მოქმედება** **შინადასახული**, **შინადასახული**).

ა. **პარარტრეტიზმი** - **παραραρτησις** შესესტარების და შინადასახული კარგი განვითარება, ძლიერი შინის სარტყელი, სხის შესესტარის ნაკებით, განვითარებული ნაკაბა.

ბ. **პარარტრეტიზმი** - **παραραρτησις** შინადასახული, გრძელი კიდრები, ვიწრო გულმკერდი, ოვალური ფორმის წარქმედებული სხეუ. ეტაპზე ცხოვრების ქსოვილის უმნიშვნელო განვითარება. იხ. **შინადასახული მოქმედება**, **შინადასახული მოქმედება**.

გ. **პარარტრეტიზმი** - **παραραρτησις** (ბერძნ. पासάν - ფორმირება). გამოირჩევა სხეულის ცოცხელი ნაწილების არარტრეტიკული მოძებით, შავიერ სპირისპირი სქესისათვის დახასიათებული ეფიქიური თვისებურებებში (ყვინძურებაში ან ფერმინაციის მამაკაცებში, შავიკიური - ქალებში).

დ. **პარარტრეტიზმი** - **παραραρτησις** (ბერძნ. λεπτος - წერილი, ნაჩი). იხ. ა. **შინადასახული**.

ე. **პარარტრეტიზმი** - **παραραρτησις** (ბერძნ. πυκνός - ძლიერი, მოცულობითი მოძებით შარბობს სივრცის; შრტყელი თაგი, მოცულ კიდრები, დახალი განი, ხშირად კანქმება ცხოვრების ცხოვრების შარბობს განვითარება.

ბ. **პარარტრეტიზმი** - **παραραρτησις** ცხოვრების განვითარებული, უბრუნეული განცდა (შეგრძობება).

**ალკმბ** - **ხორცილე ხაუნის თვალბანაო (ხატოვანა)** ასახე ადამიანის ცნობიერებაში შევრძენების ორგანოებზე (რეუტეორგებზე) ამ საენის შემოქმედების პროცესში. ა. განსხვავდება შევრძენისაგან საენობრიობით. ა. განიცლება არა რიგორც სუბიექტში მიმდინარე განცდა, არამედ როგორც ჩვენს გარეთ, ჩვენგან დამოუკიდებლად არსებული რეალური საენის და მისი თვისებები. ა-ს ახასიათებს **ხტრუქტურული მოღიანობა**. ა. განიცლება არა როგორც შევრძენებითა და შევრძენებაში ასახული თვისებების ნაკრები, არამედ როგორც ერთიანი მოღიანი საენი. ა-ს ახასიათებს **კატეგორიალობა**. აღქმული საენი განიცლება გარკვეულ კატეგორიად (ადამიანები, ხეები, მანქანები და სხვ), რაც გარკვეულ ფორმებში ნიშნავს გაცეხას, მაგრამ ეს პროცესი არ წარმოადგენს ამროვნებით პროცესის ნაწილს, არამედ აღნიშნავს, რომ კატეგორიალობა ანუ ამრიანობა აღქმულ ხატთან ერთად მოღიანობაში, მისგან განმარტებლად თვით ა-ში მოყუბული მანამ, სანამ აღმინი რუელუქიის დაიწყებს. ა-ის ერთ-ერთი თვისებაა **კონტანტობა** ანუ ა-ის პრობების ისეთი ცვლილებების შიხედავად (განათება, მანძილი და სხვ), როზელც არსებითად ცვლის შევრძენებათა საფუძელებს, საენის თვისებათა ა. გარკვეულ ფორმებში უცუელი, კონტანტური რჩება. ა. შევრძენისაგან განსხვავებით აქტიური, პირიუნელი ბუნებისაა. იგი ადამიანის მოქმედების მიმართული აქტია. ჩვენ ეხედავთ მიგომ, რომ უუერებთ, გეესმის, იმიგომ, რომ ეესენით. ა-თვის მნიშვნელოვანია ადამიანის განცხობა, მისი მინაგანი მდგომარეობა, მისი გამოცდილება და ინტერესი. ა-ის სახალს მისი "სენსორული მითარის" შეადგენს, რაც იყვლება სუბიექტის წარსული გამოცდილების საფუძეულზე.

**აპარ-რანდინის პოტოპანა** - **Ashard-Randino Potomac (Ashard E. Ch., Ramon, 1905)**. მეეტრად გამოხატული წერტილი (პირველად პოლიდოხაა მეორეული პოლიდოხაა). გეხდება მითომბაა და ხტრით დააბელებული ბავშვებში. საჭიროა მისი დიფერენციობა უმეტრო დაბედისაგან.

**აპარ-ტინის სინდრომი** - **Ashard-Tieria Sindrom (Ashard E.Ch., Tiers J., 1921)**. ქალებში პარხუნტუზმის და შაქრთან დაბელებს ერთობლივს არსებობა. თინაობა ხეულზე მამაკაციურ გ-ით. ეარილიბაციის სხვა ნიშნები არ არის. სინსქენ. ამენორეა. ხხრად - არტერიული პიქტატენია. მიხები - პიჟოფის ბაზოფილური ადენომა, თირკმელზედა ჯირკეტის სისხინე.

**აშაშენბურბის სინდრომი** - **Ashaffenburg Sindrom (Ashaffenburg G.)** მუქავე გარდამავალი ფსიქიკური აშლილობა გაოცების აუტის ფორმით. **შოგერ აღნიშნება ქალებში მშობიარობის დროს ან მის შემდეგ.**

**აშაშენბურბის სიშატოპი** - **Ashaffenburg Schizophrenia (Ashaffenburg G., 1890)**. აღნიშნება ბიური ცხელებს დროს. ავადმყოფი «ლამარკობს» ქალიდან გამორტული ცელფონით. პითონენში, როგორც რახიარდის სიშატოპის დროს, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს აღკოპოლიზმით შეპტრობილ პირებში აწული შოატონებალობის უნარი და პალეონიკებისადმი მიდრეკილება.

**აული სხაულის სიშატოპი** - **расстройство зрения типа о. бл-пав-შიდებრბის მონეცყდა სხაულის სიშატოპი.**

**აშნერ-ღანინის რეფლექსი** - **Ashner-Dagnino reflex (Ashner, Dagnino, 1908)**. თვალ-გულის რეფლექსი. ვეებეტიკური სინჯი. ნორმაში თვალის კალეებზე თანაბარი შექოლბას (10 წმ განმავლობაში) შეირდება პულისის სიხშირე 4-8 დარტყმით 1 წთ-ში და არტერიული წნევა ქვეითდება 10 მმ ვწყ. სე-ით. ვეცუსის გონუსის სიჭარბისას პულისი შეირდება 10 და მეტი დარტყმით 1 წთ-ში, ხოლო სიშატოპური გონუსის სიჭარბისას - აღინიშნება პულისის აჩქარება.

**ატლინოვი მიტქმელება** - **митохондрие (ნიბიობა)**. **ხტრული დარდებებს ხიშტობა**. ელინდება დასულ შეკითხვაზე არაარსებითი პასუხით, თუცა, დასული კითხვის გატება ავადმყოფისათვის მისაწელობაა. ამავე დროს ავადმყოფის პასუხი ყოველთვის არის შეკითხვის ამროხზე სიბრტეში. შეღს განწერის სინდრომის, ფეცელმენების ცტრუქტურაში.

**ახის მეთოლია** - **Ach Method (Ach K., 1921)**. ექსპანტენტულ-ფსიქოლოგიური მეთოლია ახსტრუქტული ამროვნების უნარს გამოსაკელებად ხელეწერი ცნებების ფორმირების გითა. გამოვლენება გეომეტრიული ფიგურების ნაკრები, რომელთა კლასიფიკაცია შესაძლებელია სხვადასხვა ნიშნების მიხედვით. ერთ-ერთი ნიშანი მკლეცკარის მიერ მიიღება როგორც კლასიფიკაციური პრინციპის საფუძეული, რომელიც უნდა მოქმედონს გამოსაკელებად პირმა. ცნობილია მეთოლიის ხიხაროგის (Сахаров А.С.) და გეოტესკის (Вансучин Н.С., 1930), პაუფმანის, კახანანის (Hauflmann E., Kusanin G., 1930) და რუშეგანის (Русский Е.А., 1953) ვარიანტები.

**აპასუშარის სინდრომი** - **Agaphria Sindrom (Wingate F., 1951)**. გეხდება ალკოჟოლის, ნარკოტიკული და სხვა ფსიქოატკური ნივთიერებების მოხმარებულ ფსიქოპათიურ პირივნებებში. ავადმყოფები მიმართავენ რა სხვადასხვა პირებს ან სამედიცინო დაწესებულებებს, თხმანენ ხატოვან ისტორიებს საკუთარი გავირებისა და ავადმყოფობის შესახებ, რათა მიუყუთ საშუალება, მოაპოვონ სასურველი ნივთიერება. ნარკოპანის დროს შოგერ მიმართავენ სხეულის თვითღამიანებასაც სამედიცინო დახმარებისთან ერთად ნარკოტიკული საშუალებების მოპოვების მომინით. აპასუშარი - მითოლოგიური პერსონაჟი, მულბივი მიგბეური, მხარადიული ურთა.

**აპინომენოზი** - **апиненоза (ბერან. ხურიას - პილი, ეიონს - შეენობა)**. **პილბ ატქმბ დარდგვა**. ავადმყოფები უჩივიან უძილობას, თუცა, რეალურად აღნიშნებათ ძილს პერიოდები.



- ბაბინკოვას სინდრომი მარჯვენა კენკისფარისი** - ნიხნიკოვი თარაძე ხარაძის პოლყარია (ნიხნიკოვი С.В., 1967). ფსიქიკური დარღვევები, ძირითადად აღნიშნება თავის გეინის მარჯვენა კენკისფარისი ქერტის დამიანების დროს: კორსაკოვისმაგვარი ანვქიური სინდრომი, ანოზოგნოზია, «ფსევდომორია» (ვიფორია, ბავშვური საქციელი, განმარტება), სივრცეში დამორიენგრობა, დროის აღქმის დარღვევა, ფსიქომოტორული აგზნება, ცნობიერების აშლა (მათ შორის ცნობიერების ძილისმაგვარი მდგომარეობანი, დელირიუმი, ონიროიდი, აშენცია).
- ბაბინსკი - ვაკუზის ღბამაღება** - ნიხნიკოვი - Бакин Ваква (Babinski J., Vaques L.H., 1901). ზურგის ტვინის სხობის აბორტული ვიკამტა დამასასიათებელია ვიწრო გუტები, რომლებუც არ რეაგირებს სინათლეზე პორტივი აორგის ანვერიმბის განვითარებისაღმი მიღრკილებით, შუბლის რეველესების შესუსტება ან გაქრობა, ქრონიკული შინგიკოვქედალიგის სიმკგომავიკა.
- ბაბინსკის ნაშნავის სიმპტომები** - ნიხნიკოვი Бабинский синдром (Babinski J., 1899). აღადლოქიენები, ასინვრეკია, ცრებულური კავალესია.
- ბაბინსკის პათოლოგიური ნიშანი** - ნიხნიკოვი Патологический знак (Babinski J.) პათოლოგიური ექსტენზორული ნიშანი მიუთითებს პირამიდული გზების დამიანებას. გერვის უპისიგულისშირივი შელაპირის შგროხული გალიზიანება იწვევს I თითის (ყრის) ექსტენსიას. შოგ შემთბევეკი I თითის ექსტენსიას თან ახლავს დანარჩენი თითების მარაოსტერი გაშლა.
- ბაბინსკის პიტიატომები** - ნიხნიკოვი Патетизм (Babinski J., 1909). აბ. პიტმატომები.
- ბაბინსკის სიმპტომი** - ნიხნიკოვი Синдром (Babinski J., 1914). ტუქშარიტი პანანოზოგნოზია. აღნიშნება კემიკლევის დროს, როცა ავადმყოფმა არ იყის თავისი დაავადების შესახებ. ამ დროს დემონიის ან ცნობიერების აშლის ნიშნები არ არის. შოგერთმა ავადმყოფმა იყის, რომ მას აქვს კიდურების დამილა, მაგრამ ამას მნიშვნელობას არ აძლევს (ნიხნიკოვი).
- ბაბინსკი - შიპალინის დავაღება** - ნიხნიკოვი - Шипалин Ваква (Babinski J., 1900; Frölich A., 1901). აბ. დამარტობა კავარსინგბაკტომი.
- ბაბინსკი - შიპალინის სინდრომი** - ნიხნიკოვი-Шипалин синдром (Babinski J., Froment A., 1918). უნიშენლო ტრავმის შედეგად ილმოუებული ფუნქციური მარტება და კენტოიანი კონგრატურები რეველესურ ნევროლოგიურ დარღვევებთან ერთად (კუხილეგია, პოსტგრაიეული შეშუბება, პოსტგრაიეული ოსტეოპოროზი).
- ბაშინსკი და შიპარდის პიტიატომი** - ბაშინსკი და შიპარდის პიტიატომი - асимметричные патетизмы у детей и подростков წარმოადგენს ნორმალან ვადანტის და გამოვლანდება განშორების შვოთიითი, ფობიურ-შვოთიითი, სყოიალურ-შვოთიითი აშლილობების, სხბლირეთა კონკურენციის (აღალი დის ან ძმის ვაჩენის გამო კონკურენცია) სახით.
- ბაშინსკი და შიპარდის პიტიატომი** - ბაშინსკი და შიპარდის პიტიატომი - асимметричные патетизмы детей и подростков. შეგვევლების თავისებური ფორმა, დარღვეულია განვითარების დრეული ხვეუბრიანევე. არ არის გამოწვეული სამეცეველი აპარატის პათოლოგიით ან გონებრივი ჩამორჩენილობით. გამობიანება კითხვის და შართლქერის დარღვევებით, პართენებათშორისა ურთიერთობების ნაკლებანებით, ემოციური და ტუვეითი აშლილობით. გუხლება: ფორთავიგურა, არტკეულატურის (ენაშლენგობა), ექსტრუხული (დისფიზია, ავამბია), რეკტოტლურის (კოგნაცური სემენიიი აქქმის დარღვევა: რეექტორული დისფიზია და ავამბია, ვერნიკეს ავამბია, სივრქე სეკუტობი: შიპარი) აშლილობების და ღანგაუკლევენტის ხანდრომბ, ევილესით გამოწვეული შვენიილი ავამბის სახით.
- ბაშინსკი და შიპარდის სიმპტომი** - ბაშინსკი და შიპარდის სიმპტომი - асимметричные патетизмы детей и подростков აღნიშნულ შემთბევეებში დრეული პერიოდლანქე დარღვეულია სპიკოლი ნევეების გამოშვმავეების უწარი, რაყ არ არის გამოწვეული არც სწავლის განვლენებით, არც გონებრივი ჩამორჩენილობით და არც რაიბე დაავადებით. გუხლება: «კითხვაში ჩამორჩენილობა», «შენვლებული კლხეგის, შართლქერის. ართმეცეველი თვლას დარღვევების, გერტბამანს განვითარებას ხანდრომბს სახით.

**ბავშვთა და მოზარდთა ქცევითი ავლადობები** - расстройста поведения детей и подростков. ახასიათებს ხანგრძლივი განმეორებადი, ასოციალური, აგრესიული, გამომწვევი ქცევები. ასეთი ქცევა თვის უკიდურეს ხასიათს აღწევს ასაკის შესაბამისი სოციალური (ზორადურ-ეთიკური) ნორმების გამოხატული დარღვევების ფონზე და სცილდება ბავშვური მავნეობის და შეამბობილობის ფარგლებს. ხანგრძლივობამ შეიძლება მიადწიოს 8 თვის და მეტს. გამოვლინება ხდება შემდეგი სახით: ვადაპირბუბული მოზიხურობა, ხელიგნობა, ადამიანების და ცხოველთა მიმართ სისასტიკე, საკუთრების განადგურება, ცეცხლის აჩქლება, ქურდობა, მატყუარობა, სიზარბავე სკოლაში, ვიქტევა სკოლიდან, ხშირად - ერთის აფექტი. ქცევითი ავლილობა შეიძლება შემოიფარგლოს ოჯახური წრით და გამოვლინდეს არასოციალიზებული ან სოციალიზებული ქცევითი ავლილობებით (ჩვეუური ქურდობა, მეურაცხოვოს მიყენება ჩვეუურად, ჩვეუური გაყვლები სკოლაში).

**ბავშვთა და მოზარდთა ქცევითი ავლილობები** - аномальные расстройства поведения и эмоции у детей и подростков. ხასიათდება ხანგრძლივი აგრესიულით. ასოციალური და დაუმორჩილებელი ქცევების კომბინაციით დეპრესიის გამოკვეთილ სიმამომებთან, შოთეთასა და სხვა აფექტურ ავლილობებთან ერთად.

**ბავშვობაში** - базисная (ბერძნ. basis - სიარული, ნახიჯი, spatio - კრუნხვა). აბაზისის სისასტიკური ფორმა. აღინიშნება ისტერიის დროს.

**ბავშვობაში ეპიფორიზმი** - ნაძირიყვთი ეპიფორიზმი. იხ. **მისეპი-ეპიფორიზმი** და **კავადება**.

**ბატიანეზოზიზი** - баптиозоз (ბერძნ. baptyo - ღრმა, anthesis - გრძობა, მეგრენება). პროპრიოცეპტორი, ღრმა მეტრობულობის პოზია. წარმოადგენს შერვის გინის ხმობის მუღვი ნიშანს. აღინიშნება აგრეთვე ისტერიის დროს.

**ბატიარჯის სიმამომები** - Бейерже оштом (Ballarger J., 1887). არათანხარი შობის გუგები პროგრესული დამბლის დროს. **ბატიარჯის სიმამომები** **პალესტინეზიზმი** - Бейерже psychosis galatheaia (Ballarger J., 1844). იხ. **პალესტინეზიზმი** **სიმამომები**.

**ბატიარჯის მონესაბულობი** - Бейера конфабулы (Bayer W., 1943). იხ. **მონესაბულობი**.

**ბატიარჯის მონესაბულობი ბოღმა** - Бейера конфориди бред (Bayer W., 1932). იხ. **ბოღმა** **მონესაბულობი**.

**ბალარ-დეგენ-პის სინდრომი** - Балар-Деген-Пис синдром (Balard, Degen, Pole., 1943). გენეტოენცეფალიტის შემდგომი ენცეფლოპათია, ხასიათდება მესხიგების დამწიფებით, არასაკმარისი აქტივობით, თავის ტკივილით, თავბრუსხვევით, ტკივილით ხერხემლის სვეში, დალილობის მეგრებებით.

**ბალინიკის ბუბის სიმამომები** - Балникого аномалие оштом (Балникои И. М., 1859). პროგრესული დამბლობის დახასიათებული ნიშნები - არათანხარი გუგები და სხვათაგან მათი რეაქციის მოსაბა. ბალნიკი მუთითებდა ამ სიმამომების მნიშვნელობაზე დააქალის აგრეთვე დიაგნოსტიკების დროს.

**ბალინიკის ბრისტალესტატიზმი** - Балникого кристаллиа бред (Балникои И. М., 1858). იხ. **ბოღმა** **ბრისტალესტატიზმი**.

**ბალინტის დობა** - Баллиа аста (Ballist R.). დობა დედაბის სუფრის ზარლის რაოდენობის შემდღიით. მოტლებული ფო ეპიფორიის სამკურნალოდ. ამამად დამოკლებლად არ ინიშნება, ზარლის შემცირება წარმოადგენს დიგის შემდღებულ ნაწილს ეპიფორიის მეურნალობის დროს.

**ბალინტის სინდრომი** - Баллиа оштом (Ballist R., 1909). "ცეპრის ფეჟიკური დამბლობ" სიმამომთა კომპლესი. ავადმყოფს მუღლია მის თვალჩინ არსებულ ერთ-ერთ საგანზე ცეპრის ფეჟისა, მაგრამ კერ ხელდას დაწარჩინს, არ შეუძლია საგნებს შორის მინიბის განსაზღვრა. ამის გამო გამოვლენულია გრძელი სიგეების წაკითხვა, თვალის გადახლება და მთელი სურათის აღწერა ცალკეული საგნად დასახლების დროს (სამედიკალინური ანობა). ზ.ბ-ის საუღველი თვალების მოძრაობაზე კონტროლის დარღვევა, ცეპრის ფეჟისკის წერტილის შეცვლის განმდებ. აღინიშნება დიდი გინის თხების წილის მოძრაივი დამიანების დროს, ხშირად სისხლძარღვოვანი და აგროფივი გინისა. **იხ. ნიშნები: პტატიზმი** **ოტოტიკიზმი**, **მინის რაბბა** **სიმამომები**.

**ბალინტის ჯგუზობი** - Баллиа оштом (Ballist M.). მოგალი პროფლის ექიმთა ჩვეუები, რომლებიც შესწავლიან ფსიქოთერაპიის გამოცდები **ფეჟიკანალიტაკოსების** ხელმძღვანელობით. სახელწოდება დაკავშირებულია ამ ზეგნების რეველარული შექმნის ინიციატორის უნგრელი ფსიქოანალიტიკოსის ბალინტის სახელთან, რომელიც გადასახლდა ინგლისში 1940 წ. და 1949 წ. ღონდონში გაეისტოკოლოდუში მოწედა პირველი სემინარი თემაზე **ფეჟიკური პრობლებები ექიმის პრაქტიკაში**.

**ბალის რაბბაობა** - Балო ბილი (Balo J., 1927). თვის გინის ორგანული დაავლება, რომლის სიმამომაცკა ზოღება დაავლების მსგავსი. დამახასიათებელია ქალსმთა წვევის მომცება შევლელობის ნერვის დეროგების შემუგებით. სიყოსღეში, ჩვეულებრივ, არ დიანოსტიკრდება. პათოლოგანდროზობად - თვის გინის ქემისფრების თეთრ ნიჟოთერბაში აღინიშნება მრგვალი ცლიმურ-ფიბროზული ეკრები. განიხლება როგორც გაუანტული სკლეროზის ფორმა. სინონ.: **მადემატოტიკიზმი** **მსმამალობა**, **პარამტიზმი** **მონესაბულობი**, **პარამტიზმი** **მონესაბულობი**.

**ბამბარბერის სინდრომი** - Бамбарера оштом (Bamberger H., 1859). ისტრიალს ინიცია ფორმა. დამახასიათებელია ქვედა კიდურთა კუნთების კლინური შეკუმშვები, მუგობა, ცეცხლმავალი მოძრაობა, რომელიც ეთარდება უნების შეხებისას მიწანე. სინონ.: **სალესტროზი** **სპაზმი** (ლათ. anstatis - ცეცხლ).

**ბარბანტოზი** - Барбантози (ბერძნ. baros - სიმძიმე). აუნოზის ფორმა, რომლის დროსაც შეცვლილია საგნის სიმძიმის აღქმა. წარმოადგენს ბარესთემიის დარღვევის გამოვლენებას (პროპრიოცეპტორი მეგრებულობის სახ. აღინიშნება ნათხების დამიანების დროს).

**ბარბან-ფერნანდესის პოლორისფრინეზი** - Барбан-Фернандес полиморфизм (Barbano-Fernandez J. იხ. **პოლორისფრინეზი**).

**ბარბანოლ-მონესობის სინდრომი** - Барбанол-конфориди оштом. იხ. **პბტალ-აუფენის სინდრომი**.

**ბარბიტურატები** - барбитурати. სამკურნალო ნიჟოერებების ჯგუფი, წარმოებული ბარბიტურის მეთეას სედატიური, სიმღე, ნარკოზული და კრუნჩხაწინააღმდეგო მოქმედება. ცნ-ზე ახდენს შემამაქებულ გავლენა:



პირველად 1903 წ. მიღებული იქნა ბარბიგალი (ვერონალი), შესვლაში გახანგრძლივებული მოქმედების (12-24 სთ) ბარბიგალი - ფეხბარბიგალი და ხარბამილი, ამოხარბიგალი, ამიგალი (6-12 სთ მოქმედებით); ხანსიკლე მოქმედების - ნაგრიუშის ეგამინალი, პენგოხარბიგალი, ნემბუგალი. შავ ბაზანზე ძირითადად ეტყობა სამი სახის ზ. სეკობარბიგალი (ჯარვინული დასახლება - reds, red devils, scoggy, downers), ამაყალ ნაგრიუშის (yellow jackets, yellow, measles) და სეკობარბიგალის და ბარბამილის კომბინაცია (reds and blues, rainbows, double-trouble, tootsies. ის აგრეთვე თავი IV ). ზ. მოწვევა მარამელის დროს ვითარდება კომპაგოზური მდგომარეობა ტულსისხტარბიგალი და ხანსიკლე სისეკების ფუნქციის დაზარეულები, პიპოხარბიგალი; სიმე შემთხვევებში - პიპოხარბიგალი, სენსიტივის გამიშვარება, ვაჩერებლობა. პულის სისუსტე, უთანაობა, გუგების შევიწროება, სინაილზე რეაქციის მოსპობა; გერმინალურ სტადიაში გუგები შეიძლება ვაფაროთივს, კორნალური, ყლაქის და მუცს-მბალი რეულექციები არ გამოიყვევა. დიურეზი შეიკრებლობა. აღნიშნული მდგომარეობა რთულდება ბრონქოპნევმონით, ფლუგების შემუგებით, ღრმა ნაწოლავითა და გროვიული წყლებით. პოსკომპაგოზურ პერიოდში ელინდება ნევროლოგიური სიმპტომაცია: ფტოზი, არაშუარი სიარული და სხვ. ფსიქიკის შირიგ - ეპოციური დახილობა, დერესია. სომავრად შეიძლება ეპიეთარბიგალი თრომბო-ენობლიური ვართულეულები. სასიკელადი ღომა ინდივიდუალურაა, მიხილებით შეადგენს 10 საშუალოდ ღრმად.

**ბარბიტურატოზში - ნარკოტიკული ბარბიტურატებით სისებეაგური ან ქრონიკული ინსტოქსიკაცია.**  
**ბარბიტურატოზის აბსტინენცია - ნარკოტიკული აბსტინენცია ბარბიტურატების სისებეაგური მიღების რამდენიმე კვირის შემდეგ ვითარდება მინიგვა და აბსტინენციური სინდრომი, რომლის გამოვლინის სუქტში მტკავ ვარითა. აბსტინენციაში აღინიშნება: გულსრევა, ღებინება, სისუსტე და დისკომფორტის შეგრძობა, გაჭიკარობა, თულიანობა, მხოთვად და გამბინიანებლობა, ორთოსტატიკული პიპოგენზია, ხელების, უნდა და ქეთოთიგების გამოხატული ცენტროზი. შესაძლებელია ადგილი კოუნზიტი განვითარდეს და დელორული სინდრომი ბარბიტურატების სხვადასხვა დოზა-იწვევის სხვადასხვა სიმძიმის აბსტინენციური სინდრომი, მაგ. ამბოვალ-ნაგრიუშის ან სეკობარბიგალი - 400 მგ დღეში - იწვევს სუსტ აბსტინენციურ სინდრომს; 800 მგ დღეში - იწვევს ორთოსტატიკურ პიპოგენზიას, სისუსტეს, გრემოზს, პუთიანობა, 75%-ში კრუნზიტი განვითარდება; უფრო მაღალი დოზების მიღებისას ვითარდება ანორექსია, ცნობიერების დაზარალება, ამნეზიური სინდრომი, დელორული, პალეუსნიკური ფსიქოზები და დიდი ეპილექსიფორმული გულყრები. აღნიშნული ფსიქოზი უნიშნელად განსხვავდება ალკოჰოლური თეთრი სულებითაგან - მასში ადგილი აქვს გამოხატულ ავთიკაციას, ვარდა მუთველითობითი პალეუსნიკებისა, შეიძლება ფოსტატიკული და სმენითი პალეუსნიკაციები.**

**ბარბიტურატოზის ინტოქსიკაციური მდგომარეობა - ნარკოტიკული ინტოქსიკაცია მოგვიანდება ალკოჰოლურ სიმოთრადეს. აღინიშნება შეკავება, დისკომფორტული ანორექსია და მუხთიერების გაზრდა, მუტუელისა და გავების პაროქსიზმები, კრავის დეპრეტივობა, სეკსუალური აგრესიული იმპულსების განხორციელება, ყრადღების დაბამონის შევიწროება, ეპოციური დახილობა, პორენული ხანძის გამკაცრება. შეკავებითი მოუღებობა რეკურსივების განხილვის რამდენიმე საათში, ხოლო კრიტიკის, გრება-განწყობის და მოძრაობითი დარღვევები შეიძლება გაგრძელდეს 10-22 საათის განმავლობაში. თირის სურათში აღსანიშნავია ვირეულა, მრისხანება, მგრული დამოკლებლობა ზოგ შემთხვევაში - პარანოიული დეკივი და სუპილური გრუნტელები ნევროლოგიურად - სისგაგები, დელოზია, ავტოპური სიარული, რომლებიც პოპში არამდგრადობა, პიპოგენზია, ამბოვალ, მუღაბიური რეულექციების ეპიზოდებია. ნარკოზანითი დაავადებულობითი სასიკელადი ღომა ინდივიდუალურაა და მერეობის 3:1 5:1.**

**ბარბიტურატოზის ტოქსიკანტოზში - ნარკოტიკული ტოქსიკანტოზი აქვეითებს განსაკუთრებით ანგიკოაგულანტების და გრიკიკური ანგიკიკურანტების ეფექტურობას. ალკოჰოლიანტ გამობატულია ვტარეულია ტოლერანტობის ეფექტი.**  
**ბარბიტურატოზის შირიგში - ნარკოტიკული ფიგია 1) ვაზოვალური ანტიპოტიკული ადინიული ფორმით ხარბიგურაგებს; დეულებზე ძირითადად მოხარდება; მიღების მიზანდა მიადწონ ვიკორიას და ნეგარების მდგომარეობის, ე.წ. რუზაღლებ ვარტოზი (Xსხ) იმის მიხედვით, თუ როგორია პაროგენება ნარკოტიკული საშუალების მოიზარებული ან როგორი ვარტოზი (პოლიონი) აქვს და რა სიკავიაში დებულის მას, ვითარდება სეკსუალური ან ვიკორიული ეფექტი. 2) ქრონიკული ანტიპოტიკული გვხვდება სომატორანტოზის შემთხვევებში, როცა ბარბიტურატები მიიღება ხანგრძლივი დროის განმავლობაში როგორც უძილობის ან მუთთვის მომხსნელი პრეპარატი, ან როგორც ანგიკოვულანტი. ავადმყოფები ბარბიტურატებს დებულებს წლებს განმავლობაში, მიჩვევა ვითარდება თანდათანობით, შეუძლებელია, სანამ არ გამოიღებინება პრობლემები სასმასურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს ან ფიზიკური სიმპტომები, მაგ. ვარტეული დობაროტიკული (დელორული) მუტუელეობა. პირატრავტურ გამიშვარება მოიხარების ასეთი ფორმა ჩვევად გამოვიდეს ნარკოტიკებისათვის. მოსხარენე ძირითადი ბარბიტურატების, რადგან იგი მულარებითი აფესიანია და იწვევს სასიპოზონ, თილი, ძილდების მდგომარეობას. მათი შემოქმედებით ნარკოზანების ხელების აგრესიულობები, ურდებლად ნერვისა და განსაგრების სურველობა. ბარბიტურატების მოხარენე აგრეთვე პერიონის ან ალკოჰოლის მიწვევების გასაძლიერებლად ან ამუტუარებით გამოიყვევად ავთიკაციის ბოლოში და ავთიკაციის მდგომარეობის მოსახსნელად ბარბის სიმპტომში - ნარე თანათი (Barre J.A.). პროგრესული ჰუკასტუგობის შესაძლო ნიშანი: გუგების რეაქციული შესუსტება სინათლეზე.**

**ბარბის სიმპტომში - Barre თანათი (Barre M., 1939).** აქტიური მოძრაობის დროს ვით-ერთი მელა კიდური ვერად ვარეველი დროით უმოძრაოდ ჩერდება. მოგვერ ავადმყოფი ეძილობს მერე ხელთ აამომარბის კიდური. მოკვით შემთხვევებში თან სდევს კრუნზიტი გულყრა ცნობიერების აშლით. მიუთითებს უმოძრაო კიდურის საწარმადმდეც მხარეს დიდი გვირის მუბლის წილის დაზიანებაზე.

**ბარბის სინდრომი მდგომარეობებში - ნარე თანათი ბარბიტურატითი (ბერმ. dys-სორმიდის გადახრა, harmonia-თანაზომიერება) (Barre M.).** ხაბარულის დარღვევა, სეკსუალური და დისკომფორტული ავთიკა, სისგაგები. აღინიშნება პორგავული პოუგისი დოკალიზაციისას ნიშების შემსფეროვებით.

**ბარბის სინდრომი - ნარე თანათი სიგეების ვარტეული წარმოქმნა დამართობის დროს.**

**ბარბის სიმპტომში - ნარე თანათი (Barre H., 1947).** დეპოლეთოფორი მუთოვტიკა, მიმართულია ფორილური განსჯის და მისი ვარტული ვარტეული (თანდერული) სისგაგების დროს.

**ბარბის სიმპტომში - ნარე თანათი (Barre H., 1947).** დეპოლეთოფორი მუთოვტიკა, მიმართულია ფორილური განსჯის და მისი ვარტული ვარტეული (თანდერული) სისგაგების დროს.

**ბარბის სიმპტომში - ნარე თანათი (Barre H., 1947).** დეპოლეთოფორი მუთოვტიკა, მიმართულია ფორილური განსჯის და მისი ვარტული ვარტეული (თანდერული) სისგაგების დროს.

**ბარბის სიმპტომში - ნარე თანათი (Barre H., 1947).** დეპოლეთოფორი მუთოვტიკა, მიმართულია ფორილური განსჯის და მისი ვარტული ვარტეული (თანდერული) სისგაგების დროს.

**ბარბის სიმპტომში - ნარე თანათი (Barre H., 1947).** დეპოლეთოფორი მუთოვტიკა, მიმართულია ფორილური განსჯის და მისი ვარტული ვარტეული (თანდერული) სისგაგების დროს.

**ბარბის სიმპტომში - ნარე თანათი (Barre H., 1947).** დეპოლეთოფორი მუთოვტიკა, მიმართულია ფორილური განსჯის და მისი ვარტული ვარტეული (თანდერული) სისგაგების დროს.

















და პილოზი. ნათების თეორიული ნივთიერების და გვიხის უჯრების მიდამოში ამორფული და კრისტალური ქოლესტეროლის მსაღებება იქვეუს პეროდიგარულ ცერებელურ აგაქსას. ფსიქიკის მხრივ - გონებრივი განვითარების შეუფერება ახლებილობამდე.

**ბიოლოგიური-არბიტრუმი სინდრომი კვლევის და სინთეზის მიზნით განხორციელებული** - ნოგოლინოვა-არისტოვიძის თანამშრომლობითი ნაშრომი და ანკნოლინი (ნოგოლინოვა ნ.კ., არისტოვიძე პ.ა., 1967) მისი **სინდრომი კვლევის და სინთეზის მიზნით განხორციელებული**.

**ბიოლოგიური-ილუზორული-კალუმინაციური შებენიანობა** - ნოგოლინოვი ილიაოპოლი-გალიუხინი-ნოგოლინოვი (ნოგოლინოვი ნ.კ., 1963) პარალიზებულ კიდურის ავადმყოფები აღეჭრებენ როგორც ცხოველს, ისე სტრუმენს ან აპარატს. აღინიშნება თავის გვიხის ირგანულ კერძინი დაბინების დროს და შეიკუთვნება სხეულის სტრუქტურის ავადმყოფობას.

**ბიოლოგიური-ქორნიკარული-სპირიტუალური სინდრომი** - ნოგოლინოვა კოპოვი-პერედი-ნოგოლინოვი (ნოგოლინოვი ნ.კ., 1949). ამოკლებული-ფორმული სინდრომი მთავარდროშის ინფარქტის დროს აღინიშნება ცნობიერების დარღვევა, თავის გვიხის ქერქის და გვიხის დროს უწყვეტობის გარდაშალი მობლა. მოცუფრ ცერებრული სიმპტომატიკა ვამოლის წინა პლანზე და ნიღბებს მთავარდროშის ინფარქტის. თავის გვიხის განმყოფლებებს. თავის იმეტიური ცვლილებებს და მთავარდროშის ინფარქტი შესაძლოა განვითარდეს ერთდროულად მოცუფრ კი ცერებრული პათოლოგია წინ უსწრებს კორნიკარულს.

**ბიოლოგიური-სპირიტუალური შებენიანობა** - ნოგოლინოვა ნოგოლინოვი (ნოგოლინოვი ნ.კ., 1967). ნაგრიუბის ანტიოგოეკულური ციტოგოქსიკური შრავი. გამოიყენება ავტობიოლოგიის სპეკიანობად (სტრუქტურა ი.ბ., 1976).

**ბიოლოგიური-სინთეზური-ნოგოლინოვი (ნოგოლინოვი ნ.კ., 1947) მისი სინთეზის მიზნით განხორციელებული**.

**ბიოლოგიური-ნოგოლინოვი (ნოგოლინოვი ნ.კ., 1947) მისი სინთეზის მიზნით განხორციელებული**. ანტიოგოეკული პრეპარატი შეიკუთვნება ავადმყოფის ცნობიერებაში წარმოდგენების, მსურველობის და დასკნების უნარიანობას, რეალობას ასახავს დაბინიერებულად და არ ექვემდებარება კორექციას. სინთეზური (ნოგოლინოვი ნ.კ., 1948) მისეფით, ზ. ადამიანების და მოცუფრების შორის დამოკიდებულების და კავშირების რეალობისმოკლებული არაკორექტირებადი განწყობაა. ზ-ის ძირითადი ნიშნები: 1) ზ. დაავადების შედეგად, რითაც განსხვავდება ფსიქიკურად დაბინიერებული პირების შედეგებისგან; 2) ზ. ცოცხლების არასწორად ასახავს რეალობას, თუმცა ზოგ შემთხვევაში შეიძლება შესაბამისობის სიმართლებით; 3) ზოფითი იღებები ურყეფია, არ ექვემდებარება კორექციას; 4) ზოფითი იღებებისათვის დაშახსათიფილია მდარია საფუძეფი (პარალიზოტიკა, მძრულა ფიფიკა); 5) უმეტეს შემთხვევაში ზ. აღმოცენდება ნათელ ცნობიერებაში ფონზე (გამონადეღის ეგზოგენური პარანოიფი); 6) ზოფითი იღებები მჭიდრო კავშირშია პარონულ ცვლილებებთან, შეკეთრად ცვლის ავადმყოფისთვის მანადრ არსებულ დამოკიდებულების სისტემას საკუთარი თავისა და გარემოცოფითა მიმართ; 7) ზოფითი იღებები არ არის განმარტებული ინტელექტის დეფიციტით; ზ. განსაკუთრებით სისტემატიზირებული, ხშირად აღინიშნება მაღალი ინტელექტის დროს. ზ-ის სტრუქტურული განყოფილება: შახალა (მოცოფრება, აღქმა, სადუენიაცი), რომლის საფუძეფზე იცება ზ; ფახალა - განსაკუთრებული გაფორმება, პირველ რგამში, სისტემატიზირებულია, რომელიც თითქოსდა ვითარდება დროში - ავადმყოფის შეუძლია გარემოცოფი იგი განსაკუთრებული თანმიმდევრობით; ფორმები (სისტემატიზირებული-არასისტემატიზირებული, ფუნქციონირების მიხედვითიდან ახლის მდგომარეობა) იხ. ზ-ის შრეხება შებენიანობა (სპეხი ნ.კ., 1901) მისი სინთეზის მიზნით განხორციელებული - დამოკიდებულია - დამოკიდებულია, უქსანისიურა - დეპრესიული).

- ბ. პილოზი - ნ. ანტიოგოეკული ხანმოკლე რეცეპტული, შეიკუთვნება ცოცხლ ბოფით იღებს.
- ბ. პილოზი - ნ. ანტიოგოეკული. შეიკუთვნება იღებს, თითქოსდა ავადმყოფზე დაქსირებულია პოლოგიური ან რეციფური ხასიათის მისა. სინონ. ზ. შებენიანობა.
- ბ. პილოზი - ნ. ანტიოგოეკული (სტეხი ნ.კ., 1889). სისტემატიზირებული ბოფი, განსაკუთრებით პარაფრენიულის სანზე გამოირჩევა სოფიების თავისებურებით (ავადმყოფობა ანტიციფენ, რომ მიყოფიან რადეკ ანტიოგოეკული ძალების დაბინიერების ცენტრში; ავადმყოფის პოფიკა მტრული ძალების მიმართ რჩება პასიური.
- ბ. პილოზი - ნ. ანტიოგოეკული შეიკუთვნება სისტემატიზირებული, ყველა ცოცხლ არსების დადუქის, დედაინფის განადგურების, დადუქის, პლანტების შეფაქების და ა. შ. იღებებს. სინონ. ზ. ხანმოკლე რეცეპტული და ა. შ.).
- ბ. პილოზი - ნ. ანტიოგოეკული (კამეხინი ნ.კ., 1938) ბოფი წარმოქმნა, რომლის ფორმირებაში მონაწილეობს ცერებრული, მავირი წარმოდგენების და რეციფური რჩება (ჯადოქრობის ბოფი, უქსანისიურა გამარჯვება და ა. შ.).
- ბ. პილოზი - ნ. ანტიოგოეკული შეიკუთვნება ბოფი, აღმოცენდება აუციტის პათოლოგიურ შედეგისთან დაკავშირებით - ბ. პოლოზიური და კატათიური.
- ბ. პილოზი - ნ. ანტიოგოეკული იხ. ზ. შებენიანობა.
- ბ. პილოზი - ნ. ანტიოგოეკული აუციტური, ხშირად დეფრებულია ზ-ის ვარიანტი, ხასიათდება ავადმყოფის შეკუფებით, თითქოს მის უსაფუძლოდ შეაფრენ დასაძრახ საჭეფელს, ბრად სლებენ ბოროგოქსეფებში. ხშირად ერთის დამოკიდებულების ზ.
- ბ. პილოზი - ნ. ანტიოგოეკული შეიკუთვნება უღელსი მნიშვნელობის გამოგონებების, სანეციფური აღმოცენების იღებს, რომლებიც მტრულად ცვლის კავშირობის ცხოველების წესს. ხშირად ეს არის პარანოთალური ან პარაფრენიული ბოფი, რომელიც ფიფიკურად მდებეი მრავის გამოცოფებით, უნევერსალური კანონების შექმნა (ანსოთა კანონი, არსებთა კანონი და ა. შ.). სინონ. ზ. პილოზი.
- ბ. პილოზი - ნ. ანტიოგოეკული ხასიათდება ავადმყოფის მიერ საკუთარი თავის, მისი იმეტიური და ფსიქიკური შესაძლებლობების, საბოგადობაში მისი მდგომარეობის გრანდოზული გლახუქების. სინონ. ზ. პილოზი-მნიშვნელოვანი. ზ. შებენიანობა. პილოზი-მნიშვნელოვანი (აღექსანდრე შეკიფონილისაგან).
- ბ. პილოზი - ნ. ანტიოგოეკული მნიშვნელოვანი - ნ. ანტიოგოეკული ახლია დამოკიდებულების ბოფისთან კამეხინი (კამეხინი ნ.კ., 1957) განისხვავდება როგორც დამოკიდებულების ზ-ის ვარიანტად ფორმის, რომელიც შეესაბამება დაავადების სიღრმეს. ავადმყოფები განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ გარემოცოფითა სისტემატიზირება და ექვემდებარება თითქოს გარემოცოფითა დამოკიდებულება ავადმყოფისაღში გამოსტეფია შენიღბული, სიმბოლური ფორმით.



და პილში). ნათხების თვითი ნივთიერების და გვირის ფეხების მიღამში ამორფული და კრისტალური ქოლესტერინის ჩაღებება იწყებს პერფორირებულ ცერებრულ ატაქსიას. ფსიქიკის მხრივ - გონებრივი განვითარების შეუჩერება იმპერალბამდე.

**ბიოლოგიური მედიცინის სინდრომი ალკოჰოლის და სინდრომული განვითარების** - Боголюбов-Аристовой с участием Иосифовича Востригина и сестрицами (Боголюбов Н.К., Аристова Р.А., 1967) იხ. **სინდრომული კარის და სინდრომული განვითარების**.

**ბიოლოგიური მედიცინის სინდრომი ალკოჰოლის და სინდრომული განვითარების** - Боголюбов и Иосифовича-Галюшиных с участием Иосифовича (Боголюбов Н.К., 1963). პარალელურად კიდურს ავადმყოფობა აღიქვამენ როგორც ცხოველს, ინსტრუმენტს ან აპარატს.

აღინიშნება თავის გვირის ორგანული კეროვანი დაზიანების დროს და მიეკუთვნება სხეულის სქემის აშლილობას. **ბიოლოგიური მედიცინის სინდრომი ალკოჰოლის და სინდრომული განვითარების** - Боголюбов и Иосифовича-Галюшиных с участием Иосифовича (Н.К., 1949). ამომღებელი ფორმული **სინდრომი** მიოკარდიუმის ინფარქტის დროს აღინიშნება ცნობიერების დარღვევა, თავის გვირის ქვრება და გვირის დროს ფუნქციონის გარდასაქმალი მომლა. მოგვიერ ცერებრული სიმპტომატოგია გამოდის წინა პლანზე და ნიღბავს მიოკარდიუმის ინფარქტის გამოვლინებებს. თავის გვირის იმპერალბამდე და მიოკარდიუმის ინფარქტი შესაძლოა განვითარდეს ერთდროულად, მოგვიერ კი ცერებრული პათოლოგია წინ უსწრებს კორონარულს.

**ბიოლოგიური მედიცინის სინდრომი** - Боголюбов с участием (Боголюбов А.А.). ნაგროვის ანტირეაქციული ციტიკოსიკური შრავი. გამოიყენება **დაკომპლექსის ხამკრანალიდ** (Срелотук И.В., 1976).

**ბოდამერის სინდრომი** - Боданер с участием (Bodamer J., 1947). იხ. **სინდრომი სისხლში**.

**ბორელი - ვედი** (лат. delium ვედი ვედი). ამროვებითი პრივესის თვისებრივი შედეგა. ავადმყოფის ცნობიერებაში წარმოდგენების, მსკელობისა და დსკენების ერთობლიობა, რეალობის ახსნავს დამახინჯებულად და არ ექვემდებარება კორექციას. **სევენჯეტის** (Севенжетти А.В., 1933) მიხედვით, ბ. აღიანიშნება და მოვლენებს შორის დამოკიდებულების და კავშირების რეალობისმოკლებული არაკორექტირებადი განწყობაა. ბის ძირითადი ნიშნები: 1) ბ. დაავადების შედეგად, რითაც განიხილება ფსიქიკური უნაძრთელი პირების შევლენისთვის; 2) ბ. ყოველთვის არასწორად ახსნავს რეალობას, თუმცა ზოგ შემთხვევაში შეიძლება შეესაბამებოდეს სინატირება; 3) ბოლოთი იღვები ურყუვა, არ ექვემდებარება კორექციას; 4) ბოლოთი იღვებისათვის დამახასიათებელია მყარის საფუძველი (პარალელია, იმრულია, ლოგატი); 5) უნებებს შეთხვევაში ბ. აღიხილება ნათელი ცნობიერების ცნობზე (გამონაკლისია ეგზოგენური პარანოიდეობა); 6) ბოლოთი იღვები შედარდ კავშირშია პირიველ ცნობიერებაში, შეეუთრად ცვლის ავადმყოფისთვის მანამდე არსებული დამოკიდებულების სისკვების საკუთარი თავისა და გარემომყოფთა შიშით; 7) ბოლოთი იღვები არ არის განპაროზებულნი ინტელექტის დაქვეითებით; ბ. განსაკუთრებით სისკვამიგებელია, ხშირად აღინიშნება მაღალი ინტელექტის დროს, ბის სტრუქტურული გამოყოფილია: შიშავა (მოგონება, აღქმა, პალეოსინაია), რომლის საფუძველზე იღვება ბ; ფიხულა - განსაკუთრებული გაფორმება, პირველ რიგში, სისკვამიგებელია; რომელიც თათქობლად უთარდება დროში - ავადმყოფს შეუძლია გადმოცეცის ფი განსაზღვრული ანამნეზიკურიებით; ფორმება (თიქვება) იმპერალბამდე-არასისკვამიგებელი, ფანგსტიკურა-სინამდვილესთან ახლოს მდგომი) იხ. **ბ-მ სინდრომი სისხლში** (Specht G., 1901) **სინდრომი**; **შეიშავება** (განდილება - დამცირება, ექსპანსიური - დეპრესიული).

ბ. **სინდრომი** - ნ. იმრითხამი. ხანმოკლე რევესირებული, შეუყავს ცალკეულ ბოვით იღვებს.

ბ. **სინდრომი** - ნ. მსრუხითხამი. შეუყავს იღვებს, თითქოსდა ავადმყოფზე დაქისვულია პოლიტიკური ან რელიგიური ხასიათის შისა. სინონ: ბ. **სინდრომი**.

ბ. **სინდრომი** - ნ. მსრუხითხამი (Seglas J., 1889). **სინდრომი** ბოვით, ცანსაკუთრებით პარანოიდეობის სახე, გამოირჩევა სინდრომის თავისებურებით (ავადმყოფები ამტკიცებენ, რომ იმყოფებიან რაღაც ანგარიშსტრი ძალების დაპირისპირების ცენტრში); ავადმყოფის პირობის მტრული ძალების შიშით რჩება პასიური.

ბ. **სინდრომი** - ნ. მსრუხითხამი. შეუყავს ბოვით სიამყაროს შისახლეობის, ყველა ცოცხალი არსების დაღუპვის, დედაშიქის განადგურების, დაღუპვის, პანეფტების შეტაკების და ა. შ. იღვები. სინონ: ბ. **სინდრომი** **დაღუპვის**, ბ. **სინდრომი** (ესკაოლოგია - სწავლება აღიანიშნება და სიამყაროს სიბოლოო ბედზე).

ბ. **სინდრომი** - ნ. მსრუხითხამი (Камнева Е.Н., Кушанов А.И., 1938) ბოვით წარმოქმნა, რომლის ფორმირებაში პირაქილების ცერებრული, მაგიური წარმოგენების და რედევიური რქმენა (ჯადოქრობის ბოვია, უწინდერებზე გამარჯვება და ა. შ).

ბ. **სინდრომი** - ნ. მსრუხითხამი. შეიყავს ბოვით, აღმოიენდება აუცილის პათოლოგიურ შექცვლასთან დაკავშირებით

ბ. **სინდრომი** და კატათმორია.

ბ. **სინდრომი** - ნ. მსრუხითხამი. იხ. **სინდრომი**.

ბ. **სინდრომი** - ნ. მსრუხითხამი. შეიყავს ბოვით, ხშირად დემრებულია ბის ვარიანტი, ხასიათდება ავადმყოფის მტკიცებით, თითქოს მას უსაფუძვლოდ მიეწერენ დასაძრახ საცეცელს, ბრალს სდებენ ბოროტმოქმედებაში. ხშირად რეუვის დამოკიდებულების ბ.

ბ. **სინდრომი** - ნ. მსრუხითხამი. შეიყავს ბოვით, ხშირად დემრებულია ბის ვარიანტი, ხასიათდება ავადმყოფის მტკიცებით, თითქოს მას უსაფუძვლოდ მიეწერენ დასაძრახ საცეცელს, ბრალს სდებენ ბოროტმოქმედებაში. ხშირად რეუვის დამოკიდებულების ბ.

ბ. **სინდრომი** - ნ. მსრუხითხამი. შეიყავს ბოვით, ხშირად დემრებულია ბის ვარიანტი, ხასიათდება ავადმყოფის მტკიცებით, თითქოს მას უსაფუძვლოდ მიეწერენ დასაძრახ საცეცელს, ბრალს სდებენ ბოროტმოქმედებაში. ხშირად რეუვის დამოკიდებულების ბ.

ბ. **სინდრომი** - ნ. მსრუხითხამი. შეიყავს ბოვით, ხშირად დემრებულია ბის ვარიანტი, ხასიათდება ავადმყოფის მტკიცებით, თითქოს მას უსაფუძვლოდ მიეწერენ დასაძრახ საცეცელს, ბრალს სდებენ ბოროტმოქმედებაში. ხშირად რეუვის დამოკიდებულების ბ.

ბ. **სინდრომი** - ნ. მსრუხითხამი. შეიყავს ბოვით, ხშირად დემრებულია ბის ვარიანტი, ხასიათდება ავადმყოფის მტკიცებით, თითქოს მას უსაფუძვლოდ მიეწერენ დასაძრახ საცეცელს, ბრალს სდებენ ბოროტმოქმედებაში. ხშირად რეუვის დამოკიდებულების ბ.



- ბ. **შაქათოლოგიები** - ნ. **ШАХАТОЛОГИИ** (ბერძნ. eschaton - მღერაი, დასასრული). იხ. ბ. **პარაპლექსიზმი**.
- ბ. **შეშინებულობა** - ნ. **შეშინება** ხასიათდება ცალკეობის დღეებში, ყოველთვის კავშირში ავადმყოფისადმი მორალურ-მედიკალურ მართლად. ხშირად სისტემიზაციას უკავშირდება. აღნიშნული პარანორმული განვიწყობის ჩარჩოში აღმოცენდება დროის მიმოვლენის დროს ე.ბ. ავარებს როგორც პარანორმული, ასევე პარანორმულ ხასიათს, აღმოცენდება უმთავრესად, არ შეესაბამება პარანორმული პრეპრობილული თავისებურებებს. ვ. ბ-ის აღმოცენებას და გამოვლენების თავისებურებებს იმპროვიზების უარგებლობის მიუთითებს ვ. **ზურმუხტაშვილი** (1967), სინონ: ბ. **დაზოიანობა**, ბ. **დაღიანება**.
- ბ. **შემოქმედება** - ნ. **შემოქმედება** ხასიათდება ავადმყოფის მკვლელობით, თითქოს მისი მოქმედება დამოკიდებულია ვარაუდობაზე, მისი სხეული და მასში მიმდინარე პროცესები წარმოადგენს უცხო აღმინების მიერ ფიქციური და (ან) ფიქციური შემოქმედების ობიექტს. არჩვენებს **ფიქციური** (პიანობის გაუგებარა, გულუბნობრივი) და **ფიქციური შემოქმედება** (კონსოლიდირებული, ლაბორატორია და ა.შ.) **ზოდგახ. ხშირად ზ. ბ-**ის ეს სახეები აღნიშნება ერთდროულად წარმოდგენს კანდიდატ-კლერკატის სინდრომის გამოვლენებს. ავადმყოფის ფიქციური და ფიზიოლოგიური უწყობილობა თითქოს თავს მოხვედრის, ავარებს ნაძალადე ხასიათს (**Кандидатизм**, **Б.К., 1980**).
- ბ. **შენიშნულობა** - ნ. **შენიშნულობა** (**Binbaum K., 1915, 1928**). ვითარდება მღერაზე მოვლენის იდეებისაგან ბოლით ხასიათის მღერაზე წარმოდგენების სტადიის გაყვლით. შემდგომში შეიძლება შევიყვანოს პარანორმული ბ-ით (**Сучеван А.Б., 1972**).
- ბ. **შინაშინიანობა** - ნ. **შინაშინიანობა** იხ. ბ. **მედიკალიზაცია**.
- ბ. **შინაშინიანობა** - ნ. **შინაშინიანობა** დებურებული ბ-ის ერთ-ერთი ტიპური ვარიანტი. ხასიათდება იდეებით, რომ ავადმყოფი საკუთარ თავს მიაწერს წარსულში ან აწმყობით თითქოსდა ჩადენილ დანაშაულებრივ საქციელს, რომელიც ვარაუდობს მათთვის მათთვის მომავალი და მომავლის განხილვას. ხშირად წარმოადგენს სუიციდური ქცევის მოტივს. არაშინაშინიანობა ავადმყოფი მოთხოვნის დასჯას ამ საქციელის გამო. დეპრესია გამოვლენიანობის თვითმზარდობის იდეები.
- ბ. **შინაშინიანობა** - ნ. **შინაშინიანობა** ავადმყოფის განხილვას საკუთარი ფიქციური, ფიქციური და მორალური არარაობის შესახებ. ავადმყოფი უარყოფით პარანორმულ ნაწილს არა მარტო ვარაუდობს, არამედ საკუთარ თავშიც. დებურებული ბ-ის ვარიანტი.
- ბ. **ინტელექტუალიზმი** - ნ. **ინტელექტუალიზმი** ვითარდება ინტელექტუალურ **ზუგადგებაში**, რომელიც აქვს რომელიმე სახის ხილვით იდეა. უმეტესად ინტელექტუალის სახით გამოდის ავადმყოფისთვის ავტორიტეტული ახლო ნათესავი ან მეგობარი ბ. ხშირად არამყარია და ინტელექტუალის მიხედვით ხილვით იდეები განიცდის რელიგიურებას. ახლოს დგას კონფორმულ ბოლდობას. საკარტული პირველად აღწერა **შ. გამყრელიძე** (1954).
- ბ. **ინტელექტუალიზმი** - ნ. **ინტელექტუალიზმი** იხ. **პარაპლექსიზმი**.
- ბ. **ინტელექტუალიზმი** - ნ. **ინტელექტუალიზმი** ხასიათდება ავადმყოფის განხილვით, რომ მის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენები წარმოადგენს საკუთარ თავს შექმნილ ინსერციებს, რომელიც აქვს განსაკუთრებული მიზნები ავადმყოფთან მიმართებაში; მოგვიანებს არის რაღაც მასობრივი ექსპერიმენტი, რომლის საყვარელი ობიექტია ავადმყოფი.
- ბ. **ინტელექტუალიზმი** - ნ. **ინტელექტუალიზმი** (ლათ. intel-ზონის, ბერძნ. ინტელექტუალიზმი - ცვლილება, გარდაქმნა) (**Courbon P., Tusques J., 1932, Darwazian G., 1937**). ცრუ **ამოცნობის** ერთ-ერთი ვარიანტი. ავადმყოფები ამტკიცებენ, რომ მათ შეუძლიათ სხვა პირთა (არა ერთი პირის, როგორც ურეგულარის სიმპტომის დროს) ფიქციური, მორალური და სულიერი სახის მიღება. სინონ: ბ. **შინაშინიანობა**.
- ბ. **ინტელექტუალიზმი** - ნ. **ინტელექტუალიზმი** (ლათ. intel-ზონის-შეამაღლება). იხ. ბ. **პარაპლექსიზმი**.
- ბ. **ინტელექტუალიზმი** - ნ. **ინტელექტუალიზმი** ხასიათდება ბოლით განხილვის უფრო, ვიდრე მინიმუმ ყოველგვარი ავანტიურის ვარაუდობა წარმოქმნის, რაც ვარაუდობს გოგონის ფსიქოლოგიურად გაუგებარა შინაგულად ბოლით ავანტიურის ავანტიურის შესახებ წერა **ასპერსი** (**Asper E., 1912**) და **პარაპლექსიზმი** ბ-ის ვარაუდობის გამოყოფისაგან **მორალური გაუგებრობების**. სინონ: **ინტელექტუალიზმი**.
- ბ. **ინტელექტუალიზმი** - ნ. **ინტელექტუალიზმი** ხასიათდება ავადმყოფის განხილვით მისი შესახებ, თითქოსდა მას აქვს მისივე განუკურნებელი დაავადება, უმეტესად სომატური, თუმცა აღწერილია ბ. მისივე ფიქციური პათოლოგიის არსებობის დროსაც (არ უნდა ავტორის მიმოვლენის დებურებას **გულუბნობრივი მიზნის**). ხშირად ეს დაავადება «**უხვეულობა**», განსაკუთრებით ყველა სხვა ცნობილი დაავადებასაგან და ამიტომ ამოუცნობია. დაავადების დასაწყისში ბ. არამყარიათად გვხვდება სინდრომათიკური ერთად. ფსიქოლოგიური იპოქონდრალიზმი სიმპტომების წარმოქმნისას (**განსაკუთრებით** იპოქონდრალიზმი განვიწყობისას) შეიძლება თვლიდ გვაღვივროთ ფსიქოლოგიურად გასაგები და კორექციისთვის სპორადული ცალკეული ამოქონდრალიზმი განხილვის გარდაქმნის, მან, კარდოლოგია მღერაზე ბოლიდან ნაშეული იპოქონდრალიზმი ბოლიდან.
- ბ. **ინტელექტუალიზმი** - ნ. **ინტელექტუალიზმი** იხ. ბ. **პარაპლექსიზმი**.
- ბ. **ინტელექტუალიზმი** - ნ. **ინტელექტუალიზმი** (**Maier H.W., 1913**) შეიქმნება **ავტორიტარი** ბ. რომელიც ვარაუდობს რომელ თამაშებს წარმოადგენს სენსორული შეფერადება და ვარაუდობს მინარეობს. ტიპური მაგალითია კრემერის დამოკიდებულების სენსორული ბოლი.
- ბ. **ინტელექტუალიზმი** - ნ. **ინტელექტუალიზმი** (ბერძნ. kataisthanoimai - შეგრძობა) (**Исторический Б.А., 1949**). ბოლდებს **წარმოქმნის** ფორმა, სახეობა ინტელექტუალიზმი კავშირდება. კატექტორული შეიძლება იყოს შემოქმედების, დევიანის, იპოქონდრალიზმი ბოლით იდეები. უმეტესად აღნიშნება მიმოვლენის და ეპილეფორული ენციფალიტის დროს.
- ბ. **ინტელექტუალიზმი** - ნ. **ინტელექტუალიზმი** (ლათ. querulus - მუღბილი მოშივანის). იხ. ბ. **პარაპლექსიზმი**.
- ბ. **ინტელექტუალიზმი** - ნ. **ინტელექტუალიზმი** ხასიათდება სტრუქტურული კონფლიქტების მიმდინარეობის დროს, რაც განსაზღვრავს მის შინაარსს. ხშირად ეს არის ხატოვანი, უანგასტიკური განხილვის პარანორმული ბოლის წარმოქმნის ვარაუდობა. გ. **კუპერი** შეიქმნება: 1. **რეტროსპექტიული ბოლი** **მომავლის** **განხილვის** (**Исторический Б.А., 1933**). გხვდება პარანორმული მიმოვლენის პარანორმული სტადიის დროს. ავადმყოფი აყვება, თითქოს რამდენიმე წლის წინ მას შეხება აღმინება და უწინასწარმეგობრად ყველაფერი, რაც მას გააძაბდა და რაც მომავალში შესაძლებელია. ახლოს: რეტროსპექტივი ბ-თან, თუმცა, მისგან განსხვავებით, კონფლიქტური ტენდენციები მიმართულია

- არა მარტო წარსულისკენ, არამედ წარსულიდან აწმყოსა და მომავლისკენ. 2. **მარადიული** არსებობის ბ. (ნედსდერ E.M. 1923). დამახასიათებელია ინფორმაციური პარაზიტებისთვის. ავადმყოფის განცდები მიმართულია წარსულისკენ.
- ბ. **კონსერვაციული** - 6. **консервативный** (ლათ. conservans - მსგავსი) (Bayer W., 1932). ფორმით და შინაარსით ასაკუთს ხსენებული მსგავსი ბოლოჯი, რომელიც უვითარდება ერთად მცხოვრებ და ახლოზედ ორ ან რამდენიმე დამამიანს. ანდუცრებელი ბ-ჟან განსხვავებით, კ. ზის დროს ორჯე მონაწილე უსაქიერად დაავადებულა, მაგ. შიმოფრენით. ბოლოჯი შინაარსი განსაზღვრება არა მარტო ენდოგენური, არამედ უსაქიერგური პათოლოგიკური მომენტებით. შოლიჯი შინაარსის კონსერვაციული არსებობის მიქედებს ავადმყოფის პოზიციამ. ავადმყოფი იარე საპყარის უპირისპირდებით არა როგორც ცალკეული ინდივიდები, არამედ როგორც რადაც ჯგუფი. განსხვავლება სიმბიონტური უსაქიერებისგან, რომლებიც მიეკუთვნება ონდუცრებულს და ამავე დროს შესაძლებელია ინდუქტორის გამოყოფა.
- ბ. **ქოტარისა** - 6. **Kotara** (Colard J., 1980). **ნახალისტურ-მონაწილურული** ბოლოჯი გრანდიოზულობის იდეითიან ერთად. ხშირად ცხვებება ინფორმაციური შედარებითი, იმიოთად, ცოკუდარული დეკრისის დროს. არჩევენ კ. ზის ორ ვარიანტს: 1) **ამოქონდრული** - ხასიათდება მშფოთიარე შედარებითური აუქტის შეუღლებით ნიპილისტური სოქონდრული ბოლოჯით; 2) **დებერსული** - ხასიათდება მშფოთიარე შედარებითი გამოხატული დეგრადირული ბოლოჯი იდეების და შეყადომინიურ ხასიათის გარე საპყარის უარყოფის იდეების არსებობით. სინონ.: **ქოტარისა** სინდრომი. ბ. **ქოტარისა** სინდრომი, **შედაქონდრული** ბოლოჯი, ბ. **შინაარსი** სინდრომი.
- ბ. **ლესიონისა** - 6. **Лесина** об. **ლესინა-შარდარმარისონების პირისპირტული ბოლოჯი**.
- ბ. **მანიპულაციური** - 6. **маневренный** (Didde M., Giraud P., 1922). ანტაგონისტური ზის ვარიანტი, რომელიც დაპარაკია ორი მძღაერი ხასყაროს ურთიერთწინააღმდეგობასა და ორი საპირისპირო ძალის - საკეთე და ბოროტება, ნათელი და ბნელი - ურთიერთდაპირისპირებაზე. (მანიპულატიონი - რელიგიური მოძურება, დეკამენტები და დეგრადირული მარის ხასებთან. წარმოიშება ახლო ადმოსადღებითი ახ. წ. III ს).
- ბ. **მანვლი** **შარდარმარისა** - 6. **маневры шардарамариса** შეიყავს იმ პირთაგან წარმოშობის იდეას, რომელიც დაპარაკიობაში უჭირავთ შიადლი მდგომარეობა. ამ დროს, ნეულებრივ, ნახვილი მშობლის ენებებთან იმ ადამიანებს როლი, რომლებმაც რადაც გამოუვალა მდგომარეობის გამო გამარჯვს და სხვები მასყს ავადმყოფის. ხშირად ავადმყოფის მხრიდან მათ მიმართ ელინდება მგრული დამოკიდებულება. შესაძლოა თვის როგორც შეყადომინიური, ასევე დეგრადირული ბოლოჯი ვარიანტი. (ავადმყოფი - ვითარების მსხვერპლი, თვისად) პოლიტიკური თამაშში). სინონ.: ბ. **სხვა** **შარდარმარისა**, ბ. **შარდარმარისა**.
- ბ. **მანვლი** **მანიპულაციური** - 6. **маневры манипулятивный** (ბერძნ. **μαγειν** (magis) - იდეი). იხ. ბ. **მანვლი**.
- ბ. **მეორეული** - 6. **вторичный** ადმოსადღება კლინიკურ სურათში ამა თუ იმ უსაკრითალოგურ სიმპტომატიკის (აუქტური ანდილობები, პალყუინაციები, ცნობიერების შეყვდის მდგომარეობანი) არსებობის დროს და მასთან კავშირში.
- ბ. **მედიანური** - 6. **медианная** (მესია - იუდეურ და ქრისტიანულ რელიგიამში: დმერთის შიერ წარგმანილი მაცხოვარი, რომელიც უნდა გარდმოყოფს მყიდან დეოთის სუფიების დასამკედრებლად). იხ. ბ. **ქოტარისა** სინდრომი.
- ბ. **მეტაბოლური** - 6. **метаболический** იხ. ბ. **მეტაბოლიკური**.
- ბ. **მეტაბოლიკური** - 6. **метаболический** (ბერძნ. **μεταβολή** - ავადმყოფის მსხვერპლი). შემოქმედება ბოლოჯის ვარიანტი, რომლის შინაარსია ავადმყოფზე გარეგანი მემოქმედებით მისი გარდაქმნა ცხოველად ან უსულო საგნად. სინონ.: ბ. **მანვლი**.
- ბ. **მეტაბოლური** - 6. **метаболический** (ბერძნ. **μεταβολή** - ხაიდუმლო ჩვეულება). ხასიათდება გამოხატული მხტიკური შინაარსის ავადმყოფური განცდებით, ავადმყოფი დარწმუნებულა, რომ მის თავსა და გარემომყოფებზე ხდება რადაც აუხრელი, ბოლოჯი, აბტყეობს იმეყენურ საპყაროსთან მისი ურთიერთობების შესახებ. ბ. - მსგავსებება რელიგიური შინაარსის იდეითი იდეები.
- ბ. **მორალური** - 6. **моральный**. ხასიათდება ბრძოლით საკეთარი, თითქოსდა შედახული უღლებების დასაყავად. ამის გამო ავადმყოფები მივილი შინაარსიან ეყვად შესაძლო ინსტანციას, აგროთევენ დიდი რაოდენობით, მათი აზრით მნიშვნელოვან დოკუმენტებს არამეფათად გვებება პარანოიკური განვითარების დროს შესაძლოა თვადი გაავადენით დინამიკის რეაქტრად განსარობებული კონვლუტური განცდებიდან მელირებული იდეების სგადიის გაყვდის ბ. - მდე, რომლის ობგენსიობა არ იყვლება პირველად კონვლუტის ნიშნავლითა სყენიდან გასყდის შემდგეყ - თვად მოდავეობა წარმოადგენს თეთიშობის. სინონ.: ბ. **მორალური**.
- ბ. **მორალური** - 6. **моральный** ხასიათდება ავადმყოფის ბრძოლით დაშვებულა უსამართლობის, მისი სოყიადური, საბუნეირი (ადმონიანი) და ა.შ. უღლებების შედახების წინააღმდეგ ხშირად შეუღლებულა რეურომგაგრობის იდეითიან, კეერულანგობასთან.
- ბ. **მორალური** - 6. **моральный** შეიყავს ამრს, ავადმყოფის წინააღმდეგ მომწამელი ნივთიერებების გამოყენების შესახებ, რაც ხორციელდება საყვებში, წყადში მათი შიყრის ან პაერში მოურტყევის ვნით ავადმყოფის ჯანმრთელობისათვის მიანის მყეუების ან მისი მყოკდის მიხნით. მოტოინებთი ასაკის ფსიქოზის დროს გვებება მყად გაქანება ბ-თან ერთად.
- ბ. **მორალური** **რატყვევებისა** - 6. **морально-рациональный** (Сухаво С.А., 1956). შეყავს ზარანოდი, აღმოყენება სოამიკო ვითარებისას ფრონტის პარობების. დამახასიათებელია შეყავს დასაწყისი, დასოკიდებულების და დევენს ბოგითი იდეების მომხდავება, ძღვარი მისი ფონი აღმოყენება ოდლორული ადშია. პარანოიკის შინაარსი დამახასიათებლად ასახავს სიგუყიას: გარემომყოფებში ავადმყოფი ხედავს მტრის ჯარისკაცებს და ა. შ. გამოყანმრთელება დღება კრიტიკულად. ანუზაბა არ არის, თუცა შესაძლებელია რ. ზღვრადიარე ბოლოჯის მოყვდის. ფსიქოზის მყეერვადმე შესახებებია აგრესიული მოქმედებები. განახლებება როგორცეყადე ყოთარების ზარანოდიან ერთ-ერთი ფრონტი, რომლის განვითარებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს უსყეულო სიგუყიის არასასიყეთი მსოქმედება და სომატიკური დაავადებები (გუყუხა A.H. 1950).
- ბ. **მორალური** **რატყვევებისა** - 6. **морально-рациональный** (მარალი, დევისი, მოქმედის იდეები, რომლებიც ურყვდება უპირატესად ავადმყოფის ახლობებზე, ნათესაებებზე, მეზობლებზე. აღინიშნება ინფორმაციური უსაქიერების, იმიოთად - ათეროსკლეროზული ფსიქოზების დროს.

- ბ. შშპპპ - ნ. სურათი შეგავსებს ფსიქოზურა მდგომარეობა მკვეთრი აგნებებით და ცნობიერების დაბნელებით, რომელიც აღმოუჩნდება სხეულის გემპერაგურის მნიშვნელოვანი აწევის და ფიზიკური გამოყოფის დროს. დამახასიათებელია ვარძობის ილუზორული აღქმა, შიშის, მუთთვის აუქტი, გამოხატული იმპულსური ქცევები. აღინიშნება ინფექციური და ინტოქსიკაციური ფსიქოზების, პროგრესული დამბლის ცალკომბებური ფორმის, ეპილეფსიის, მწკავე ტრავმული და მოხუცებულობითი ფსიქოზების დროს, ბ.შ - არასაკმარისად დიფერენცირებული ცნებაა, უპირატესად მიეკუთვნება ეპილეფური ფსიქოზის, თუმცა, მისგან ერთ-ერთი ვარიანტის სახით გამოყოფილია ფებრალური შიშოფრენია (Kraepelin E.L. 1913; Юхан Т.И. 1939; Stauder K., 1937; Scheid K., 1937; Pomaevskoi E.A. 1989) რომლისთვისაც დამახასიათებელია კატაგორიურ-ორენტირებული შეგვეები უნდაგსტიკური ბოლით. სინონ: შშპპპმ დეპრესიამ (ლათ. Defurium acutum) ბანდა ზაქსლამი (Bell L. V. 1849), შშპპპმდეფილი შიშოფრენია, შიშოფრენია, შიშოფრენია, შიშოფრენია.
- ბ. ნიპილიტური - ნ. იურასიოვიჩი (ლათ. nihil - არაფერი). იხ. ბ. შშპპპსი.
- ბ. რეგლამენტო - ნ. სიპრევიჩი (Regis E., 1901). ეგზოგენურ-ორგანული ტენზის დელირიულ-ორენტირებული მდგომარეობა (ინფექცია, ინტოქსიკაცია, ენკეფალიტი, თავის გინის სისხიენე და ტრავმა). აღმოუჩნდება ღამით (იბოდე ხაზმრება), ვალეიების შემდეგ - ვრამენტული ავადმყოფური განვლები, რომელიც კლავი ძლიერდება საღამოობით. მოგვურ ავადმყოფურ განვლები წარმოიშობა დღისით თუალების დასტუქვისას. მათში დასახება წარსულის, ოჯახური ცხოვრების, პროფესიული საქმიანობის სეგნები. აწნეზია არის რეული. შტრ.: ბ. ბაშოფრენია ბაშოფრენია.
- ბ. რეპრესიზი - ნ. ჯანსაღი. ხასიათდება ორეულების განვლით, ერთი ან რამდენიმე პირის არსებობით, რომლებიც ცხოვრობენ ავადმყოფისგან დამოუკიდებელი ცხოვრებით და ხშირად სწლიან მის შემარცხებულ საყვილს. შიშოფრენის დროს ორეული, როგორც წესი, არის მის სხეულში, მაშინ, როცა ეგზოგენური ფსიქოზების დროს (ორეული) ავადმყოფის სხეულის გარეთია (Пилоридიჩი E.A. 1922).
- ბ. რეპრესიზი - ნ. ცაიუსიოვიჩი (ლათ. repressum - რხევა). ხასიათდება არამყარი, ინტენსიული ბოლითი ილევების აღმოუჩნებით და ვაქოობით.
- ბ. პარანოსიზი და რეპრესიზი - ნ. პორახი თარაქანი (Wiener S., Kessler H., 1966). ხასიათდება ავადმყოფის შიშოვებით, თითქმის მისი სხეულის სხვადასხვა ნაწილები, კანი, საცხოვრებელი, განსაკუთრებით დამიანებელია პარანოსიზი. დამარტებულია შენაგვრებულ მდგომარეობებში. უპირატესად გვხვდება 50-60 წლის ასაკში, განსაკუთრებით ქალებში. აღინიშნება ინფოლუსური პარანოსიზის და მელანქოლიის, აგროფიული პროფესიების, სხვადასხვა ევოლოგიის დეპრესიული მდგომარეობების, პარანოსიული განთვარების დროს. ხშირად ამ დროს აღინიშნება დროს ინტენსიური მოძრა და კანის დაავადებები. შტრ.: პარანოსიზი სიდეფილი ბ. რეპრესიზი.
- ბ. პარანოსიზი - ნ. თარაქანი. იხ. ბ. შშპპპსი ბაშოფრენია ბაშოფრენია.
- ბ. პარანოსიზი - ნ. თარაქანი. ხატემატიზებული ბ. ფენომენოლოგიურად იხილსა პარანოსიულთან, მაგრამ დამახასიათებელია ენდოგენური დაავადებისათვის და ამიგამ აქვს სხვაგვარი დინამიკა. კრეპელინი (Kraepelin E. 1912, 1915) პირველად გამოყო მის პარანოსიას, განსხვავდა პარანოსიული ბოლის წარმოქმნის ორი შესაძლო მექანიზმი: იგი დაკავშირებულია ან კონსტიტუციურ წინაგანწყობასთან, ან ენდოგენური პროფესიის გარკვეულ ეტაპთან. შიშოფრენიის დროს ბ.შ. აღინიშნება ან ბოლვის წარმოქმნის ხაყვის სტადიაზე და თანმიმდევრულად ილევება პარანოსიულად და პარანოსიულად, ან ხდება სტადიალური და წარმოადგენს პარანოსიული ფორმის აგვიპურად მიმდინარე პარანოსიულ ვარიანტს.
- ბ. პარანოსიზი - ნ. თარაქანი. ავითარების ბოლის სხვადასხვა ფორმის ავადმყოფი უსამოცი უარყოფითი მექანიზმების რეუბით (ბ. დამოუკიდებულება, ბ. შიშოფრენია, ბ. დეცნია, ბ. შიშოფრენია, ბ. შარალისა, ბ. ვაქოვრება და ა.შ.)
- ბ. პარანოსიზი - ნ. თარაქანი. ხატემატიზებული ბოდე, რომლის შემქნაში ძირითად როლს ასრულებს რეალური ვაქების ინტერპრეტაცია, პარანოსიური ამონების თავისებურებანი. ყოველივეს უფრო დასახულებულია, ნაელ შეუსაბამო და სინამდვილეს ასე არ ეწინააღმდეგება, როგორც წყველი. ბ. შ. შეიძლება იყოს განმტავებული თემატიკის, შინაარსის, ფუნქციის მიხედვით, პარანოსიულ სიმპტომთა წარმოქმნა დამახასიათებელია პარანოსიული განვითარებისათვის, რომელიც გვხვდება უპირატესად ფსიქოპათიის მგაროში (Лаврушина Л.Е. 1914 - 1933).
- ბ. პარანოსიზი - ნ. თარაქანი. ხასიათდება რეტროსპექტიული ინტერპრეტაციით, კონვალუაციებით, განდლების, განსაკუთრებული მისიის და დენის ბოლითი ილევებით. იხ. პარანოსიზი სინონ: შ. შინაარსიანი, ბ. შარალისი.
- ბ. პარანოსიზი - ნ. პედიკოვიჩი (ლათ. peractio - დენა). ბოლითი ფორმების ქვეყუ, მიმდინარეობს შიშის გრანობით, გარემომყოფთა შიშარ უნდობლობით და ეტუთ. ხშირად ილევობს ხდება მღვეარი. ბ. შ. აკუთვნებენ დენის (ციფრის გაგნება), დამოკიდებულების, განსაკუთრებული მნიშვნელობის, მეზოქმელების, მოწამელის, შარალის ბოლის.
- ბ. პარანოსიზი - ნ. პედიკოვიჩი იხ. ბ. პარანოსიზი.
- ბ. პრინციპალიზი - ნ. ფრანკლინი (ლათ. principium - საწყისი, პირველი) (Griesinger W., 1867). საწყისი, პირველი ბოდე, რომლის აღმოუჩნებას, პრინციპის ფსიქოზის კონკრეტული თანახმად, წინ არ უსწრებს აუცილებელი აუქტური ამღის სტადიები, შეღანქობა და მანია. შემდგომ ფსიქოგრაულ ლიგურაგურამი ბარგელად, ტეშპარიტი ბ. განიხილვორა როგორც სხვა ფსიქოპათოლოგიურ ამლილობითან დაკავშირებული, ფსიქოლოგიურად აუნსენელი (Jaspers K., 1913; Schneider K., 1931. Gruble H., W., 1932). იასპერსი პირველად ბ.შ. არჩედა ბოდეით აღქმის (აქევაგურად მსალეხი ბოლითი განმარტება), ბოდეით წარმოადგენს (რეალური მოგონებების რეტროსპექტიული განმარტება, უეყარი ფესბილისინგა) და ბოდეით ნაწილობის (მსალეხი მნიშვნელობის მოვლების შესახებ ცოდნის აღმოუჩნება). შინაარსითაა ვააეროთანა ბოდეითი წარმოადგენა და ბოდეითი ნაწილობა და განიხილვორა როგორც ბოდეითი ფსიქოპათოლოგია; ბოლითი აღქმა მან შიქუთენაა შიშოფრენიის პირველი რანგის სიმპტომს. გაუკრი მავადობით ბ. შიშოფრენიული ბარგელად ბ. უპირისპირდება შტორად ბ.შ (ან ბოლისმავარი ილევს), რომელიც გამოქმინარების ცნობიერების ამლიან, აუქტურობიდან, პადეუსიაციებიდან, ფსიქოლოგიურად განსაკუთრებულია ბოდეითი განვითარების დროს. თანახმურევე ფსიქიკოზია ურავლესობა შიშოფრენიის (სილოდე) ბ. შის კლანიტი-ფენომენოლოგიურ ვააეროთანა მამან, როცა პათოლოგიური მნიშვნელობის, ბოლის წარმოქმნის ნებისმიერ ფორმის განხილვადი როგორც შეიარაღს, რომლის აღმოუჩნებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს პერსექუციის, აუქტურობის, ამროენების.

ცნობიერების აშლილობები. კლინიკური სურათის მიხედვით, პირველადი ფსიქიკური ცვლილებები, მ-ს მანიფესტაციის ეტაპი მიმდინარეობს ლატენურად, არ უვლიდება ქუევის გარეგნული, ხილული დარღვევები. ამიგომ ჰ. ბ. ხშირად გრუვებს უფროდ აღმოცენებულს, ფსიქოლოგიურად გაუცხარის შობაზედღებამს.

ბ. რუსმდეპალმერმ - ნ. რუსმდეპალმერმ (Nessel C., 1894). აღმოცენდება გადატანილი ფსიქოზურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით ქუევის გარეგნული ნორმალბობის ფონზე. მეოცის ადრეული ავადმყოფური განცდების ურამგენგებს. შეობადა შეგვებელს შუავე ქალკუნიანური-პირანდიული მდგომარეობის, დელირიუმის (დელირიული ბოლე) შემდეგ, აღიღვეფური ბილისებური მდგომარეობის განმარტობისას.

ბ. რამტრნამტრნამტრნამ - ნ. რამტრნამტრნამტრნამ (Sommer K., 1901). ავადმყოფის წარსული ცხოვრების მოვლებების აღმახინჯებული ინტერპრეტაცია, ზოგჯერ ბოლის პარაფრენიული ხასიათის დროს, ასეთი ახსნის გნგემში შინშენულეონ რიოსს ასრულებს პარამენური ანლიობები. სინონ: ჰ. რამტრნამტრნამტრნამ.

ბ. რუსმდეპალმერმ - ნ. რუსმდეპალმერმ. განხილვებს ჰ-ის ეარიანგი, ხასიათდება ქუევის პოლიტიკური. ეკონომიკური, რელიგიური ცხოვრების ძირეული გარდაქმნის იღვებით. ხშირად გვხვდება დენის იღვებთან ერთად. როცორც წესი, სისტემატიკებულა.

ბ. ხანოშინოვიჩი - ნ. ხანოშინოვიჩი (Хановичи А.И. 1927). ზერევე ბილბს მდგომარეობა, რომლიდაც შესაძლებელია ავადმყოფის გამოყენა და ახვე დროს ავადმყოფს შეუძლია ზოგიერთ კითხაზე ადვკატური პასუხის გაყება. ავადმყოფი შამართავს მოსაურეს, კამათობს მასთან. ამასთან ეს საურბები ათხარებს დალოგებს სახეს. აღნიშნება ეგზოგენური ფსიქოზების დროს.

ბ. სარეპინი - ნ. სარეპინი (Krapelin E., 1881). ამჟვეკური ფსიქოზი, აღმოცენებული ინფექციური დაავადების ინკუბაციურ პერიოდში გემპერატურის მომატებაზე დაავადების კლინიკური სურათის გამოიუნამდე. არ წარმოადგენს ბოლას, პირდაპირ გაგებთ. უწინმწროლოგურად ადარებს დელირიუმის ხასიათს. უმეტესად გვხვდება მუცლის ტივის დროს (პირველად მამინ იყო აღწერიდა), თუმცააღწერილია ზოგიერთი სხვა ინფექციური დაავადების დროსაც (წითელა, გრიპი, პარატუბერკოლი). სინონ: ჰ. მდომალხმ.

ბ. სანსონი - ნ. სანსონი (Krausner E., 1918). ბოლის წარმოქმნა, საუბედელ უღებს ავადმყოფის აწული პიროვნული მტრობობლობა, მისი აქუნგურებული აუჯტურობა და კონსტიტუციური ხასიათობობა. ამგვარად, დამოკიდებულებს ჰ. გამოზიდბარობის ავადმყოფის პიროვნების პრემორბიციული ხასიათობა და აუჯტური მდგომარეობა. ჰ. დ. მოწოდებულა პარანოის დროს ბოლეს წარმოქმნის ასახნდელი მისი ფსიქოგენების კონფიციის შესახამდა. დიანოსტიკის დროს გათვალსწინებულია ისეთი ფაქტორები, როგორცაა კონსტიტუცია (სენსიტივობა ხასიათი), განცდა და სპეციფიკური გარე გამლიზინებელი. თანამხედველ შეხედულებით, დასტავა პარანოიულ გენეოტიკებულა.

ბ. სანსონი - ნ. სანსონი (Krausner E., 1918). ხასიათდება განსაზღვრული ბოლვით სისტემის არსებობით. ცადკეული ბოლვით სიუტეგები ურთოდდაკავშირებულია. მოზილია უმარტესად გარე საშუარის ასტრაქველი შეცრობის უნარი, დამახინჯებულია მოვლებების შორის შინაგანი კემიონების დამარტება. საწინააღმდეგოა: წყვეტილობა. ციკური მეტაბოლია - ჰ. პარანოიული, ჰ. პარანოიული, ჰ. პარანოიული ზოგიერთი უორმები.

ბ. სანსონი - ნ. სანსონი (Clerambault G., 1925). პარანოიულ ხამტიონია კომპლექსი, ხასიათდება ვანდილებს იღვებით და ეროგომანიური შინართულების ბოლვით განცდებით (ავადმყოფი უყვარებულია ვილა პირზე). თვის განმართებამი გაივლის სამ სტადიას: 1) ობტრახტიური (სეყვარული); 2) მესამხტიური (შილი, მტრული დამოკიდებულება, დაუსაბუთებელი ბრალდებები); 3) ხამდეგობა (შუქარა, სკანდალი, ანონიმური წერილები). (ჰ. მსგავსი). სინონ: პრეტომანია, ჰ. პრეტომანია, ჰ. პრეტომანია.

ბ. დელბრუკი - ნ. დელბრუკი (Delbrück A., 1857). ავადმყოფი ამციცებს, რომ იგი უღანმეულია ან ახმის, რომ განახენი გაუქმებულია და იგი შეწყლებულია. ხშირად გვხვდება აციხის ესტოპების დროს ფსიქოგენური ბოლეს წარმოქმნის ფარგლებში, იშვიათად, შინოფრენის დროს.

ბ. რუსმდეპალმერმ - ნ. რუსმდეპალმერმ. სინონ: ჰ. პარანოიული.

ბ. რუსმდეპალმერმ - ნ. რუსმდეპალმერმ. სინონ: ჰ. პარანოიული.

ბ. რუსმდეპალმერმ - ნ. რუსმდეპალმერმ. სინონ: ჰ. პარანოიული. აღნიშნება ამ პირებს, რომელთაც აქვთ სმების შინშენულეობის დაქვეითება გარემოცუოვით დაყეველების არასწორად აღქმის გამო ამ მათთვის სრულად გაუცხარის მნიველებლის ავადმყოფური ინტერპრეტაციასთან მტკინობით. უმეტესად აღმოცენდება დამოკიდებულების, დენის იღვები. სინონ: რუსმდეპალმერმ.

ბ. რუსმდეპალმერმ - ნ. რუსმდეპალმერმ. არტავლი ჰ-ის ვარიანტი. ასახავს განცდებს ავადმყოფის სხეულში რაღაც ცოცხალი არსებების, ხშირად ფანტასტიკური, უწინდური ბილბს მასახლების შესახებ. ხშირად აღინიშნება დაუღულებს ჰ-თან ერთად. წარმოადგენს ტექსტუალ-კლერამბულ ფსიქოკური ავტობიტიზმის ხინგრობის გამოვლინების. ავადმყოფებს აღნიშნება შეივლებობა-შობრადებელი უსველადკეიანობები. ზოგჯერ ისინი ამციცებენ, რომ მათ სხეულში შეაღწია სხვა აღამამა (ცნობელი მსახობა, პანოტიზმი, ეუსტრასენტი); შინაგანი - არსებობა (zooplasma interus) ბოლგებს სხვა შემთხვევებში ფიგურირებს ცხოველებს.

ბ. ცრემლი - ნ. ცრემლი. სინონ: ჰ. მდგომარეობა.

ბ. დიპრე - ნ. დიპრე (Dupre E., Longre J.B., 1914). ამტენარტიკაციული და ქალკუნიანური ბოლეს. საწინააღმდეგო, გამონაგონა და გამოზიდბარობის პიროვნების მღრტკლელიდან ფანტაზირებისადაც, ოცნებისადაც. ჰ. აღმოცენდება მწკვედ ინტუიციის, შინაგნების, ფასილიონების უღვებზე. ავტორთა მიხედვით, მის აღმოცენებას განაპობებს შინოტიონური კონსტიტუცია (მ. შინოტიონი). ინტუექტის სისუსტე და პიპამონაკლური მდგომარეობა. არ აღინიშნება შესისტრების დრმა დარღვევები, ქალკუნიანობები, ფსიქოსენსიტიული ანლიობები. ციკურია გარემოს ნათოთი აღქმა და სრული ოორენტიონი თანამდროვე შეყვარების (Krupnik I.J., 1976) მიხედვით, წარმოადგენს მასტაბით განსხვავებულ (შეკლომანიურიდან ყოვითამდე) ავადმყოფურ ფანტაზირებას, რომელაც ეთარობა აქტიური სტრუქტურის საუბედელი და ურეკლები წარსულზე, წყნობა და მომადლე. ჰ. შ. შლის პარაფრენიული სინდრომის სეგრეტარამი და მისი ერთ-ერთი მიმუჭვებელი ნიშანია. სინონ: ჰ. მდგომარეობა, ჰ. შინაგანი, ჰ. შინაგანი.

ბ. შინაგანი - ნ. შინაგანი. სინონ: ჰ. შინაგანი. აღნიშნება ბოლგებს ვარიანტი. შესაძლებელია იყოს როგორც წყვეტილი, ასევე სისტემატიკებული. უმეტესად თან ახლავს სმებით და ტექტიკური ვემმარტიკი ქალკუნიანობები. ავადმყოფი აცხადებს,



რომ დევნის მიზნით შემოქმედებას ახდენენ მის სასქესო ორგანოებზე ან აუბაგირებენ მას. ზოლვის ტონი, რიგორც წეხი, მანამ აკუმულირდება უარყოფითად, ქალებში შესაძლებელია იყოს დაღვთება. რამდენად შეესაბამება «წახდენილობა» ქალებში ადამოვნებულ ბოლვის ან ვარიანტს, საკამათია (ა. ვაშლიყვითელი).

**ბ. სტრუნიჩი** - ნ. ივანოვიჩი ხასიათდება არათანმიმდევრული და არასტაბილური, წყვეტილი წარმოდგენების მოზღვავეებით. ეს არის **ბ. წარმოდგენა** (ფანტაზია, ოცნება), მიმდინარეობს შვიტოსის, შიშის, უსკამის მდგომარეობით ან დაზნევატობით. ვერტოგრადოვა (Вертogradova O.I., 1976) ბ. -ის ცნებას უახლოებს შნაიდერის (K. Schneider) ბოლიტი გამონაკლის და დიპრეს (E. Dupre) და ლანგრეს (J.B. Longre) წარმოსახვის ბ.ს. პრაქტიკული ავტორის მიერ **ბ. განიხილება** როგორც გრანდობა ბ. -ის სინონიმი, თუმცა, ვერტოგრადოვა და დიპრესი (Вертogradova O.I., Деметриева H.H., 1976) ან უკანასკნელი გამყოფენ მას როგორც თავისებურ ვარიანტს.

**ბ. შინაგანი** - ნ. ივანოვიჩი შიშოვანი ბ. -ის ვარიანტი, აღმოცენდება კლინიკური სურათში გამოხატული და მყარი ქალუცინაციების, უშეცდელ ვერობალების, არსებობის დროს. სწებითი ქალუცინაციები ავადმყოფის მიერ აისინება როგორც მომორებით განდგებულ ფიქციური აპარატების შემოქმედების შედეგი, რომლებსაც მართავენ აღმართა კოლექტივები, სტყუარული ორგანიზაციები, უკანასკნელ ხანს, უსკამიანეგული. ქალუცინაციური მოვლენები შეიძლება თან არ ახლდეს ბოლიტი ინტერპრეტაცია; მოგვიან მსწინის პათოლოგია ან შემოქმედების იდეები აღმოქმედება ერთდროულად - ეს შიშითების მათ შორის მიხედობრივი კავშირის არარსებობაზე. ქალუცინაციებს და ბოლვას აქვს აღმოცენების საერთო წყარო. ქალუცინაციები შეიძლება მასხაბლეს ბოლიტი განაცლებს ავადმყოფის მიერ მათ გაგებაზე მიუკითხველ შემორეული ბოლვის მექანიზმებს (Klasmeyer E.H., 1957).

**ბ. სინდრომი შინაგანი** - ნ. ივანოვიჩი (Синдром В.М., 1905) პიკნობური შემოქმედების სინდრომიანეული ბოლიტი იდეები. ავადმყოფი ამატოკიუზენ, რომ ისინი ჯანმრთელად არიან და იმყოფებიან პიკნობის შემოქმედების ქვეშ: მოკლებული არიან თიანთ ნება-სურვილს, მათი ქცევები შიშაგონებულად გარეგანად, რაც განსაზღვრავს მათ აზრებს, შეტყუებულს, წრას. დამახასიათებელია ამრთა გაორების შეგრძნება: გარდა საკუთარი ამრის, არსებობს ავადმყოფისთვის უცხო, ცანრე ამრები. თანამდროვე მეკლეკარია ამრთა (Гулянов М.А., 1965), წარმოდგენს ფსიქიური ავტომატიზმის სინდრომის ერთ-ერთ ვარიანტს. ახლოსაა დაუფლებების ბოლვისა.

**ბ. შიშოვანი** - ნ. ივანოვიჩი შიშოვანი ავადმყოფი ბ. -ის ვარიანტი, აღმოცენდება ემოციურ სფეროში გამოხატული დარღვევების დროს ავადმყოფის მიერ გაცხადებულ მტ. ობიექტურად და ბ. ენოციურად დაზნევის დროს. აღწერილია ე. ბლოკლერის (E. Bleuler, 1906) მიერ. ავადმყოფია ხატატური ბ. -ის ცნებას (Mayer H.W., 1913).

**ბოლვითი ავტომატიზმი** - Вредовые автоматизмы (Magnan V., 1893). მჭკვე ქალუცინაციური ბოლიტი მიმოყრენისმაგეარო ფსიქოზება ხასიათდება მჭკვე აღმოცენებით ნათელი ცნობიერების ფონზე (ცნობიერების უბში დარღვევები არ არის), ემოციური მიმდინარეობით და სინდრომიანე რემისიებით. ბოლვა აღმოცენდება უეცრად («გახსებოსნებით»). გაცხადების, მის ფაბლა მოლიზორეულია და არასტაბილური, აღინიშნება ინტენსიური ავუტივი (გუნება-განწყობის აწევა ან დაქრისა). პათოლოგიური ბოლიტი და გვხვდება არა მარტო «დევენერანგებულ» ფსიქოზის გამოსავლის შემდეგ არ აღმოცენება დეუტივის ნიშნები. შესაძლებელია რეციდივები. **ა. კრებითი ცნება**, მოიცავს: 1) მჭკვე უნდასტყურად ფსიქოზებს (Dupre E., 1925), როგორც პათოლოგიის დამახასიათებელია განცილებების ბოლიტი იდეები, იმეითად თიხობრადლებს, გრანდობრობის ხასიათით; 2) მჭკვე ინტერპრეტაციული ფსიქოზები (Serieux P., Capgras J.M.J., 1909), მიმთ და შვიტოთი მიმდინარე მჭკვე პარანოიების სახით; 3) მჭკვე ქალუცინაციური ავუტივი, უპირატესად ვერობების ქალუცინაციების, უსკამიანეგული და შიშოვანი იდეების იდეები (Ey H., 1954); 4) ჰეშაირად პოლიმორფული ფორმები (Ey H., 1954), რომლებიც გამოირჩევა ბოლიტი იდეების სისტემატიკით. განიხილება ისე როგორც მჭკვე მეტეფსიქიური ენოციური ფსიქოზები (Klasmeyer E.H., 1957) **გაქრული** (პ. 198).

**ბოლვითი იდეები** - Вредовые идеи (Jaspers K., 1913). ბრეველადი ბოლვის ვარიანტი - ადუკატორად მისაღები მოვლენის ბოლიტი განმარტება. საგანი ან მოვლენა აღიქმება სწორად, მაგრამ ეძლევა არაადეკვატური, ბოლიტი მიმდინარეობს. მათი ახლებური აღქმა მიუღწევადია კრიტიკული გადისწავლისთვის. **ბ. -ის** დიაგნოზი გაურკვეველია კარ კოდე გავლებში მიმდინარეობს მინიჭებლად (შემხვედრის ურეელო მჭკვა, მისი განსაყმლის თივისებურება ან ა. შ.) დამოკლებულების ბოლიტი იდეებზე.

**ბოლვითი ბანკირება** - Вредовые представления (Сухомин И.С., 1948, 1958). ბოლვის ფორმა, აქვს ავადმყოფური განცლების მიმართული მომავლისაკენ ავტორი მას უკავშირებს ფსიქიურ აქტივობის შენარჩუნებას, თუმცა ცნობილია ბოლიტი, პარაფრენიული სინდრომები, რომელთაც აქვთ მიმართულია ერთდროულად წარსულს, აწმუსა და მომავლისკენ (იხ. **ბოლვა მინიჭება**). **ბოლვა რატორსაქტული შიშოვანი ბანკირება**).

**ბოლვითი იმპრესიონალიზმი** - Вредовые «impression» (Schneider K., 1939). ბრეველადი ბოლვის ვარიანტი, მოიცავს ბოლიტი წარმოდგენას და შეცნობას. **ამპრესიონალიზმი** (Jaspers K.) მიხედვით, ბოლიტი ამრის უეცარი, ინტუიციური აქტუალისა.

**ბოლვითი შიშოვანი** - Вредовые мысли. ავადმყოფის თაგადუტოთი ქცევა, განმარტებული მისი ბოლიტი განცებით. მოიცავს ავადმყოფის ქვებობებს, მიმართულ მის საგარეულო მტრების წინააღმდეგ, მისი სინაოთლის დამატოკიუტული საბუთის შეგრძობებას (მაგ, ავადმყოფი ინტერპრეტაციური ბოლიტი ამატოკიუტული, რომ მისი კოლის სახით სახლში ჩასახლდა 10-მე მეტი ქალი, რომელთაც აქვთ კოლის გარეგნობა, ამგომ იგი ავროვებს ცხოვრების სხვადასხვა პერიოდში გადაღებულ ფოტოსურათებს, რომ დაადგინოს განსხვავება), ბოლიტი შიშოვანია.

**ბოლვითი შიშოვანი** - Вредовые мысли. ბოლიტი განცებით ავადმყოფის საცხოვრებლის (ბინა, ქალაქი, ქვეყანა) გამოყვლა, მჭკველი შიშოვანის შეცვლა, რაც თითქოსდა კონტროლდება მდენელთა მიერ. აღინიშნება **დენება** შიშოვანობა, **ზარალის** ბოლვის დროს.

**ბოლვითი შიშოვანი** - Вредовые мысли (Jaspers K., 1913). ბრეველადი ბოლვის, ხასიათდება, ავადმყოფის ამრთ, შიშოვლი მიმდინარეობის მოვლენებზე კონცნის აღმოცენებით, თუმცა, მანამდე ამ პრობლემებზე არასიყვის უფიქრია.

**ბოლვითი შიშოვანი** - Вредовые представления (Jaspers K., 1913). ბრეველადი ბოლვის ვარიანტი, ხასიათდება რატიორი მოგონებების გრტროსპექტული ხელახალი გაამრებით ან უეცარი აღმოცენით, «გახსებოსნებით», რომელიც არ გამოიმდინარებს წინამორბედი ამროვნობად და აღმოცენდება სწორად ბოლიტი იდეები. დამახასიათებელია თივისებური ინტუიციური ამროვნება. ხშირად გვხვდება შიშოვანობის დროს და აკავშირებულია პარანოიების გახლებლობას (Bleuler M., 1972).









**ბუნებრივი მთავარი მთავარი მთავარი** - Бусцарно матори гнѣрнотернотн (Buscalino V. M., 1938). ესეიქმების ბართვქული თერაპიის ერთ-ერთი მეთოდი (იხ. *ვახანა-მარკიძის ბუნებრივი მთავარი მთავარი მთავარი*). მოწოდებულია შიმოფრენიის სამკურნალოდ. კვირაში ორჯერ ინტრავენურად შეჰყავთ გიფ-პარატიული ვაქცინა იმ დოზით, რომელიც იწვევს სხეულს ტემპერატურის მომატებას (კურსი - 16-20 ინექცია). მიეკუთვნება ფსიქოების **სოფალბოლოგურ** თერაპიას, ხელს უწყობს ორგანიზმის დაშეკული ძალების მობილიზაციას და ბუქსეანთს მეხედულების შესაბამისად, შიმოფრენიის პათოგენეზზე, ახდენს აუციონგოქსიკაციის წინააღმდეგ ბრძოლას. აღინიშნება ეფექტრობა შიმოფრენიის პარანოიდული და პეტეფრენული ფორმების დროს.

ბ

**ბაბკულაშვიტი** - *рабочая* ადამიანის უნარი, დამოუკიდებლად მიიღოს სასახუსისმგებლო გადაწყვეტილებები და მოახდინოს მათი რეალიზაცია გარკვეული მოქმედებით.

**ბაბრუხა** - *отрушение* ცნობიერების აქტის ხანგრძლივობა. დამახასიათებელია აღქმის მღერბლის მნიშვნელოვანი აწევა გარე გამაღვიანებელზე ასოციაციების წარმოქმნის გამწვანება, მათი მიმდინარეობის შეწყვეტა. წარმოადგენსი ღარბობა, გარეშობი ორიენტირება არასრულია ან სასესებით არ არის. გამობატულია ბრადიფიქსირება. კითხვები აღიქმება მწვალად, მათზე პასუხები არასრულია, უზუსტობა. გ-დან გამოსვლის შემდეგ - აწვებია. არაკეთილსაიქედო მიმდინარეობის დროს გადაღის **სოპორში** და **კომაში**. **ვალტერ-ბუელის** (*Walter-Buell H., 1951*) მიხედვით, გ. არის ფსიქიკური მოქმედების პარენია სინონი: **ცნობიერების ბაბრუხაში** **სინდრომი**.

**ბაბრუხა** - *патологическое состояние* იყვანება, ჩაწვლეს ამის და რაიმეს მნიშვნელობას, ათვისოს და კვლავწარმოქმნას ამა თუ იმ მოვლენაზე არსებული მონაცემები, რომლის კუმზარიტებაში მას ეწეი არ ეწარება.

**ბაბრუხაში** - *переходное состояние* დაღუწვით ეღამი შორიგ კომისიაზე გამოსაღვლევი პირის ვაგარება დააეღების მიმდინარეობაში დინამიკის არსებობის ან არარსებობის განსაზღვრის მიზნით. აწარმოებენ **შ** **ს** **კ**-ში **ღ** **ხ** **ს** **კ**-ში.

**ბაბრუხაში** - *состояние* (გერმ. *Verschlebung*). **ფსიქიკანალიზაცია** ამა თუ იმ წარმოადგენის დამახლობის და მნიშვნელობის შეგრძნების გადასვლა უფრო სუსტ წარმოადგენაზე, რომელიც უკავშირდება პირველ ასოციაციურად.

**ბაბრუხაში** - *переходное состояние* ფორმირებელი მოქმედების (შევის) გავლენა ახალი მოქმედების ათვისებაზე. ახალი მოქმედების ათვისება ხდება უფრო ადვილად და სწრაფად ვიდრე წინა მოქმედებისა. მისი შექანაშია სუბექტის მიერ საერთო მოქმედების გამოყოფა ათვისებულ და ასათვისებულ მოქმედებებში. იხ. **ტრანსფერში**.

**ბაბრუხაში** - *переходное состояние* **ორგანიზმის მდგომარეობა**, აღმოცენდება იმ სამუშაოს შესრულებისას, რომელიც იწვევს მნიშვნელოვან დაღლილობას. ეს შეიძლება იყოს ერთჯერადი გ. ან ხანგრძლივი დაღლილობის დაგროვების შედეგი დროის მნიშვნელოვანი პერიოდის განმავლობაში. მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ნეურეგული მდგომარეობების (ნეურასთენია) აღმოცენება და წარმოადგენს არსებით პათოგენურ მომენტს მოგვირთი ფსიქიკის განვითარებაში, მაგ, მწვავე პარანოილები.

**ბაბრუხაში** - *рабочая способность*. ამროვნებით ოპერაციის ფორმირება, ამცირებს პრობლემური სივრცის საწყის გაერკვევლობას. გ-ის პროცესში გამოყოფენ ძიების, გადაწყვეტილების მიღების და რეალიზაციის სტადიებს.

**ბაბრუხაში** **შენიშვნა** - *феномен тождества* იხ. **სინდრომი** **შენიშვნა** **ბაბრუხაში**.

**ბაბრუხაში** **შენიშვნა** - *Галкеевич-Геллер-Гельманова болель* (*Галкеевич ВМ, Геллер Т.А., Гельманова А.И., 1912-1916*) **ათვისკლეროზული** და **ხედავარატროფული პათოლოგიის** ერთ-ერთი კლასიკური ვარიანტი. დასაწყისში აღინიშნება პიროვნების მოხუცებულობითი ცვლილებები, რომელთა ფონზე უკონტოლირება სისხლძარღვოვანი გენების კეროვანი აუთიურ-აგნოზიურ-აპრაქსიული დარღვევები, ლოკალიზებული დომინანტური ინსულიფროსი თხემ-საფეთქლის მიდამოში. მიმდინარეობა პროგრადივული, გაუარესებით, რაც ცანოწვეულია ანსულებით. დაავადების სურათი ხშირად ხასიათდება ფსევდოალეკაიზმის სინდრომით.

**ბაბრუხაში** - *рабочая* (გერმ. *GAE* - კავა, *missus* - ადამიანი). **შეტამორფოზის პოტენციალი**, რომლის დროსაც ავადმყოფი დარწმუნებულია, რომ იგი გადაიტყა კავად. შეგამორფოზის მოდის სახუცებისგან განსხვავებით (რომლისთვისაც დამახასიათებელია, თითქმის ავადმყოფი გადაიტყა უსული სანად), გ. წარმოადგენს **სოპორის** პარანოზის ცხოველად გაღატიების მოდეს. მდრ: **კანანრობა**, **დამანრობა**.

**ბაბრუხაში** - *рабочая* (გერმ. *GAE* - ნათელი, განათებული, *specis* - შედეგობა). **დამახანჯვებული შედეგობობითი აღქმა**, საგნის განათების ინტენსივობის გაძვირება. მუთუთ გამოთ მოწამელის ერთ-ერთი სინტეზი.

**ბაბრუხაში** **შენიშვნა** - *Галуст Орехович* (*Gall F.J., 1758-1828*). იხ. **შენიშვნა**.

**ბაბრუხაში** **შენიშვნა** - *Галустова* ნილუსი (*Gull W., 1873; Ord N., 1878*). მრდასრულ ასაკში აღმოცენებული იქიქვება. ფსიქიკური დარღვევები - ამათის, მოგორული აქტივობის დაქვეითება, ძილიანობა, შრომის უნარის





ფარმაკოლოგიის მიღწევების გამოყენებით ასწავს ენდოგენური ფსიქოზების წარმოშობის მექანიზმებს. ავიკორის აზრით, ენდოგენურ ფსიქოზთა ვენეში ვადაძველები როლი უნდა შეიღოს ნიროსტრანსმიტერების და ნირობიოგენეზის და ნირობიოგენეზის უფქიერე ლოკალიზაციის შეუღლის შედეგად განვითარებულ ავუქტურ, იდეატორულ და მოტორულ ანალიზებს, უბლიგენური ფსიქოზები სავირობა განიხილდებოდა კონგენუალური თვალსაზრისით. მათი სავირობა გამოყოფს ე.წ. „ავუქტურის სავიქტრას“ და „მხოფრანული სავიქტრას“ დაავადებები.

**მანპაპიბა** - მანპაპიბა (Mantapapa) დაავადების ქრონიკული მიმდინარეობის სტადიაა. ხასიათდება ავადმოყოფური სიმპტომატიკის ვარდირებით და ახალი ნიშნების გამოჩენით, გაძვეუდა დაავადების განვითარების სტერეოტიპით, მისი დინამიკით.

**მანპაპიბის სინდრომი** - Cirova trenda (ვერმ. Angststigma). ფსიქოპათოლოგიაში: ფრთხილად შინის თორბის ერთ-ერთი გერმინი, აღნიშნავს იმას სავიქტრებს შეყვანას სამიშროების სიტუაციაში, როცა სუბიექტი ცლოობს ვანერბილის აგმბის მომღებებზე. ეს შესუსტებული ფორმით წარმოქმნის შუოთით რეაქციის მატარებრივად სიტუაციასთან დაკავშირებით, როცა ირთვება დაცეით მექანიზმები.

**მანპაპიბის სინდრომი** რაოდენობა რაოდენობა გლოკობდება. ნორმალური ძირითადად აღნიშნება ნერვულ განვლივებით, ავრთუვე ერთორბივობაში დიფილს, ელენის ქსოვილი და ა.მ. მონავიციების ურდემორის პროექციაში, წარმოადგენს ზოგიერთი გოქსინის (გვანუსი, ქოლრა და სხვ) და სეროტონინის რეცეპტორს. გ-ის შემადგენლობის და რაოდენობის დარღვევა დამახასიათებელი ზოგიერთი პათოლოგიური მდგომარეობისთვის, მ.გ. პანპიროზული დილიტია.

**მანპაპიბის სინდრომი** - რაოდენობა ელენობა მარტივიდან რთულიმდე, დაბალიდან მაღალიმდე, რბობის დროსაც ხდება რაოდენობრივი მატების დარღვევა თვისებრივად და ხარისხობრივად. არჩევენ ფარაფარ და ფსიქოქურ გ-ს. დამიანის გ-ში განიარჩება რამდენიმე საუბური, რომელიც თან მოხდებს ერთმანეთს ასაკობრივ გ-ში. იხ. სანპა.

**მანპაპიბის სინდრომი** - Гаусер сыпатом (Gauss S.J.M., 1898). ხსენებება დამარტაკის სიმპტომში დასძლე შეტებისავე ავადმოყოფი არსებით პასუს არ ილდება, თუმცა, შეტისების არსს ხდება (Eichendorff H. H., 1907). მოხელდავად იმისა, როც ავადმოყოფის პასუს არასწორია, იგი ხდება დასძლე შეტისებით. ამით იგი განსხვავდება შიშორდენის დროს არასტერული პასუსისაგან. ვებებზე არა მარტო მეტყველების, არამდე მოქმედების დროსაც. დამახასიათებელია ზოგიერთი ფსიქოგენური რეაქციისაბოების. იხ. შხაფარდებრივობა. მანპაპიბის სინდრომი.

**მანპაპიბის სინდრომი** - Гаусер сыпатом (Gauss S.J.M., 1898). შეყვეფე ფსიქოგენური სტერეოული რეაქციაა. დამახასიათებელია ავდენილი მეტყველების და ავდენილი მოქმედების სიმპტომები, ფსიქოლოგებიც, პურილიზმი, ცანხობების შეუქრებება ისტერული გოპით. მამდინარეობა შეყვეფე დასაწყისში - დახვეულობა, შუოთობა, მამი, შიგაკურ შედეგობობითი პალეუნიაციება. ხანგრძლივი დროის განმავლობაში რჩება ფსიქოლოგებიც და პურილიზმის მოხელდება.

**მანპაპიბის სინდრომი** - ინტენსივი. აზრთვანება შროდქუტი, რომლის საშეშეშეობითაც ხდება აღქმული სინამშლივის მოგადი თვისებების ასახვა და შეხვეტება.

**მანპაპიბის სინდრომი** - მანპაპიბის დასახული მიხნის რეალიზაციისკენ გააზრებული მიწრავება განსამდრული გვემის მხებელი.

**მანპაპიბის სინდრომი** - тологания (გერმ. Deutung). ფსიქოპათოლოგიაში: 1) გამოკვლეება დროს - სუბიექტის აზროვნების და მოქმედების ფარული მიმდინარეობის აღმორება; 2) შეუქრანობობა დროს - სუბიექტთან ურთიერთობა და მისთვის ამ ფარული მიმდინარეობის გახსნა.

**მანპაპიბის სინდრომი** - психопатические синдромы. გლოელის (ვეების, სოციალური, სექსუალური და სხვ) ვადდების და უკონგრელობის მდგომარეობა. დამახასიათებელია ქვეტის სოციალურად გამოუმადებელი ნორმების, გაყნობიერებული პირვენური შეხედულებების დარღვევა. აღნიშნება ენდოგენური ფსიქოზების (შიშორდენია, მღვის შინაგენერული ვიპა), ფსიქოსიათების, თავის გენისს ორგანული დაზიანებების (პოსტექსტუალური მდგომარეობა, პანპიროზის ქოროვა, პიქის დაავადების საწყისი სტადია და სხვ) დროს.

**მანპაპიბის სინდრომი** - парафаз (გერმ. Abfuhr). ფსიქოპათოლოგიაში: ფრთხილად მიერ შემოღებულ ვეინობიურ ტერმინში. გ-ის დროს ხდება შინაგანი ან გარეგანი აგმბებით გამოწვეული ენერგიის გამოყოფა. შეიძლება იყოს მთლიანი და ნაწილობრივი.

**მანპაპიბის სინდრომი** - პანპაპიბის სინდრომიში მიმდინარეობს - парадоксальная реакция. ევგ-მე პაროქსალიზმი, თან ახლავს გულყრა ან ელინდება გულყრათმორის მდგომარეობაში. დამახასიათებელი ვევ-ფენომენები (პიქეტი, კომპლექტები პიკვალა ან ნელი კალევი). აგარების ხილავტერალურ სინქრონულ და სიმეტრიულ ხასიათს.

**მანპაპიბის სინდრომი** - შიშობების სინდრომი - парадоксальная реакция. მანპაპიბის სინდრომი (იხ.) განსხვავდება შიშობების სინდრომიდან და მართადავ ელინდება გულყრათმორის მდგომარეობებში. დამახასიათებელია ფსიქოლოგიური ევალეფისისთვის. გულყრის დროს ტეფრალიზება.

**მანპაპიბის სინდრომი** - შიშობების სინდრომიში მიმდინარეობს - парадоксальная реакция. მანპაპიბის სინდრომი (იხ.) განსხვავდება შიშობების სინდრომიდან და მართადავ ელინდება გულყრათმორის მდგომარეობებში. დამახასიათებელია ფსიქოლოგიური ევალეფისისთვის. გულყრის დროს ტეფრალიზება. მანპაპიბის სინდრომი (იხ.) განსხვავდება შიშობების სინდრომიდან და მართადავ ელინდება გულყრათმორის მდგომარეობებში. დამახასიათებელია ფსიქოლოგიური ევალეფისისთვის. გულყრის დროს ტეფრალიზება.

**ფსიქოზური** - აშლილობების ჟგუვება, რომლებიც მსგავსია რიგი მიმდინარეობის კლინიკური ნიშნებით (ვეყარი დასაწყისი ურდეთის გარე ფეფტორებთან დაკავშირებით; ხანმოკლეობა; მიმდინარეობა ცნობიერების შეუღლებ; გამოსვალა - სრული ან ნაწილობრივი ანებიზია). გ-ში მიეუღებება პათოლოგიური ავექტა. ფსიქოკრებით განპირობებული ცნობიერების ბანდებიური აშლა, პათოლოგიური ძილაიანობის მდგომარეობა, „შოკლ ჩართობს“ რეაქცია (იხ.). პრემორბიდი დიდი მიმდინარეობა აქვს თავის ცანისს გამოხატულ რემილუალურ-ორგანულ ცვლადებებს (მოიბოვა Г.В., 1979), კონტრაკტურ, განსაკუთრებით ევალეფილოგურ წინაგანწყობის, ვეფტორების, რომლებიც დროებით ედლის რეაქციების ნიადაგს ანუ დროებით შექმნილ წინაგანწყობას (Очаков Б.И., 1941) - ასთენია, გამოფიგვა წინამორბედ აგმბეხასთან დაკავშირებით, დამახებლობა, უსილობა. გ-ში ლიდროსტიკა ვეყარება მათ ფსიქოპათოლოგიურ სტრუქტურას და შინილად წარმოადგენს სასამართლო-ფსიქიატრული ევალეფისის ხანგას-ხება ფორმებისგან განსხვავებით, ხანდისებური მდგომარეობა შეიძლება მრავალჯერ განვითარდეს ერთი და იკვე-პირ. შიშობის, რომლებმაც გ-ში მიაღწიეს სამოვადობრივად ხანმოკლე ფეფტორის, ანალიზული არალბერებულ ცვლადებულ გურეფის (Гуревич М.О., 1936) არჩევა გ-ში განსხვავებულ სახეს (очные состояния). ეს არის ცნობიერების აშლა, გი-რო ხანდისებური ცნობიერებისგან განსხვავდება გადატანის შესახებ არა სრული, არამდე ნაწილობრივი ანებიზიით. ცნობიერება შეუქრებელია, მატარებ გარეშო, თუმცა დამახინჯებულად, მანვე აღიქმება. შენარჩუნებულია ნაწილობრივი ორიენტირება დროსა და ადგალი. დამახასიათებელია ფსიქოსენსორული დარღვევა. გ. შეიძლება იყოს ე-ვალეფიური გულყრის ევალეფიური. მის შეუღლებება აურა, რომლის შესახებაც რჩება მოგონება.

**ბანსისპირაპირი დარღვევა უსულ სანქციონს** - нарушение обязательств по условиям договора, гарантирующее получение, რომლის დროსაც გარემო აღიქმება როგორც უსიყოსლო, შეუძარი, არაბუნებრივი ან უცნაური, იღვწაღს, ახლებლით უმოკრო რებონანის დაკარგვა შეიძლება გამოიწვიოს რეალური საშეაროდან მოწყვეტის, მისი გუუსოების, მასთან კავშირის გაწყვეტის გრძობამდე.

**ბანსისპირაპირი ბანსისპირაპირი სანქციონი** - обязательства по условиям договора, гарантирующее получение, რომლის დროსაც გარემო აღიქმება როგორც უსიყოსლო, შეუძარი, არაბუნებრივი ან უცნაური, იღვწაღს, ახლებლით უმოკრო რებონანის დაკარგვა შეიძლება გამოიწვიოს რეალური საშეაროდან მოწყვეტის, მისი გუუსოების, მასთან კავშირის გაწყვეტის გრძობამდე.

**ბანსისპირაპირი** (გერმ. Enthebung der Besetzung) ფსიქოანალიზში: რაიმე წარმოდგენაზე არ წარმოდგენილია რეგულ, საგანზე, ინსტრუქციამდე და ა.შ. წარმოშობილი დატვირთვის მონსი.

**ბანსისპირაპირი რეგულ** - паразитарно-инвазивная терапия (Никольский Ю.С., 1948). ფსიქიკური დაავადებების შეკრნალობის ერთ-ერთი ზოგიდობალიტერატურა შეიქმნა. დამყარებულია ღობირებულ შიმშილზე წყლის გამოყენებით და შემდგომი დიეტური კვებით. ნიკოლაევის აღმდგენი დიეტა შეიქმნა უმარაგებლად რბის პროლეტების და შეტარებულ საკვებს მართლდის რაოდენობის შემცირებით. საკვების ენერგეტიკული ღირებულება და მოცულობა, რომელიც შეიცავს ცილებს, ცხიმებს და ნახშირწყლებს, შიმშილის პერიოდის შემდეგ იზრდება შეკრდა თანდათანობით. ნაწიენებია დუნდე შიმშილარად და შეიქმნა რეგულდინგული ვარაიანის შეგვესმადეარი შიმშიორენის, ეგოგურეორ-რგანული წარმოშობის განსწრძობიებული ნეეროზის და ნეეროზისმადეარი მდგომარეობების დროს (Никольский Ю.С., Полищук Ю.И. Заповь Г.К., 1979).

**ბანსისპირაპირი მადლმადეარო ტიპი** - Гангушанская типология тип реакции (Гангушакян П.В., 1927). ფსიქოგენური ფაქტორების, ცხოვერებისული არასასურველი სიტუაციების შემოქმედებით აღმოყენებული ხანგრძლივი, ხშირად განმეორებითი რეაქციები. ელინდება გარშემოცოთა შიშართ დესფორთული განწყობით, ბოლძანობით, მრბისანებით, სეველით. ეს მდგომარეობანი ატარებს გარდასაღად ხასილის, მოგჯერ გრძიდლება თვეების განმავლობაში. მათ შემდეგ რჩება პარანების პათოლოგური განვითარებაში მადლმადეარი ევითარებათ სხვადასხვა სიძშიებით გამოხატული ეპილეფსიოდური თვისებების მქონე პირებს, რომლებზეც, განუკინის გამოთქმით, დელიფსიოდური წრეა. თუ არ არის ნათლად გამოხატული, მოსალოდნელიაა. ფსიქოგენური ეპიზოდების სახით შეიძლება აღინიშნოს რიგი პათოლოგური პროცესების დროს (ეპილეფსიური ენკეფალიტი, თავის ცვირის დიზანება, ცერებრული ათეროსკლეროზი). სინონ: შიშარტი მადლმადეარო მდგომარეობა, მადლმადეარო ტიპი.

**ბანსისპირაპირი მდგომარეობის შემოქმედების დინამიკა** - Гангушанская типология динамики психопатии (Гангушакян П.В., 1933). სახატობრევი კრბსებების გარდა განუკინი არჩეულა ფსიქოპათიის დინამიკის შემდეგ ფსიქიკურ ვარიანტებს: 1) შეუმწეველი გარემო მიზეზით აღმოყენებული ფაზები (მაგ, ცოლოდური); 2) რეაქციები ფსიქოგენური ან სობრეგენური (შიშორენი, ეპილეფსიოდური, ცოლოდური); 3) პათოლოგური განვითარება (ასინკური, ოსტესიური ეპილეფსიონებები, იმპულსური ქვეყნის განვითარება, პარანობი). ფსიქოპათიის დინამიკის კინიკური ფორმები შიმშილარობით და განზავალით განსხვავდება პროგრადინგული ფსიქოპათიისაგან. განუკინი მიუთითებდა კონსტიტუციური წინაინწყობის და ფსიქოგენური შინაარსის როლზე, ამით ეფი ხსნიდა განსხვავებულ ტიპებში ფსიქოპათიის მტავის კლასიკური სურათის არსებობას და რეაქციის განსხვავებულ ფორმების ურთი და იგივე ფსიქოპათიურ პარონებაში ფსიქოგენურ მომენტებთან დაკავშირებით.

**ბანსისპირაპირი ლატენტური შემოქმედების** - Гангушанская латентная психопатия (Гангушакян П.В., 1933). იხ. შემოქმედების ლატენტური.

**ბანსისპირაპირი ტრიპარტიტი** - Гангушанская-Кершикова триада критериев психопатии (Гангушакян П.В., 1933; Кершиков О.В., 1961). 1) პარონების პათოლოგური თვისებების განზავლება სოციოდური ადამტავის ადრეუამდე; 2) მათი შედარებით სებაღურობა, ნაკლებად შექცევაობა; 3) პარონების პათოლოგური ხანების გოგალრობა, რომელიც განსაზღვრავს მთელ ფსიქიკურ სახეს.

**ბანსისპირაპირი ფსიქოლოგია** - 1) სუბიექტის მიერ განყვლილი ნებისმიერი ფსიქიკური შედეგად მდგომარეობა და მოვლენა, რომელიც უშეაღიდა წარმოდგენილი მის ცნობიერებაში და მასთვის წარმოადგენს საკუთარი ცხოვერების ეპიზობი; 2) მისწრაფების, სურვილის და ტენდენციის არსებობა, რომელიც ირდელუვად ცნობიერებაში წარმოადგენს სუბიექტის მიერ მისი მოქმედების მოტივების და შინების ამორევის პროცესს; 3) აქტივობის ფორმა, რომელიც აღმოყენდება სუბიექტის მიერ მისი ცხოვერების წამყვანი მოტივების მიქვეყნობის, იდელების და ფსიქოლოგიათა მსხვირების დროს და ელინდება მისი ფსიქოლოგური საყაროს გარდაცვლა, საკუთარი არსებობის გააგრძობით. გ.ს. ასასიათებს სუბიექტრობა, მთლიანობა, დინამიკა, შემყენებითი ბუნება (აღება, წარმოდგენა, აზრი). გ. ასასიეს სუბიექტური სინამდვილის მოვლენას და წარმოადგენს სუბიექტის მდგომარეობას.

**ბანსისპირაპირი უსაბოლო** - ანგელოზი შიშარტი გოგეული მოქმედებისათვის. არსებობს გ-ის განსხვავებული ცნებები: მოტორული გ. - გელისბობის აღმანის მოგორული სისტემების შიშარტი მოქმედებისათვის; ფსიქიკური გ. - ცნობიერების შიშარტი ამა თუ ამ ფსიქიკური პროცესისათვის; სოციოდური გ. - აღმანების გარკვეულ დამოკიდებულებას სოციოდურ ღირებულებათა შიშართ, რის გამოც განსხვავებულა მათი სოციოდური აქტივობაც. გ. განპირობებულია პარონების გამოყენებით და მის ქვეყას აძლევს სათანადო შიშართულებას. გ. უსაბოლო განწყობის ცნებაში იგულისხმება სნიდოლის 'აწყობა' ყოველგვარი აქტიურის განსაზღვრელებლად. იხ. უსაბოლო (შიშართ) მანუშის. შიშართრობა მანუშის.

**ბანსისპირაპირი ბრძობა** - мучительная борьба, მდგომარეობის ცლილება მუთის, დაბნეულობის, დაუძვეული უსაბოლო შიშის, შესაძლო საფრთხის წინააღმდეგობის არსებობით. წინ უსწრებს ბოლეს კრისტალიზაციის (იხ. ბრძობის მინიმალური ტიპი). ცნება აღეკავრება 'ტრუმბის', კონრაბის (Coarctat, O., 1918) მიხედვით; ხასიათდება უსაბოლო შიშის, იგივე ავლემოების და გარე სინამდვილის ცვლილებების გრძობით. იხ. ბრძობის ტიპი, ბრძობის მინიმალური ტიპი, ბრძობის უსაბოლო შიშართრობა. მანუშის. შიშართრობა მანუშის.

**ბანსისპირაპირი უსაბოლო** - мучительная борьба, მდგომარეობის ცლილება მუთის, დაბნეულობის, დაუძვეული უსაბოლო შიშის, შესაძლო საფრთხის წინააღმდეგობის არსებობით. წინ უსწრებს ბოლეს კრისტალიზაციის (იხ. ბრძობის მინიმალური ტიპი). ცნება აღეკავრება 'ტრუმბის', კონრაბის (Coarctat, O., 1918) მიხედვით; ხასიათდება უსაბოლო შიშის, იგივე ავლემოების და გარე სინამდვილის ცვლილებების გრძობით. იხ. ბრძობის ტიპი, ბრძობის მინიმალური ტიპი, ბრძობის უსაბოლო შიშართრობა. მანუშის. შიშართრობა მანუშის.

ევილებით, საწყაროსგან გამოყოფით, განდევნებით, დეპერსონალიზაციის, არაიშვითად აღრევალიზაციის მოვლებით. ავადმყოფის რეცედივ მოხდარ მოვლებებზე ბუნებრივი აუტოტური რეაქციების დაკარგვით.

**ბარბაზა შესმპაპრმ** - *доинфекционная* ავადმყოფის ზაროვნება გაციოვება, მისი გარეგნობა, საკუთარი პიროვნება ავადმყოფის მიერ აღიქვება როგორც გაციოვებული, დაკვირვების ობიექტი. მასვე მიეკუთვნება: ორგულის პათოლოგიის ზღვდა; ანთივადმყოფობა; ორმაგი ორიენტირება ბოლის მოციუნება ფორმის და ცნობიერების სათოლოვის დროს; ორმაგი ციფრება, რეალურ და ფანტასტიკურ საწყაროებზე; ბოლის მოციუნება ფორმა, მავ, მანქანის ბოლი; ორმაგი აჩრუვება, რომლის დროსაც ერთდროულად მიზნინარობს ახრთა ორი რიგი - რეალური და ავტისტური, დერეისტული (მომოგრენიის, ასთენიის დროს, ჯანმრთულ პირებში სიმშრის დროს). მასვე მიეკუთვნება ორმაგი, ალტერნატიული ცნობიერება, რომელიც აღინიშნება პიანოზური მდგომარეობებში და ისტერიის დროს; პერიოდულად ხდება „სიომბალიზმი“ ცნობიერების „გადართვა“ და მისი შევება სხვა აგრებით, ცრმბობებით, განხიზთით. თითქოს იქნება ორი პარალელური პიროვნება, რომლებიც ერთარდებიან დროის და სივრცის განსხვავებულ სიტემებში. პიროვნების ალტერნატიული (ორმაგი «შე») გაციოვება შენარჩუნებულია პიანოზური მთავროების ან ისტერიულად ბინდისებური მდგომარეობის შემდეგ.

**ბარბაზაპლი მარბიპლმპაპაპა** - *доинфекционное отравление* (გერმ. Doppelblindung) (Botesson G., 1956; Hirsch S.R., 1979). მკაცვების არააღუეკავარი გამოყენება მიზნორენით დაბადებულია მშობლების მიერ, რაც იწვევს შინაგან ვიქუიკურ კონფლიქტს და ოპიკში ურთიერთობის დაპარმონიას. ავადმყოფი ბავშვები დაბარბაპლი მისივე მიმარულია ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო და ურთიერთგამომრიცხავი სტიმული. იქმნება კომპენსაციური უპრობა. ეს ურთიერთსაწინააღმდეგო სტიმული შეიძლება ეკუთვნოდეს არა ერთ, არამედ რამდენიმე მოსახლეობას; მავ, დაღებით სტიმული შეიძლება დღის მკაცვებება, გარყოფის - მამისა (Lempp R., 1988). ასეთი «გარბაპლი» სიტუაციას განხილდება როგორც მიზნორენოგენური. ამავე დროს არ არის გამორიცხული, რომ იგი იყოს ლატენტური მიზნორენის გამოვლინება ავადმყოფის ნათესაებებში.

**ბარბაპლიპლი** - *гиперпатия* (გრანგ. *gengopathie* - წყალსაღნი მღვლების განტოვება ქიმიკების რელიეფური გამოსახულებით) (Hurler G., 1919). იშვითი გენეტიკური დაბადება ვადაცემის ავტოსომურ - რეცესიული ტიპით. ვლინდება პეპოლოდაქარიადების ევლის მომდით. ძირითადი ნიშნება - ჭკუასახლობა, ქონდროსტეგოლისტროფია, ჰუპოსისტროფიკობა, რქოვანის ურთივრება. ტიპურია დიდი თავი, სახის ნაწილის სიბინრე, ჭკუა გარი, შშარდი სირბავე სინან. *პარბაპლი მარბაპლი, ჰარბი მარბ-ის მარბაპლი* (პარბაპლი აღმარბი პარბაპლი სახალი), ბრაპოპლი მარბაპლი, მარბაპლი მარბაპლი (Pfaundler M.).

**ბარბაპლიპლი სინდრომები** - *переходные синдромы* (Wlcek H.H., 1956). საბტიკობა კომპლექსი, აღინიშნება მწკვე ევბოგენური ტიპის რეაქციების მიზნინარობაში და აქვს პროგნოზული მნიშვნელობა. უკონაცს შუალედური მდგომარეობა მწკვე ევბოგენურ რეაქციებსა და ორგანულ ფსიქოსინდრომს ან ფიკის მიხედვით, ორგანულ აღუქვსინდრომს შორის არჩევენ ზღვ-ის 4 ფორმას (რეგისტირ): 1) ხსიათდება სურვილების ევლდეგობით; 2) აუტოტური (ასთენური, ანქსიოზურ-დერეისტული, დეპრესიული); 3) მშოგრენისმავარი პალეინაიკურ-პარანოიდული; 4) ანენიური კონსაკოკისა. **შტერნეზტრა** (Штернерг Э. Я., 1969) ორგანულ რეგისტრს აკუთვნება აპათურ-ახუელური, ევფორიულ, ფსელაპარანოზურ, ფრასამიურ-კონსახუალაიკურ და კონსაკოკის სინდრომებს. საბიპის მიხედვით გ. ზიოვამ შუბუქ საშუალ და მამად (იხ. მამარბ ტარბი). აუტოტური რეგისტრის გ. ზს აქვს კლინიკამდელი პროგნოზული მნიშვნელობა მაშინ, როცა ორგანული გენების გ. ზ მოქმობს პროცესის გადასვლის გენდენციას ორგანული ფსიქოსინდრომის (დუქვსინდრომის) სტადიაში დუქვსიკის ჩამოყაღებებით.

**ბარბაპლი ზემოთმარბის ბრბინდრომი** - *полсихиномомический синдром* იხ. *სინდრომი ბარბაპლი ზემოთმარბის*.

**ბარბაპლი მარბაპლი** - *мрачная идеяшная* ფსიქოლოგიური თაღადცემი ერთ-ერთი მექანიზმი, ხსიათდება განსაზღვრული აზრების, გრანობების, ქვეყნის გამოყოფით სუბიექტის პარონებისაგან. ამ მექანიზმის წყალბობით, აღმანის შეიძლება არ შეიძლება განუღამ ქვეყნის ნაღვისა, რომელიც ეწინააღმდეგება ქვეყნის სამოგადე მღვბულ ნორმებს. გ. თან ახლობ სეპარაციის მექანიზმი (ლათ. *separatio* - განუალკეება, გამოყოფა) - აღმანის უნარი, გარედან შეხედოს სიტუაციას, რამით თვითონ მონაწილეობს. ასეთი სეპარაციის მავალითა სიმშვიდის შენარჩუნება, გარეგანი გარბრებლობა კატასტროფების დროს, ევსტრემალურ სიტუაციებში.

**ბარბაპლი სინდრომი** - *мрачная идеяшная идея* იხ. *შარბაპლი ზემოთმარბი რეპარბი*.

**ბარბაპლი სინდრომი მარბაპლი** - *Гаркши синдром отчуждения личности* (Гаркши И.Л., 1945). აღინიშნება ციკლოპარალიზ (ციკლოპიოური) დებრეშობის დროს და ხსიათდება ვიკალური გრანობის აღქმის უკონობით (მომშობის, წყურვილის გრანობის დაკარგვა, ავადმყოფი ვერ ნაყრდება მიხედვად იმისა, რომ ხევის ჭამს, კეების მოთონილიებას არაჩსებობა). ვიკალური გრანობის გაციულობა განიხილება როგორც დერეისტროფული დარბრებობის გამოვლინება და ხშირად გვხვდება დეპერსონალიზაციის და დერეინაზიკის მოვლებთან ერთად, შეიძლება იყოს ნიპალისტური ხსიათის ბოღვითი აზრების აღმოცენების წყარო. *შომბაპლი პანმარბი* (იხ) ვარიატი.

**ბარბაპლი მარბაპლი** - *разрватные действия*. ბერვერსიული ტიპის სექსუალური ხსიათის ქმელობები შეარეწლიანებისა და არასრულწლოვანების მიმართ. ამ ფაქტის კონსტატაცია განაპირობებს სასამართლო ფსიქოგაროლი ექსპერტიზის ჩატარების საჭიროებას.

**ბარბაპლი სარბიპლი** - *Гасто шидом* (Gastaut H., 1954). იხ. *შარბაპლი ზემოთმარბი ზემოთმარბი*.

**ბარბაპლი სინდრომი** - *Гасто синдром* (Gastaut H., 1957). ე. წ. ბავშვთა ევლდეგობის დინეევალური ფსიქოპოლოგურული ფორმა (ავდმბრევი სრუნრეითი შეგებები, აურა, ცნობიერების დარღვევა, ჰემიპლეგია, შიმის გრანობა, წოეთი მოძრაობები).

**ბარბაპლი მარბაპლი** - *исчуждение* (გერმ. *Perversion*). ფსიქოანალიზში: 1. «ნორმალური» სექსუალური აქტიდან ვიკალბა, მიმართული საპინასპორ სქესის წარმომადგენელთან არაგენეტიკურ კონტაქტით სერგამის მისაღწევად 2. როცა ორგანში მ იღწევა სხვა სექსუალური ობიექტების საშუალებით (პროსტრუქსუალიზმი, პედოფილია, მოთოღობა და სხვა) ან სხუელის სხვა ნაწილებით (მავ, ანაღური ორგანში), ან როცა ორგანში დამოკიდებულია გარე ფაქტორებზე

(უფემინიზმი, გრანსეგვიზმი, ევატიზმი, ექსისიციონიზმი, საღიმი-მამიზმი). 3. გაუკუღმართება იგულისხმება ფსიქოგენური ქვევის ჩამოყალიბებული ფორმა, რომლის საშუალებითაც მიიღწევა სექსუალური დაქმავილება. **გაუკუღმართება ზემოწინებში** - *inversio sexualis* (იხ. *ქიმიკა*).

**გაუკუღმართება ინსტინქტებისა** - *inversio instinctuum* (ლათ. *perversio instinctuum*). აღამიანის ინსტიქტური მოთხოვნების პათოლოგიური დარღვევა (თვითგადარჩენის, სქესობრივი, კვების და სხვ). თან ახლავს შარი დაქმავილეულების არაბუნებრივი ფორმა.

**გაუკუღმართება სექსუალური** - *inversio sexualis* (სექსუალური პერვერსიები). სექსუალური პათოლოგია, როცა სექსუალური აგნება, დაქმავილება მიიღწევა მხოლოდ არაბუნებრივი გზით ან ღამბეჭვით გამოსინახებულთან ერთად. ს.გ. გვხვდება ფსიქოპათიურ და ფსიქოპათიზებული პირებში, სქესობრივი იმიტაციის, აგრეთვე ღრმა ღმერთის ან ნებით სქესოს დარღვევების დროს, როგორც ფსიქოზის შედეგი, იშვიათ შემთხვევებში ვითარდება კომპენსაციურად ბუნებრივი სქესობრივი ურთიერთობის დროს (მაგ. ონანიზმი).

**გაუკუღმართება ძილისა** - *inversio somni*. ძილის და ღვიძლის ნორმალური რითმის დარღვევა, უძილობა ღამის საათებში და ძილიანობა ღამის. სინონ.: *ინვერსია ძილისა*.

**გაუბატონებლობა** - *incontinentia micturitionis*, მინარტლი სექსუალური საშუალებებით მეორე პირის მეურავსულის ან ძალადობის მიზნით. გ-ად ითვლება სასქესო ასოს შეყვანა მსხვერპლის ეულეში, ამ დროს არ არის სავალდებულო ერექცია და ეაკულაცია. ნაძალადევი ფუნქცია და სასქესო ასოს ანუსში შეყვანა განიხილება როგორც *სოფობია*.

**გაუბატონების შერეული შემთხვევები** - *Guaym-Mayer'sche Mischformen* (Guaym R., Mayer F., 1926). იხ. *შემთხვევები შერეული*.

**გაუბატონება** - *incontinentia*. სუბიექტის მიერ სხვა ინდივიდებისადმი და სოციალური ჯგუფებისადმი დამოკიდებულების ისეთი შედეგა, როცა ისინი მისთვის მიუღებელი ხდება. გ. გამოუღიანება განკერძობით, განმარტობით, განკოცებით, "გ-ს" დაკარგვით და ა.შ.

**გაუბატონება შრატონებისა** - *incontinentia micturitionis* ფსიქიკური ატრომატიზმის გამოვლენა. ავადმყოფი განიცდის საკუთარ ემოციებზე კონტროლის დაკარგვას გრძნობას, ემოციები თითქოს აღმოუქვდება და ქრება გარეშე გემოქმედების შედეგად. სინონ.: *გაუბატონება შერეული*.

**გაუბატონება შერეული** - *incontinentia micturitionis* იხ. *გაუბატონება შრატონებისა*.

**გაუბატონება ჰალუცინაციური მანიფესტაცია** - *incontinentia micturitionis hallucinatio* (ლათ. *incontinentia micturitionis hallucinatio*). აზრის წარმოქმნა ან ქმედობა ხდება დეპრესიის პრეკუიით ახლომდებარე (იხ. *ქიმიკა*) კარტონისა და ბოლდითი შოკიებით (დერეგულირებული ბოლდით განსვება ავადმყოფის მიერ ერეკლეება მისი ოჯახის წევრებზე, ახლობლებზე). **"გაუბატონება" სინდრომი** - *incontinentia micturitionis* იხ. *Steal-syndrome*.

**გაუბატონება ჰალუცინაციური** - *incontinentia micturitionis hallucinatio* (ლათ. *incontinentia micturitionis hallucinatio*). აზრის წარმოქმნა ან ქმედობა ხდება დეპრესიის პრეკუიით ახლომდებარე (იხ. *ქიმიკა*) კარტონისა და ბოლდითი შოკიებით (დერეგულირებული ბოლდით განსვება ავადმყოფის მიერ ერეკლეება მისი ოჯახის წევრებზე, ახლობლებზე). **"გაუბატონება" სინდრომი** - *incontinentia micturitionis* იხ. *Steal-syndrome*.

**გაუბატონება ჰალუცინაციური** - *incontinentia micturitionis hallucinatio* (ლათ. *incontinentia micturitionis hallucinatio*). აზრის წარმოქმნა ან ქმედობა ხდება დეპრესიის პრეკუიით ახლომდებარე (იხ. *ქიმიკა*) კარტონისა და ბოლდითი შოკიებით (დერეგულირებული ბოლდით განსვება ავადმყოფის მიერ ერეკლეება მისი ოჯახის წევრებზე, ახლობლებზე). **"გაუბატონება" სინდრომი** - *incontinentia micturitionis* იხ. *Steal-syndrome*.

**გაუბატონება ჰალუცინაციური** - *incontinentia micturitionis hallucinatio* (ლათ. *incontinentia micturitionis hallucinatio*). აზრის წარმოქმნა ან ქმედობა ხდება დეპრესიის პრეკუიით ახლომდებარე (იხ. *ქიმიკა*) კარტონისა და ბოლდითი შოკიებით (დერეგულირებული ბოლდით განსვება ავადმყოფის მიერ ერეკლეება მისი ოჯახის წევრებზე, ახლობლებზე). **"გაუბატონება" სინდრომი** - *incontinentia micturitionis* იხ. *Steal-syndrome*.

**გაუბატონება ჰალუცინაციური** - *incontinentia micturitionis hallucinatio* (ლათ. *incontinentia micturitionis hallucinatio*). აზრის წარმოქმნა ან ქმედობა ხდება დეპრესიის პრეკუიით ახლომდებარე (იხ. *ქიმიკა*) კარტონისა და ბოლდითი შოკიებით (დერეგულირებული ბოლდით განსვება ავადმყოფის მიერ ერეკლეება მისი ოჯახის წევრებზე, ახლობლებზე). **"გაუბატონება" სინდრომი** - *incontinentia micturitionis* იხ. *Steal-syndrome*.

**გაუბატონება ჰალუცინაციური** - *incontinentia micturitionis hallucinatio* (ლათ. *incontinentia micturitionis hallucinatio*). აზრის წარმოქმნა ან ქმედობა ხდება დეპრესიის პრეკუიით ახლომდებარე (იხ. *ქიმიკა*) კარტონისა და ბოლდითი შოკიებით (დერეგულირებული ბოლდით განსვება ავადმყოფის მიერ ერეკლეება მისი ოჯახის წევრებზე, ახლობლებზე). **"გაუბატონება" სინდრომი** - *incontinentia micturitionis* იხ. *Steal-syndrome*.

**გაუბატონება ჰალუცინაციური** - *incontinentia micturitionis hallucinatio* (ლათ. *incontinentia micturitionis hallucinatio*). აზრის წარმოქმნა ან ქმედობა ხდება დეპრესიის პრეკუიით ახლომდებარე (იხ. *ქიმიკა*) კარტონისა და ბოლდითი შოკიებით (დერეგულირებული ბოლდით განსვება ავადმყოფის მიერ ერეკლეება მისი ოჯახის წევრებზე, ახლობლებზე). **"გაუბატონება" სინდრომი** - *incontinentia micturitionis* იხ. *Steal-syndrome*.

**გაუბატონება ჰალუცინაციური** - *incontinentia micturitionis hallucinatio* (ლათ. *incontinentia micturitionis hallucinatio*). აზრის წარმოქმნა ან ქმედობა ხდება დეპრესიის პრეკუიით ახლომდებარე (იხ. *ქიმიკა*) კარტონისა და ბოლდითი შოკიებით (დერეგულირებული ბოლდით განსვება ავადმყოფის მიერ ერეკლეება მისი ოჯახის წევრებზე, ახლობლებზე). **"გაუბატონება" სინდრომი** - *incontinentia micturitionis* იხ. *Steal-syndrome*.

**გაუბატონება ჰალუცინაციური** - *incontinentia micturitionis hallucinatio* (ლათ. *incontinentia micturitionis hallucinatio*). აზრის წარმოქმნა ან ქმედობა ხდება დეპრესიის პრეკუიით ახლომდებარე (იხ. *ქიმიკა*) კარტონისა და ბოლდითი შოკიებით (დერეგულირებული ბოლდით განსვება ავადმყოფის მიერ ერეკლეება მისი ოჯახის წევრებზე, ახლობლებზე). **"გაუბატონება" სინდრომი** - *incontinentia micturitionis* იხ. *Steal-syndrome*.

**გაუბატონება ჰალუცინაციური** - *incontinentia micturitionis hallucinatio* (ლათ. *incontinentia micturitionis hallucinatio*). აზრის წარმოქმნა ან ქმედობა ხდება დეპრესიის პრეკუიით ახლომდებარე (იხ. *ქიმიკა*) კარტონისა და ბოლდითი შოკიებით (დერეგულირებული ბოლდით განსვება ავადმყოფის მიერ ერეკლეება მისი ოჯახის წევრებზე, ახლობლებზე). **"გაუბატონება" სინდრომი** - *incontinentia micturitionis* იხ. *Steal-syndrome*.

**გენალ-რეზერვი შინე** - *генерал-резерв* (ბერძ. *genealogia* - საგვარეულო ნუსხა). მეშვიდე რეზერვში არსებული ფსიქიკური ან სხვა დაავადების ან პიროვნული ცვაზების არსებობის მონაცემების კომპლექსი.

**გენალ-რეზერვი** - *генерал-резерв* (ლათ. *generalis* - ზოგადი, მთავარი). რაიმე პათოლოგიური პროცესის ორგანიზმში გავრცელება პირველად ორგანული კერისა და მისი გავრცელებული მიმდინარეობა კეროვანი, ფოკალურიდან განსხვავებით. მაგ., ეპილექსიური გულყრა შობილება იყოს ფოკალური და გენერალიზებული.

**გენალური სისტემატიკა** - *генеральная систематика* (ბერძ. *geneiatis* - წარმოშობისა და დაკავშირებული). სამედიცინო განვითარების დარგი, მისი წარმოშობის ფსიქიკური დაავადებების მეშვიდე რეზერვითობის კანონზომიერებას და შიშობილებას აქვს ფსიქიკური დაავადებების ეტიოლოგიის, სისტემიკის, დაგნოსტიკის, მკურნალობის, პროგნოზის, ავლემოვობა რეაბილიტაციის მეთოდების შესასწავლად. არკვევს მეშვიდე რეზერვში, გარე ფაქტორების და მათი ურთიერთქმედების როლს. გამოკვლევის ძირითადი მეთოდები - კლინიკური-გენეალოგიური, ტყუპების, ნაშვილები ბავშვების შესწავლა, ნახეგარახისებებ შედარების მეთოდი, ჰოპოლაიფორია ციტოგენეტიკური.

**გენიტალური შინე** - *генитальный шис* გენების კომპლექსი, ურთიერთქმედებს იმ გენთან, რომელიც აკონტროლებს ასა თუ იმ ნივთს, ამით გავლენას ახდენს ამ ნივთის რეალიზაციის შესაძლებლობაზე.

**გენი** - *ген* (ბერძ. *genos* - წარმოშობა). მეშვიდე რეზერვის სტრუქტურული და ფუნქციური ერთეული, მეშვიდე რეზერვითი ინფორმაციის ერთეული. აკონტროლებს სპეციფიკური ნივთის შექმნას. წარმოადგენს დემოსტრირიზაციის ან რეინტეგრაციის მექანიზმის მოლეკულის ნაწილს.

**გენალ-რეზერვი** - *генеральная резерва* (ლათ. *genius* - სული). როგორც ინტელექტუალური, ასევე სპეციფიკური ნივთის განვითარების მოლეკული დონე. გ-ზე შესაძლებელია დაპირაკი მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როცა პიროვნება შემოქმედებით მოღვაწეობს ან აქვს ისეთ შედეგებს, რომ ქმნის ეპოქის სამოგალობის ცხოვრებაში, ეკლერის განვითარებაში.

**გენიტალური სისტემატიკა** - *генитальная систематика* (გერმ. *genitale Liehe*). ფსიქიკალურ-გენეალოგიური, ტყუპების, ნაშვილების სიყვარულს, რომელსაც სუბიექტი აქვს თავისი ფსიქოსტრუქტურული განვითარების მწვერვალზე ანუ მიღის არა მარტო გენეალოგიური სტრუქტურა, არამედ გადასახადის თანამართლის კომპლექსობა.

**გენიტალური შინე** - *генитальный шис* (ბერძ. *genos* - წარმოშობა, *typus* - სახეობა) (*Генетика* W. E. 1926). ორგანიზმის შემოქმედებაში ფაქტორების ერთობლიობა, გარემოსთან ურთიერთობით განპირობებული ნივთების (ბ.) წარმოქმნას. გ-ზე მკვლევარებ ვერტიკალურად მისი გამოვლენის მიხედვით. გ-ს შესწავლა შიშობილებების სამედიცინო-გენეტიკური სიმულაციებისათვის მგ., შიშობილებით დაავადების რისკ-სხვა ფაქტორებთან ერთად აღმოაჩინებულია მშობლების გენეტიკის მსგავსებაში (*Генетика* В. 1989).

**გენიტალური შინე** - *генитальный шис* (ლათ. *genus* - სახეობა). სახეობის ან პოპულაციის გენთა ერთობლიობა ორგანიზმების მოყვებული კატეგორიისთვის დამახასიათებელი მუცაქების სისტემა.

**გენიტალური შინე** - *генитальный шис* (ლათ. *genus* - სახეობა). მშობლების ცალკეული ჯგუფების განადგურება რასობრივი, ეროვნული, ეთნიკური ან რელიგიური ნივთის მიხედვით. გ-ს შექმენება აღამანდაც განადგურება ფსიქოლოგიური ექსტრემიზმის პრინციპების მიხედვით (სულით ავადმყოფობა განადგურება გენეტიკისა და რეალიზაციის გერმანიისა და რეალიზაციის გერმანიის). წარმოადგენს უმძიმეს დანაშაულს კაცობრიობის წინაშე.

**გენიტალური შინე** - *генитальный шис* (ლათ. *genus* - თანდაყოლილი, ბუნებრივი, ნამდვილი). გერმანიის გამოყენება პირველად აღმოაჩინებული ფსიქიკური პროცესების აღსანიშნავად. მაგ., რიგი მეშვიდე რეზერვის შიშის ეს ნივთი ამორჩეულია გენეტიკური (ჰემოფილია) და სიმპტომური ცალკეულის განადგურება.

**გენიტალური შინე** - *генитальный шис* (ბერძ. *gen* - დედამიწა). ლგოლეს-დარღვევა **გენეტიკის** (ბ.) ფორმით. აღინიშნება ხანმოკლე დაძლეული შედეგების სახით.

**გენიტალური შინე** - *генитальный шис* (*Heusinger*, 1852). ცხოვრებისა და ლგოლეს დარღვევა, აღინიშნება შიშის ჰემის მოთხოვნილებით. აღინიშნება ფსიქოპათიის, შიშობილების, ცხოვრებული დარღვევის დროს. სინონ.: **გენეტიკის** **სისტემატიკა**.

**გენიტალური შინე** - *генитальный шис* (ბერძ. *genos* - ზოგადი, *typus* - მუცაქების) მეშვიდე რეზერვის მოხუცებულობით ასაკის დაავადებებს, მათ დაგნოსტიკის, მიმდინარეობის თავისებურების, მკურნალობის, სოციალური რეაბილიტაციის მეთოდებს. გ-ს საგნად წარმოადგენს როგორც აღრუდ ასაკში აღმოაჩინებული, ასევე სპეციფიკური გერონტოლოგიური დაავადებები. გ-ის ნაწილად **გენეტიკის** **სისტემატიკა** (ბ.).

**გენიტალური შინე** - *генитальный шис* (ბერძ. *genos* - თანდაყოლილი, ბუნებრივი, ნამდვილი). გერმანიის გამოყენება პირველად აღმოაჩინებული ფსიქიკური პროცესების აღსანიშნავად. მაგ., რიგი მეშვიდე რეზერვის შიშის ეს ნივთი ამორჩეულია გენეტიკური (ჰემოფილია) და სიმპტომური ცალკეულის განადგურება.

**გენიტალური შინე** - *генитальный шис* (ლათ. *genus* - თანდაყოლილი, ბუნებრივი, ნამდვილი). გერმანიის გამოყენება პირველად აღმოაჩინებული ფსიქიკური პროცესების აღსანიშნავად. მაგ., რიგი მეშვიდე რეზერვის შიშის ეს ნივთი ამორჩეულია გენეტიკური (ჰემოფილია) და სიმპტომური ცალკეულის განადგურება.

**გენიტალური შინე** - *генитальный шис* (ბერძ. *genos* - ზოგადი, *typus* - მუცაქების) მეშვიდე რეზერვის მოხუცებულობით ასაკის დაავადებებს, მათ დაგნოსტიკის, მიმდინარეობის თავისებურების, მკურნალობის, სოციალური რეაბილიტაციის მეთოდებს. გ-ს საგნად წარმოადგენს როგორც აღრუდ ასაკში აღმოაჩინებული, ასევე სპეციფიკური გერონტოლოგიური დაავადებები. გ-ის ნაწილად **გენეტიკის** **სისტემატიკა** (ბ.).

**გენიტალური შინე** - *генитальный шис* (ლათ. *genus* - თანდაყოლილი, ბუნებრივი, ნამდვილი). გერმანიის გამოყენება პირველად აღმოაჩინებული ფსიქიკური პროცესების აღსანიშნავად. მაგ., რიგი მეშვიდე რეზერვის შიშის ეს ნივთი ამორჩეულია გენეტიკური (ჰემოფილია) და სიმპტომური ცალკეულის განადგურება.

**გენიტალური შინე** - *генитальный шис* (ბერძ. *genos* - ზოგადი, *typus* - მუცაქების) მეშვიდე რეზერვის მოხუცებულობით ასაკის დაავადებებს, მათ დაგნოსტიკის, მიმდინარეობის თავისებურების, მკურნალობის, სოციალური რეაბილიტაციის მეთოდებს. გ-ს საგნად წარმოადგენს როგორც აღრუდ ასაკში აღმოაჩინებული, ასევე სპეციფიკური გერონტოლოგიური დაავადებები. გ-ის ნაწილად **გენეტიკის** **სისტემატიკა** (ბ.).

**გენიტალური შინე** - *генитальный шис* (ლათ. *genus* - თანდაყოლილი, ბუნებრივი, ნამდვილი). გერმანიის გამოყენება პირველად აღმოაჩინებული ფსიქიკური პროცესების აღსანიშნავად. მაგ., რიგი მეშვიდე რეზერვის შიშის ეს ნივთი ამორჩეულია გენეტიკური (ჰემოფილია) და სიმპტომური ცალკეულის განადგურება.

**გენიტალური შინე** - *генитальный шис* (ბერძ. *genos* - ზოგადი, *typus* - მუცაქების) მეშვიდე რეზერვის მოხუცებულობით ასაკის დაავადებებს, მათ დაგნოსტიკის, მიმდინარეობის თავისებურების, მკურნალობის, სოციალური რეაბილიტაციის მეთოდებს. გ-ს საგნად წარმოადგენს როგორც აღრუდ ასაკში აღმოაჩინებული, ასევე სპეციფიკური გერონტოლოგიური დაავადებები. გ-ის ნაწილად **გენეტიკის** **სისტემატიკა** (ბ.).



**ბიკრის სინდრომი** პეპს - Гроу с синдромом ПЭМА (Graud P., 1935). იხ. **სინდრომი პეპს**.

**ბლანზონის სინდრომი** - Глязоу синдром. ცნობიერებას შეცვლის განსხვავებული სიკვდილი. გამოიყენება ძირითადად ნევროლოგიური პათოლოგიის დროს. სამხრეთს ცნობიერებას შეცვლის სიღრმეს 15 ქულიანი სისტემით: ა) **თავი** - ნებისმიერი 4 ქულა, მიმართულ შეცვლებებზე 3, მტკივნეულ გალიზიანებაზე 2, არ არის. ბ) **სიტყვიერი** პასუხი: სრულად ორიენტირებული - 5, აბნეული შეცვლება - 4, გაუგებარი სიტყვები - 3, დაზნაწევრებული ბგერები - 2, შეცვლებების არარსებობა - 1. ც) **პირბაზოლი** რეაქციები: ინსტრუქციებს ასრულებს - 5, მიზანდასახული მტკივნეულ გალიზიანებაზე - 5, არამიზანდასახული მტკივნეულ გალიზიანებაზე - 4, გონური მოხრა მტკივნეულ გალიზიანებაზე - 3, გონური გამლა მტკივნეულ გალიზიანებაზე - 2, მოძრაობითი რეაქციები არ არის - 1. ქულების შეგრძობით ისამიღრება ცნობიერების ცვლილებების სიღრმე გრაფიკული ცერმინოლოგიით: 15 ქულა შესაბამება ნათელ ცნობიერებაზე, 13-14 - გაბრუნებას, 9-12 - სომორს, 4-8 - კომას, 3 ქულა - ღრმა კომატოზურ მდგომარეობას ან ტვინის შეცვლას.

**ბლანზონის სინდრომი აღმართის ბაქტერიოზისა** - Глязоу синдром повторности достриптий (Глязоу В.А., 1946). იხ. **სინდრომი აღმართის ბაქტერიოზისა**.

**ბლმირიოზი** - гликрозия იხ. **ბლმირიოზი**.

**ბლინსკი-სიმონსის დაპავლება** - Глинск-Симонда блезна იხ. **დაპავლება ბლინსკი-სიმონსისა**.

**ბლინსკი-სიმონსის დაპავლება** - глинск-симонда блезна იხ. **დაპავლება ბლინსკი-სიმონსისა**. გლინსკი-სიმონსის (ბერძ. glykos - შვებავი, eides - შვებავი) (Minkowska F., 1923, 1935). ეპიდემიოლოგიური კონსტიტუციური წინადაწყობა, განხილვება როგორც გენეტიური ეპილეფსიის განვითარების აუცილებელი პირობა. ხანგასმულად შეკვიდრებითი ფაქტორების ფსიქიკური (აფექტის ინტერგულობა, უმოძრაობა, გრაფიკების კონსტრუქციონი) და სომატური (ათლეტიკური აღნაგობა) თავისებურებების მნიშვნელობა. სინდრომი **ბლინსკი-სიმონსისა**, **პილესტრისა**, **მინსტრისა** ეპილეფსიოდური, კონსტიტუციური მატარებელია - გლინსკი (ბერძ. glosa-ენა, lalia-შვებავი). შეტყუვლებს დარღვევა, ხასიათდება მისი აქტივობით და პარაფაზიების, ნეოლოგიზმების გაჩენით. **ბლინსკი-სიმონსისა** (იხ.) განსხვავებით, იგი აფექტურად გამოწვეულია. აღინიშნება მოგვირით რელიგიურ სექტაში ღვთისმსახურების, ისტერიული ექსტაზის, ენაბლადიის დროს, ცნობიერების შევიწროების ინტეგრირებაში. აღმოცენდება მწკვიდე, ისტერიული სახების მტკნე პიროვნებებში ან ფსიქოგენური ინტექსიის არსებობისადმი განწყობილ ვითარებაში. ნეოგლოსიისგან განსხვავებით, არ არის აბალი შეტყუვლების რაიმე სისტემატიკისადაც ტრენდენცია. გლინსკი-სიმონსის შეტყუვლება ყოველთვის ემოციურად შეუწერილია და მამიღნარეობს მოგადი ფსიქომოტორული ავანებით.

**ბლინსკი-სიმონსის დაპავლება** - глинск-симонда блезна იხ. **დაპავლება ბლინსკი-სიმონსისა**. საკუთარი ენის აკვიტებული დათავლებება სარკემი. ნევროზული ტენზის იპოქონდრიული მდგომარეობის ხშირი სიმპტომი.

**ბოუპარსის სინდრომი** - Говард с синдромом (Gowers W.R., 1889). გუგებს პარალიტული გაუართობება განათების დროს. ძირითადად აღინიშნება თავის ტვინის სუფლასური დამიანების დროს.

**ბოსუპარსის ანთროპომორფი სინდრომი** - Говард патологическая симуляция (Говард А.А., 1899). იხ. **სინდრომი (სა) ფიქტურა დაპავლება**.

**ბოუპარსის დაპავლება** - патологическая симуляция (გოთური არტიკეტურის მიხედვით, გამოირჩევა უპირატებად ვერტიკალური მოძებით, რაც განსაზღვრავს არტიკეტურის ფორმებს, სტაბლს). კონსტიტუციური ასთენიის სასტი ვერტიკალური მოძების უპირატესობა გარდამავალი მოძებთან შედარებით.

**ბოლანტის სინდრომი დაპავლება** - Голанта с синдромом насильственных мыслей и действий (Голант П.Я., 1929). აღინიშნება პოსტენცეპალიტური პარკინსონიზმის დროს. დაზნასათიებელია ექტრის კუნძების შეტყუვები (იხ. **პიპა-შტანსის სინდრომი**), ე.წ. «**იყვირებული აზროვნება**», ცალკეულ სიტყვათა და ფრაზების გამოტანა, ნაბაღველი სიყვლი და გირილი, პაღვლია, პაღვირაფა, გაკონილი სიტყვების გამოტანა, აკირია, ნაბაღველი მოძრაობები. მიმღნარეობა ინტერმისირებული. დაპავლებული არ არის პარკინსონიზმის გამოვლენების ხარისხზე. მოგვირ ძლიერდება ფსიქოგენური ფაქტორების მემოქვლებით. სინდრომის სტრუქტურაში შეზავალი ფსიქოპათოლოგიური გამოვლენებები განხილვება როგორც პერსივერაცია ძალადობის სუბიექტური განვლი.

**ბოლანტის სინდრომი სოროლოზის შემარება** - Голанта с синдромом ошущения невесомости (Голант П.Я., 1940). ხასიათდება საკუთარი უწონებობის შეგრძობებით, ყნოსვითი და გემოვნებითი არარსებობის აღქმით, ეტაბული სეკითი და ნევროლოგიური სიმპტომებით (პათოლაღმური, ოტიკური-თალღმური). ამ დროს ავადმყოფები უწიონ კიდურთა მოშის შეტყვლის შეგრძობებს. აღინიშნება თავის ტვინის ნეირონეფტიკური ტენზის დაზნასების დროს კრის ლოკალიზაციით მარჯვენა საფეთქელის წილში (საფეთქელ-თალღმური ტვინის დაზნასების).

**ბოლანტის პალესტრასტიკის უნის მატყვლებითი მოძრაობისა** - Голанта патологически речевых движений (Голант П.Я., 1939) იხ. **პალესტრასტიკის უნის მატყვლებითი მოძრაობისა**.

**ბოლანტ-შვარსის სინდრომი მატყვლებითი პავების ბავსსებობისა** - Голант-Шварц с синдромом отчуждения восприятия речи (Голант П.Я., Шварц А.С., 1940). ხასიათდება ავადმყოფის მიერ შეტყვვლებას აღქმის ვარჯიშობის მისი აღქმის შეტყვლით, თან ახლავს უსაბოლოო გრძობა. ამ დროს აღინიშნება პრეკარდული სევადა. სერვოლოგიურად - თავის ტვინში, სახის წერვის ცენტრალური პარტები, ოქენპაიზის მარჯვენა-მარჯვნივ ნიშანი, მუცლის, კანის რეულექსების არარსებობა, მგრძობადობის მოღა. ვეეტატიკური დარღვევები - სიმსუნე, მენსტრუაციის დარღვევა, ძილით და კეკით სიმპტომების მიღების შეუძლებლობა. ძირითადი ნიშნები: შეტყვვლების დეკერსონალიზაცია და პაქტაკატიკა აღინიშნება თავის ტვინის ორგანული დაზნასების დროს (ნეირონეფტიკა, სიმსინე) ლოკალიზაციით მარჯვენა საფეთქელის წილში.

**ბოლანტ-შვარსის სინდრომი სინდრომი** - Голандер с синдромом психопатических синдромов (Голандер BERG-1961) იხ. **პათოლოგიური მდგომარეობისა**.

**ბოლანტ-შვარსის სინდრომი** - Голандер с синдромом психопатических синдромов (Голандер BERG-1961) იხ. **პათოლოგიური მდგომარეობისა**.

**ბოლანტ-შვარსის სინდრომი** - Голандер с синдромом психопатических синдромов (Голандер BERG-1961) იხ. **პათოლოგიური მდგომარეობისა**.

**ბოლანტ-შვარსის სინდრომი** - Голандер с синдромом психопатических синдромов (Голандер BERG-1961) იხ. **პათოლოგიური მდგომარეობისა**.

**ბოლანტ-შვარსის სინდრომი** - Голандер с синдромом психопатических синдромов (Голандер BERG-1961) იხ. **პათოლოგიური მდგომარეობისა**.

**ბოლანტ-შვარსის სინდრომი** - Голандер с синдромом психопатических синдромов (Голандер BERG-1961) იხ. **პათოლოგიური მდგომარეობისა**.

**ბოლანტ-შვარსის სინდრომი** - Голандер с синдромом психопатических синдромов (Голандер BERG-1961) იხ. **პათოლოგიური მდგომარეობისა**.

**ბოლანტ-შვარსის სინდრომი** - Голандер с синдромом психопатических синдромов (Голандер BERG-1961) იხ. **პათოლოგიური მდგომარეობისა**.

**ბოლანტ-შვარსის სინდრომი** - Голандер с синдромом психопатических синдромов (Голандер BERG-1961) იხ. **პათოლოგიური მდგომარეობისა**.

**გოლდშტაინის სინდრომი** - Голдштейн Сашим (Goldstein K., 1916). ანთებითი ან გრაველი ცენტრის ნათხემის დაზიანების სიმპტომთა კომპლექსი: სებაციური და ღინამიური აკაქსია, აღინაოქოქინები, პიკერმეტრია მუკალთრავი, ბრადილაქია, მოძრაობათა აშლიეღელის გარბრა, წონის მეგრძნების შესუსტება, ინტერსულური გრაველი, ნათხემის კატალექსია, ქრეფფორმული პიკერკინებება.

**გოლდშტაინ-შეერის ბიოქიმიკა** - Голдштейн-Шеер Методика (Goldstein K., Sheerer M., 1953). ფსიქოლოგური ამოღეკა ანროუნებითი მოქმედების შესწავლად, რომლის საშუალებითაც აღინებება ასტრატეული და კონკრეტული მეორეების თანაფარობა. მეღებება ხუთ სუბსტრატისგან: საგნათა ქლასიფიკაცია, ქლასიფიკაცია ფორმის და ფერის მიხედვით, ქლასიფიკაცია მხოლოდ ფერის მიხედვით, გეომეტრიული ფიგურების კოპირება, კუბების აწყობა ნიშნების მიხედვით. მეთოდის გამოყენება უწყვეტრია ორგანული ცენტრული პათოლოგიის დროს, გონებრივად ჩამორჩენილი ბავშვების გამოკვლევის დროს.

**გოშეს ლაპარეზა** - Gouze Nicolas (Goucher R.Ch., 1882). ოჯახურ-მემკვიდრეობითი პათოლოგია გაღაცემის ავტოსომურ-რეცესიული ტიპით. ხასიათდება ნოთიფერებათა ცვლის შოშლით (ყუერბროზადეღო ლამადოზა), ორგანიზმში ცერებროზიდი კერამინის დაგრუნებით. დაგანოსტიკური მნიშვნელობა აქვს მერლის ძვლის და უღვინის უწყვეტები კერამინით მიღდარი გოშეს ურრედების აღმოჩენას. ტიპურია ეღვინის, შოგჯერ ღვიძლის და ლამფური კვანძების დაღებება. პინსა და პირის რრეს ღორწობანი გარკების მოყავსურეუთული პიგმენტაცია, ბავშვთა ასაკში დაავადების დაღებისას - ჩრდის შექრება. სისხლში-პიკურემული ანემია, დეფიციენცია, მეორადი დათიფი. ძველენში გოშეს ურრედების გავრცელება იწვევს ოსტეოპოროზს. გ.ღ.ის მწვაეე ფორმა აღინიშნება ჩეილ ბავშვებში, მთავრდება სკლეოთით დაავადების დაწყებდან რადიკლიმე თვეში; ეღინდება კნთოვანი ოსტეოლოზი, თასის მამოძრავებელი კნთების დაშლებით და უზღვრო სიმპტომები. ქრონიკული ფორმა ეღინდება ახალგაზრდა ასაკში და ომორღილბში; მიმდინარეობს შეგვეისმავარად, შოგჯერ ხანგრძლივი რემისიებით. ქრონიკული ფორმის დროს ნევროლოგიურად - მეგვეულები და ყდაპეის მოშლა, ნათხემის სიმპტომები, კნთთა გონჯის მოშაგება სპასტიკური ტიპით, ეპილეფსიორმული გლუკურები. ფსიქიკის შრავი - პაროენული ცვლლებები, ინტრექსების შეზღუდვა, მმადლი ღებწყია. ფსიქომური მდგომარეობანი (Weinstock C., 1954) - აუექტის მუჟაეებლობა, მრისხანება, ავრესულებობა, პერიოდულად ავრების მდგომარეობანი ღეპრესული ან ფიფორიული აუექტი. აგნების დროს აღინიშნება შარლისა და ნათხემის შეკავებლობა, სავიგებისა და სხვადასხვა ცნებების უაზრო მეგრეულება. შოგჯერ - სმნიითი პაღეკინიციები.

**გოშინოსის სიმპტომი** - Gouze Nicolas (Goucher R.Ch., 1929). გამოხატულია ალკოჰოლიზმით დაავადებულ თიგებში. ეღინდება გუების ხშირი ლეკოთი, რაც გამოწვეულია პირის სიმშრალით ან პირითი, ალკოჰოლურ ტიგბიკამე საუბრისას, პიკერსინებებით.

**გოშინოსის სიმპტომი** - Gouze Nicolas (Goucher R.Ch., 1929). ობ. შანგეგალკურსინდრომი

**გრანდინი** - ГРАНДОНИЯ (ლათ. grandis-დიდი). განღიებისკენ მეღებე მისწრაფება ამაპარტავნების ეღქმენებებით აღინიშნებათ აქსენტორებულ და ფსიქოპათურ პიროვნებებს, მანიაკალურ და პიპომანიაკალურ მდგომარეობებში. ბრავიცილი - ГРАФИЦИЛИ (ბერძ. γραφ-შეხება ქალი). გვრონტოფილის ხახე, ეროტიკული ღღოღეა უპირატესად მოხუცი ქალებისადმი.

**გრასეს ბარდაპასალი მოტროზი ნარეული ცენტრების** - Grasset S., 1906). ფსიქიკური დარღვევების თავისებურებანი თაყის ტყინის სისხლძარღვითი აფროზიკური ზის დროს. გამოწვეულია ეპიზოდურად აღმოცენებული ანგოსამშვიო მოუღებებით (მაგ, ხანმოკლე ეპიზოდური აფანია, მენბრკების სუნთქვის შეგვეება და ა.შ), ხშირად წარმოადგენს უბში გროვანი ორგანული პათოლოგიის (ინსულდე, ტყინის დარბდება) წინპირობას. ბღრ: შტარტოს სიმპტომი.

**გრავოლი** - ГРАФИОЛИ (ბერძ. γραφ-წერა, ხახე, გამოსახვა). შეესწავლება აღმანათი (ჯანმრთელების და ავადმყენების) კალიგრაფიას. ფსიქოტრაპია: ხელწერის ცვლილების თავისებურებას შეიღებება პიროდეს ღიფრენიკალურ-დაიგნოსტიკურა, სასამართლო-სამედიცინო (პიროვნების ხადღენიფიკაციოდ) და სასამართლო-ფსიქიატრიული მნიშვნელობა, განსაკუთრებით სიკელილის შემღებში ექსპერტიზის ჩატარების შემთხვევებში. ხელწერის სისხლვით შეიღებება დაწერილი ტექსტის ავტორის ხასიათის თავისებურებებზე მსჯელობა.

**გრავოლი** - ГРАФИОЛИ (ბერძ. γραφ-წერა, ხახე, გამოსახვა). ნაწარმოებების, ფსევდომენიურული გრაქტატების შეთხმვისადმი პათოლოგიური მისწრაფება. გრაფომანიური გენდენიციები ხშირად მოღაეე ფსიქოპათებში.

**გრავოლი** - ГРАФИОЛИ (ლათ. gravis-განძდარი). ხაშუქნის შაში. წონაში დაკლებას დაუბღვეელი სურვილი, სპეციფური ხაშუქინი, ღიფრენი სარეულებებით, შოშმლით. ხშირად აღინიშნებათ ცოტონებს. წარმოადგენს მნიშორეობის, ფსიქიკური ანორექსიის ერთ-ერთ პირველ სიმპტომს.

**გრასოსის ლაპარეზა** - ГРАСИ ПОТЕРЯ (Kasperlin E., 1910). შიტროკიას დარღვევებ სიმპტომი მემოფრენის დროს, ხასიათდება ბუნებრიობის, პარზონიკლობის, ტრეკიზიული მოძრაობების უნარის დაკარგვით. მოძრაობები ხდება ტანში, წვეგობი, იმპულსური. ფსიქოლოგია და პომები ლეულობა დაბბება, რიგიდულ, არაბუნებრივ ხასიათს. პერიოდულად აღინიშნება კუნთების მოღუნება. შოგჯერ ფსიქები და შიშიც ფრამენტალი, დაურღვეებელია. ნაწერი ხდება მაღალფარეობანი, მეღმგლად ჩახეველი ხაშუქი. უმეტესად აღინიშნება კვანძოვანი აშლიეღობების დროს.

**გრავოსის ლაპარეზა** - ГРАФИОЛИ (Graves R.J., 1835; Basedow C. 1840). დაავადება, ხასიათდება ობრეკტივითი. სიმპტომთა წარმეგნი გრიადა: პიგეოთარეიღებელი მწყეა, გროფოლამი, ტრაქიკარლა. ფსიქიკის შრავი - ენდორინული ფსიქოსინდრომის მოუღენები (პიკერსინური ასოფია, გუნება-განწყობის მეგრეობა, ყრადღების დარღვევა). მეშაძლო ფსიქიკური სიმპტომბიკა-ღელირიული და ავენციური მდგომარეობები, მოღეა, პალეუსიფია, მანიაკალური და ედპრესიული სინდრომები. სინრ: ბაზილიზმს ლაპარეზა, ბრავოსის (ბრავიცილი) ლაპარეზა, რიკიო დიფიკულტა ტრანსმენიდა.

**გრავოსის სიმპტომი** - ГРАФИОЛИ (Гришаев А.Е.). ნეკრასიების ნიშანი: ავადმყოფი უქრის მხერის ხანგრძლივი ფუსიფია მოძრავ საგანზე, კარგება შას მხედვლობის ევლიდან და უმგრის სიგრეში.

**გრავოსის სინდრომი** - ГРАФИОЛИ (Graefe A.F. W.E., Sjogren T., 1950). მემკვიდრეობითი პათოლოგია, გაღაცემის ავტოსომურ-რეცესიული ტიპი. ხასიათდება ფახეკურა და გონებრივი განვითარების





აუქტივი მონაწილე მორე მხარსთვის დამახასიათებელი, მაგრამ არე გამოუხატავი თვისებების აღმოჩენა. პიროვნების მახასიათებლებიდან გამოდინარე, შეიძლება თან სდევლოს ფსიქოპათიური აგნების ან მემოთარე რეაქციის საპასუხო რეაქცია. აუქტიური რეაქცია ხანმოკლეა და გამოსავალი ყალიბდება ასთენიურ-დემარსული მდგომარეობა სეულის ან ფრუსტრაციის ეფექტებით. აგნებადობისკენ მიდრეკილ ფსიქოპათიურ პიროვნებებში შესაძლებელია განვითარდეს სთინური რეაქცია შერისძიების ეფექტებით. კორეგირება ხდება მხოლოდ პიროვნების შორალურეთიერი დაყენების და ღირებულებების საშუალებით. შესაძლებელია გახდეს ნეერობის ან რეაქციული ფსიქოზის განვითარების საფეხელი.

**ბრძნობისმან მენსტიმბერი** - *чувства восприятия (Мертвин А.А. 1959)* უმაღლესი ადამიანური გრძნობები, იქმნება ემოციებისა და წარმოდგენებისგან. შეგრძნების ეფექტებს ემატება შემეცნებითი ეფექტები, გარე საგანთ ერთეულ სახეებს, საკუთარი სხეულის შეგრძნებას და სივსეურ ცნებებს - ადრე შექმნილი. განსოგადებულო გამოყოფილება გნსტიკური ხასიათის სისეფური აეგომამებუელი შეგრძნების ფორმით. გ.გ. განსოგადებს მოეღუნამე და ცნებაზე არეულ გამოყოფილებას გრძნობადი ფორმით და უზრუნველყოფს ფსიქიკური პროცესების გრძნობად მიკუთვნების აშუკ-სთან, პიროვნებასთან და განსახლებუეს ემოციური გონის შესაბამის შეუერძლობას და ინტენსივობას. გ.გ-ის პათოლოგია განსაკუთრებით ნათლად ელნიდება ფსიქიკური პროცესების დეაგომამიაციით, დეპერსონალიზაციური სინდრომის სტრუქტურაში.

**ბრძნობისმან კლასიფიკაცია უხანაის მხეულში** - *классификация чувств по Уханаеву (უხანაევი ე., 1940)*. აეგორის მხეული განირჩევა გრძნობების ორი ღლი ჯგუფი: 1. გრძნობადი გრძნობები - გრძნობები, რომელსაც ვერის, სუნის და სხე. აქტის შედეგად ეღებულობთ და რომელნიც ამისდა მიხეულით ამ ობიექტურ მინაარსებთან დაკავშირებით განიცდება. 2. უმაღლესი გრძნობები - ის გრძნობები, რომელნიც რამე ამრის ესთეკური ობიექტების (შეატეული ნაწარმოები, ზუნების მშეუერება) ან რაიმე ქვეყის განცდის შედეგად აღმოეღება. ეს გრძნობები ინტელექტუალიური, ესთეკური, მორალური გრძნობების სახელოდებთ არის ცნობილი. *იხ. მანკაძე მარტოძე.*

**ბრძნობისმან კლასიფიკაცია შენსტიმბერი** - *классификация чувств по Шенселиеру (Schewelder K., 1934)*. აეგორის აბრით, გრძნობების განხილვა საქონრა მოხდეს ორს მიხეულით, უს საით არის მიმართული. იგი მათ განიხილავს როგორც რეაქციის ხასიათის გამოენიებებს რადიკის მიმართ და გამოყოფს მათ სამ სახეის მდგომარეობას ემოციები: 1. ხასიათიანი: სხიარული, სიამონება, მხიარულება, ბენიერება, სიმეილე, დარწმუნებლობა. ეპაუილება. 2. უხამიანი: სეული, დარი, შიმი, უხალისობა, ნელიინობა, უმწირო, ხამშობლის სეული, სასოწარკვეთილება, წუხილი, ძრწოლა, წყნა, რისხვა, ზრახი, შურა, ევე, მოწყენა, სეიარილე ემოციები საკუთარი თავის მიმართ: 3. ხასიათიანი: ბალი, სიამევი, თავემოწონება, საკუთარი ღირსების დაცვა, სდიუევი, საკუთარი უსარტესობის გრძნობა. 4. უხამიანი: სირეხელი, შრადიანობის გრძნობა, სინანული, დარსენვა, თადეპერილობა, თავიდანბლობა ხსენებამი მიმართული გრძნობები 5. ხასიათიანი: სიყვარული, სიმპათია, ნლობა, თანაგრძნობა, პატივისცემა, ინტერესი, მოწონება, მადლიერება, კუთვანწეობა, თავისუფლება, აღფრთოეულება. 6. უხამიანი: სიძულილი, შიმი, ენობლობა, არაფრად ჩადება, გგრობა, დეიუნება, ეპაუილება, აღშოთება.

**ბრძნობისმან კლასიფიკაცია შტიმბერი** - *классификация чувств по Штирнеру (Штирнер F., 1935)*. აეგორი ეთლენს გრძნობების კლასიფიკაციის ღროს მიხეულით: 1. აწმყის გ: გუნება, აუექტი, საკუთარი ყოველღიერი გრძნობის წარმმართველი გრძნობები და განცდების, გრძნობების გონი. 2. შომაგლახეტენ მიმართული გ: მოთხოინება როგორც გრძნობა, წინასწარი გრძნობა მომადლის, მოღიწი, შიმი, იმედი. 3. წარსულსკენ მიმართული გ: დეადეობა: აბლოლობის გრძნობა (სიყვარული, ერთეულიება, პატრიოტიზმი). ვარყოფიანი: დარი, დამოკიდებულების გრძნობა. *იხ. მარტოძე.*

**ბუღვის სიმეოზი** - *Гудден симтом (Gedden B.A.)*. გუნის სიმეოზები (შიოზი, ანმოკოროია, სინათლეზე რეაქციის შესულება ან არარსებობა) და კონერტების დარღვევა. აღინიშნება მიმედ მიმდინარე ალკოჰოლიური ელიტორუის და ალკოჰოლიური ენეფალიოპათიის ღროს.

**ბუღის სინეოზი** - *Гуле синдром (Gule Y., 1887)*. *იხ. პარეზისმან.*  
**ბუღის სინეოზისმან ხანმოკლე შეხამე პლიქოლოზი** - *Гулюева-Сидорова кратковременный острым атактольным гаулолизом (Гулюева М.Г., Сидорова С.С., 1906)*. *იხ. პალეოპეზი პალეოპეზი შეხამე ხანმოკლე.*

**ბუღის სინეოზისმან კალეფინაციური პარიანტი შმბტიანი პლიქოპეტიზის სინეოზისმან** - *Гулюева гаулозинаторный вариант синдром психического аутоагнания (Гулюева М.Г., 1963)*. *იხ. პლიქოპეტიზი შმბტიანი პალეოპეტიზი პარიანტი.*

**ბუღისმან** - *проявления* უეერად აღმოეენებულ ხანმოკლე, იველებრივად მრავალჯერადად განმეორებადი ავილყოური მდგომარეობა. ხასიათდება ცნობიერების დარღვეულით, კრუნსხეებით და სხე. პათოგენები რთულია, მიმეები მრავალეერიანი - ეპილეფსიენური და ეპილეფსური კერების არსებობა, ჯიკოქსია, ნიფთერებათა ეულის მოშლა თავის გეინის ქსოვილში, ფსიქოგენია (ფსიქიკური გ.), ნარკოლეფსიის, კეპალეფსიის მოეღენი. შესაძლებელია გრძინევი პათოგენური ფაქტორის ერთდროული არსებობა.

**ბ. რეპრეზენტაციული** - *п. дорефлективная*. ხასიათდება ყველა ენთვის გონური კრუნსხეით, ოპსიგოგონსით და ეპილეფსია თავის გეინის შეყავი იმების ღროს. შავ, ღლი ექიმეფირობის ქერტის დიფუზური ნეკროზის ღროს.

**ბ. რეპრეზენტატიული** - *п. д. докортикальной (ბრძ. ძიანტი-ნაბალიდე შეყვევა)* (Jaxzen R., 1961) ეპილეფსიური გულერების განსაკუთრებული ფორმა. ხასიათდება სუნთქვის შეყვე დარღვეული (შინსტიკის სუნთქვა, ანოე). მიღწიარების კრუნსხეით გამოენიებების ვარეშე. აღინიშნება თავის გეინის შემენეფალური ღოკალიზაციის ორგანულად დაავადების, ავრყოფი მოჭრძო განის დამიანების ღროს.

**ბ. სეკ აბშიმანი** - *п. асимметричный*. აღინიშნება ორსულით ეკალიზის ღროს. ავარებს ვიშოლურ ხასიათს. ანენენში არ არის მოითება ეპილეფსიაზე. დამახასიათებელია ხახის ენთვის ფობილარული კრუნსხეები, რომელსეე ურეღდება ჩინების შესეუაბარებაზე. სხეულის ენთვის გონური კრუნსხეები, რომელიც ყველა ჯერ სხეულის ენთვის ენთვის და მშედე შილა და ქვედა კრუნსხეები კონური კრუნსხეებით. მთავრდება კომპაგოზი მდგომარეობით. გულერების გამოენიებას წინ უსწრებს ნეუროპათიის სიმეგომაცია.

- 2. **პილივზნობრი** - *пильвизнобры* **მ. ბუნება** *პილივზნობრი*.
- 2. **პიპიპსოფორუმო** - *пипипсофорумо* აღმოცენდება აქტიური მიმდინარე ემიოგენურ-ორგანული და ორგანულ პროცესების დროს ინფექციური, სიმბიოტური, ან რეზიდუალური ორგანული პათოლოგიის შედეგად მაგ, ქალაგუნის გრავის შემდეგ ზ აგარებს ავტოტონურ ხასიათს, ჩვეულებრივ, არ არის ან შერდ დროს დამოკიდებული გარემო მაროოციტებზე ფაქტორებზე. კლინიკური გამოვლინებები მოკვანებებს ეილფენსის, თუქია გულყრათმროს პერიოდში ავადმყოფს არ აღენიშნება ეილფენსისთან დაახასიათებელი ფსიქიკური ცვლილებები (იხ. *ბრუნვალის მტკანბრუნვალის ხნდრეწი*).
- 2. **მტბრბოლო** - *мтбрболо* აბოლოგენება ფსიქოგენურად, ჩვეულებრივ, ვიდაის თანდასწრებით. შეიკავს თეაგრობის ელემენტებს, სხეული ეყება ნელა დამიანების ვარშე. მძაფრ ხასიათსხეულობითი მოძრაობები, შესაძლებელია ისტერიული რკალი. მიმდინარეობს შევიწროებული ცნობიერების ფონზე.
- 2. **ბტბტბტბტბტბ** - *бтбтбтбтбтб* ხასიათდება გონულის ხანმოკლე დაკარგვით გარე გამოვლინებულს ეყვარა მოქმედების დროს გამოვლინებისას ან პირფით, ძილში. გადასვლის მდგომარეობაში. შეიძლება აღინიშნებოდეს ნარკოლეფსის, ზოგჯერ თავის გუნის დამიანების დროს.
- 2. **ბრკალშეხი** - *бркалшехи* აღინიშნება პროგრესული დაბნელების დროს და მიმდინარეობს ემლოგოფორული გნით, მოკვანების ვეჭოანის გ-ს. მის შემდეგ შეიძლება დარჩეს გარდაამტეხი პარეფიზ ან დაბნელება.
- 2. **სინკოპო** - *синкопо* (ლათ. syncope) (Schulte W., 1949). სისუსტის ხანმოკლე შედეგად სინკოპურ მდგომარეობას წინ უსწრებს გარკვეული ვერტებნება, "თვლებში დაბნელებები" შეტრბნება, შიში, ძლიერი ოულბინობა. აღინიშნება ცნობიერების ხანმოკლე დაბნელება. კრუნებები არ არის. ზოგჯერ არის თვითღმინების შემთხვევები. აღინიშნება დროს სათაებში, ხშირად ხანგრძლივ სეიდრობის, ძლიერი აგნების, წინშეწლოვანი სტატიკური დატოვითის, შემინების შემდეგ შეიძლება აღმოეყენოს რაიმე თვალსაზრის მიზეზის გარეშე. გუნდის მხევეთი შეიძლება იყოს **ფფფფფფფფ** და **ხმტტტტტტ** (მაგ, თავის გუნის გრავის შემდეგ). უპირაქს შეაღებური მდგომარეობა **ბტტტტტტტ** და **ორგანულ გულყრებს** შორის, თუმა, ხანგრძლივ მიმდინარეობის დროს დაავადება შეიძლება შეინიშნოს ფსიქომოტორული ეილფენსის ხასიათი. სინონ: **მ. პპპპპპპპპპ**, **მ. გზრრრრრრრრ**, **მ. შაშრრრრრრ**.
- ბუნება** *პილივზნობრი* - *пильвизнобры* **გულყრა** ემლოგოფობის დროს. აღმოცენდება თავის გუნის ნირონებში, მათ შორის, ეილფენსური კერის ნირონი მეტისმეტ აგნებისა და განწესტესთან დაკავშირებით.
- 2. **ბ. ბბბბბბბბ** - *б. бббббббб* ხასიათდება უსიამოვნო ვერტებნებით ან ფეკილით ჭი.ის ან შერდის ძილის მიღამში, ექვეწარვლავის გრავის დისფუნქციის მოვლენებში. ხშირად მიმდინარეობს ცნობიერების დაბნელებით. ეილფენსური კერის ლოკალიზაცია ინსულარულ ან პერიინსულარულ მიდამოში.
- 2. **მ. ბბბბბბ** - *м. бббббб* რეალურიებულ, მისი ცალკეული კომპონენტების სუსტი გამოხატულებით ან არარსებობით.
- 2. **მ. ბაბბბბბბ** - *м. бабббббб* ხასიათდება თვლების, თავის, სხეულის მოძრაობით. ავადმყოფის პოზა გოებს შთაბეჭდილებას, თითქოს უნდა გახედოს გვერდზე ან უკან. შემობრუნება ყოველთვის საწინააღმდეგობა ეილფენსური კერის ლოკალიზაციასა და მდებარეობას შუბლის ან საუბთქელს მიღამში ან დაშტტტტტტ მოგორულ მიდამოში.
- 2. **მ. ბბბბბბბბ** - *м. бббббббб* იწვევა ავადმყოფის ნებთ. ვითარდება იშვიათად. ძირითადად აღინიშნება გონებრივად მამორტრნილ ბავშვებში. გ-ის თვითნაროციტებისთვის გამოვლინება ხელების სწრაფი მოძრაობები თვალში მოხედრება მშის სიივების გაწყვეტით, პიქერვენგლივია, მშერის ხანგრძლივი ფოქსაცაა შეკეთობად კონტრასტულ ობიექტზე. სინონ: **მ. ბ. ბბბბბბბბ**.
- 2. **მ. ბბბბბბბბ** - *м. бббббббб* გენერალიზებული ან ფოკალური გულყრა უნებლიე, შეღარებით კოორდინირებული, მოქნირტივებული მოძრაობით აქტივობით ცნობიერების დაბნელების ფონზე. შემდეგობა ანეგნით.
- 2. **მ. ბბბბბბ** - *м. бббббб* ა. *ბბბბბბ* (ბერძ. *α-α-α*, *κιναισι-მოძრაობა*) (Doose H., 1964). მტყვე ეილფენსური გულყრა, ხშირად აღინიშნება 9 თვლად ახალ ასაკის ბავშვებში. ავადმყოფი უკურად შემდგება, არ არის კრთობიანი აგნების ელემენტები. ეეგზე გიქურია ჰიქ-გალღების კომპლექსები. პროგნოზი არა ეტიოლასებელია. ხშირად აღინიშნება პროგრესული დემენცია. სინონ: **ბბბბბბ** *FETT-MAL*, **ბბბბბბბბ** *ბუნება*, **ბბბბბბ** *ბბბბბბ* - *ბბბბბბბბ* *ბუნება*, **ბბბბბბ** *ბუნება* (Hunt R.J., 1922).
- 2. **მ. ბბბბბბბბ** - *м. бббббббб* ა. *ბბბბბბ* **ბბბბბბ**.
- 2. **მ. ბბბბბბბბ** - *м. бббббббб* ა. *ბბბბბბ* მიმდინარეობს აბულაკორიული ავტომაგნით. ხანგრძლივად მიმდინარეობს დროს აღაბაკოქენ ეილფენსურ ვეგამზე.
- 2. **მ. ბბბბბბ**, **ბბბბბბ** *ბბბბბბ* - *м. бббббб* ა. *ბბბბბბ* მოხდარის დაახსლოების შეუძლებლობა, თუმა ცნობიერება არ არის დარღვეული. აღინიშნება ეილფენსური კერის არსებობის შედეგს წილის ქერქში.
- 2. **მ. ბბბბბბ** - *м. бббббб* გენერალიზებული, პოსტურალური გონულის დაყენით, ავადმყოფის სხეულის ვარდნით, ცნობიერების დაბნელებით. ხანგრძლივობის მიხედვით არჩევენ: **წამფერი** (წამის ნაწილი), **ბტბბბბ** *ბბბბ* (3-5 წამი) და **ქვეშანტტტ ბტბბბბ** (რამდენიმე წუთი).
- 2. **მ. ბბბბბბ** - *м. бббббб* ა. *ბბბბბბ*.
- 2. **მ. ბბბბბბ** - *м. бббббб* ა. *ბბბბბბ* ფოკალური გ. ხასიათდება სრულ ან ნაწილობრივი მოგორული ან სენსორული აგნითი, ეილფენსური კერა ლომინანტური ქემისფეროს საფეთქელის ქვედა ან თემშ-საფეთქელს მიდამოში.
- 2. **მ. ბბბბბბ** - *м. бббббб* ა. *ბბბბბბ* 1. აღმოცენდება აფექტის გავლენით; 2. საწყისი გამოვლინებები ხასიათდება არამოგორიებული შეკეთირი აფექტით (შინის გრწნობა, იშვიათად სისხარულს, დაქმყოფილების, გამშენივარების) კერა საფეთქელის წილის წინა მდინარე ნაწილში.
- 2. **მ. ბბბბბბ** - *м. бббббб* ხასიათდება სხეულის ერთი ან რამდენიმე შემობრუნებით ეერტიკალური ღერძის ორგულად.
- 2. **მ. ბბბბბბ** - *м. бббббб* ა. *ბბბბბბ* და **ბბბბბბ** რაიმე განსაზღვრული ფაქტორით, რომელიც ასრულის გამშეშ მეკანბმების როლს (პიქერტივრია, პიქერენტილაცია, ალკოჰოლი, აფექტური აგნება, გრწნობობა ორგანობებზე უშუალო ზემოქმედება).





გრამული და სიმეორული დამინების დროს. შედეგებზედა აღმოყენება ნაძალადევი ლგოლეა (გარემომყოფთაგან ვინმეს დახრობის, უყენურო სიყვევის წამობახების, არახატირო ნოთების ყილვის და ა.შ. მისწრაფება). ამასთან, შეიძლება ნეეროლოგიური სამტომაციის გარმაყება აურის, ცეერის კრუნხების სახით. ავადმყოფი გრძნობს საკუთარი მისწრაფების უახრობას, მაგრამ არ შეუძლია დაბლიოს იგი. აკვიტებული მდგომარეობებისგან განსხვავებით, ნაძალადევი მისწრაფება, რომელიყ ვწინააღმდეგება ავადმყოფის მორაღურ-ეთიკურ დაყენებებს, ხშირად რეალიზდება შესაბამისი მოძრაობითი აქტებით.

**გურევირის ანჰანატიზმი** - Гуревича антагонизм (Гуревич М.О., 1940). იხ. **ანჰანატიზმი**.  
**გურევირის განსაკუთრებული მდგომარეობები** - Гуревича особые состояния (Гуревич М.О., 1936). იხ. **ანჰანატიზმი**.

**გურევირის ინტერპარიეტული სინდრომი** - Гуревича интерпаритетный синдром (Гуревич М.О., 1933) აღინიშნება თავის გინის ქერქის თხემამუა დარის და ქვედა თხემის მიდამოს დამინების დროს. ელნიდება ფსიქოსენსორული დარღვევებით, ლეპერსონალიზაციით და დერეგალიზაციით.

**გურევირის იმპულსტატიზმი** - Гуревича импульсстатизм (Гуревич М.О., 1936). **გუტბულურა სამტომია**, ელნიდება სტატიკის დარღვევით თვალბის მოძრაობისას, კონერგენციის და ნეეით ახედვისას ავადმყოფი შერყუობს ან ვეემა უკან, გურდით გახედვისას - ეემა შესაბამის მხარეს. ამ დროს აღინიშნება თავბრუსხეევა, თვალბუღის არემი ტყვილი, კრემდღენა. ეს მდგომარეობა გრძელდება რამდენიმე წუთი. აღინიშნება ქადა-გეინის დახურული გრამის დროს დამინების ყველა სტადიაში, მათ შორის, მოგვიანებით სტადიაში, რითყ განპირობებულაა ა.ყის დიაგნოსტიკური მნიშენელობა. **მატრულახა** (Maturux, 1940) მიერ აღწერილა ენეუბლიგის ეესტიბულური გორმის დროს.

**გურევირის შემოქმედებელი შორისა გვიდვირის ენცეფალიტიზა** - Гуревича психоэпилепсия форма энцефалитического происхождения (Гуревич М.О., 1941) იხ. **ენცეფალიტი გვიდვირის შემოქმედებელი შორისა**.

**გურევირის შემოქმედებელი შორისა გვიდვირისა** - Гуревича психоэпилепсия форма эпилептического происхождения (Гуревич М.О., 1936) იხ. **გვიდვირის შემოქმედებელი შორისა**.

**გურევირის შემოქმედებელი წესდებულებები** - Гуревича психофизиологические аномалии (Гуревич М.О., 1971) გართლება ნეიროლევისური პრეპარატებით ხანგრძლივი მკურნალობის დროს. ელნიდება მყარი ფსიქოორგანული სინდრომით და ქრონიკული ნეეროლოგიური, უპირატესად ეესტრაპირამიდული დარღვევებით. დამახასიათებელია ინტელექტუალურ-ანტიკური დაქვეითება, ყურადღების სათოლოდა, აუტტკური გაუწონასწორებლობა, ფსიქტკური პიპერესთების მოლეენები, მფოთები, ფსიქტკური მოქმედების მონოგონრობა. დღეენიდა თავის გეინის ორგენული სათოლოგის სათოპისგეყური როდ.









ნოთიერებები: კოკინი და კოკას უთლებები; 6) პალეოცონტოგენების ტიპის ნოთიერებები: ლითონიანი ლიბერაინის მეთაისი, დიმიტოლტრანგამინი (დმტ), ლიმურგიდი, მესკალინი, პეიგოლი და ფსილოციტინი; 7) კატხის ტიპის ნოთიერებები: Cathin edulis Forsk-ი პრეპარატები; 8) ოპიუმის (მორფინის) ტიპის ნოთიერებები: ოპიუმი, მორფინი პეროინი, კოდეინი და მორფინის გიხის სინთეზური ანალოგები: მეფალონი და პეიგოლი; 9) უთეროგანა გაშხნელებების ტიპის ნოთიერებები: გოლუვი, ატეკონი, ბენზინი, ოთხქრომოვანი ნახშირბადი და რიგი სანაწიველი ნოთიერებებისა, როგორცაა ვიტი, ქლაროვინი, აბოგის მეცანიკი.

**დაპმპტრმ სტოლბ** - **ДОМАШНИЕ НАКОПИТЕЛИ** სკოლა ვანცხრეიხი ნაპმპტრმის ბაჭყვებისათვის. მოსწავლეთა შერჩევა ხდება საკუთარი სახელმწიფო-საჯაროგური კომისიების მიერ ბაჭყვთა ფსიქიკატის და სასკოლონო ფსიქოლოგის მონაწილეობით. და-ში შემყვლელთა წინააღმდეგევენებისა - სწავლის უუნარობა გამოსაგული გონებრივი ჩაბორჩნილობით ან მიმზე ხასიათობრივი გაღაბრებით, აგრეთვე სოციალური და ქედგოგური ჩამორჩენილობის გამო გამორეული იმიგრებულები გონებრივი ჩამორჩენის მოვლებები.

**დასანს სინდრომი** - **Dana синдром** (Lichtbein L., 1887; Dana, 1891). ოლიობათური (გუნეხური) ფუნქციური მდლობა. მიმზე უცნობი ანალოგური სინდრომი აღინშნება პერნიციოზური ანემიის დროს. მსგავსი კლინიკური სურათი აღწერილია ლეიკოზების, სიმპლიზური სეპთილის, ჰედაგრის, ბერილიის, სხვა პი პოტიგამინოზის, აღკოლიუმის, ერგოტიზმის დროს. დიდი მიმშენებლობა ენიჭება ორგანიზმში B12 ვიტამინის ნაკლებობას. კლინიკურად - დაბასიბთებულა შერეის გვიხის უკანა სვეტების და პირამიდული გვიხის კომპონებულები დამიანება, რაც ელენდება პროპოქსიური მგინიბთელობის მომზით, სანაღური ატაქსით, დაღბითი რომერგის სიმტომით, პარესთეზიებით გერეხებში, ხელის თითებში, ენაზე, ცენტრალური პარეზებით, პათოლოგური რეფლექსებით, დევექსორული კონტრექტურებით უფებში. მოგჯერ პროცესში ერიებება ნათხეში, რაც ელენდება ატაქსით. არაიმეფათი ფსიქიკური ანალოგები: მხანა ელენდება მტეგამარობები, პარანოიზული განყლები, დელირიუმი. პერნოციოზური ანემიის დროს სისხლში ელენდება პიპერტრომული ანემია. პათოლოგანალოგურად - შურგის გვიხის არათანაბარი ატროფია, მგავა ეამოსაგული სისხლმარდობა შესეღის და გამოსეღის აღეილებში. სინონ.: **შენიბქულური მინდრომი, ლინტანანს სინდრომი, ზანდის ტანის მქმპრეპოქსიური მგინიბთელობა, შენიბქულური მინდრომი, შენიბქულური მინდრომი, პატანანს სინდრომი.**

**დანაშაშაშის ბრძოლა** - **Ученая борьба** (გერმ. Schulfelgen). ფსიქიანაღბაშა: აუქციური მდგომარეობა, რომელიც სუბიექტს უეითარდება ამა თუ იმ გასაცეხა მოქმედების ან შორის შესაბამისად, გაცნობიერებულად ან გაუცნობიერებულად, საკუთარი არარაობის გრძობის წარმოშობით. სიგყვა „განმობა“ შოგ შემოსუეევაში არამარტულად იხმარება, ვინაიდან განცნობიერებულ მდგომარეობაში სუბიექტი შეიძლება არც თელდეს თავის დაწინაშევედ, ამაქვე დროს არაიუსობიერის ანაღბი სხნის სუბიექტის მოგვიყაიას, დანაშაულეებრივ ქმედობას, განჯუის და სხვ. დანაშაულის გრძობით.

**დაწლოვის მეთოდი ნაბატონი მემქმედეგამას** - **Дунлоп метод начатного начеления** (Dunlop K., 1929). ფსიქიანაღბაშა მეთოდი. მოწოდებულა გიყების, ენურეზის, მასკრეპაციის და სხვ. სამკურნალოდ. მეთოდის პირიყე პი - ავაღმყოფს აბრელებენ შეგნებულად აწარმოოს ეს თუ ის მარენ ჩვეევა, რისგანაყ სურს თათს დაღჯევა. იბ. **შრანქონის მეთოდი პარანოიზური მტანებობა ტანებობის მეთოდი.**

**დაწლოვის მეთოდი** - **Дунлоп метод** (გერმ. dunnop - დუნაპ) იყეეებისაღბი ავაღმყოფური მტანობა, შუა საუენებში აღინშნებოდა ესოტოგური ისტერიული ეპილეზიის სახით (იბ. **პარანოიზ მემქმედეგამას ტანებობა**).

**დაწლოვის ტიპური შორმეხი ნაბრძოლი ტანებობის ტანებობის მეთოდი** - **Дунлоп метод начатного начеления** (Dunlop W.R., 1910). მიმოგრენის ატიპური, ცირკულარული გორმის ერთ-ერთი პირეველ აღჭერა, რომელიც შემტომში განყოყ კრეპელინა (Kraepelin E., 1913). აღნიშნული იყო, რომ დაეაილებების ცირკულარული მომდინარეობის დროს აღინშნება ფსიქიკური დევექტის პროგრედეტეგობა.

**დაწმებულაშა** - **Деструктивная**. ნებისყოფითი თვისება, მიზართული იმისაკენ, რათა განტრეღად წინააღმდეგობების და სინდრეგების მუხებდავად, მოაჭყუდ ექნას მიზანი. ვითარდება სკოლადელო ასაკიდან მოყოლებული ბავშვის აღზრდის პროცესში, რომ სუბიექტმა მიიყვანოს დაწყებული საქმიანობა ბოლომდე, დაუქმებულბაროს ქეევა მომიავე მეღვის იმ მომენტიმ არსებულ სურვილების მუხებდავად. ნორმაში და-ის განვითარებში დიდ როლს ასრულებს მიწნება, პასუხისმგებლობის და მოვალეობის გრძობა დეეაღბული საქმის მიზარი. პათოლოგიაში და ფსიქოპათიის შემთხვეეებში დ. ხმირად ქვემეღებარება ინსტინქტებს, აუქციებს და პათოლოგიურ ვენომენებს.

**დაწმებულაშა რრომის მემქმედეგამას** - **деструктивная** **психопатия** **деградации** დროს წყყეეტი მამდინარეობის გრობობა დაქატავა, მისი ფრაგმენტეგლობის, არათანამეღვერდლობის განყვა. მოგჯერ ავაღმყოფური ატაქსიებენ, რომ დრო მიღის ძალიან ნელა ან თითქოს შერერდა, სხვა შემთხვეეებში განიყლიან მისი მიმდინარეობის ატიკრებას. მოგჯერ ელენდება წარსულ, აწყე და მომავალ დროს შორის საბღერის დაღენის შეეძლებლობით. რეგ შემთხვეეებში თითქოს იმელება საბღერი აწყესა და წარსულ შორის (სიგყაიის გაღანაყელება წარსულში), სხვა შემთხვეევაში - დ.შ.დ. ატარებს ბოღითი განყლის ხასიათს (მოგჯერ პარანოიზი არსებობა, მეტეფსიქოზი).

**დაწმებულაშა შიტაღურობის თქმშემქმედეგამას** - **деструктивная самосоциальная интальности**. ხაკუთარი ცხოველმყოფელობის გრძობის დაქატავა ან დაკარგვა. მიმზე შემთხვეეებში ავაღმყოფური აღნიშნავენ, რომ იერ აღეიქემენ საკუთარ თავს როგორც ცოცხლად (სე მექედარი, ეს არის მხოლოდ მეში გარეობა); შედარებით იღვ ნორმალეებში ავაღმყოფის დაპარაკობენ სასიყოსებ გონჯისს, ფიბიკური (სხველოყანი) კეთილდღეობას დაქატავაქვე. დაბასიბთებულა ენოლოგური ფსიქოპათიისთვის.

**დაწმებულაშა შენის რრომის მემქმედეგამას** - **деструктивная психопатия** **деградации** **шени** ტიპობრივი ფუნქციის, დევექციულ და შარდის დაღრევა. აღინშნება ცნს-ის ორგანული დამიანების დროს დამიანების ლოკალიზაციისას შესაბამის სპინალურ ცენტრებში, ქერეულ ცენტრებისა და მათ შორის გამგარ ცენტრში.

**დასიმქა** - **Участь**. ლოგოკური აზროვნების ფორმა, მოქმედება, რომლის შედეგადაც ერთი ან რამდენიმე შეკვლის საფუძველზე ეწმება ახალი ცოდნა. ხაჭყაი მყველობა წარმოადგენს წინაპრობას. დ. არის სინამდელიის მუქნობა და გამომდინარეობს ლოგიკური მსჯელობიდან. მისი ობიექტებია - ობიექტური სასყაროს ურთიერებაში, იღვებულა მოვლენებში და სანგებო მსჯელობა და დასკვნა ქმნის ლოგიკურ ფიგურას - ხილოგოზმ.

**დედუქიური** ღ. ხასიათდება კონკრეტული დასკვნების მიღებით მოგადი წინაპირობიდან გამომდინარე, ინდექსური - მოგადი დასკვნების გამომავალი უსაქვლო, კერძო წინაპირობებიდან. ესეთი პათოლოგიაში ხშირად ევლებითი და დახარბუნების **პარანოზალური პარანოზის** (იხ) დროს.

**დახარბუნების გეოგრაფიკული** - იურიდიული და სოციალური (გერმ. Strafbefürnis). **ფსიქოპათოლოგიაში** ერთობლივ მიხედვით, მნიშვნელოვან როლს ითვლება განაპირობების სუბიექტის მოქმედებას. სუბიექტი მისი წარსულის დასკვნასა და დატყუარების, რათა მართლად დატყუარებულია (მოზარდური მანიაქიზმი).

**დატყუარების დახარბუნება** - Дуттоа ნილასი (Dutton, 1902). იხ. **მკვლევარული დახარბუნება**.

**დაუნდობილი დახარბუნება** - Авантюрна (Dova L., 1866) **რელიგიური** ფორმაა. დახარბუნებული გონებრივი და ფსიქიკური განვითარების შეფერება, სობაგური ცვალებები, სპეციფიკური გარეგნობა (მოკრობიოფიციფიკალი, თვალის კაკლების აბსოლუტური მდებარეობა და თვალის ირიბი ნაპირები, განვირვი და ჩაეარდნილი ცხვირის ფუძე, ნახევრადღია პირი, ყვრების არასწორი ფორმა). სხედასხვა სიღრმის გონებრივი განვითარებები: სუსტად გამოხატული ელემენტობიდან ილითობამდე. 21-ე ქრომოსომის თანდაყოლილი გრისომომის გამოვლინება.

**დატყუარების დახარბუნება** - Дуттоа ნილასი (Dutton, 1902). **ფსიქიკური** - ერთი ან რამდენიმე თითქმის აღმოცენებული ფორმა კრანხეგება აღინიშნება ცნისი ორგანული ან ფუნქციური (ისტერიული) დაავადებების დროს. დის ერთ-ერთი ფორმაა **კრანხეგება**.

**დატყუარების დახარბუნება** - Дуттоа ნილასი (Dutton, 1902). **ფსიქიკური** - ერთი ან რამდენიმე თითქმის აღმოცენებული ფორმა კრანხეგება აღინიშნება ცნისი ორგანული ან ფუნქციური (ისტერიული) დაავადებების დროს. დის ერთ-ერთი ფორმაა **კრანხეგება**.

**დატყუარების დახარბუნება** - Дуттоа ნილასი (Dutton, 1902). **ფსიქიკური** - ერთი ან რამდენიმე თითქმის აღმოცენებული ფორმა კრანხეგება აღინიშნება ცნისი ორგანული ან ფუნქციური (ისტერიული) დაავადებების დროს. დის ერთ-ერთი ფორმაა **კრანხეგება**.

**დატყუარების დახარბუნება** - Дуттоа ნილასი (Dutton, 1902). **ფსიქიკური** - ერთი ან რამდენიმე თითქმის აღმოცენებული ფორმა კრანხეგება აღინიშნება ცნისი ორგანული ან ფუნქციური (ისტერიული) დაავადებების დროს. დის ერთ-ერთი ფორმაა **კრანხეგება**.

**დატყუარების დახარბუნება** - Дуттоа ნილასი (Dutton, 1902). **ფსიქიკური** - ერთი ან რამდენიმე თითქმის აღმოცენებული ფორმა კრანხეგება აღინიშნება ცნისი ორგანული ან ფუნქციური (ისტერიული) დაავადებების დროს. დის ერთ-ერთი ფორმაა **კრანხეგება**.

**დატყუარების დახარბუნება** - Дуттоа ნილასი (Dutton, 1902). **ფსიქიკური** - ერთი ან რამდენიმე თითქმის აღმოცენებული ფორმა კრანხეგება აღინიშნება ცნისი ორგანული ან ფუნქციური (ისტერიული) დაავადებების დროს. დის ერთ-ერთი ფორმაა **კრანხეგება**.

**დატყუარების დახარბუნება** - Дуттоа ნილასი (Dutton, 1902). **ფსიქიკური** - ერთი ან რამდენიმე თითქმის აღმოცენებული ფორმა კრანხეგება აღინიშნება ცნისი ორგანული ან ფუნქციური (ისტერიული) დაავადებების დროს. დის ერთ-ერთი ფორმაა **კრანხეგება**.

**დატყუარების დახარბუნება** - Дуттоа ნილასი (Dutton, 1902). **ფსიქიკური** - ერთი ან რამდენიმე თითქმის აღმოცენებული ფორმა კრანხეგება აღინიშნება ცნისი ორგანული ან ფუნქციური (ისტერიული) დაავადებების დროს. დის ერთ-ერთი ფორმაა **კრანხეგება**.

**დატყუარების დახარბუნება** - Дуттоа ნილასი (Dutton, 1902). **ფსიქიკური** - ერთი ან რამდენიმე თითქმის აღმოცენებული ფორმა კრანხეგება აღინიშნება ცნისი ორგანული ან ფუნქციური (ისტერიული) დაავადებების დროს. დის ერთ-ერთი ფორმაა **კრანხეგება**.

**დატყუარების დახარბუნება** - Дуттоа ნილასი (Dutton, 1902). **ფსიქიკური** - ერთი ან რამდენიმე თითქმის აღმოცენებული ფორმა კრანხეგება აღინიშნება ცნისი ორგანული ან ფუნქციური (ისტერიული) დაავადებების დროს. დის ერთ-ერთი ფორმაა **კრანხეგება**.

**დატყუარების დახარბუნება** - Дуттоа ნილასი (Dutton, 1902). **ფსიქიკური** - ერთი ან რამდენიმე თითქმის აღმოცენებული ფორმა კრანხეგება აღინიშნება ცნისი ორგანული ან ფუნქციური (ისტერიული) დაავადებების დროს. დის ერთ-ერთი ფორმაა **კრანხეგება**.

**დატყუარების დახარბუნება** - Дуттоа ნილასი (Dutton, 1902). **ფსიქიკური** - ერთი ან რამდენიმე თითქმის აღმოცენებული ფორმა კრანხეგება აღინიშნება ცნისი ორგანული ან ფუნქციური (ისტერიული) დაავადებების დროს. დის ერთ-ერთი ფორმაა **კრანხეგება**.

სინდრომთან და ხშირად წარმოებს რეტროსპექტულად. ამავე დროს სინდრომა "გაუქვების" მოვლენებ (წინამორბედი, forpost syndrome), რომელსაც შაკიკუნებზე დს.

**დეგენერაცია** - дегенерация (ლათ. degenerare - გადაგარება). ფსიქიკური დეგენერაცია ნიშნების შეონე პირზე შემკიდრობით გამოწვეული პირველი დისპანონით. გერმინი მოძველებულია, ამჟამად, დ. შიკიკუნებთან შესაბამისად წრის ფსიქოპათიებს. ფრანგულ ფსიქიატრიაში არჩევენ უმაღლეს, რომელთაც აქყო რაიმე, ხშირად ცალმხრივი ნიჭი, და უმაღლეს ღს, პრიმიტიული ინტელექტით. თვლიდნენ, რომ ღს წინაგანწყობა აქეთ დეგენერაციული ფსიქოპათიისადა (იხ. *შემაჩვენებ დეგენერაციული*).

**დეგენერაციული შორტიკულ-ხრტილ-ხანაილური** - дегенеративный хрящково-остеоартроз იხ. *მაძიარ-პროტიტხრტილ-ხრტილ-ხანაილური*.

**დეგენერაციული შიმშილი** - дегенеративная дистрофия. მოძველებული, მხოლოდ ფრანგულ ფსიქიატრულ ლექსიკონში შემოიხრტილი, ფსიქიკური გადახრების განმსაზღვრელი გერმინი. გამოწვეულია შემკიდრობითი რატორებით, გადაგარებით. ფრს აღმოყენებაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა ნათესაურ ქორწინებებს.

**დეგენერაციული შიმშილი** - дегенеративная дистрофия იხ. *დსტრუქტიული შიმშილი*.

**დეგენერაციული ალკოჰოლიზმი** - дегенеративный алкоголизм (ლათ. de - დან, gradus - ნახეური, საფეხური, მოძრაობა). იხ. *ალკოჰოლიზმი დეგენერაციული*. სინონ: დეგენერაციული ალკოჰოლიზმი.

**დეგენერაციული შიმშილი** - дегенеративная дистрофия. პირველად აღმოჩენილია თვისებების დაკარგვა, მისი სხვადასხვა უნარის (გრძობის, მსჯელობის, ნიჭი, აქტიუობა და ა.შ.) გაღარბებით. ხშირად წარმოადგენს ფსიქიკური დაავადების შედეგს, ფსიქიკური დეგრესიის გამოვლინებას, მაგრამ შეიძლება იყოს სოციალურად განპირობებული მოვლენა.

**დედა წმინდა ნეველი** - мать блаженная ედა, რომელიც ღმრთობის ბავშვთან კონტაქტში, თრუნავს მის ინიციატივას, შედგება მრუნავს მის ჩაყვობაზე, იყავს მას სოციალური შესაძლო უარყოფითი გავლენისგან თანაგობლების მხრიდან. დედას ასეთი შემზრუნველობა განხილავს როგორც შიმშირების განვითარების ხელშემწყობი ერთ-ერთი ფაქტორი. სინონ: *შემზრუნველობა დედა*.

**დევიანობა** - девиантность - დევიანობა ნიშნების შექმნაზე ქვეყნის გარეშე სასოციალური მოვლენები და სოციალურ-დემოკრატიული კრიტიკიზმით გამოხატული ურთობიდან, რომელიც არ აღწევს განხილავლი *დევიანობის* (იხ.) ხარისხს. დევიანობის ილუმინირება - девиантная illumination (Davidson G.M., 1956). იხ. *ფრანკლინი*.

**დევიანობა-მრეველი** - девиантно-преступная ფრანკლინი, ხშირად არსებული პერსპექტიული ბოდეის დროს, როდესაც ავადმყოფი ბოდეით თვალდაყვის მოცივით სრიდან ატრეუსულ მოქმედებებს, მიმართულს მოჩინებითი მრეველის წინააღმდეგ.

**დევიანობა ალკოჰოლიზმი** - девиантный бред алкоголизма იხ. *ალკოჰოლიზმი პარანოიკი ვერსია*.

**დევიანობა-მრეველი** - девиантная (ლათ. aggravare - დაძვირება, გაუარესება). ავადმყოფის შიერ გაუმჯობესება და განმარტრებად საკეთარი დაავადების სიმძიმის შესუსტება, ცალკეულ სიმპტომა დაშლავა, ავადმყოფური ქვეყნის დაფარვა.

**დევიანობა-მრეველი** - девиантная (ლათ. aggravare - მიერთება) (Сутанов С.А., 1906). ანტრადევიანობა ატაქსია (Stransky E., 1903) და გახლავს (Bleuler E., 1911) ანალოგიური ცნება.

**დევიანობა-მრეველი** - девиантная (ლათ. adparatio - შეგება). საარსებო პირობებთან თრუნავის შეგებას უნარის მოშლა. ფსიქიატრიაში ღს ქვემ იგულისხმება, პირველ რიგში, სოციალურ გარემო პირობებთან შემკვლავლობის უნარის დაკარგვა ფსიქიკური დაავადების შედეგად. შესაბამისად, ფსიქიკური ავადმყოფის რეაბილიტაციის ერთ-ერთი ეტაპი ეწოდება რეაბილიტაციური (Khanikov M.M., 1978-1985).

**დევიანობა-მრეველი სესქუალი** - девиантная сексуальность სოციალური ხიარულის მფარი უარყოფა სასქუალი პროგრამის ათვისების განვლებების გამო ან თანაგობლებთან და პედაგოგებთან ურთიერთობის გართულებასა და კონფლიქტებთან დაკავშირებით. აღნიშნებათ ბავშვებს და მოზარდებს, რომელთაც აქეთ ქვეყნით პათოლოგია, ნეგროშული დარღვევები ან ფსიქოზის ინიციალური გამოვლინებები.

**დევიანობა-მრეველი რეაბილიტაციური** - девиантная реабилитация იხ. *რეაბილიტაციური მრეველი რეაბილიტაციური რეაბილიტაციური*.

**დევიანობა-მრეველი** - девиантная (ლათ. actio - სული). საკეთარი პირობების შეყვლის განუდა დევიანობა-მრეველი გამოვლინება.

**დევიანობა-მრეველი რეაბილიტაციური** - девиантная реабилитация (ლათ. actualis - მოქმედი). ბოდეის მნიშვნელობის დროებითი ან ხანგრძლივი, მფარი შესუსტება, რაც ნაკლებ გავლენას ახდენს ავადმყოფის ქვეყნზე. ამყარებს ფსიქიკური ავადმყოფის სოციალურ საურობის ცნება ახლა ბოდეის ინტელექტუალუობითა. დევიანობის (საორტანური ან შამქურალო) დაწყების შედეგად.

**დევიანობა-მრეველი** - девиантная (ლათ. insensibilis - მოქმედი) (Гуреев М.О., 1949). ანტრადევიანობა ფსიქიკური შეწყვეტის მოშლა, მათი დროებითი დაყოფა კომპონენტებად, დ. წარმოადგენს გინის კეპირების დარღვევის შედეგს (ანაბრება). ეს ცვლილებები შეიძლება იყოს მფარი ან შეტყვეობა (იხ. *ანაბრება*). ეხვლებით შიმშირების (ანბრების განხილვა, ინტრადევიანობა ატაქსია), ეგზოტენური ორგანული ფსიქოზების (ანბრების მდგომარეობა და სხვ.) დროს.

**დევიანობა-მრეველი რეაბილიტაციური პროცესი** - девиантная реабилитационный процесс (Khanikov K., 1979). ნორმალურად მიდინარე ასოციალური პროცესებთან გადახრის ელემენტები, რომელიც ახსიათობს უარყოფითი ერთობის და პათოლოგიური შექმნილების შესაბამისად ირგანული და ფუნქციური პათოლოგიის ფორმებში, მაგ, *შემოფრთხილი განვლილობის და ფორტანდაზიის* დროს. გარდა რეაბილიტაციის მიერ გამოყოფილი ანბრებობი და ფორტანდაზიური მნიშვნელობით განპირობებული დევიანობის, *შემაჩვენებ* და მრეველი გამოყოფილი განპირობებული მოვლენები პიროვნულ და ყვეფებისათვის შეჭრით, პერსპექტიული და დევიანობა, უკონკრეტოების დევიანობა ასოცირებული ყრადლოგიასთან დაკავშირებით და ა.შ. მათი ანალოგიის სახით, რომელიც აღნიშნება ხიარებაში, განსიილება შეგველებითი დევიანობა (შედეგები, შედეგობით გამოჩინებები). ასოციალური დევიანობის

პათოლოგიური შექანიზმის განმარტება ხდება **ჯეკსონის დებოლუციის კონცეფციას**, გველენკის პარახოზის, პალოფის პანოილურ-ფაზური მდგომარეობების და უბტოპიკის დომინანტების თეორიების ასპექტზე.

**დეზინტოქსიკაცია** - детоксикация (ბერძ. τοξικον - შავი). მრავლი დაავადების, მათ შორის ფსიქიკურის, შეწინააღმდეგებელია. მიმართულია ორგანიზმში ცირკულირებელ გოქსიკური ნივთიერებების, პროლაგებების გასაუფლებლად და ორგანიზმიდან გამოსაყოფად. ამ მიზნით იყენებენ გლუკოზას, ღლი რაოდენობით სითხეებს (ფიზიოლოგიური ხსნარი, კათონების და ანიონების შემცველი ხსნარები), ცოცხრდის პრეპარატებს (უნითალი, სულფონი). პლაზმის შემცვლელის (პლაზოლი) და ა.შ.

**დეზრინტამტრია** - дезринтациа (ლათ. rinos - აღმოსავლეთი) ორინგინების დარღვევა ადგილზე, ღროში, გარემოში (ე. ალოფსიკურის), საკუთარ პიროვნებაში (ე. ატოფსიკურის) არჩევენ და ამწეუარი (დაკუმირებულია მესიერების დარღვევასთან და საფუბლად უღვეს ფიტსაკურ აბინიას) და ხმატურ-ფსიკურის (საკუთარი სხეულის, შისი ცალკეული ნაწილების, ორგანოებისა და მათი ხიერყეში მღებარეობის აქტის დარღვევა, მაე. ავტოგოპავნიონის, ავტოკოპის და სხე. დროს).

**დეიტრინტამტრია** - деитриотация (ბერძ. deuterios - მეორე, სხეა). საკუთარი თრულებ ზეგა აღინიშნება მოზოვრენის, ინფიკური და ინფიქსიკური ფსიქოზების, ცხელებითი მდგომარეობების, ცამხაგული გამოვიგის დროს. სინონ: ხმტრია რეპრესია.

**დეპაპიტაცია** - депапация (ლათ. caput-თავი). ფსიქიკიკის მულოდ, მდგომარეობს ექსპერიმენტული ცხოველის თავის მოკვებით.

**დეპიტანსაცია** - депитация (ლათ. compensare - გათანაბრება). მომხიგანის, ორგანიზმის ფუნქციური დარღვევების და სტრუქტურული დევეტების აღდგენის შექანისთვის უპარისობა. ფსიქიატრიაში: ცნება დ. გამოიყენება სიყოხლის პროექტში ავადმყოფური მდგომარეობის აღმავსატან დაკუმირებით, უღინდება დემადაკაციით (აქტუვაციის, ფსიქოპათიის დროს) და მიმდინარეობს სიქიალურ-ფსიქოლოგურ და ბოლოგურ (სომატური დაავადებები, ასაკობრივი კრიზები) ფაქტორებითან კავშირში.

**დეპიტრამტრია** - депитрация (ლათ. decompensare - მეწოლის გარეშე). ხამტრიალთ დონისაბება, მიმართული დასმულ ღრში მეწოლის შესაქისებლად შისი შემდგომი მგებნის თაფლან აუილების მიზნით. მაე. გრენანაქია თავის გეინში მოყვლობითი პროექტის (სიმშინე, პეპოზია და სხე) არსებობისა.

**დეპიტრატაცია** - депитрация (decoloration, ლათ. cortex - ქერქი). 1) თავის გეინის ღლი პენისფერობის მოცილება ან ფიქციური გათიშვა ნაწლავობრივ ე. გამოიყენება როგორც მოგერი დაავადების ნეოროტურტული შეწინააღმდეგებელი; 2) რაიმე ორგანოს ქერქული (კორტიკული) შრის მოცილება.

**დეპრეპარაციის ცილის შემოღება** - Делбрюка-Зиссера порошковые препараты (Delbrück A., 1953; Sommer R., 1984). **იხილეთ** ცილის შემოღება.

**დეპრესიის ბრედა ურანგაულობისა და შემყალბება** - Делбрюка бред неясности и помилования (Delbrück A., 1957). **იხილეთ** ბრედა ურანგაულობისა და შემყალბება.

**დეპრესიის სინდრომი** - Делбрюка синдром. **იხილეთ** შემყალბება და შემყალბება.

**დეპრეპარაციის ტიპური შემოღება** - Делбрюка-Зиссера типичные препараты (Delbrück A., 1957; Sommer R., 1984). **იხილეთ** ტიპური შემოღება.

**დეპრეპარაციის სინდრომი** - Делбрюка синдром (Delbrück A., 1957). ნეოროლეფსიური პრეპარატებით შეწინააღმდეგებელია გარდაუდებელია, უბეჯდალ თერაპიის საწყის სგადიანი. უბტრატამაბული ნეოროლეფსიული ხანდროზის ვარიანტი. დამახასიათებელია: კნთთა გონესის პიპერკინეურ-პიპერკონიული ცელილებით და აკათიზია; ეს უპანატელი გამოხატება ერთ ადგილზე დღისაზ ჯდომის შეუბღებლობით, სხეულის მდგომარეობის მუღნიე ცვლით და გასიკანებათ. ფსიქიკური დარღვევიდან აღსანიშნავია: მაციგლობა, გარე მოუღენებისაბმი ინტერესის დაკარგვა, გუნება-განწყობის დაქვეითება, ცელი ძილი, ზრადიფრენია და სხე.

**დეპრესიის პათოგენეზიანი ბიპრატამტრული ნეოროლეფსიური სინდრომი** - Делбрюка злокачественный тип депрессивного неясности синдром (Delbrück A., 1957). ნეოროლეფსიური პრეპარატებით თერაპიის ვარიანტის გამოიყენება. იყენება ექსტრაპირამიდული მოვღენებით, შემდგომში მიმდინარეობს პიპერკინეურის, არტერიული წყნის მომატებით, კანის სიფერმრთაობით, გულ-სისხლძარღვით და სასუნთქი სისგემების ფუნქციონირების მოზღლით, ცნობიერების კომპოზური დარღვევით. გამოირტება მალად ლევალობით (70%-ზე) გამოწყეე მიზნად მიიჩნევენ ნეოროლეფსიური პრეპარატებით გამოწყეულ ქოლინერტული სისგემების პიპერკინეობის.

**დეპრესიის მატრინტრული პრეპარატი** - Делбрюка интратриальные препараты (Delbrück A., 1957). **იხილეთ** მატრინტრული პრეპარატი.

**დეპრესიის ტატრული სემანტიკური პრეპარატი** - Делбрюка тактильная семантическая агнозия (Delbrück A., 1935). **იხილეთ** ტატრული პრეპარატი.

**დეღინანტრია** - делинквентность (ლათ. delinquentia - დანაშაული, ცოცვა) (Beauregard J., 1960). ხასიათის პათოლოგიური რეაქციის ხანდროზი მომართა შირის. გამოვღინდება მათ მიერ სისგემატურად ჩადენილი დანაშაულებით, როზღლი არ აღწევს კრიმინალურ დონეს და არ წარმოადგენს სამართალდარღვევას. აღინიშნება ფსიქოპათიის და არამდგირად გიქის აქტუვტორებულ პიროვნებებში.

**დეღინანტრია** - делинквентность (ლათ. delinquentia - შეზღობილი) ცნობიერების აშღის ხანდროზი. გამოვღინდება გამოსატული ვემპარიტი შევღენითი პალენაციებით, აღწეებით და პათოლოგიებით. ხმრად პარალელურად ვითარდება მერიული ბოლო და ფსიქოპოტრული აგნება. დამახასიათებელია ორიენტაციის დარღვევა ადგილსა და დროში. პალენაციური განცდები ავტოპი სერქსამავარ, მოძრა, ხმრად მოლოდერებ ხასიათს. სინონ: სინდრომი დეღინანტრია.

**დეღინანტრია** - делинквентность (ლათ. delinquentia - გაუშვლილი). ხამტრიალთ აქტის პათოლოგიის ფრამგენული გამოვღინებებით. შევღებლობით იღვებება და მიკროფსიული პალენაციებით არ აგარებს დამოკიდებულ სიფერტრ ხასიათს. შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს სმენით პალენაციებისაე აკოამების და ფორმების ხასით. კლნიკურ სურათში გამოკვეთილია მოთითისა და შიშის აქტეტი. ბოღეთი პრეპარატი მინარსით დარასია, ბირათლად აგარებს ურბოლობის, ეჭვის, მოზადასა სამიშობის ხასიათს. ნებისი სურვოს პათოლოგია გამოვღინდება აგნების რეკომპოზიით, შმმართულია თავდაუცხაკენ. დროში ორიენტაციის დარღვევულია, ადგილში შედარნუნებულად

ხანგრძლივობა - რამდენიმე საათიდან ერთ დღემდე. გამოხვდა კრიტიკული, ძილის შემდგომ. გადატანილი მდგომარეობა უმეტესად აზნებირებულია. სომბაგურ-ნევროლოგიური დარღვეებიდან აღსანიშნავია გრემორი და პიკრინოზი.

წ. **პატიონისძე** - **ა. ანთონიძის** აღნიშნებით ალკოჰოლიზმი (**Жидков С.**, 1929), ნარკოზიანი და გოტსკომპანიით დაკავრული ირებს აბსტინენციის პერიოდში.

წ. **აქტივობა** - **ა. ანთონიძის** ყველაზე ხშირი შეტყაველობური ფსიქოზია. პროლონგირებული პერიოდი შეიძლება გარკვეულდ რამდენიმე დღიდან რამდენიმე კვირამდე, რომლის ღრსიყვ გამოხატულად ძილის დარღვევა კომპარული სიმპტომებით, შიშებით, ხშირი გამოივლინებით და ექვეტაგორი სიმპტომებით. ღღის საათებში გამოხატულად ასთინენური მდგომარეობა შეითარება და შიშით. ზოგ შემთხვევაში პროლონგირებული პერიოდი შეიძლება წინ არ უძლიდეს ფსიქოზის განვითარებას. დ. ეითარლება და კომპლური აბსტინენციის ფონზე ამ დროულ სმის რამდენიმე დღის შემდეგ ფსიქოზური გამოვლინებები უმეტესად წარმოაქვება საღამოს საათებში ხაგოეანი წარმოადგენებისა და შედეგლობითი ილუზიების სახით. ადგილი აქვს შოგორიისა და შიშიის გამოყოფლებას, პასორი ყურადღების აწვეას, აფექტთა ცვალებლობას. ხაწყის სტადიამი შეიძლება შეეფუდეს ერთულად ან მრავლობითი კრუნხითი განვითარებები, არამიუთავად ევრხალური ქალეუნიაციები და ხაგოეანი ზოგა. გამლოლ სტადიამი გამოხატულია უძილობა, მხედველობითი ილუზიები პარეილიტების სახით და გემპარტი შედეგლობითი შიროუსიული ქალეუნიაციები. ავადმყოფი ხედავს შყრებს, ადამარბებებს ცხოველებს, თიებებს, ცულებს, თიკებს, თიხებს ჭყად, მავთულებს ანაბათად შეიძლება ადგილი აქონდეს მაკროფსოულ, უფრო ფანგსატიკური შესახებლობის აღამიანებისა და ცხოველების გამოსახულებებს. შედეგლობითი ქალეუნიაციები შორბადა, იყდებს ფორმას და წიბას, ატარებს სუნერ, ქალეულისკური ხასითი. ღღის გარემოებებს თან სდევს სმნითი, ყრსითი, თირმული, გატყალური ქალეუნიაციების წარმოქმნა. ირეუდა სხეულის სქემას და სიერეში სხეულის მდგომარეობის აღქმა. აფექტური აშლილობები და ზოლითი აზრები შინაარსობრივად დამარბებულია ქალეუნიაციურ განვლებზე მოქმედებით სვეროში გამოხატულად შობრაობით აგწმნა, საქმიანი გულსუსი, მდგერისგან გაქცივის, დამბლის, სხეულიდან რამაშ საგნის მოცილების მოქმედებით. შეეყველება წყველობა, გასტყარი სიყველითი ან ფრამებით. დომინირებს პასოური ყურადღების აწვეა, გარემო შობმდარ მოუღებებს ავადმყოფი უგრადლხოდ არ გოყებს, პასუხობს სიყველით, ტყუილ, შიშით. აფექტური სვერო მუდმივად ცოცხალბადა; აღინიშნება გულარბინობა, გოყეობა, სასოფრკეცილები, იზობრი, მდგომარეობა, რომელსაც თან სდევს სმნის გრბობა. დომინირებს დენებისა და ფსიქური განადგურების ბოლითი აზრები. მათ შინაარსში ხშირად ულინობა ეროგულად და დამოიბინობს ბოლითი აზრები. ხაკუთარ პიროვნებაში რიტიგაციის შერხაბდს ფრწმ დარღვეულია ან შეყვლილია ირეტიგაცია დროსა და ვარემში. ავადმყოფები შთაგონებამდე არიან. ხმარად ამა თუ ამ ფაქტორებთან დაეკუვირებით დღიურიული აშლილობები სომბაგურად სუსტდება - ეწ. დღიურიული პერიოდები. ფსიქოზის ხანგრძლივობა 3-5 დღე აშეითად 1-12 კურსა. გამოხვდა უმეტესად კრიტიკული, ხანგრძლივი ძილის შემდეგ მოყვარ თანდათანობით. გადატანილი ფსიქოზის შემსახებ რჩება ფრამგმრეული შოგონებები ნევროლოგიური დარღვეებიდან აღსანიშნავია წყრდამბლიგულიანი, რიშიული კანკალი, რომელიც ზოგ შემთხვევაში დებლობს ფრწმალმეხული გრემორის ხასითი, ატაქსია, კნითია პიკრინოზი, პიკრინეფლექსია, კონტრეგენციის სისუსტე. სომბაგური დარღვევებიდან - გამოხატულია ოვდიანობა საყუიკური სუნით (დაუხანებელი ვეფების სუნე), კანის, განსაკუთრებით ხახის, განსაკუთრად, გაქიკარლია, არაკორული წყნის შერეობა, გაქიკარო, დომინირებს, სვერების სიყველით, გემპერატურის სუფუტიკური მატება, სისხლში დეჰიოციბინი მარეინანაზური გადართი, ელ-სი ატარება, ბილარბინის და ქოლესტერინის მომაგება. სინონ: ტრამბა დღიურიული, ტრამბა დღიურიული, ტრამბა ტრამბა. DELIRIUM TREMENS.

წ. **ალკოზიზი** - **ა. ანთონიძის** ალკოჰოლური ფსიქოზია, რომელიც ერთდროულად გვხვდება ალკოჰოლური ქალეუნიოზისა და თირის ცხედებისათვის დამახასიათებელი სიმპტომთა კომპლქმით. ფსიქოზის ძირითადი ვახვდა დენის აზრები, მხედველობითი და სმნითი ქალეუნიაციები. ავადმყოფები აწყობენ ბარიკადებს, რითაც ურთ დაიყვან თავი.

წ. **პარანოზი** **ბაქონისძის** - **ა. ანთონიძის** ჩვეულებრივი ხანმოკლე (2-4 დღე) ცხოვრება აშლი, დაკვირებული აგრობინით (უღდაღის ალკოლიდ) შოქმელსაან დღიურიებისათვის დამახასიათებელი ჩვეული ნიშნების გარდა აღნიშნება გიკური პიკრინოზი, გრემორი მთელ სხეულში, დამართია, ატაქსია, მღირიამი, აკომოდაციის დამბდა, ლორწოვანი გარსების სმნრალე პულის, სუნთქვის ვახმრება. მხამე შემთხვევაში დ გადადს კომპანი ქალეუნიაციები უმეტესად შიროუსიულია, ატარებს მოლოდირ ხასითი, ავადმყოფი ხედავს მფინაე შყრებს და ატყურად ცუდადს მათ დტყრას.

წ. **პარანოზი** - **ა. ანთონიძის** (**Paraphrenia**, 1904). ალკოჰოლური - დის ტამებით ვარაანტი, მიზღინარე გამოხატული ეროლოგიური ქალეუნიოზი.

წ. **პარანოზი** - **ა. ანთონიძის** როგორც წესი, ფსიქოზის წინ უსწრებს ან შროფებელი, ან ტამური დვდართეში. ან ეითარდება ვადა გარკვეულ ალკოჰოლური ტრეფადობათთან ფრწმ კლინიკურ სურათში წყვენიას ცხოვრების დრმა და დამდებ, განსაკუთრებულად შობრაობით და შეეყველებითა დარღვევებით გამოხატული ნევროლოგიური და სომბაგური მოშლილობების ფონზე. ავადმყოფებთან კონტაქტში შესაძლებელია გამოხატული შობრაობითი აგწმნა შემოიფარგლება საწოლით (შეხება, გადასმა, გუება, მოქმება, გაქმება). არამიუთავად თან ერთობს კნითია შიროუსიური ნევროზობები, ქორეოფორმული პიკრინოზები, შეეყველება დაბაღ ხმამე, გუყვებარი, მოვლიაციის ვარემე. არაკორული სიყველითი, დამრეველი, შიროუსიული, გოყებს ბურგყუნის შთაბეჭდილება პერიოდულად როგორც შობრაობითი, ასევე შეეყველებით აგწმნება ქრება. ნევროლოგიური დარღვეებიდან აღსანიშნავია ორალური ატკომბადგმობა და თუღლი მამირბეხელი ინერეაციის დარღვევები, რომელიც გამოიწვევება სტრახისშით, ნისგაგებით, გტომით. სომბაგურად - პიკრინოზი, არტოლოგი წყნის შერეობა პიკრინოზისკენ, პიკრინოზი. ვართულებს შობმხვევაში გადადს მამირე არ დრმა კომპლქური მდგომარეობაში გამოიანშრობლებს შემდეგ აღნიშნება სრულად აზნებია.

წ. **პარანოზი** **პარანოზი** **პარანოზი** - **ა. ანთონიძის** დარღვევა **PARANOSIS**. ასეთი ფსიქოზების შინდინარეობის დრმა ისტენსური მხედველობითი და გატყალური ქალეუნიაციების, სხეულის სქემის აშლის და მხედველობითი ილუზიების პარანოზურად გამოხატულია სმნითი ვერბალური ქალეუნიაციები. მისი ინტენსივობა სხეუ შემთხვევაში იზღუნად მზარდ, შედეგად და ხანგრძლივია, რომ აღაპარაკობენ ალკოჰოლური და დღის უკრატურაში არსებულ ვერბალურ მარღვეობებს. ქალეუნიაციური ვანვლები, როგორც მხედველობითი, ასევე ევრბალური, ატარებს შემამარბებელ, შექარის შინაარსს, რის საფუძველზეც აღმოყენდება ფიშიკური განადგურების ბოლითი იდეა. ეს უკანასკნელი იზღუნად დებადიმიებულია, რომ გოყებს სისტემატრეხებული ზოდებს შთაბეჭდილებას. თუქა.



ელემენტარული მხედველობითი პალეონაციებით და ბოლის უკუგანეთარების ექიზოლებით. ო.დ. ვითარდება შესამე-  
მეოხებ დღეს კლინიკური სურათის გართულების გეპით, განსაკუთრებით ღამის საათებში. ხშირად ორმაგი  
ორინენტაცია, დაღებითი ორელის სიმამობა (იხ. *ქაშრაქ ხანჯრეშო*). შენარჩუნებული ავტოფსიქიკური  
ორინენტაცია, სიკრქში სრწყო გადაღვივების შეგრძნება. დასაწყისში - შიშის აფექტი, თ.ღის სურათის  
ფორმირების დროს - ვაოცება, ცნობისმოყვარეობა, მოკრეერ განურჩევლობა. ხანგრძლივობა - 2-3 დღემდე.  
შესაძლებელია რემიდალური ბოლის ამოტყვება.

რ. **ტიპური ტაქსონომია** - *ჟ. თაყაიანი*. საკუთრივ სუვთა თაქიოლებით გამოწვეული დელირიული ფსიქოზები არ  
გვხვდება. დელირიული ფსიქოზი აღმოცენდება ან ალკოჰოლური პათოლოგიის შემთხვევაში (*E. Kraepelin*),  
ან, როცა ხდება თაქიოლების და ალკოჰოლის ერთდროულად მოზმარება. კლინიკურ სურათში გარდა მხედველობითი  
პალეონაციებისა, წამყვანი ადგილი უჭირავს მწვევე ფსიქოზოლოგურ აღგენებას, რომელიც აღწევს ავტოფსიქოზის  
რეერს.

რ. **პროტრასპირაზი** - *ჟ. თაყაიანი*. აღნიშნული ფსიქოზი ეთიარდება: ხანტოტოტიზებული ფ-ის, ობტორული  
დროს, ეერზაბოლი პალეონომიით და ესპირული ავტომატიზებით მიზღინარების პერიოდში.  
ხანგრძლივობა უმეტესად რამდენიმე კვირადან ერთ თემდე. დღის განმავლობაში ცამონსაკვლეა ასთრია, უფოზოური  
ღებლობა, შიქოთიბა, ცრემლიანობა. ორინენტაცია შენარჩუნებულია. კრეტიკა დაავადებისაღმი შენახულია.  
საღამოს საათებში მიზღინარობის პიანტოფორი ფ-ის გეპით. მხედველობითი პალეონაციების შეიძლება თან  
პერიოდულ გავტყვება და სწებითი (აკოშმებზე, ფონემებზე) პალეონაციები. ბოლივიანი ანალიზებისა და დროის  
შემოიფარდება დიუქური პარანიოლობით, აუქტი არადრნა შოთოფით და სუსტად გამოზბაული შიშის განკლით.  
სინონ: რ. *პროტრასპირაზი*.

რ. **ტიპური ტაქსონომია** - *ჟ. თაყაიანი*. უმეტესად იწყება ტიპური ფ-თვის დამახასიათებელი კლინიკური სურათით,  
რომელიც შემდგომში განიცდის გრანსფორმაციას: კლინიკური სურათი ღარბობა პალეონაციური-ილუზორული და  
აუქტიური ანალიზებით. დღეის საგოთან ბოლდა სუსტადაა გამოხატული ან სრულებით არ არის. ფსიქოზოლოგური  
ანგნება არ ატარებს თავბაქობს და განარჩევს ხასიათს. დამახასიათებელია უჭვეი, ავტომატიზებული მოქმედებები.  
მოძრაობითი აქტივობა ასახავს ავადმყოფის ჩვეულ პროფესიულ მოღაქეობას. ფსიქოზი მიზღინარობის ლუციდური  
პერიოდების გარეშე ფ-ის დასაწყისში შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს გარშემოშოყოფთა ცრე ცნობას. ტიპური  
მიზღინარობის დროს ავტოფსიქიკური ორინენტაცია შენახულია. მძიმე შემთხვევებში შეიძლება გადაიღეს შუახანობაზე  
ფ-ში გამოაზრბირების უმეტეს აღნიშნება გადაგზავლის იმენება. სინონ: ხანტოტოტიზი *პროტრასპირაზი*  
*პროტრასპირაზი*.

რ. **ტიპური ტაქსონომია** - *ჟ. თაყაიანი*. აღნიშნული გეპის ფ-ები ერთიანდება მიზღინარობის  
სიძიშის და გამოსავადის არაკეთილსამელობის მხედვით. კლინიკური გამოხატულებით უფრო ხშირად გვხვდება  
ტიპური, შუახანობაზე და პროფესიული და მიზღინარობის პროტონომია, შემთხვევითა იტენი ანამნეზში არსებული  
მხედველი კლინიკური ფეონომები: ალკოჰოლისაღმი მაღალი გოჯერანტობა, ფსიქოზის მანიფესტაციის წინ ხანგრძლივი,  
სისტემატური სმა, ეპილეფსიფორმული დელეერების არსებობა და სხვ. საკუთრე ფსიქოზის დამამეებისაღმი გენდერციაზე  
საოთიოების გარკუბის სინდრომის სწრაფი ფორმირება, გამოზბაული ნეირო-ფეგატაციური დარღვევები, პიქურთრბია,  
იანქრება ჰეპატობის არსებობა, დეიდას ვადილება და მისი ფუნქციის მოშლა. სინონ: რ. *ტიპური ტაქსონომია*.

რ. **ტიპური ტაქსონომია** - *ჟ. თაყაიანი*. აღნიშნება მოხუცებლობითი ჰეკას უსტობის დროს, მიზღინარობის სიმატრად დამიშებელ  
სიბადებზე გამოვლინდება ღამის საათებში დარბი, ნაკლებად მოძრავი, უფოზოური ფერმკრთალი პალეონაციების  
სახათ. ფსიქონ: (*ჯიჯანი* *ა.ე.*, 1960) აღნიშნება, რომ ადქმითი პროექციების გავუღმარობებში ასეთ შემთხვევებში  
უფრო მნიშენელოვანია მოგადი „ადქმება და ორინენტაციის დეფექტობა“, ვიდრე პალეონაციები. კლინიკურ  
სურათში უგრადებას იტარობს ანგეზოური დეზორენტირება, სივტაციის ვადანაცლება წარსულში, ავადმყოფთა  
აწყვეტი აქტიურობა, მოზვენებითი „საქმანობა“, ფესფესი, ხშირად პარანესიები. სინონ: შუახანობა *ტიპური ტაქსონომია*.  
რ. *ტიპური*.

რ. **ტიპური ტაქსონომია** - *ჟ. თაყაიანი*. დამახასიათებელია მრავლობითი სუნისმატარო მხედველობითი  
პალეონაციები, უმეტესად საუჯტო განვიტარებითი. ავადმყოფები ხუდრე გაქცევის, ლეუვის, მასობრე სანახაობების  
აშახველ სუნებს, რომლის მოწაწილები თვითონ არიან გამოზბაულია შიშის აფექტი. ბოლდით განკლები ცვალებიდა,  
გამომინარობის პალეონაციების და ილუზიების შინაარსიდან, არამყარ და არასისმატარებულია ფსიქოზი შეიძლება  
მიზღინარობის ერთ კვირამდე შეგ ხანს, გამოსავად ღობისური. ხშირად რჩება რემიდალური ბოლდა, ანგნება ნაწილობრივია.  
რ. **ტიპური ტაქსონომია** - *ჟ. თაყაიანი*. ცნობიანებზე დეფორული ტიპი შეეკება, გამოვლინდება თაქის გენში  
სისხლის მომოქციების მოშლის შედეგად. უეთიარღებით გამოზბაული ცრებრული ათეროსკლეროზით, თაქის გენში  
სისხლის მომოქციების მწვევე მოშლით და არტერიული პიქურტონით დაავადებულეს უიორატესად ღამის საათებში.  
რ. **ტიპური ტაქსონომია** - *ჟ. თაყაიანი*. აღნიშნება ეთილირებული ჰეჯინანი მწვავე  
მოწაწილებზე შედეგად. პროლოგული პერიოდის (უბოლბა, სისუსტე, პიანტოფორი პალეონაციები) შემდეგ მწდება  
ურსოთი, ევზოგებითი პალეონაციები, პირის დრში უფო სხეულების არსებობის შეგრძნება (დაფი, თმა, მავთული,  
წროლი ცხოველები - „იმაზე სიმატობა“). ავადმყოფები ვანიცილიან შიშს. ფსიქოზი გრძელდება აქტივად შეიძლება  
მაღლიონ მნიშენელოვან ხარისხს. დამახასიათებელია სიმატობა გრიადა: შიქოვობა, შიქოთერბა და მრადალირბა.  
მძიმე მოწაწილების შემთხვევაში გრადის კომანი.

რ. **ტიპური ტაქსონომია** - *ჟ. თაყაიანი*. აღმოცენდება ტოფრანოლის (ამბარამანის) მაღალი დოზების  
მიღების ფონზე, უმეტესად მოხუცებლობით ასაკში.

რ. **ტიპური ტაქსონომია** - *ჟ. თაყაიანი*. აღმოცენდება თაქის გენის ტრანტების მწვავე პერიოდში. კლინიკური სურათი  
როგორც გამოზბაულებით, ასევე მიზღინარობითი მრავალფეროვანია.

რ. **ტიპური ტაქსონომია** - *ჟ. თაყაიანი*. აღკოპოლური ფ-ის ერთობი სახე. ინიაციული პერიოდში აღნიშნება  
მრავლობითი მტრწიანეი და მნათი ფოტოფსიები (მევერი, ბოლი, თმები, ობობას ქელი, ძაგები, სპირალები და ა.შ.).  
ტიპური ფ-თვის დამახასიათებელი პალეონაციების არსებობა მეტად იშვიათია. შეიძლება თან ერთოდეს აკოშმებზე.





- რ. ანტირქიმული - ა ანთოპოლოგია აღინიშნება თავის გენის სისხლძარღვთა ათროსკლეროზის დროს. მიმდინარეობა პროგრესიულია, საწყის სტადიებში შეჩერებებით და რემისიებით. კლინიკური სურათი მრავალფეროვანია; პრონოზის უსიკაბითისმადეარი ცელილებები, კონსაკივის სინდრომი, ქალეუნიკურ-ბოლითის ჩართვები, ფუელოპარალიზური ცელილებები და ა.შ. დინამიკაში დაკუნრის ცელი გლობალური დემენცია.
- რ. პლემული - ა მათოზომა აღმოცენდება ალკოჰოლური ინტოქსიკაციის შედეგად. დამახასიათებელია ფსიქიკური დეგრადის პროგრესირებადი მთვინები. გამოიწინდება მესხიერების, ყურადღების, საკუთრივ ინტელექტის, ავტოტორ-პროგრული სფეროს, მორალურ-ეთიკური თვისებების დაქვეითებით. ა.დ. პროგრესირდება ყერებრულ ათროსკლეროზთან დართვის შემთხვევაში. იხ. სინდრომი პათოლოგიაში.
- რ. პნემოზი - ა მანეთოლოგია წინა პლანში წამოწყულია მესხიერების უბრა პროგრადენტული დარღვევები (პროგრადენტული პნემოზი; პარაპნემოზი); მსხიური დემენციის დროს. მასიათების თავის გენის ორგანული დაზიანებით (განსაკუთრებით ატროფიული გენის მოხუცებულობით ჰუანსუგობის, ალკოჰოლის დაავადება) მიმდინარე დაეადებებს.
- რ. პნემოზი-პარაპნემოზი - ა მანეთოლოგია გამოიხატება კონსაკივის სინდრომის არსებობით აღინიშნება ყერებრული ათროსკლეროზის, მოხუცებულობით ჰუანსუგობის პრეპროგრადული ფორმის, ალკოჰოლის დაავადების დარღვეულ ვეაებზე, აგრეთვე ინტოქსიკაციური და ინტექსიური ფსიქოზების დროს.
- რ. პპთიზი - ა მანეთოლოგია მიმდინარეობს ნეპთი აქტოლოგის მნიშვნელობის დაქვეითების დროს და გენის მუცხეცვლებების რეგრადის, ეთიოლოგის გადაზიანება. უმეცხად გეხვდება თავის გენის მულ-კონტრასტური დოკადამაციის ორგანული დამაზიანების დროს (მაგ, სიკის დაავადების მუხლის ვარიანტი), რომლისთვისაც დამახასიათებელია ასპროგნობა, პასურობა.
- რ. პპთიზი - ა მანეთოლოგია აღმოცენდება თავის ტენიის სისხლის მოთქვევის მოხილხის ნიადამე-გენის სისხლძარღვოვანი ვეაგროფა შეიძლება განვითარდეს ან უკვე არსებული დემენციის ფონზე, ან იწვევის მწვავე დაკუნრ დემენციის (Абухат-Костантинидзе А.И., 1966). კლინიკური სურათი განპირობებულია, ერთის მხრივ, კერის დოკადამაციის მოთი, ხოლო, მეორე მხრე, კომპენსაციური მეტენიშების არსებობით. სინონ: რ. იმული მუცხეცვა.
- რ. პპთიზი - ა მანეთოლოგია გამოიხატება მულ-კონტრასტის ფუნქციის, გნოზის და პრაქსის კეროვანი დაზიანებით. გეხვდება ყერებრული ათროსკლეროზის, სიკის და ალკოჰოლის დაავადების, მოხუცებულობით ჰუანსუგობის რეკავიებით ვეაებზე და პროგრადული დამხლის მოგვირით ფორმის დროს.
- რ. პპთიზი - ა მანეთოლოგია დამახასიათებელია ავტოტორული სინდრომის დაავადება.
- რ. პლემული - ა მანეთოლოგია (Stierl G., 1928) გამოიწინდება თავის გენის დემენური ორგანული დამაზიანების დროს, როგორცაა პროგრადული დამხლა, მულ-კონტრასტის ტენიის ტენიის დაავადება. პროცესის დანაწყისში თვალსაჩინოა რთული და დეგრადირებული ინტელექტუალური ფუნქციების რეკავა. პროგრადენტით- გიკურია პროგრადენტის ბირთვის დამაზიანება სრულ დამლაზე. თითმემეცხეცვლი პროცესების უბეში დაიწყება. სინონ: რ. ტობული. იხ. პარაპნემოზი. რ. დემენცია.
- რ. დემენცია - ა მანეთოლოგია იხ. რ. ტობული.
- რ. დემენცია - ა მანეთოლოგია იხ. რ. ტობული.
- რ. პლემული - ა მანეთოლოგია სისათობა მესხიერების, ინტელექტის მულ-კონტრასტის თანდათანობით ვადარებით, მუნეცხელი, ინტელექტის, ბლანტი, "წიხიანი" ანრონებით, ალელიადეფექტობით და პოლარული ეთიოლოგიით (იხ. პლემული პარაპნემოზი). ადგილი აქვს კონტრასტულ დემენციას. დროთა განმავლობაში, იშვიათი გამოხატვის ვარიანტი, დ.ე. იმის ტობული დემენციის ხასიათის.
- რ. პპთიზი - ა მანეთოლოგია დამახასიათებელია აწველი განვითარება, აგნებალობა, გამახებრებულობა, სინდრული ფსიქოლოგიური აგნების ფონზე გეხვდება ვეაფუხის და მოგვირით ფორმის ვეაფუხელოტების დროს.
- რ. ტობული - ა მანეთოლოგია გეხვდება მულ-კონტრასტის ბირთვის ლორბალურ-მედიკალური ბირთვის დამაზიანების დროს. დამახასიათებელია ეთიოლოგიის სინდრომი, ინოვაციის დაკრევა. ფსიქოლოლოგიურად მხელი განსარჩევა თავის გენის მულ-კონტრასტური ნაწლის დამაზიანების კლინიკისგან.
- რ. ტობული დემენცია (პპთი) - ა მანეთოლოგია იხ. ტობული რეკავება.
- რ. იმული მუცხეცვა - ა მანეთოლოგია იხ. რ. ტობული.
- რ. იმული მუცხეცვა - ა მანეთოლოგია იხ. რ. ტობული.
- რ. კონტრასტული - ა მანეთოლოგია დამახასიათებელია პროგრადული საკუთარ თავზე და საკუთარ ინტერესებზე ყრადღების გამახივება, პროგრადული ეთიოლოგია. უმეცხად გეხვდება ვეაფუხის დროს.
- რ. კონტრასტული - ა მანეთოლოგია (ლთ. curabnis - კურნებადი). მწვავე დ-ის სინდრომი. ვაპოირჩევა ფსიქიკური ეკანრობის სიმპტომაციის სრავა რეგრადენტობით. გრმინი მოქველებულია იხ. რ. კონტრასტული.
- რ. კონტრასტული - ა მანეთოლოგია (Stierl G., 1928) წარმოადგენს თავის გენის უბრა ორგანული დაზიანების შედეგად გეხვდება ყერებრული ათროსკლეროზის, თავის გენის სრადისის, ვეა-გენის გრადის, გენის მოგვირით სინდრომის დროს. დამახასიათებელია ინტელექტის საწყისების დამაზიანება, ფსიქიკური ფუნქციის არათანბარი დაქვეითება, სიმპტომატიკის, პროგრადენტის დროს დაქვეითება მისი ბირთვის და მორალურ-ეთიკური თვისებების შენარჩუნების ფონზე.
- რ. პარაპნემოზი - ა მანეთოლოგია იხ. რ. ტობული.
- რ. პარაპნემოზი - ა მანეთოლოგია დამახასიათებელია ნეპთიური არპროგრადული სიმპტომაციით მიმდინარეობა. ყერებრული ათროსკლეროზის, მოხუცებულობით ჰუანსუგობის, ეპილეფისის და სხვ. დაავადების დროს შეიძლება გამოვლინდეს როგორც ვეაფუხე ანუ გეხვდება ვეაფუხის დროს. იხ. სინდრომი. მულ-კონტრასტული ათროსკლეროზის დროს. შესაძლებელია მარტივი დაკუნრული დემენცია ეპილეფისის დროს, მარტივ დაკუნრული დემენცია მარტივ ვეაფუხის დროს. მარტივ დაკუნრული დემენცია მარტივ ვეაფუხის დროს.
- რ. პარაპნემოზი - ა მანეთოლოგია იხ. რ. ტობული.
- რ. პარაპნემოზი - ა მანეთოლოგია გრმინის შემოზიანება ტობული მნიშვნელობა. განხილავდეს ერთიანი ფსიქოზის მიმდინარეობაში. იხ. ტობული-პარაპნემოზი-პროგნობა მნიშვნელოვანი მნიშვნელობის მნიშვნელობა.







- შესდგომ პერიოდში, როცა ხაემუს უკვე ჩამოყალიბებული ბქეს ღედის შიძარტ "დამოკიდებულება". პათოგონური ნაღდანი, სვედანი გაზომვეყულება, აუტსტრობა, აპათია, ფსიქომოგორული შეკავება, სიამოენების გრძნობის უქონლობა, აწუელი გამღმობიებლობა, ფართოდ გახვლილი თვალეხი, კონტაქტის გამბელება, რიგი ფსიქოსომატური მახეებელები: ძიღ-ღვიძილის რითმის დარღვევა, წოვის უნარის დარღვევა, დისპეფსია, ეპიზოდური სუბჟერნილიტეფი. დღესათან კონტაქტის აღდგენის შემთხვევაში აღინიშნება დ-ის სიმტკობთა უკუგანეთიარება.
- დ. ანდამსტრუმი - დ. АНДРАСТУСКИ (Laster H., 1962). ენდოგენური დ-ის სახე, რომლის დროსაც ერთობლივად ეწვლება როგორც ანანესტურს, ასევე დეპრესიული სიმტკობთაყ. დამახასიათებელია ხანგრძლივი შიშლინარეობა. ამ შემთხვევებში ანანესტური სიმტკობთაყა განიხილება როგორც პრემორბიდეული ფსიქასთენური ხასიათის ჯაქყარების გამოვლინება.
- დ. ანსამოშიური - დ. АНСАМОШЕВСКАЯ ფ. მიმდინარე ფსიქიკური ანესთეზია - მტანჯული უგრძობლობა, შინაგანი სიყაროელის, ახლობლებისადმი მგრძობობარე დამოკიდებულების დეკარგეტი, ემოციური რემონანსის ტაქრობის შეგრძნებით.
- დ. ანსამოშიური - დ. АНСАМОШЕВА (Lopez-Thor J.J., 1959). ფ. მიმდინარე გამოხატული შიშის განკლით. სინონ: ანსამოშიური.
- დ. ანდამრეშიური - დ. АНДРАСТУСКИ ფ. მიმდინარე ანჰედონით (სიხარულის, სიტყბიების გრძნობის დეკარგეტი).
- დ. ანსამინამსტრუმი - დ. АНСАМИНСТРУМСКАЯ გამოხატება შერეული მდგომარეობით, რომელსაც თან ახლავს დეპრესიის ფონზე ხანგრძლივი შეტყულებებით და მოგორული აგზნება. მიმდინარეობს შეოთებით, თეთიგვეთით, მოჯერ მტინიარეობით, შიშით. ასეთ შემთხვევებში დეპრესია შეოთიფან-აფიტრეზულ დ-ში ან აფიტრეზულ დ-ში შიშით. შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს დეპრესიული ბოღვის (კოტარბო ზოდგა) წარმოშობასაც ცვაყრულადე უ., 1954).
- დ. ასთენიური - დ. АСТЕНИЧЕСКАЯ ფ., მიმდინარე გამოხატული ასთენით, ფიზიკური და ფსიქიკური განღვეალობით, პიერესთებით.
- დ. ბაქრულარული - დ. БИХРАУЛАРСКАЯ მდგოს მიმდინარეობის განსაკყარებულ ფორმა, როცა შინადაკლური და დეპრესიული ფაზები ერთმანეთს ეცლის ნათელი პერიოდების გარეშე (Peters U.H., 1977). ეყვება 15-20 წლის ასაკში ცოკლითიშიარ პირინებებს. ფაზები შირია. ამ შემთხვევაში უფრო სწორია საუბარო ბიპოლარულ ფაზაზე.
- დ. ბორეშიტი - დ. БИРЕТИЯ (Peters U.H., 1967). ზოდგო შეზღუდულ დ. დამახასიათებელია პალეონიციების არარსებობა, თეთობრალების იდეები დენისა და დამოკიდებულების ბოღვის ფონზე. დეპრესიული სიმტკობები გამოიხატება ამორების შეკავების სუბიექტური შეგრძნებით, ძილის დარღვევით, ღლის სათუხში აკუთავებული ბრძნობით, მოშაელის უიფობით და შიშით. სომატული აღნიშნება შადის დეკარგეტი, ფიზიკური სისუსტის შეგრძნება, სიგაზრულ, გამოფიგეკ გუნება-განწყობის სადღეამისო შეგრეობა არ აღინიშნება. პირველი ფაზის შინაფიგეტიკა ხდება შუახნის ასაკში. უნების ხანგრძლივობა ზოდან 6 თვეზე. გამოხატულია სუიციდური გენღენიციები. სინონ: დ. ბარეშიტი.
- დ. ბუსულენა - დ. БУСУЛЕНА ფ. გამოხატულია უპირატესად გარემომტყობა და გარემოსადმი უკმაყოფილებით. მუშეფი ბუღუნით, პირქუში გუნება-განწყობით, გარე მოღღენიხსადმი არაკეთილგანწყობით. სინონ: დ. ბუსულენა.
- დ. ბარეშიტი - დ. БИРЕТИЯ (Peters U.H., 1967). ხანგრძლივი ემოციური დამახლობით ან ფსიქიკური გრავებებით გამოწვეული დ-ის ტაყბებური ფორმა დამახასიათებელია შიშარეკსეღიანი ან მოღღელუდაპათიური გუნება-განწყობის სიმტკობთარენალური სისტემის დეკომპენსაციითან ერთად. პროლოგრულ პერიოდში გამოვლინა პი პათიონური ასოშიარება და ფსიქოსომატური ენდოგენიგონური გამოღმებები და შიღილება. აღინიშნება ტრეღენიკა ვიგაღმაიციისა და შეოთიანი-პოქინორიული სიმტკობთაყის ჩამოყალიბებისადმი. უმეტესად გზარეობათ სენსიტიური ასთენიური ბუნების ინვატიკული და დეკოსომბური კონსტიტუციის 30-50 წლის ქალეხი. შამაკეობა პრემორბიტი ხასიათიღიანი უკავარეობით, ეყოყენღრითში, ამპარეფიკობით. სინონ: დ. ბუსულენა.
- დ. ბანსამსტრუმი - დ. БАНСАМУСТРУМСКАЯ ფ. აღმოცენდება ხანგრძლივი ფსიქიკური დამახლობის, შიშზე განღლების და აღღლების შეღდგე ეთარღება გაიტრეტტებ ენდორეტტული დეპრესიის (ღვითიამთ) ტაით.
- დ. ბაქსიკობისა - დ. БИХИКОБИСА კლინიკურ სურათში დეგენობალიზაციურ-დერეღიზაციური ხანღრთობით მიმდინარე დეპრესიული მდგომარეობა. აღღება ანესთეზიურ დ-სთან და დამახასიათებელია გახანგრძლივებულ მიმდინარეობა.
- დ. ბაქსიკობისა - დ. БИХИКОБИЯ (Meadow W., 1922). ინოლეციურ ასაკში განხეთარებულ, კლინიკურ სურათში შიშით მიმდინარე ენდოგენური ფ. გენღენიით ქრონიკული მიმდინარეობისადმი. ძირითად სიმტკობები: დეპრესია, შიში, მოუყენებობა, იპოქონდრიული ჩივლები, აფიქონდრიული ზოდგა. (იხ. დ. ბაქსიკობის უპტბისა. ბორეშიტი მარეფიკობა. ბორეშიტი მარეფიკობა). ხანგრძლივი მიმდინარეობისას აღმოცენდება კატატონისმაჯვარი სიმტკობები: უმოქობა, შუგინში, ბრადიქინეფია.
- დ. დეპრესიული - დ. ДЕПРЕССИВНАЯ ფ. ნეკ აღღება იხ. დ. ლატრეტტა.
- დ. დეპრესიური - დ. ДЕПРЕССИВНАЯ ფ. განსაკყარებული ფორმა, აღმოცენდება ფსიქიკურ ან სომატოგენურ ნიაღბზე (40 წლის ასაკის შემღვე და კლინიკურად ჰავას ენდოგენურ დეპრესიას. ამ ფორმების უფარეს შეზღღღერი ადგელი რეაქტაულ და ენდოგენურ დეპრესიის შორის. ანაზეფში არ აღინიშნება გამოკვეთილი ემოციური ცვლილებები. სინონ: ბანსამსტრუმი ენდოგენური დეპრესიული ფორმა.
- დ. დეპრესიური - დ. ДЕПРЕССИВНАЯ ფ. მიმდინარე ბოდშიანობით, მოღღელული გამღნიანებლობით, გარემომყოფებისადმი არაკეთილგანწყობით.
- დ. მუსტიტინესტალური - დ. МУСТИТИНЕСТАЛОВАЯ (Hilsmner H., 1954). დეპრესიული მდგომარეობა, როღღესაც ენდოგენური ვიგაღური დ-ის კლინიკურ სურათში აღინიშნება რეაქციული დ-ის კომპონენტები, სასოწარკვეთილება ნორმალური პიორენებთშორისი ურთიერთდამოკიდებულების გამოგარღნის გამო.
- დ. პერიოსტრუმი - დ. ПЕРИОСТРУМСКАЯ აღინიშნება სახის დ-ის არ ახასიათებს პრივეციული უფონში. ავადმყოფს შის გარემომყოფი ვიგაღ მაინია მასზე უფრო უმრუნეღელია, რაც, ერთი შერიც, ხელს უწყობს დ-ის წარმოშობას, ხოლო, მეორე შერიც, აღრმეებს მას.



შევეთი დაქვეითებით და მოგვიერ თვითბრალდების ბოლევით იდეებით, რაც განპირობებულია არა მარტო ფსიქოლოგიური მომენტებით, არამედ უფრო დიპრისიანტურ სტრუქტურებში ნეიროგანამხატვრების ცელის პროცესებით ნეიროლევსიური მოქმედების შედეგად (ვაშკარაძე შ., 1983). ხშირია სუიციდური ქმედობები, რომელსაც განპირობებულია განმეორებითი შეტევების მიზით. ხანგრძლივია რადიკალიზაცია და აღნიშნული თვლიდან წყვილდანიანებშიც. ხშირია ამინბინით და რეპრესიებით შეკრძალობის დროს.

დ. ნილაშვილი - ა. იოხან (Schneider K., 1949, 1955). დემარსული მდგომარეობები, მიზნინარე დაქვეითებული გრუნება-განწყობის, რომელიც არამყიდება ეწ. "სიდავიდალან", "ქვესაფუძვლიდან": პრემორბიდში და კლინიკაში არ ჩანს დემარსის მიხეში. ადგილი აქვს სუფთა აფექტურ ანალიზს განუხეიანებლობით. არ მოითხოვს სტაბილურად დახმარებას. ასეთი გიჟის დს თან არ ახლავს დემარსის განცდა. აღნიშნულ უმთავრესად ფსიქიკურად რანმრთელ ადამიანებს და ფსიქოპათებს. ცნება ახლოა განუშენის (Ганнушкин П.В., 1933) მიერ აღწერილ კონსტიტუციურ დემარსულ ფსიქოპათიზმთან და დეპონარდის (K.Loonhard, 1968) მიერ აღწერილ ბიროგნების აქტენტუაციის დამთავრ ტიპთან.

დ. პანტოფინი - ა. ПАНОФИНОВАЯ ცნება ახლოა ანაკსეტურ დთან; დამახასიათებელია ფობიური განცდების მრავალფეროვნება.

დ. პარანოიზი - ა. ПАРАНОИЯ ადინიშნება პროგრესული დამბლის შედარებით იშვიათი ფორმის დროს. მიზნინარობს შეკავებით, დემარსულ-ბოლევითი იდეებით, სუიციდური ცდებით. აღნიშნება დემარსულ-მაქონდრთული მდგომარეობები, მოგვიერ კოტარის ნიშლისტურ-მაქონდრთული ბოლვა, შფოთვითი ავტენტება. ზოგ შემთხვევაში, თუ ადგილი აქვს ენოგენურ რადიკალს, მიზნინარობს ციკლურად .

დ. პარანოიკალი - ა. ПАРАНОИКАЛИ იხ. დ. პარანოიკალი.

დ. პერიოდული - ა. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ იხ. დ. პერიოდული.

დ. პრემორბიდი - ა. ПРЕМОРБИДИ იხ. დ. ПРЕМОРБИДИ.

დ. პრემორბიდი პრემორბიდი - ა. ПРЕМОРБИДИ ПРЕМОРБИДИ (Kraepelin E., 1912). უმეტესად იწყება პრესინილურ ასაკში, თუმცა, აღწერილია 30 წლის შემდეგაც დამახასიათებელია აქტიური, ავთონიზანტი მდგომარეობა დ. კატატონი სიმპტომა უმეტესად (ნეგატივიზმის გარეშე), ორგანული ფსიქოპათიზმით და პროცესუალური ტრეპსუსებით. შფოთვით-ავტონიზანტი უმეტესად მიზნინარობს ცნობიერების ორგანული ანეფთი, ასოციაციის მიზნინარობის ანლით, რაც გამოვლენება დაქვეითებული შეტევებით. დაახლოებით 1 წელიწადში მთავრდება სიკვდილით. შორეულფორმად გამოხატულია თავის გიჟის ტერმის სპირული სამი შრის ურგნული ავროვია, უმეტესად მოლანის სტეულის, ნუშისფორმის სტეულის და დაქვილული ბირობის. მოკლეტერმის პრესინილურ დემარსულ ენოლოგია უცნობია. სინონ: პრემორბიდი დამარსული.

დ. პრემორბიდი - ა. ПРЕМОРБИДИ უმეტესად აღნიშნება ადინიშნება გრუნება-განწყობის ცვალებადობა და რეკონსტიტუციური აფექტური ფაზები. შედგომის მიზნინარობს როგორც მდგ.

დ. რბილი - ა. РАДИКАლი იხ. დ. რბილი.

დ. რამბტალი - ა. РАМБТАლი დამახასიათებელია ფსიქოგენური წარმოშობა. ხასიათდება დ. სველის აუქტით და ზოგად ფსიქოლოგიურ შეკავებით. შეიძლება ადინიშნება ასთენიური, ისტერიული და პარანოიკული ჩართვები. უნება-განწყობის დლორი მერყეობა არ აღინიშნება. სედა არ ატარებს ვიგადურ ხასიათს. ავადმყოფთა განცდებში დამინარობს ფსიქოგენურ-მატრადემარსული სიტუაციის პროგნოზი კეთილსაიმელოა, მაგრამ შესაძლებელია განხატვლებული მიზნინარობა.

დ. რანგინგალი - ა. РАНАЖИКАლი უმეტესად ცნება ავრონტოლოგიურ პრაქტიკაში სანტიერებელი ადგილის შეკვლის ანუ რეველი სტერეოტიპების ნერვული დროს.

დ. რანგინგალი - ა. РАНАЖИКАლი იხ. დ. რანგინგალი. სინონ: დ. რანგინგალი.

დ. რამბტალი - ა. РАМБТАლი დ. აღმოცენებული თავის გიჟის ორგანული დამინიების და მინიგანი ორგანობის დაავადებების დროს. ფართო გაკებით, უმეტესად გარდა ცხვება დ.

დ. რანგინგალი - ა. РАНАЖИКАლი მიუკუთვნება რეაქტიული და (ან) ახტენური შეფერილობით მიზნინარე ტრეპტული ათეოსიკური მისის სავის ეგაქსზე გამოვლენილ დ. დამახასიათებელია ენოციური დამილია, მიდრეკილება დისფორიებისადმი, ცრულბანი გრუნება-განწყობა, სიმარტური და აქტიონური წიგნები, თავიერუსხევა, თავის გიჟი, მუხსიერების დაქვეითება. მაკრონოული დაავადების შემთხვევაში შეიძლება ადგილი ჰქონდეს მიზით მიზნინარე შფოთვით-გარტული მდგომარეობებს.

დ. რანგინგალი - ა. РАНАЖИКАლი უმეტესად ორგანობის დაავადებებთან დაქვეითებული აღმოცენებული დ. როგორც წესი, დან ერთის ასთენია. გარკვეულ მნიშვნელობას იძენს რეაქტიული მომენტები. დემარსული გამოვლენები რიგის ნერვობის გარკვეულში და რეკონსტიტუციური, თუმცა გართულების შემთხვევაში შესაძლებელია ვიგადობა.

დ. რანგინგალი - ა. РАНАЖИКАლი დ. გამოხატულია ავროგნებით და მოქმედებით შეკავებით. ზოგ შემთხვევაში შეკავება აღწევს სტეორულ მდგომარეობას (ვაშკარაძე შ., 1954).

დ. რანგინგალი - ა. РАНАЖИКАლი რეაქტიული დს სხვა აღნიშნულთან სიმეორე გვეებს, პატიონის, საკონსტრუქციო ტანკების გრუნება. დამახასიათებელია ხანგრძლივი მიზნინარობა დემარსული ფობიური განცდებით, ასთენიით, სურვილებისა და შრომის უნარის დაქვეითებით. წარმოადგენს ადინიშნულ კონგინგანში სიკვდილიანობის ერთ-ერთ ფორმას. ემსგავსება კვ. სინდრომს.

დ. რანგინგალი - ა. РАНАЖИКАლი (Schneider K., 1949). სიმარტურად დაგვირთულ ფონზე (მენტრუაქია, კლინიკის, სიმარტოგენური ასთენია) განვითარებული რეაქტიული გრუნება ფსიქოგენული მდგომარეობა. უჭირავს შეკავებული ადგილი უნდოგენურ. რეაქტიული და სიმარტოგენურ დს შრომის.

დ. რანგინგალი - ა. РАНАЖИКАლი იხ. დ. რანგინგალი.

დ. რანგინგალი - ა. РАНАЖИКАლი იხ. დ. რანგინგალი.

დ. რანგინგალი - ა. РАНАЖИКАლი დ. მიზნინარე მოძრაობების და ავროგნების შეხელებით, რომლის გადრეკებაში შეიძლება გამოიწვიოს დემარსული სტეორი.



**ლ. შენიღაშვილი** - *А. Исааковича* იბ. **ლ. ლატანტაშვილი**.

**ლ. ვაგნიანი** - *А. Чухра* დ., მიწლიანე კლინიკურ სურათში არამოტივებულმა შიშმა გრძობის არსებობით. ელნიღბა აგრეთვე მოუსვენრობა, აუხსნელი საშიშროების შეგრძნება, რომელიც ვრცელდება აუღამყოფებ და მის ახლობლებზე. სინამ: **რ. ანანოვი**.

**ლ. შუმიტოვი** - *А. Трехкина* დ., რომლის კლინიკურ სურათში დომინირებს შუთოვა. დამახასიათებელია აუღამყოფის ფიქტური შიშავალი უბედურების შესახებ. ხშირად გვხვდება თითბარადლების, ცოლფიანობის იღეუბი. თუმაჲ შიშ ვეშთიევაში აუღამყოფი აღიქვამს მია როგორც მისთვის დამსახურებლად მოვლენად უბედურებას. გამოხატულია აგრეთვე შობიარობით და მეტყუელებითი ლამენგაყია, შუთთვის ეღრმეებესთან ერთად - ბეიგაყია.

**ლ. ტამაროვიძე** - *А. Шахтасарова* 1) ცირკულარული დ-ის ყუეღამე თოლი ფორმა; 2) ცოლოთიშის ფაზა ზეღმარესული გამოვლენებით; 3) უცხოურ ლიგერაგურამი, განსაკუთრებით გერმანულენოვანში, გამოიყენება მღფის დეპრესიული ფაზის ექვივალენტურ ცნებად. კანაბახი (Каменух Ю.В., 1914) წარმოადგენდა რა ცოლოთიშის როგორც მღფის რეღმინგულ ფორმას, აღწერდა მემღეე სინდრომებს: 1) მობითოფიურა - ძირითადი როლი მიენიება გუნება-განწყობის დაქვეითებას წარმოადგენილ სუფთა სახით ინგელექტუალური პრობლემატიკის გარემე (ანარკოლექტივი დეპრესია); 2) ამბოფურა - უმოწყობა, გარემოსადმი ინტერესების დაქვეითება, მოვლენა, აპათია; 3) აბიურა - წინა პლანზე წამოყუელია თიფგრძობის ასთენური ხახათის გაცეღება; 4) ბოქონდრესული; 5) ფეხქბთიურა; 6) ნარკოზიურა, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დიფსონორი შეგეუბი.

**ლ. ტამაროვიძე** - *А. Шахтасарова* წარმოადგენს მღფის დეპრესიულ ფაზას. გამოხატულების მიხედვით არჩევენ (Иванович Т.Ф., 1970): ცოლოთიშის, არღრმას (ზეღმარესიები), მარტიეს (ყუეღამე უფრო ხშირი და გიჲური), ბოღიის, მეღანტილიურ პარაფრენას.

**ლ. ტარაშვილი** - *А. Сухомлин* დ., რომელსაც თან ერთვის გულჩეღობა, ცრებლიანობა. ხშირად გვხვდება თავის გეინის სისხღმარღობა დაფაღებების დროს.

**ლ. პალეონიძე-პარანოიკული** - *А. Гаспарян* სინდრომის სტრუქტურამი ადგილი აქვს ეერხალურ ქალეყინაყებს და იღუხებს, დაღანაშაულების, შექარის, ლენის ბოღობი იღებს. უმეტესად გვგვღება შიშუღებულებით ახაჲია.

**ღემარეშვილი** *პეშეშვილი* - *депрессивное состояние* იბ. **პეშეშვილი** *ღემარეშვილი*.

**ღემარეშვილი** - *депрессивная* (ანღ. deprivation - მოკლებული, დაკარგული). სამეღიეინო ლიგერაგურამი გამოიყენება როგორც ორგანიზმის რაიბე ფუნქციის შესვლები, არასაკმარისად გამოვლენების, დაკარგვის აღსანიშნავად.

**ღ. დემურაძე** - *А. Матвеевич* დღვასთან არასაკმარისი კონტაქტები გამოწვეული ანღვლები (ანღვეულ ასაჲი). ადგილი აქვს ნეგროზულ და ფეიქოზური ღონის აფექტურ აშღღობებს - ანაკლიტიურა დემურა (Spitz R., 1946). მიიწევენ არღვეულ ზავშუთა ასაჲი გამოვლენილი შიბოფრენის ერთ-ერთ უტიოლოგიურ უქტიორად (Leubard K., 1986).

**ღ. შიქარაშვილი** - *А. Угителская* ცხოვრების წესით განპირობებული შობრახობითი აქტივობის შეზღუღვა.

**ღ. ხენსორელი** - *А. Сухомлин* ცხოვეღქმეღებისთვის აუცილებელი ინფორმაციის არქონა, რომელიც ხშირად ბიენს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ფიქტიური აშღღობების პათოგენეზის, მღ, შარღ ბონებს ტობის პალეცნობა.

**ღ. სიტყაშვილი** - *А. Сухомлин* გარე სამყაროსთან არასაკმარისი კონტაქტი, რის გამოც არ ხღდება ფიქციის ნორმალური განვითარება, მღ, კასპარ პუშერის და შუეღის სინდრომი, ან არღე არსებულ სოყიადღური ადაჲაციის დაკარგვა, მღ, ეგბისგენეზიადღური დეპრესია, მიმიე ნეგროზული მღგომარეობები, გამოწვეული საშახურებრივი ან ოჯახური ყუეღებებით, ნარკოზიანი და სხვ.

**ღ. სპისობრეში** - *А. Полон* იბ. **პსტინტაშვილი** *სპისობრეში*.

**ღ. ძიღობა** - *А. Сухомлин* შეკრხაღობა. გამოიყენება ძირითადად თერაპიულად რემისტენგული ან ენღოგენური დეპრესიების ხაწყის სგაღებზე. შეიღღება ფის ტოტაღური - 36-40 საათის უბიღობა, ან ნაწღობრივი - 18-20 საათის ბღლებითი უბიღობა.

**ღემარეშვილი** *ღემარეშვილი* *შემარეშვილი* - *Держина директивная психотерапия* (Déjérine J., 1902). ფეიქოთერაპიული შეოთღე, დაშეარებულია სუესციასა და აღმრღამე. არსებითი მნიშვნელობა ენიება ფიქტიოთერაპიული რეჲქმეღების ერთიგე. პროგრესიულობის, ფსიქოპედიის პროფესში აუღამყოფის და ექიშის განღლის თანხედრობის აუღღღობობს. მნიშვნელოვან ფაქტიორად თთღება აუღამყოფის იბოღაყია, მისი გაღყვანა ჩეუეღებრივი გარემოდან სააყადშეოფობი.

**ღემარეშვილი** *ცენტრი* - *Держина центр* (Déjérine J.-J., 1891). თავის გეინის დომინანტური პეშისფეროს ქერქის ეუთხის ხეუღის შიღამი. დამოკიღებულებამი მეტყუელების ფუნქციასთან. დ-ყ-ის დამანების დროს აღინიშნება აღყესა (ზეტყეფური ხბრმაღე).

**ღემარეშვილი** *ლიტბაღეში* *შემარეშვილი* - *Держина-Лихтхайна феномен* (Déjérine J., 1906; Lichtheim L., 1884). აღინიშნება ზეღმარესული შიტიორული აჲაზხმ დროს, როცა არგეკლირებული მეტყუელება შეუღებუღობა, მარგამ სიყუეღების აღყმა შენარუნებუღობა. აუღამყოფის არ შეუღღია სიყუეღის წარბოტქმა, მარგამ შეუღღია ეესტებით აიეუნის რამღენი მარეკაღობა, ბმოენია სიყუეღობა.

**ღემარეშვილი** *ტომას სინდრომი* - *Держина-Томас синдром* (Déjérine J., 1902; Thomas A., 1900). თაყეს ტღენის ფეხებბ ატირფობა საბიშის კოორღინაციის დარღვეუბით. დასაწყის 35-40 წლის ასაჲი; აღინიშნება სიარღლის დარღვეუბი, შეღღამიშე აგაჲობა ვრეღღობა ზეღა სღღრებზე (წყრის დარღვეუბა). მარღვის შეუკაყებუღობა. პათოლოგიური რეჲქმეღების დეპრესია. პროგრესიულობა იღმენყია. შოგჯერი - პარკინსონიანი. აღინიშნება სიარღღული და მეშყეღღობობითი (გღღამოშის აეგოსომურ-ღომინანტური და აეგოსომურ-რეყესიული გიჲები) ფორმეზა. სინონ: *რღმარეშვილი-ტომას-სინდრომი* ატირფობა, *პარკინსონი* *სინდრომი* აბაჲაზა, *შემარეშვილი* *ღემარეშვილი* *ღემარეშვილი*.

**ღემარეშვილი** *პრობლემა* - *депрессивная* (ღაი. *solis* - სასოზრივი). ფეიქოთერაპიული რეჲქმეღება, დამახასიათებელია გარემობის რეღღური აღყმის უნარბს დაკარგვბს განყდა. ამ დროს ბბიექტუალ არსებულ რეღღობა, ცოლოთიშული საყებბი, მოვლენები აღღმენება შეეღღიღად, დამახინჯებულად დროში, სიყრეში, ფორბით, შომით, შეუერღობობით.

ურთიერთმდებარეობით და ა.შ. ირდევს გარემოს ღრმადი სიღრმისა და პერსპექტივის შეგრძობა. ღ განსაკუთრებული ფორმით ელანდება "უკვე ნახახს", "უკვე მიხმარება", "უკვე გაცდობს", "უკვე შექმნის", "უკვე არსებული სახეცვლის" და ანალოგიური ფენომენების სახით, სადაც სიტყვა "უკვეს" ნაყველად დგას სიტყვა "არახსოვს"(მხ.) ხშირად გვხვდება ლექსისონალიზაციისათვის ერთად. მხ. სინტაქსი მკვლევარის მსახურად.

**დერმატიზმი** - дерматизм (ფრანგ. realité - რეალობა). ფუნქციონებისაღმა, თუნებებისაღმა, რეალობიდან მოწყვეტისაღმა მიდრეკილება.

**დერმატიზმი** და **დერმატიზმი** - Дерматизм (Derkum F.X., 1888) პათოლოგიური ხასხასე ცხიმის არათანაბარი განაწილებით და კანზე ცხიმოვანი ქსოვილის მკვიდრელობით. უმეტესად ავადდებათ ქალები საშუალო და მოგვიანებით ასაკში. კლინიკურად გამოხატულია ნეიროენდოკრინული, ენდოკრინო-სისხლძარღვოვანი და ნეიროგროფიული დარღვევები. ძირ-ღვიძლის ციკლის დარღვევა, ასეთნადა, ლემარესა, მესმარების გაჯერება. მოგვრ ლემარესა. ხშირად ნეიროსისმატიკური ამბილოგები. არის მითითება, რომ პათოლოგიური მოუღენები უკავშირდება დენეგულირ ამბილოგის რეტოკულურ ფორმასა და თანამდებში. იმთავითად აქვს პარანოსის და ესპეციფიკურად ავანებს. მიზნობრივად ხანგრძლივი, პროგრადიულია. შესაძლებელია ხანმოკლე რემისიები. ცნობილია ნეირობიფიკური და ინტოქსიკაციური ფაქტორების, მემკვიდრეობითი წინაგანწყობის ეთიოლოგიური როლი (ტალკუმის ავტოსიმურ-დომინანტური ტიპი). სონან: პრემიზაღმის, დამატება, დამამატებო ბრძანებები. მკვლევარი სინტაქსი. მკვლევარი.

**დერმატიზმი** - дерматитизм (ბერძნ. დერმა - ფერა). მექანიკური შერბული გაღმინებით კანის ფერის შეცვლის ფენომენი. ღ-ის მიხედვით შეიძლება ენდოკრინო ნერული სისტემის ფუნქციონ. არსებობს თეთრი და წითელი დ. თეთრი დ. წარმოიქმნება გაღმინებებზე კაპილარული სისხლის სასაქობად; წითელი დ. - კაპილარების გაფართოების შედეგად. არჩევენ ძველფორმის და გაცვრულს.

**დერმატიზმი** - дерматитизм (ბერძნ. დერმა - კანი). კანის ავთიზაზანების, თმების ამოღების, ფრჩხილების კენჭისაღმა დაუღვევი ღოღოლი.

**დერმატიზმი** - дерматитизм (ბერძნ. დერმა - გაყვება, გინაღვევა). კანის ჭყვების, შეღვის, ვარცხნის, მიქეგისაღმა ავთიკული მიდრეკილება.

**დესპინოზი** სინტაქსი და **დესპინოზი** - Деспиноза синдром избирательной депрессии (Деспиноза В.Ф. 1978) მხ. მკვლევარი ლატვიელი.

**დესპინოზი** - депрессия (ბერძნ. deos - სხელი). ლექსონალიზაციის გარანტი, აბლო სხეულის სეფის ამბისთან. პარონება თითქმის არსებობს მთლიან ფსიქიკური აქტივით ფიზიკური სხეულებივე სუბსტრატის გარემუ-მზავის განცდა, როგორც წესი, ძველად ახალგაზრდა, თან ახალის დამრეხული შეგრძობა.

**დესპინოზი** - депрессия (ფრანგ. deuterus - დამატრეველი, დამრეხავი). გააბის (Waks E.) მიერ შემოღებული ფსიქიკალიზური ტერმინი, რომლითაც აღინიშნება ავთიანის ღოღოლი სიკვდილისაღმა.

**დესპინოზის ნეპროსისმატიკური ფორმის მკვლევარი** - Деспиноза неапатическая форма аутопатического депрессии (Деспиноза Ф.Ф. 1948). დაავადების ფორმები, რომლის კლინიკური თანამი განსაკუთრებულ რაოდენობის ნეიროსისმატიკური სიმპტომებიც (სეგრიფორმული, ასეთნადა და რისესული). მათი გენები რთულია: 1) ნეიროსისმატიკური დარღვევები შეიძლება იყოს ორგანული ბუნების და მთლიან გარემულად მოგვარების ნეიროსის თანკვლად ელემენტებს; 2) თავის გენის ორგანული დამატება ხელ შეუწყობს პარონული პრემორბიდული თავისებურების გამოყენების და განვითარებას; 3) შეიძლება გამოხატული იყოს პარონული რეაქცია დაავადებებზე და ამით განვირობებულ უსუსურება, მაგ. მოძრაობითი უსუსურება.

**დესპინოზის მკვლევარი** - депрессивная аутопатическая (ფრანგ. deuterus - გაუარესება). ფსიქიკური დეგრადების სახე ფსიქიკური მოქმედების ხარისხობრივად გაუარესება. გამოყენდება ენოიკური სისხლძარღვოვანი და ენოიკური, მოღუნებით, უნიფიკაციობით, ხშირად გვხვდება ფსიქიკური შეცვლის გადაცანის შემდეგ და უსუსულიცების დროს.

**დესპინოზი** - депрессия (ლათ. depresso - განსაღვრა). ფიზიკოლოგიური კონცეფცია ბუნებაში მიზნობრივ პროცესებსა და მოვლენებს შორის ძიებურ კავშირის და მიზნობრივობის შესახებ. უწინადადებათ დეგრადებისა და რომელიც უარყოფს მიზნობრივ კავშირებს ღ-ის პრინციპი გამოყენებულად ფსიქიკალიზში.

**დესპინოზის მკვლევარი** - депрессивная аутопатическая форма аутопатической депрессии (ფრანგ. deuterus - გაუარესება). ფსიქიკური დეგრადების ერთი სახე. მოღვევა გაყვებზე ნახშირზე საწინებზე სრულდებათ აღმინების ბოლოტური სინტაქსის პერიოდში. ფსიქიკალიზი გამოიყენება პრიონად უპასურობის სახით იმ დაავადების მკვლევარების, რომლებიც სათვალავებზე დეგრადაციური ბუნებისა; აგრეთვე ფსიქიკური მიზნობრივობის და ავთიანობის ნეოლოგიური სინტაქსის მკვლევარებისთვის.

**დესპინოზი** - депрессивная аутопатическая (ბერძნ. დერმა - საშუალო განცდა). ფსიქიკალიზში გამოხატავს ბუნების განცდას მისს ან ღის დაბადებისთან დაკავშირებით. პარონების დაკავშირების ავთიკური განცდა, ორთოლოგიული ფსიქიკალიზის თვალსაზრისით, წარმოადგენს ერთ-ერთ დარეულ ფსიქიკალიზს და განხილდება როგორც ბუნებრივი ნეიროსის გამოყვევა.

**დესპინოზი** - депресс (ლათ. depresso - უკმარისობა). ფსიქიკური დაავადების გამოყვევა რეზილუენტური ფსიქიკური ბირველი რეაქცია, მართონული ცვლადებში. გვხვდება მიზნობრივობის და თავის გენის ორგანული დამატების ავთიკური. სხვადასხვა დაავადებისთვის უკმარისობა განსხვავებული თვისებებით, მაგ. მიზნობრივის დროს უნიფიკაციის დაკავშირების ცვლილებებით. პარონებათ დისოციაციური გამოვლენებით. ქალა-გენის გრანულების დროს - ძირითადად ინტელექტუალურ-მენტალური და ხასიათობრივი ცვლადებით. ღ-ის გამოვლენების ხარისხი დამოკიდებულებაშია აგრეთვე დაავადების მიზნობრივობის კეთიან. მაგ. მიზნობრივის შეცვლისმატიკური პარონებიცვლით მიმდინარეობის დროს და უფრო სწრაფად ვითარდება და უფრო ღრმა, უფრო რეკურენტული ფორმის დროს (კამყვლივი შ. 1971; კამა გ. 1984; ცუკაშვილი შ. 1996).

**დესპინოზის მკვლევარი** - депрессивная аутопатическая (მაიზ F., 1937) ტპოლოგიური ჯგუფი. მიეკუთვნება იტალიურ კონსტიტუციის და გარდა ეპილეფიკური ხაზებისა; ახასიათებს მოცდობით

სხეულოვანი სსკდემების განვითარების სისუსტე (სხევადასხვად დისპლაზიები, ძვლის ნაკერების შეუხორცებლობა და სხვ.) და სისხლძარღვოვანი სისტემის ანატომიური უკანონობა. სინონ.: *ჰრესტიტუმი იმბაჰსინი*.

**დუშმბუქის რეპროდუქციული უნარი** - *репродуктивная способность* შენარჩუნება, შეისწავლის ფიზიკური და (ან) ფსიქიკური ნაკლოვანების შეთანხმებებს (ყრუების, სენეაღაქვეითებულთა, ბრძმების, მხედველობადაქვეითებულთა, გონებრივად ჩამორჩენილთა, ლოკომატივის, მოძრაობადაღრვეულთა) განვითარების და აღზრდის თავისებურებებს, შეიმუშავებს მათი შეკრანლობის და სოციალურ-შრომითი ადაპტაციის მეთოდებს. იყენებს ფსიქონევროლოგიური და ფსიქოლოგიური გამოკვლევების მონაცემებს.

**დუშმბუქის ინტელექტუალური უნარი** - *интеллектуальная способность* (Weick H.H., 1961) ებღოთიერებს ორგანული ფუნქციონირებას ანალოგიური ცნება. განისაზღვრება ფსიქიკური ფუნქციების შეუქცეადი დევეტების არსებობით; პირველ რიგში, ივლისისებდა დემენცია და პროვინების ხასიათობრივი ცვლილებები.

**დუშმბუქის ინტელექტუალური უნარი** - *интеллектуальная способность* (Haddenbrock S., 1964) შეაროლეფსობის ზინდრომის განიანტი. გვხვდება ნეიროლეფსობური პრეპარატების ხანგრძლივი მიღებისას, გამოწვეულია დოფამინერგული რეცეპტორების დაზიანებით. ნეიროლეფსობური პრეპარატების მოსხნა არ იწვევს ექსტრაპირამიდული პიპერკინემების რედეკორებას. დაზიანებისათვის კორეცორებილი პიპერკინემები - ენის გამოყოფა, დევეითი მოძრაობები, სახის კნთთა გრინასული შეკუმშვები, თანხმობის პიპერკინემები, სხეულის შედა ნაწილის და მუნჯის რითმული მოძრაობები, ხელის თითების ათეგოიდური მოძრაობები, მოძრაობები სტერეოტიპულია.

**დუშმბუქის ინტელექტუალური უნარი** - *интеллектуальная способность* (ბერძნ. ψυχή - სული, πάθος - განჯვა). ფსიქომათური რეაგირებისადადე მდრეკილებას უკვანჯნობარება. აღინიშნება მოზარდთა ასაკი ახალი კომპენსაციური მექანიზმების აშუშავების და დაღებთი შიროსოტიკური ვარემომი მოხვედრის დროს (Jurek A.E., 1983), ან მოხუკებულბში დაღებთი სოციალურ-ფსიქოლოგიური პირობების შექმნისას არაპქეთრად გამოხატული სისხლძარღვოვანი ცვლილებების ფონზე (Czark B.M., 1980).

**დუშმბუქის ინტელექტუალური უნარი** - *интеллектуальная способность*. ბოლოგოთური ტუტტი ენლოგენური დერესისის დაენოსტიკისა და ანგიდეგრესიული თერაპიის ეფექტურობის შეფასებისათვის. გამოკვლევების პირველი დღის ბოლოს ავადმყოფებზე დედევატამბომი (დომბ დამოკლებულია მეთოდის ვარაიანტზე) და შემდეგ დღის განისაზღვრება კორცინოლის ორზე სისხლს ჰაემობას და მარდბე. ნორმის დეესამეგობნა თრჯნავს კორცინოლის სეკრეციას დედევატამბომის განჩავლობაში, ამ უკანასკნელის ორზე ეშვება არსებული მღურბლის ევემობა. კორცინოლის დროის მომატება ენლოგენური დერესისის მაჩვენებელია. პიპოფიზის წინა წილის კორტიკოტროპულ პორმონებზე დეესამეგობნის სურათობრივი მოქმედების უკანონობა დერესისის გამოვლინების პროპორციულია. **ნულურბს და ოტოროტოგაბ** (Нулур Ю.Л., Остроумова М.Н., 1978) გამოკვლევებით, ტესტის ძირითად კრეტერიუმად უნდა ჩაითვლოს დეესამეგობნის შეყვანის შემდეგ კორცინოლის შევირების პროცენტული მაჩვენებელი და არა მისი აბსოლუტური ორღენობის შევირება.

**დუშმბუქის ინტელექტუალური უნარი** - *интеллектуальная способность* (ლათ. dolor - მარჯვენა, ინგლ. stress - დაძახება). მდგომარეობა, რომელიც აღმოცენდება ცაქცა ბავშვებში მათი იძულებითად (მექანიკურად) მარჯვენა ხელით წერის სწავლების დროს.

**დუშმბუქის ინტელექტუალური უნარი** - *интеллектуальная способность* (ლათ. decerebratio, ანგ. cerebrium - დიდი ტვინი). თავის ტვინის წინა არეების (დიდი პენინგეროები და შუამდებარე ტვინი) მოცილება (ან გამოცალკეება გადაკეუთის გზით) ცხოველებზე უკანაირმენების დროს.

**დუშმბუქის ინტელექტუალური უნარი** - *интеллектуальная способность* (rigiditas decerebrationis). გამშლელი უნარების ტონუსების რეგოთრი მთმატება. დრ-ის მექანიზმის იმპულსაციის გადაყუმის დადადევა კორცინულერეგოტეკული და რრროსპანაღური გზებით მოგო- და დაზიანებებითან. ამ დროს ჰარბონის ექსტოლურ-პანდლური სისტემის აქტივობა, რაკ იწვევს გამშლელია ტონუსის მომატებას. უპირატესად გვხვდება შუა ტვინის ტრავმის დროს. იხ. *ბრძმბუქის რეპროდუქციული უნარი*.

**დუშმბუქის ინტელექტუალური უნარი** - *интеллектуальная способность* (ბერძნ. diagenosis - გამოცნობა). შესასწავლი პროცესის, მდგომარეობის, მოვლენის კონტაქტული შედეგანაზი: ავადმყოფობის არსებობის, მიმების, გამოხატულების სიღრმის, მიმდინარეობის ფორმის და დაკითხვით მექანიზმების შენარჩუნების შესახებ დასკვნა. გარდება ხიმბტოზურ, ხინდროზულ და ნოზოლოგოურ ორზე.

**დუშმბუქის ინტელექტუალური უნარი** - *интеллектуальная способность* (d. aseroti). კულისხმობს დაავადების მიმდინარეობას კონკრეტულ ავადმყოფში მისი ორგანიზმის ინდივიდუალური თავისებურებების დადგენით.

**დუშმბუქის ინტელექტუალური უნარი** - *интеллектуальная способность* ადამიანის სხეულსა და მის ორგანოებში არსებული ნაკლოვანებების ან მათილოგიური პროცესების გარეგანი თვალსაჩინო გამოვლინების აღწერის ჩატარების შემდგომი დასკვნა.

**დუშმბუქის ინტელექტუალური უნარი** - *интеллектуальная способность* იხ. *დუშმბუქის ინტელექტუალური უნარი*.

**დუშმბუქის ინტელექტუალური უნარი** - *интеллектуальная способность* (d. morbi). დაავადების მიმდინარეობის პროვოცირება.

**დუშმბუქის ინტელექტუალური უნარი** - *интеллектуальная способность* დიკონი, განიხილავს არსებულ დაავადების გამოვლინების სიმპტომებს, რიგ შესაძლო დიაგნოსტიკურ ვარაიანტებს და კლინიკურ-ლაბორატორიული მონაცემების რითეორეტიკისპირების საუბრეებზე ასდენს კლინიკური სურათით მზავსი დაავადების გამოვლინებას. სინონ.: *d. perclusianis*.

**დუშმბუქის ინტელექტუალური უნარი** - *интеллектуальная способность* წარმოადგენს ნოზოლოგოური დ-ის ნაწილს და გამოხატავს ეტიოლოგიურ ფაქტორების როლს ნოზოლოგიურ სისტემატიკაში.

**დუშმბუქის ინტელექტუალური უნარი** - *интеллектуальная способность* ავადმყოფობის დადგენაში, მიღებული ნოზოლოგიური კლასიფიკაციის ჩარჩოებში.

**დუშმბუქის ინტელექტუალური უნარი** - *интеллектуальная способность* დგინდება გვამის პათოლოგიატომიური გაკეთების და პსიქოლოგიური გამოკვლევის შედეგად.

**დუშმბუქის ინტელექტუალური უნარი** - *интеллектуальная способность* ემარდება კატაქსეზურ მონაცემებს და მოიცავს ავადმყოფზე შემდგომ ხანგრძლივ დაკითხვებს.

**დუშმბუქის ინტელექტუალური უნარი** - *интеллектуальная способность* უორმულირდება გამოკვლევის დასასრულს, ავადმყოფის სტაციონარილიან გაწერისას ან დეკალურ გამოსავალიან დაკავშირებით.

რ. სპარაკოლი - *Α. παραπολιτολογίας* მოიცავს ნაწიას დიანგნოსტიკურ ეარაულს, რომელსე მოწმდება შემდგომ დიანგნოსტიკურ პროცესში. სინონ.: რ. პათოლოგია.

რ. სპასტოლოგი-სუნიმპატრიალი - *Α. σπασμολογία* ადგენს სპეციალური სპასმარტოლოგისტიკური კომისია. დიაგნოზი გამოკლებს საგანმარტოლო ან სპასმარტოლო შასალების, ავადმყოფის კლინიკური და დიანგნოსტიკური გამოკლებების საუბედელე. პასუხის საგანმარტოლო სპასმარტოლო ორგანოების მიერ დამსულ მეტონეებს, შავ, ქმედიუნარიაზის, შერანსალების და ა.შ. შესახებ.

რ. სუნსპატი - *Α. φυσιολογία* ნომოლოგიური და ეთიოლოგიური კრიტერიუმების გარდა სამხრავს გარკვეული ორგანოების და სისტემების ფუნქციას, მათი დეკომპენსაციის ხარისხს და კომპენსაციის შესაძლებლობას სოციალურ-შრომითი რეაბილიტაციის შედეგად. დ.ჟ. არის ავადმყოფის დიანგნოზი.

რ. სობსპატი - *Α. παραφροσία* ფორმულირდება გამოკლებების დასაწყისში და განსაზღვრავს ექიმის მოქმედების გაცეცას.

რ. სისტოპათოლოგია - *Α. σιστοπαθολογία* ანატომური დ-ის ნაწილი, შესგდებაატოფისური და ბიოფისური შასალის პისტოლოგიური გამოკლებით.

რ. სიამოპატი - *Α. σιωμασία* ს. რ. ბაქტერიოლოგია.

რ. ex juvenibus - *Α. ex juvenibus* ემეგრება წინახწარი დ-ის საუბედელე ჩივარებული შეურნალობის ეუფექტურობის შეესებებას.

რ. დიაგნოსტიკა - *Διαγνωστική* (ბერძნ. *diagnoō* - გამოცნობის ენარი). დიაგნოსტიკური პროცესი, ითვალისწინებს ექიმის დიანგნოსტიკური ამროვნების ენარს, განსაზღვრავს დაავადების კლინიკური და დიანგნოსტიკური სოციალურ-ფსიქოლოგიური, შეურნა და შეურნოლოგიური ფაქტორების შინშეხელობა.

რ. დიაგნოსტიკის ტანტი - *Διαγνωστική τεχνική* (Hyller Ю.Л., Точная В.А., 1979-1981). გამოიყენება შეოთით მიმდინარე ენლოგურნი დეპრესიის და დეპრესიის განწყობის თანხმული „ენლოგურნი“ შეოთის სადფერენტციატორი. ხეშნოლიაშეხების ფსიქოლოგიური მოქმედება მიმართულია შეოთის საწინააღდეგო ეუფექტის შესაღწევად, ამიგომ, თუ დიაგნოზის შეესება იწვევს რომელიმე ხევა სიმპტომის რედუცირებას, თვლიან, რომ ეს სიმპტომი გამოწვეული იყო შეოთით. სინონ.: *სამშეხეობის ტანტი*.

რ. დიაგნოსტიკა - *Διαγνωστική* (Spencer Th., 1965). ავადმყოფების ერთმანეთთან საუბარი შიშიეთ, ეესებით და სიყვებათა შელოლოგობით გრეებს დიანგნოსტიკის შიბაბედილებას, სინაშელებში საუბარი სრულებით არ გარეებს სოციალურების ფუნქციას, ეპრობა, ეუნაბარსა ეუფექტად გეხედება სენლური ეუფექციის და შიშიურენის დროს.

რ. დიახიზი - *Διαხιζ* (ბერძნ. *diagnosis* - გაყოფა, დანაწერება) (Monakov С., 1914). თავის ტუნახ დაუხანგელი ნაწილებს ფუნქციათა გამოგარდა. რომელიმე დანაწერი გეზით დაეპიშრებულია დიახიზის კერსთან. შიშიაბ თვლდება ნერული უარედების ფუნქციის მოშლა ეთიოლოგიური გამოიხანხელის ნაკადის შეწყვეტის გამო. ამის გამო ადგილი აქვს ლოკალური სიმპტომიკის აღმოცენებას, რომელიც არ არის დაეპიშრებული დიახიზის კერსთან. შავ, ინსულტის დროს ერთ-ერთ ექიმისფროში დიახიზებული კერა იწვევს შეორე ქემისფროში შასთან კომპლური ბიკუბით დაეპიშრებული კერის სიმპტომიკის წარმოშობას. სიმპტომიკის რედუცირება დამოკლებულია დიახიზის კერში მიმდინარე ადფენით პროცესზე, ორგანიზმის შიგალ მდგომარეობაზე, გენიში სისხლის შიშიუქეცის ადფენაზე, ავადმყოფის ასახე და ა.შ. სინონ.: *შინაშეხეობა* რ. *დიახიზი*.

რ. დიაგნოსტიკა - *Διαγνωστική* (ბერძნ. *diagnosis* - სწავლა, გეხიას - წარმოშობა). ფსიქოგენიხ სახე, როდესაც ელვარგის ტეკვა ხევა ფსიქოგარეამარტოლოგიური ფაქტორი შიშიწაელისათვის. გამოიხილება შიშირებული კონტაქტების თავისუფრებებით (პატეიისელო დამოკლებლება, სახალსო დანაწერება, ინოციგის ჩანშობა) და ასევე სასწავლო პროცესში შიშიწაელში, სტუდენტში წარმოშობილი თეთ-დაუქმავიფილებლობის გრნობით. გერმინი შეშირებულია შიშირეობა (Πλατωνος Κ.Η. 1937) შიირ.

რ. დი-ბიტ-პატრუ - *Δι-βιτ-პატრუ* (Dide M., Bozcar, 1902). გამოხაება ფისკაციური ანეგობით, კონფახუდაციებით, ორიგენაციის დაკარგვით ადგილს და დროში, აუტკური დარდევებით. აღნიშნება თავის გენის ეუფის წილის ორმხრივი დიახიზის დროს.

რ. დი-ბიტ-პატრუ - *Δι-βιτ-პატრუ* (Dide M., Giraud P.) ს. *პატრუ-პატრუ*.

რ. დი-ბიტ-პატრუ - *Δι-βιτ-პატრუ* (Dide M., Giraud P., 1922). ს. *პატრუ-პატრუ-პატრუ*.

რ. დი-ბიტ-პატრუ - *Δι-βιτ-პატრუ* (ბერძნ. *diagnosis* - ეუფის რეიში). შეურნალობის შიშიაბ დანწერი სპეციალური დეიტური კეება. ფსიქიარიაში გამოიყენება დისშეხაბლური ოლიგოფრენის, შავ, ეუნაბაროფერბის შეავს ოლიგოფრენის, ეილფსის, სიმპტომურ-ნერეულ-ფსიქიკური დაეადებების და ეურებრული ათუროსკლეროზის დროს.

რ. დი-ბიტ-პატრუ - *Δι-βιτ-პატრუ* (ბერძნ. *diagnosis* - წინდებული, აღნიშნავს უარყოფას, ბერძნ. *αντι* - შეულება). შეტყველებს, შიში არტიკულაციის დარდფევა, გამოკლებება გამოქმის (განსკურებით თანშეიუნა ბეგრების) განწლებით, ბრადიპნოზი, შეეგობით შეტყველებით. შიშიად ულინდება სიმბანურ შეტყველებაში, შიგეორ სპეციალური ხერხების (ხეადღარბიარბიარბი სიყვეების და ენის ვასტების გამოკება) საშუალებით. დ-ის სახალისი შიხედით ბიკუბით ეიშიყოლოთ დიახიზის ლოკალიზაციაზე. შავ, ნათხემის დიახიზის დროს შეტყველება სკანდირებულია, დარდეულია შიში შიხედავია, ეუფდება ხის სიბაბლე; პარენსინონის დროს შეტყველება შეწეულია, ამონოგურება, დარდეულია ხის შიხედავია და ა.შ.

რ. დი-ბიტ-პატრუ - *Δι-βιτ-პატრუ* (ბერძნ. *diagnosis* - გრნობა, შეხება). გეტილური შერბნობლობის დარდფევა.

რ. დი-ბიტ-პატრუ - *Δι-βιτ-პატრუ* (ბერძნ. *diagnosis* - ეუფის რეიში, მოქმედება) (Meyer A., 1908). თავის გენის ორგანული დიახიზებით გამოწვეული ტეუთით აშლილობა. ს. *პატრუ-პატრუ-პატრუ*.

რ. დი-ბიტ-პატრუ - *Δι-βιτ-პატრუ* (ბერძნ. *diagnosis* - სიგება, გამოთქმა) (Morgan W.P., 1896). სინდრომი, ხასიათდება წერათა შეტყველებს ამორტეობით დარდფევათ. ელინება წერა-კითხვის სწავლების პროცესში. გამოკლებს სინდრომის ოტიკურ გნსკიკურ არაქისული ლონზე და ენის ბგერათი სიმბოლოების დარდფევათ დაეკუმარებით ენებითი ამროვნების თავისუფური შიშიის დროს. პირველ შეშიხევაში ამროვნება ინგაქტურა. წარმოშობა გეხედავია ან განპირობებულია ეგნოგურ-ორგანული პათოლოგიით.



**დონსკირია** - *дискуррия* (ლათ. curiose - მზრუნველად) (Conrad K., 1949). უმრუნველობის, თუილადჯერებულობის გრძობა. მანის ერთ-ერთი სიმპტომი.

**დისნალიზი** - *дислексия* (ბერძნ. dis - წინებული, აღნიშნავს დარღვევას, lexia - შეგვევლება). შეგვევლების დარღვევა ბერძნა არასწორი წარმოთქმის სახით. არჩევნუ შექანკურს (არგოკლედაიური აპარატის ანატომიური დეფექტით განპირობებული) და ფუნქტურს (განპირობებული შეგვევლების არასწორი სწავლებით ან უორენტიკური წესის დარღვევით).

**დისმეზალურეზია** - *дисмезалурезия* (ბერძნ. mesos - ღილი, oris - შედეველობა). შეტამირფოფსახს ხახუ, რომლის დროსაც დამპირეხუვლად ღილად აღიქმება საგნის ზომა.

**დისმეტრია** - *дисметрия* (ბერძნ. metron - ზომა). შობრბობახს ეოთრდინაცოახს დარღვევა მანძილის შეგრბნების და შობრბობითი აქტების სიშუსგის და თანამოთერების შობლის გამო. შობრბობებს აქვს ღილამლიტელღიანი, არამუსტი ხასიათი, იყვლება კალფგრბობა. ცხხვლება ნათხების დამიანხებების დროს.

**დისმენზია** - *дисмензия* (ბერძნ. mensis - შესიერება). შესხერებახს დარღვევა, შიპომენიისგან გამხხევალება შესიერების შექანიმების ცალკეული გამოვლერების გამოხხეველების ხარისხის დისპროპორციულობით ან დროის შეღერებით ხანძილე შონაკვეთით შესხეკური დარღვევების სიღრმის ცელილებებით.

**დისმორფოზიზმი** - *дисморфомизм* (ბერძნ. morphē - ფორმა). ზიდეითი ღონის დისმორფოზია. იხ. **დისმორფოზიზმი**.

**დისმორფოზიზმი** - *дисморфоморфия* (ბერძნ. morphē - ფორმა, phos - შიბი) (Morzein E., 1986). საკუთარი თითქონხა გარეგნული ხამბანჯახს წარმოღვევა და შიში. კლასიკურ ღიფორატურამი დასაწყისში განხილვებოდა როგორც ნოზოფობი ფორმა, რომელსაც თან ახლავს ხხეულეიანი დეფორმაციის კლასიკული იდეები რელიემენტული პარანოიის ჩარბომი. თანამღეროვე შესხელებით, ღ. შესილება აგარბხეს აკლასტულ ზღერბხული და ზიდეითი იდეებახს ხახხახის. ამ უკანასკნელის დროს დამარბია დისმორფოზიზმი (Коркина М.В., 1965). უმეტესად წარმომობა პუბერტატულ ასაკში, თან ახლავს ხასიათის პათოლოგიური ხამების გამკაცრება, დეპრესიონალიზაციის, დერეღლიბიის მოვლენების, ნერული აბორეფსია. სინონ: **სამპტომი ხარბობა, სიმპტომი ფორმირბობისა, ბრღვა ბარფობიზმიზმიზმი შამპონი შიშიზმი ნაღვლა**.

**დისმორფოზიზმი** - *дисморфоморфия* (ბერძნ. morphē - ფორმა, oris - შედეველობა) (Schneider K., 1931). შედეველობითი აღქმის შიში, რომლის დროსაც დამპირეხუვლად აღიქმება საგნის ფორმა, ზომა ან მისი ცალკეული დეტალი. ეხელება შედეველობის (თვალის რეურბაქციის ანომალია) ან ცხსის პათოლოგიის დროს.

**დისმეტრია** - *дисметрия* (ბერძნ. metron - ზოლა) (Lechner K., 1909). არბღრბა, არასრული, ნახუერად ძილბ შესიერბობა. ავადმყოფის ასეთი პილის დროს შეიძლება ესმოლება გარეგანი გამღიზიანებელი ხხები, შავ, საათის მქოქბი, რის გამოც, შას ექნება შობახტეღილება, თითქოს ხაერთოდ არ უბნა მამხი, როცა ძილის ხანგრძლივობა დამაკუთრეღებელია. შღრ: **ამპანბრფიზმი**.

**დისმორფია** - *дисморфия* (ლათ. oris - შესხეება). გერმინი შემოდებულა ღეჭონის შიერ (იხ. **ჰემორფიზი ტურბი**) ესხეკური ურეკიების იმბრა და ფლოკენში განეითარების საწინააღმდეგო რევეის პროუქციების თანხმდეგობის აღსანიშნავად, რაც განპირობებს ნეგატიური („შახუს ხამბტოშხებ“) სიმკომების წარმოქმნას და მეთითებს გეინის იერარქიულად შეღერბობით ხალდა მდღომი უხების ურეკითა გამოარღნას.

**დისმორფიზმი** - *дисморфия* - *дисморфия* ან *дисморфия*. შესხერებახს დეკარტვა, განსაკუთრებით მიმღინარე მოვლენებზე. არა აქვს ორგანული საფუძველი და არც რეულებრბითი გულმაიწყობით და გადაღლილობით აიხსნება. ანგბია ძირითადად ვრეკლება შატკარბობხულ სიღავიამუ პარეიადურ და სუდეკიურთა.

**დისმორფიზმი** - *дисморфия* ან *дисморфия*. შესხერებახს დეკარტვა, განსაკუთრებით მიმღინარე მოვლენებზე. არა აქვს ორგანული საფუძველი და არც რეულებრბითი გულმაიწყობით და გადაღლილობით აიხსნება. ანგბია ძირითადად ვრეკლება შატკარბობხულ სიღავიამუ პარეიადურ და სუდეკიურთა.

**დისმორფიზმი** - *дисморфия* ან *дисморфия*. შესხერებახს დეკარტვა, განსაკუთრებით მიმღინარე მოვლენებზე. არა აქვს ორგანული საფუძველი და არც რეულებრბითი გულმაიწყობით და გადაღლილობით აიხსნება. ანგბია ძირითადად ვრეკლება შატკარბობხულ სიღავიამუ პარეიადურ და სუდეკიურთა.

**დისმორფიზმი** - *дисморфия* ან *дисморфия*. შესხერებახს დეკარტვა, განსაკუთრებით მიმღინარე მოვლენებზე. არა აქვს ორგანული საფუძველი და არც რეულებრბითი გულმაიწყობით და გადაღლილობით აიხსნება. ანგბია ძირითადად ვრეკლება შატკარბობხულ სიღავიამუ პარეიადურ და სუდეკიურთა.

**დისმორფიზმი** - *дисморфия* ან *дисморфия*. შესხერებახს დეკარტვა, განსაკუთრებით მიმღინარე მოვლენებზე. არა აქვს ორგანული საფუძველი და არც რეულებრბითი გულმაიწყობით და გადაღლილობით აიხსნება. ანგბია ძირითადად ვრეკლება შატკარბობხულ სიღავიამუ პარეიადურ და სუდეკიურთა.

**დისმორფიზმი** - *дисморфия* ან *дисморфия*. შესხერებახს დეკარტვა, განსაკუთრებით მიმღინარე მოვლენებზე. არა აქვს ორგანული საფუძველი და არც რეულებრბითი გულმაიწყობით და გადაღლილობით აიხსნება. ანგბია ძირითადად ვრეკლება შატკარბობხულ სიღავიამუ პარეიადურ და სუდეკიურთა.

**დისმორფიზმი** - *дисморфия* ან *дисморфия*. შესხერებახს დეკარტვა, განსაკუთრებით მიმღინარე მოვლენებზე. არა აქვს ორგანული საფუძველი და არც რეულებრბითი გულმაიწყობით და გადაღლილობით აიხსნება. ანგბია ძირითადად ვრეკლება შატკარბობხულ სიღავიამუ პარეიადურ და სუდეკიურთა.

**როსპარაქიტი** - **малярия** (ბერძნ. *μα* - წინდებული, აღნიშნავს დარღვევას, *paroxys* - სექსუალური პარტნიორი) ხასიათდება სისქესო ორგანიზმში განმეორებითი ან მყარი ტიპის **სქიზონტო** აქტებს წინ ან აქტის დროს, როგორც მამაკაცებში, ასევე ქალებში. ქალებში **მ**-ის მიზეზია როგორც სისქესო ორგანიზმის უნებართვინობის (სუბინვოლუტი და მოკორუალი) ორგანიზმი, ასევე ინფექციური, ანთებითი პროცესებით გამოწვეული პათოლოგია. მამაკაცებში იშვიათაა და ეხება ძირითადად რაიმე ორგანული დაზიანებით გამოწვეული პროცესების, მაგ. **პეპტონის დაზიანება** (Peyronie's disease) დროს, რომლის დროსაც ხდება მამაკაცის სისქესო ასოს გაღრმვა მასზე სკლეოზული ულტრის ვახვითარების გამო.

**როსპარაქიტი** - **дифтерия** (ბერძნ. *διφαια* - სურათი) (Klebs L., 1960). ნახაგების თავისებურებები ორგანული გენეზის უსიქიური დაავადების, ისტერიის და ა.შ. დროს. უსაღებია როგორც შემოქმედების ხარისხობრივად შეუვალადი პათოლოგიური ხერხი. **მტკვრული** **ფ**. ორგანული **ფ** განსხვავდება, უფრო ექსპრესიული და მრავალფეროვანია.

**როსპარაქიტი** - **аутоэрозия** (ბერძნ. *αυτο* - გორბობა, *ερωზია*, შექმნა) **ორგანული** და **ქრონიული** არასწორი განვითარება. გერმინი აერთიანებს თანდაყოლილ სიმამხინვეებს და პოსტემბრიონულ პერიოდში შრდისა და განვითარების დარღვევების შეთხვევებს. ხშირია ოლიგოფრენიის, ეპილეფსიის დროს, როგორც იშვიათად გამოკვეთილია, რომ ლამაზობენ დისპლამორ კონსტიტუციას.

**როსპარაქიტი** - **аутоэрозия**. **ხუბუკტის შხადეოფნა**, წინაგანწყობა ქვეითი აქტისადმი, მოქმედებისადმი, მათა თანხმდევრობისადმი.

**როსპარაქიტი პარაქრონი** - **аутоэрозия паракроно** (ბერძნ. *παρά* - მოღვაწეობა, *κροно* - მესხივება) (Domarus E., 1923) ხეილური დემენციის დროს პრაქსისის დარღვევა. გარეგნულად ჰგავს ავტოგორულ პარაქსისს, მაგრამ განსხვავდება იმით, რომ ავადმყოფი არ ასრულებს არასწორ მოძრაობებს.

**როსპარაქიტი** - **аутоэрозия** (ბერძნ. *αυτο* - აქტენტი) (Montard-Krohn G.H., 1947). მეტყველების მელოდიის, მის რიტმიკის და აქტენციების დარღვევა სპეკარისი სიკვდილა მარაგის არსებობის პირობებში ავადმყოფი სუხურისხ გულებს უხეილის, არასაკუთარ ენაზე მოსაუბრის შთახეილდებას აქტენციების არასწორი გამოყენებით. აღინიშნება უხელის წილის პათოლოგიის დროს.

**როსპარაქიტი** - **аутоэрозия** (ბერძნ. *αυτο* - ძილი). ძილის დარღვევა, უძილობა. იხ. **უძილობა**.

**როსტრამი** - **аутоэрозия** იხ. **ხარხამი**

**როსტრამი პარაქრონი** - **аутоэрозия паракроно** (ბერძნ. *τροπή* - კება) (Bubinski J., 1900; Fröhlich A., 1901). **ნეოროენდოკრული დაავადება**. დაზიანდათებულია სისხლურ (განსაკუთრებით ბარძაყის, მკულის, ბოქვის, დუნდულების, მხრების და სარტყე ურკელების მილამებში), პი პოვინგალიზმი, ავადი ტანი, სხეულის დაბალი გემეიგარისადმი მდგრადობა. ნეოროლოგიურად აღინიშნება თავის ტოვილი, ეპილეფსიორმული ველები, ნაწილობრივი ემბლიზოფსიის მოვლები, როგორც უმეტრო დიაბეტი. რებეტილოლოგიურად - თურქული კების პათოლოგია. წარმოადგენს ენდოკრინულ-ენდოგურულ დაავადების. გვხვდება პიპოფიის ადენომის და პირნეოენდოგომების დროს. სინონ: **პარაქრონი სისხლურ**, **პიპოფიური-მალამარი ხინდრომი**, **პიპოფიური-მალამარი ხინდრომი**, **პიპოფიური-მალამარი ხინდრომი**.

**როსტრამი პარაქრონი** - **аутоэрозия паракроно** ხანგრძლივი **შეშლილი** (რაოდენობრივი და თვისებრივი) განმარტებული დაავადება, რომლის დროსაც ირღვევა ყველა სახის ნივთიერებათა ცედა, გამოხატულია პიპოფიანობა შევად სკადიანი უსიქიური ცვლილები მწვავე ემბოლიური რეაქციების სახით, ასთენია, აპათორი გამოვლინებები. ხშირია ნეოროსიმპტომური მდგომარეობები. ასთენიამ შეიძლება მიიღოს ქრონიკული მიმდინარეობა.

**როსტრამი ტარაქრონი** - **аутоэрозия таракроно** (Schulze W.) ორგანული **ფსიქომანდრობა**, გამოწვეული ხანგრძლივი მიშლილი, ძირითადად ცვლების ნაკლებობით. აღინიშნება გვირის პარეპეტების, განსაკუთრებით შესამე პარეპეტის, გაფართობა. გამოვლინდება ქრონიკული დისფორია, უპროვლობა, მიწოდულობათა გაქრობა, პიპოფიური თვისებების ნივთიერებით, ევგზე - არასიქიური დიუბეტი ცვლილებები.

**როსტრამი პიპარაქრონი** - **аутоэрозия пипаракроно** (Wernphal C., 1863; Sirtupell A., 1898; Wilson S., 1912; Kowalew H.B., 1948). მიშე პიპოფიურიგებადი **ოჯახური-შეევიდრობითი დაავადება**. ხასიათდება დიფ. ას ციროზით და თავის გენეში, ძირითადად ქერქვეში ბირთვებში, მეორეული დესტრუქციული ცვლილებებით. პათოგენეზში მნიშვნელოვანია სპილენძის ცელის მოშლა. უსიქიური ცვლილებები მრავალფეროვანია, ასთენიური მდგომარეობიდან დეპრესიამდე. ექსტრაპირამიდულ-ქრქული ფორმის დროს - დრმა დემენცია, ხასიათობრავი ცვლილებები, ეპილეფსიორმული გულყრები, დიპარტრია, სკანდირებული მეტყველება, ეპილეფსიური ამრდგრალობა. ნეოროლოგიურად - პირამიდული და ექსტრაპირამიდული დარღვევები, ათეოლოგიური და ქრონიკორმული პიპოფიურიგებადი. სინონ: **პიპარაქრონი-მალამარი მდგომარეობა**, **მალამარი მდგომარეობა**, **მალამარი მდგომარეობა**, **პიპარაქრონი-მალამარი მდგომარეობა**, **პიპარაქრონი-მალამარი მდგომარეობა**.

**როსტრამი** - **аутоэрозия** (ბერძ. *πνοο* - ხმა). **ხმის წარმოქმნის დარღვევა**. ვითარდება ხორხის მწვავე და ქრონიკული დაავადების (ანთებითი, სიმუხურტი, ცნის ორგანული პათოლოგია) დროს. აფონიისგან განსხვავებით, **მ**-ის დროს ხმა არსებობს, შთოლოდ გამოხატულია. სუსტი, ჩახლეჩილი, მოკანკალე, წყვეტილი და ა.შ. სახით.

**როსტრამი** - **аутоэрозия** (ბერძ. *μυο* - გალიანობა, *ερωზია*, წყენა) **გუნება-განწყობის ავლა**. ჰარხობის მოღუეული, პირქვი, პოლიმანგალიანეული გუნება-განწყობა. ხშირია იტეტიური ავთქტების, ატრესიული გამოვლინებადი. ე. აღინიშნება მრავალი უნებური და ორგანული უსიქიური დაავადებების დროს. განსაკუთრებით ტიპურია ეპილეფსიისათვის, რომლის დროსაც იგი შეიძლება წინ უსწრებდეს ან მოსდევდეს გულყრას, ან შეიძლება გამოვლინდეს ეპილეფსიის დროში.

**როსტრამი** - **аутоэрозия** (ბერძ. *αυτο* - დროს). **მოვლენათა თანხმდევრობის აქტის დარღვევა** ამ დროს ხშირად ხანდება ორგანიზმის ბიოლოგიური რითმი, ძილის და დიდიდის მონაცელობა, საკეების მიღების რეგულაციული უნაბილი განსაზღვრულ პერიოდებში.

**როსტრამი** - **аутоэрозия** (ბერძ. *αυτο* - თანხობა, შესახამისობა). **პროტენების სიკვდილები** თვისებებს შორის თანაზომიერების **არარსებობა**, მაგ. უნარს, ლგოლებასა და ავუტეტებს შორის დისპარსობა მისგანი წინააღმდეგობების არსებობა ხელს უხელს პიპოფიების მოღაანობაში, სრულფასოვან განვითარებაში და

გარემოსთან შეგუებაში. არაბიუთითად პიროვნული თვისებების ერთი მხარის განვიითარებას თან ახლავს მეორის განვითარებულობა. (მაგ. ფუნქციონალური შეხსიერება, ანგარიშის უნარი შეიძლება გამოხატულა; ჰქონდეს ოლიგოფერენ დეზილესა). უსიციურნი ღისპარმონის მკაფიო მგაღლითი უსიციობათი, პათოხსიპოთირივი განვითარება და სხე. **ღიპპაპის რაბიტონალური შისპიტონაპაპაპა** - *Дисфа ратионалная психопатия* (Dushols P., 1905). **ფსიქოტერაპიათ** შეთაფი. ემყარება ღვიძილის მღვთმარებობაში ბეადღეოფზე შემოქმედების ლოგიკური ფორწუნების გზით. გარღება ღიადლივის ფორმით ავაღმეოფსა და ექიმს შორის, რომლის ღროსაყ ექიმა აეღვენ და მსუთითებს ავაღმეოფს მისა შეღვლითის შეღვლომებს.

**ღიპპაპის სიზმარბ მატპაპა** - *Джкосте отощания приступы* (Ducosus, 1899). **ბ. ხეპაპა მატპაპა**. **ღიპპაპის მღვდღე სხეღვრება** და ეავმბრებულა ცნობიღ ფრანგ ქირურგის G. Dupuytren (1777-1835) სხეღვთან. **ღიპპაპ-ბაპაპი სენსიტოპაპა** - *Дюпре-Камю аностомия* (DuprÉ E., Camus P., 1907). **ბ. ხეპაპაპაპა**. **ღიპპაპ-ღეპაპი უნიღვანბ ზეღვბაპა** - *Дюпре-Лези шугрениия зодития* (DuprÉ E., Levy, 1903). **ბ. ზეღვბაპა** **შეღვბაპა**.

**ღიპპაპ-ღეღვრბა ბეღვბა შარბეზბაპაპა** - *Дюпре-Лонгра бред возбуждения* (DuprÉ E., Longru J.B. 1914). **ბ. ბეღვბა შარბეზბაპაპა**.

**ღიპპაპის შეღვბაპაპი მინსიტოპაპა** - *Дюпре аномалия конституция* (DuprÉ E., 1910). **ბ. ბეღვბაპაპა პეღვბაპა** **ღიპპაპის შეღვბაპაპა** - *Дюпре юрфания* (DuprÉ E., 1905). **ბ. ბეღვბაპაპა**.

**ღიპპაპის შეღვბაპაპი რბაპაპა** - *Дюпре аномалия деятельности* (DuprÉ E., 1910). **ბ. რბაპაპაპა პეღვბაპა**. **ღიპპაპის შეღვბაპაპა** - *Дюпре пуритан* (DuprÉ E., 1903). **ბ. პეღვბაპაპა**.

**ღიპპაპის სიზმბრბა** - *Дюпре снмтот* (DuprÉ E., 1895). **შენაღვბა** სხეღვრება ცხეღვითი მღვთმარებობების ღროს, გარდაბავალი გულსრევა, ღვბრება, ცისრის კუნთების რეგღობა, თავის გეოელი, ხბორად - თავ-შერეგტონის სითის წნევის მომაღება. სინონ. **შეღვბაპაპა**.

**ღიპპაპის სიზმბრბა პაპაპაპა** - *Дюпре снмтот воздушной подушки* (DuprÉ E.). **ბ. სიზმბრბა** **პაპაპაპა** **პაპაპაპა**.

**ღიპპაპის პალეპეინატიპა** - *Дюпре галлюцинации возбуждения* (DuprÉ E.). **ბ. პალეპეინატიპა** **შარბეზბაპაპა**.

**ღიპპაპის ტაპაპა ტაპაპა** - *Дюпре-Деспера тест истории* (Dus L., 1940; Despert L.J., 1946). პიროვნების გამოკლევის პრეფეკტული ფსიქოლოგიური შეთაფი. გამოყენება ბავშვთა საბელეტსო უსიქოლოგიაში. გამოსაკლეე პირს უკოხბეინ 10 პაგარა ისტორიას, რომლის სუკევი გამოხატავს ბავშვისთვის აქტუალურ პრობლემას. მიბანი - გამოსაკლეეისთვის სუკეფიკური ემოიური კონფლიტის შონის გამოღენა; მაგ, მზობღებთან შეპადლო განზოღვების შიში. ინტერპრეტაცია ფსიქანალიზური.

**ღიპპაპის უნიღვანბ უსიციობა** - *Духовная слепота* (ღაი. diffrenia - განსხეავება). **ფსიქოლოგობ** ნაწიღი, შეისწავლის უსიქოლოგიურ განსხეავების რეოგორე ინღვიღებს, ასეეე აღზანათა რეღვენს შორის, ამ განსხეავებების შიბიბებს და შეღვბებს.

**ღიპპაპის დიპაპა** - *дипомания* (ბერძ. dips - წყრვიღი). პეროღვად აღზოყენებული გაღაბბული ღვითობის ეპიზოღება პროღრომში აღინიბება გუნება-განწყობის დაქვეითება, შოთოფა, ღსფორული გამოღინებები, ძიღისა და შაღის დაღღევა, თავის გეოელი აღკოპოღინაღი ღღეღვა აგარებს იშპულსურ ხსიათს. შეღვენს ხანგრბღვობა 2-3 კვირა, ხბორად თან ახლავს ღრომობინური შეღვენბი. შეღვენს დასარღვლათის აღკოპოღის მიღება წეღება, აღკოპოღისაღი შიღრეკიღება ტრება, შოგჯერ გამოხატეღვა აღკოპოღისაღი შიღის შეგრბრბეყ სე ეგოპათოღენებში შინიზღობა ენიბება კონსტეციურ თავისუბრებებს. **განუშეანბ** (Ганнушанов П.В. 1933) ამროთ, ღ-ით ავაღღებანი ეთაღვსოღიური წრის უსიქობათი. **კრეღვლიან** (E. Kraepelin) და ოსიპოვი (Осипов В.П., 1931) თეღიღენ, რომ ღ-ის შეღვენბი გამოწეულია აუქტური აზღიღობებით მღვ-ის ფარღღებში, სელოთობით და ღაგტენური ეპილეუსით. **შ. ბღიღეღი** (Shteler M., 1955) თეღიღა, რომ ოგი შეიძღება შეღვენბეს ენფორიული უსაქონღღრობის ღროსაყ. **გამყრღვლად** (**გამყრღვლად** შ. 1966) ღ-ს განხბიღაბს „აუქტური სეექტრის აზღიღობების“ ფარღღებში. **ტეშმარტი** ღ-ის შეღვენს განსხეავეღება ცრუ ღ-ის შეღვენისგან, რომღევი გვბღება აღკოპოღისაღი დასკენით სღღიანბ. **ტეშმარტი** ღ-ის შეღვენს ღროს აღკოპოღისაღი გოღრანგობა პრეღვრღვად მეიღება, შაღის, როყი ცრუ ღ-ის ღროს გოღრანგობა შეღვიღა. **ტეშმარტი** ღ-ის შეღვენ შეთარღება პღღმესეღებით და აზღვით. თანამღღრეე ღიღვრბაპაპა ტრბინი „ღ“ აღარ გამოიყენება, ვნაიღან აღკოპოღის მიღება სხეა უსიქურ დაეავღებბთან ეავმბრბი განხბიღება რეოგორე სეღვრბაპაპა აღკოპოღისაღი.

**ღიპპაპის პრეღვრბაპაპა სეღვრბაპაპა** - *Духовная слепота* (ღაი. diffrenia - განსხეავება). **ფსიქოლოგობ** ნაწიღი, შეისწავლის უსიქოლოგიურ განსხეავების რეოგორე ინღვიღებს, ასეეე აღზანათა რეღვენს შორის, ამ განსხეავებების შიბიბებს და შეღვბებს.

**ღიპპაპის უნიღვანბ უსიციობა** - *Духовная слепота* (ღაი. diffrenia - განსხეავება). **ფსიქოლოგობ** ნაწიღი, შეისწავლის უსიქოლოგიურ განსხეავების რეოგორე ინღვიღებს, ასეეე აღზანათა რეღვენს შორის, ამ განსხეავებების შიბიბებს და შეღვბებს.

**ღიპპაპის უნიღვანბ უსიციობა** - *Духовная слепота* (ღაი. diffrenia - განსხეავება). **ფსიქოლოგობ** ნაწიღი, შეისწავლის უსიქოლოგიურ განსხეავების რეოგორე ინღვიღებს, ასეეე აღზანათა რეღვენს შორის, ამ განსხეავებების შიბიბებს და შეღვბებს.

**ღიპპაპის უნიღვანბ უსიციობა** - *Духовная слепота* (ღაი. diffrenia - განსხეავება). **ფსიქოლოგობ** ნაწიღი, შეისწავლის უსიქოლოგიურ განსხეავების რეოგორე ინღვიღებს, ასეეე აღზანათა რეღვენს შორის, ამ განსხეავებების შიბიბებს და შეღვბებს.

**ღიპპაპის უნიღვანბ უსიციობა** - *Духовная слепота* (ღაი. diffrenia - განსხეავება). **ფსიქოლოგობ** ნაწიღი, შეისწავლის უსიქოლოგიურ განსხეავების რეოგორე ინღვიღებს, ასეეე აღზანათა რეღვენს შორის, ამ განსხეავებების შიბიბებს და შეღვბებს.

**ღიპპაპის უნიღვანბ უსიციობა** - *Духовная слепота* (ღაი. diffrenia - განსხეავება). **ფსიქოლოგობ** ნაწიღი, შეისწავლის უსიქოლოგიურ განსხეავების რეოგორე ინღვიღებს, ასეეე აღზანათა რეღვენს შორის, ამ განსხეავებების შიბიბებს და შეღვბებს.

**ღიპპაპის უნიღვანბ უსიციობა** - *Духовная слепота* (ღაი. diffrenia - განსხეავება). **ფსიქოლოგობ** ნაწიღი, შეისწავლის უსიქოლოგიურ განსხეავების რეოგორე ინღვიღებს, ასეეე აღზანათა რეღვენს შორის, ამ განსხეავებების შიბიბებს და შეღვბებს.



**დ. ხახიპერდილო სახეობა** - *d. cerepelyana* (Diso; d. letalis media) **დ.** რომელიც დროის ფიქსირებულ პერიოდში იწვევს საყვავილე ცხოველების 50%-ის სიკვდილს.

**დ. ტოქსიკოზი** - *d. toxicaria* (*d. toxica*) **დ.** რომელიც ორგანიზმში იწვევს პათოლოგიურ ცვლილებებს და არ იწვევს სასაქონლო გამოსავალს.

**დ. ქვიშვანა** - *d. chivshana* შედარებით დაბალი **დ.** რომლის შეყენება იწვევს ცვლილებებს ორგანიზმს, ფიზიოლოგიურ რეაქციების დონეზე. სინონ.: **დ. შიმშილი მძინავლობა.**

**დოლიქოცერატოზა** - *dolichocephalus* (ბერძნ. dolichos - გრძელი, kephale - თავი). თანდაყოლილი ანოშილია. წაგრძელებულ თავის ქალა.

**დომარუსის პანკრეოპათია** - *Domarus pancreatica* - *Domarus amseniensis* (*Domarus E., 1923*). იხ. **დამარუსის პანკრეოპათია.**

**დომარუსის პარალოგიკური მანქანის პანკრეოპათია** - *Domarus paralogisches maschinen* (*Domarus E., 1923*). იხ. **პანკრეოპათია პარალოგიკური.**

**დონანტა** - *Donata*. დროებით გაბატონებული რეპროდუქციური ხესტემა, რომელიც განაპირობებს ამა თუ იმ ნერვულ ცენტრების შეზღავანას მოყვამულ მოშენებში და ქვეყნის აძლევს გარკვეულ მიმართულებას.

**დონატის პანკრეოპათია** - *Donata pancreatica* (*Donata G., 1897*). იხ. **პანკრეოპათია.**

**დონატის პანკრეოპათია** - *Donata pancreatica*. გერმანიის გამოკვლევა აგადმეოფთა ქვეყნის ატანა-შენაგად. გარკვეულად ქვეყნის მოკვლევის შემდეგ რომანის გერმანიის ღონ კოხის ცხოველების წესს (არარსებულ მგრებიან ბრძოლა, არარსებული „დაზარალებულების“ დაცვა და ა.შ.). აღინიშნება ფსიქოპათიის, პარანოული განვითარების დროს.

**დონატის პანკრეოპათია** - *Donata pancreatica*. გერმანიის დროსაც სუბიექტი განიცდის დაუძლეველ ღკობას ქალბის მიმართ, მაგრამ მათთან პირველივე შექუსაური კონტაქტი მასში იწვევს არა დაქმნაყოფილებას, არამედ მძინის გრძობას. ამის გამო იგი ხშირად იყვლის პარანოიის სახეობებს და დაკავშირებულია დონ ტანის სახელთან. გზებზედა ქალბის.

**დონატის პანკრეოპათია** - *Donata pancreatica* (*Doose v. Schenker, 1964*). იხ. **დონატის პანკრეოპათია.**

**დონატის პანკრეოპათია** - *Donata pancreatica*. ხტემატორები ან ფსიქოპათიური პრეპარატები აგრეთვე ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული, ენდოკრინული და სხვა საშუალებები, რომლებიც ხელაწვრილ იწვევს შრომის უნარის მოშენებას და სხვანაირად აღიზიანებს შრომის, ხელაწვრილ ქმნის სასურველ ხელსაყრელ ფიზიკურ მდგომარეობას საორგანიზაციო მიწვევებისათვის; ამის გამო შეგანდობა შესაბამისი იურიდიულ დოკუმენტში. **დ.** სიკვითუნება: **ა.** ხტემატორები-ამიფინალი, ამინტინი, სკოლინი, ფენკამფამინი, პენტაფენკამფამინი, სალბუტამოლი, ამფეტამინი, კოფეინი, ეფედრინი, მეტიკალინი, პირაქალინი, გენტიანინი და მსგავსი ნივთიერებები. **ბ.** ნარკოტიკული საშუალებები - ელსტარამოლინი, დელტარამოლინი, დრამორფინი (პეროინი), მეტალონი, მორფინი, პენტამოლინი, პეტალონი და მსგავსი ნივთიერებები. **გ.** ანაბოლური ნივთიერებები - 1) ანაბოლური ანდროგენური ხტემატორები-კოსტებოლი, მეტაბოლინი, ნანდროლინი, სტანოლოლინი, ფლოქსიმეტერონი, მეტენოლინი, ოქსანდროლინი, ტესტოსტერონი და მსგავსი ნივთიერებები. 2) ანდროგენური ხტემატორები-აგონისტები: კლენბუტეროლი, სალბუტამოლი, გენტიანინი, სალბუტეროლი, ფენოტეროლი და მსგავსი ნივთიერებები. **დ.** დიურეტიკული პრეპარატები - აციტამოლინი, ბუფეგანიდი, ქლორტალიდონი, ეტაკრინის შეკვა, ფუროსემიდი, პიდრატალიდონი, მანიტოლი, მერსალიდი, სპირონოლაქტიონი, გრამეტერნი და მსგავსი ნივთიერებები. **ე.** პეტალოლინი და ვლადკომიტანინი პირამიდული და მათი ანაბოლური გონადოტროპინი; 2) კორტიკოსტერონი; 3) ზრდის პირამიდული და ყველა შესაბამისი ფაქტორი, რაც ხელს უწყობს ასეთი ნივთიერებების გამოყოფას; 4) ურთარმოუტემა.

**დორკი-აშენის მეთოდი** - *Dorky-Ashen method* (*Dorky-Ashen method*). *исследование реакции тревоги* (*Dorky M., Ashen E., 1947*). პირველად პიროვნული ტესტი ემოციური რეაგირების თავისებურების გამოსაკვლეველ ორიგინალურ ვარიანტში მოწოდებულია 8-11 წლის ასაკის ბავშვთა გამოსაკვლეველ გამოსაკვლეველ პირს აძლევს 12 სურათს, მათზე გამოსაგვლია სიუჟეტურად დაუზიარებელი ემოციური ნივთიერების სიგელოები, რომელს მიხედვითაც ბავშვმა უნდა შეაფასოს მოთხრობა. „მოწყვეტილი, სველიანი“ სურათების რაოდენობის მიხედვით აღგებენ შიშის დონეს სიგელოდ და ცალკეულ კონკრეტულ სიგელოში (სახლი, სკოლა, ქუჩა). კალანანა (*Kalanan* *JA., 1980*) ბიურ მოდიფიკირებულია მომართა გამოსაკვლეველ.

**დორკი-აშენის მეთოდი** - *Dorky-Ashen method* (ბერძნ. dorkos - საშურალი). ხაზუკიანად დაუძლეველი მისწრაფება, რეალურ მაკრეალური შესაძლებლობების არარსებობის დროსაც კი აღინიშნება მანისი, მიმიდულობათა განმუხრუჭებით და დუნესით მიმდინარე თავის გინის ორგანული დამაზნების დროს.

**დოსუკოვა ნაოთი** - *Dosukova naot* (*Dosukov Th., 1945*). იხ. **პანკრეოპათია.**

**დოპამინი** - *dopamine*. ნეოტრანსმიტორი, ნეოტრანსმისი კატეკოლამინების ჯგუფიდან. დ-ს სინთეზი იწვევს თირონის გარდაქმნით L-DOPA-ად უფრო მეტი თირონინი-დოპამინის შექმნით. შემდეგში L-DOPA განიცდის დეკარბოქსილაციას და გარდაიქმნება დოპამინად, რომლის ინაქტივაცია სორცილდება ენაშიმების მონოამინოოქსიდაზის (MAO) და კატეკოლ-O-მეთილტრანსფერაზის (COMT) საშუალებით. დაადგენილია, რომ პოსტინაქსურ ნეირონებზე დოპამინი ახდენს როგორც აქტივაციას, ასევე მრეგულირებს მოქმედებას. ჯერჯერობით აღმოჩენილია 3 (D-არასაკეოციკური და D<sub>1</sub> და D<sub>2</sub>) ტიპის დოპამინისებრი მემბრანული რეცეპტორების არსებობა. D-არასაკეოციკური რეცეპტორების აგონისტებია: dopamine, bromocriptine, apomorphine, amphetamine; ანტაგონისტებია: haloperidol, fluphenazine, thioridazine, thiothixene, thioridazine და mesoridazine. D<sub>1</sub> რეცეპტორების აგონისტებია: SKF 38393, ანტაგონისტია SCH 23390. D<sub>2</sub> რეცეპტორის აგონისტია quipro, ანტაგონისტია sulpirid და zacoprid.

**დოპამინი-ჟანაზი** (რუნღე). *Dripac*. ფსიქოლოგიური მოტივაციური ძალის, რომელიც დასაბამს აძლევს ქვეყნს. ფრთხილ განახლებებს ორ ძირითად თანდაყოლილ დრაიბებს - ხეშუადუნს (დამბეჭურს) და აგრესიულს, და მათ უწყობს ანტიტექტურ დრაიბებს.

**დრამატურგია** - драматургия. გერმანი მოწოდებულია მორენოს (Moreno J.L., 1947) მერ ამ აღმზანთა აღსანიშნავად, რომლებიც განსაკუთრებით ექვემდებარებიან დრამატულ სიტუაციებში ჩართვას.

**დრამატურგია** - драматургия (ბერძ. დრამა - სირხილი, სება - ხელის წაღება). ემილიუსის ფორმა. მიმდინარეობს პროკურსული გულურებით.

**დრამატურგია** - драматургия (ბერძ. დრამა - სირხილი). იხ. მამბრეტი

**დუბლინი** სინდრამი - Дублин синдром (Dublin A., 1846). ეკონომის მიერ აღწერილი ეპიდემიური ენცეფალიტის მოკლდონური ფორმა. სინონ. **მრავალფუნქციონალური**.

**დუბოვიცის სინდრამი** - Дубовиц синдром (Dubowitz V) თანდაყოლილი დაავადება, სეპარულია გადაცემის ავტოსომურ-რეცესული ტიპი. აღმასასაბუთებელია: დაბალი განი, მიკროცეფალია, პატარა სახე, თვალის შიგნითა ქვედა კუთხის ლატერალურად გადაინაცვლება; ფეხში, ცხვირის განიერი ნუბ, თხელი თმები, ეგზემა. ფსიქიკის შირიე - გონებრივი განუვითარებლობა

**დუბოვიცის სინდრამი** - Дубовиц синдром (Dubowitz V) თანდაყოლილი დაავადება, სეპარულია გადაცემის ავტოსომურ-რეცესული ტიპი. აღმასასაბუთებელია: დაბალი განი, მიკროცეფალია, პატარა სახე, თვალის შიგნითა ქვედა კუთხის ლატერალურად გადაინაცვლება; ფეხში, ცხვირის განიერი ნუბ, თხელი თმები, ეგზემა. ფსიქიკის შირიე - გონებრივი განუვითარებლობა

**დუბოვიცის სინდრამი** - Дубовиц синдром (Dubowitz V) თანდაყოლილი დაავადება, სეპარულია გადაცემის ავტოსომურ-რეცესული ტიპი. აღმასასაბუთებელია: დაბალი განი, მიკროცეფალია, პატარა სახე, თვალის შიგნითა ქვედა კუთხის ლატერალურად გადაინაცვლება; ფეხში, ცხვირის განიერი ნუბ, თხელი თმები, ეგზემა. ფსიქიკის შირიე - გონებრივი განუვითარებლობა

**დღის სტატისტიკა** - статистика. ფსიქიატრიული საავიდუოფის ან დისანსერის წახეგრადსტატისტიკურად განყოფილება. განსაზღვრულია ავადმყოფთა შრომითი, სოციალური და პროფესიული რეაბილიტაციისა და აღადგენისათვის. გამოიყენება აგრეთვე ამბულატორიული ბეადმყოფების პროფილაქტიკური მკურნალობისათვის.

**პაპულატო** - *ажулат* (ლათ. *ejaculor* - გამოცოცრება). ხათვლელ ზოთხე, რომელიც გამოიყოფა ეაკულაციის დროს.  
**პაპულაცია** - *ажуляция* (ლათ. *ejaculatio* - გამოცოცრება). ხათვლელ ზოთხის გადმოწონვება სქესობრივი აქტის ან კოიტუსის ჩამანაცვლებელი სქესობრივი აქტივობის დროს (მასტურბაცია და სხვ.), აგრეთვე პოლუციების დროს.  
**პ. ნაპარჩხი** - *а. паразитология* (ლათ. *ejaculatio* *parasitologia*). დგება ნაალრეველ სქესობრივი აქტის დასაწყისში, ზოგჯერ აქტის დაწყებამდე. სინონ: **პ. მარჩხი**.

**პ. შეშინებელი** - *а. паразитология* ხასიათდება ხანგრძლივი დროის განმავლობაში თესლის გამოყოფის შეუერხებით, ზოგჯერ - ეაკულაციის სრული უქონლობით. სქესობრივი აქტი აცარებს გახანგრძლივებულ, დამლულ ხასიათს. სინონ: **პ. ნაპარჩხი** **პ. მარჩხი**.

**მბაპე სინდრომი** - *Эббеке синдром (Ebbecke H., 1943)*. «ელგახურო შიშის შეტყევის» მდგომარეობა, მიმდინარეობს ერთგვარი ოპტიკური ფენომენებით. მხედველობის ველში აღმოცენდება მნათი წერტილები, ლაქები, გეომეტრიული ფიგურები, რომლებიც შეორდება ნეგატიური ანაბეჭდების სახით. თან ახლავს გუნება-განწყობის დეპრესიული ფონი და სუბილური აზრები. თავდაპირველად აღწერილი იყო ისტერიული წრის ფსიქოპათიებში. არსებობს დაკვირვებები საფეთქლის ეპილეფსიით დაავადებულ ბავშვებში უპის აღმოცენების შესახებ.

**მზალტაცია** - *а. экаstasy* (ლათ. *ecstasy*) - აღფრთოვანება. აწვეული გუნება-განწყობა მეტისმეტი აღფრთოვანებით, მომავლელი თვითშეფასებით. აღრე ეს გერმინი გამოიყენებოდა **პაპარჩხის** აღსანიშნავად.

**მზამბრახი** - *а. экаstasy* (ლათ. *ecstasy*) - გაღიზიანება, დაზიანება. დაავადების კლინიკური სურათის გამოყენება, გაუარესება. შეიძლება იყოს პათოლოგიური პროცესის მიმდინარეობის შედეგი, რომელიც ვლინდება ავადმყოფური მდგომარეობის აღმობიებით ან რემისიის შემკველელი რეციდივის გაჩენით.

**მზამტანსადღური ანალიზი** - *а. экаstasy* (ლათ. *ecstasy*) - არსებობა. ჩვენი საუკუნის 20-იან წლებში უცხოურ ფსიქოლოგებსა და ფსიქიატრებს აღმოცენებული მიმდინარეობა. საუბრულად უღივს **ფაბრის** ფაბრის იდეები (*Binswanger O.L., Milkowski E., Flescher O.*). ფსიქოპათოლოგიური კატეგორიები განიხილება ეგზისტენციალური ფილოსოფიის პოზიციიდან სივრცისა და დროის კატეგორიებთან ერთად. ცენტრალური ცნება **ფაბრის** ცნება ("არსებობის არსებობა") ანუ "აღამაის არსებობა" არის სუბიექტის და ობიექტის დაუნაწვერებელი ერთანობა. ეგზისტენცია ვლინდება მრუდით, მშობით, სიმეციით, სინდრომით. ყველაფერი ეს განისაზღვრება სიკვდილით. ეგზისტენციის არს ადამიანი წლებსა სივრცეში სივრცეში - ბრძოლაში, განჯვამში, სიკვდილში. **ფ. ა. ანალიზი** - ნოზოლოგიური ფორმების შესწავლა შეტყევილი სუბიექტის ბიოგრაფიის გამოკვლევით. **ფ. ა.** პოზიციიდან ფსიქიკური დაავადება განიხილება როგორც **ფაბრის** კოფორმის **სტრუქტურის** ეაკულაციური, გაღიზიანება, გახსნილი აპროპრიული გნით. ფსიქიკური ავადმყოფის ობიექტურ კონიკურ-ფსიქოპათოლოგიურ, დაავადების ეტიოპათოლოგიის შესწავლას, ეგზისტენციალურში უპირისპირებს ავადმყოფთან, როგორც პარტნიორთან ეგზისტენციალურ კომუნიკაციაში დაახლოვების, რაც უფრო არსებითად და მნიშვნელოვნადაა მიჩნეული. ფსიქიატრიაში შესწავლას ობიექტია არა ფსიქიკური ავადმყოფი, არამედ პარონებთამორბის ურთიერთობის სფერო. რადგან ადამიანთა ურთიერთობები საზოგადოებაში ინდივიდუალური, მრავალფეროვანი და განუყოფრებელია, ამდენად, **ფ. ა.** მხედველებით, უსარგებლოა რაიმე ობიექტური კრიტერიუმების ძიება, რომელზეც შესაძლებელი იქნებოდა ფსიქიატრიული დიაგნოსტიკის ატება. **ფ. ა.** ახლავს **ფაბრის** ანალიზთან, მთერის (*A. Meyer*) **პრაგმატის** მთთან.

**მზამბრახი** - *а. экаstasy* (ლათ. *ecstasy*) - გარეთ, გნება - დაბადება (*Mebius F.J. 1892*). ფსიქიკური დაავადების აღმოცენება გარეგანი, ორგანოსისგან დამოკიდებული მიზეზებით.

**მზამბრახი** - *а. экаstasy* (ლათ. *ecstasy*) - გარეთ ფაბრის, **ფაბრის** მემოქმედებით განპირობებული. მიეკუთვნება **სომატოკურს** (სომატურად განპირობებული, მნიშვნელოვანი მიხედვით) ფსიქიკური ამ სიკვცის ფართო მნიშვნელობით - ინდივიდუალური, ინტელექტუალური, პოსტგრაფიული, მნიშვნელოვანი ორგანოების დაავადებებით გამოწვეული.

**მზამბრახი** - *а. экаstasy* (ლათ. *ecstasy*) - გარეთ, გნება - დაბადება (*Mebius F.J. 1892*). ფსიქიკური დაავადების აღმოცენება გარეგანი, ორგანოსისგან დამოკიდებული მიზეზებით.

**მზამბრახი** - *а. экаstasy* (ლათ. *ecstasy*) - გარეთ, გნება - დაბადება (*Mebius F.J. 1892*). ფსიქიკური დაავადების აღმოცენება გარეგანი, ორგანოსისგან დამოკიდებული მიზეზებით.

**გეოცენტრიზმი** - *гедоцентризм* (ბერძნ. *gexozizo* - შედოცეა). ვშაქეულებს განდევნა. ფსიქიკური დარღვევების მეტონალობაში შედოცეს შესაქეულებების მეოღლებს გამოეუნება აუადმყოფის სხეულში თითქოსდა მანსახლებული ეშაქის განდებნის მიწნით, რომელეე აუადმყოფში იწეებს ფსიქიკურ ამლოობებს. სათავეს იღებს ედედელსი წარმოდგენიდან ფსიქომის ადმოეუნების არსის შესახებ. გაერეულებული იყო შუა საუკუნეებში, თშუქა გეხლებმა ახლად. ახლოა ექისზამბოსასთან, ჯადოქრობასთან და ბნელ ძალეებზე შემოქმედების სხვა რიგაულერ ხერხებთან.

**გეოგრაფიკული** - *географический*. თვალის კაკლებს გამოხერგა თვალბუდოდან. გამოსაგულ შემოხეუებში შეისლება თან ახლებს ქუთუოების შექერის შეუღლებლობა თვლების დაბჭვისის, თვლის ნაბრალის გაფართოება. აღნიშნება თორეოლოქსიკომის, თავის გენის სიმბეუნების, პიდრეუედილის დროს.

**გეოგრაფიკული სხვაშტრუქტურა** - *географическая структура* - *этническая структура населения* (Этническ. И.Р., 1974). იხ. **სტრუქტურა** **სხვაშტრუქტურა**

**გეოგრაფიკული სინდრომი** **სხვაშტრუქტურისა** - *этнический синдром населения* (Этническ. И.Р., 1977). იხ. **სინდრომი** **სხვაშტრუქტურისა**

**„გეო“- ან (ლათ. Ego „შე“ ფსიქოანალიზში**: შეუღლეე ამტანება ზ. ფროიდის მიერ შექმნალ პიროვნების სამხაწლიან ფსიქონალბერ სტრუქტურაში. უპირებს შეუღლეური შეგომარეობა (აგაას (ID) და „შუპერ-ეგო“ (Super-Ego) შორის. ამსამთან «*ego*» წარმოადგენს ინსტიქტების, გაუნსობხერებელი დღოლეს სათავეს, ხოლო „შუპერ-ეგო“ ასრულებს ეუნშურის ეუნქციას, არ ეუნებს „გეო“-ში სოქეალური მოციეებით მიუღებელ, უშაბადეს (მაგ. სისხლშერევის) იშპელებს და დღოლდება. ზ. ფროიდის მიხედვით, ამგვარად რეეულერდება პიროვნების და გარე სინამდილის ურთიერდამოქედლება.

**„გეო“-ს განსაწილა**, **ღაწილა** - *расщепление Эго* (ანგლ. Splitting of Ego). ფსიქოანალიზში მიუხუდავად იმისა, რომ ნორმალური „გეო“ არსებობად არის ეუნქციების შედარებით ენიციერებული და ორგანიზებული ჯგუფი, არსებობს გარემობანი, როქა „გეო“-ს გარკვეულ ეუნქციებს სხეებს საბარისპირა, ყოველ შემთხვევაში, დღოებით მიანუ. მაგ, თვითდაეიერების აქტი, როქა აღანიან ფიქრობს, გრძნობს და მოქმედებს სუბიექტურად, მაგრამ აშავე დროს აეკიდება ასეთ ქვეყას ეკნობობეჭტურად. „გეო“-ს ასეთი „გახლენა“ აუეილებული მოეუნება, დეე ენაზება მაციეისს, გაეუნობიეროს და დაეკიდება საკუთარ დაციით ან დრაივებქვეე შინარეული გამოედილებებს (ძირითადად გეაგტანება) და ენოს ასანი როგორე წარსულის გამოედილებებს (შირად დლოქეულებს) გამოერება. „გეო“-ს თქამბული გახლენა“ დროებითად და მას ცელს მანამდე არაკნობიერი მხაღის „გეო“-ში ინეგერირება. „გეო“-ს ეური შეღაბი დესოციაციები სერობილი ფსიქოპათოლოგიის არსებობის მიწნებია (მაგ, პიროვნების გაორება, უნის შეგომარეობები, გაკეუდმარების სხეადსხვა ფორმები, ფსიქიური შეგომარეობები და სხე).

**„გეო“-ს სტრუქტურის სფერო** - *сфера Эго* (ანგლ. Conflict-free Ego Sphere). ფსიქოანალიზში: „გეო“-ს მოქმედების ის სფერო, რომელეე წითრეული არ არის შიგაფსიქიკურ კონფლიქტში. „გეო“-ს მოგ ეუნქციას (ენობილებს, პერეექცია, მესეინეობა, ენიქი) თაიდანეე გაანაბ ამტანტქვეე დრაივებქვეე (იხ.) შედარებით დამოქედილობა ანუ „შერეული ატანტქვეე“. ამ ფუნქციებს, ინდივიდის ხოლოგური პოქეუნალის შესაბამსად, აქებს მომწიფების გენდენეცა. კონფლდოდან წარმოშობილი „გეო“-ს სხვა ეუნქციები განეთარების პროექტში თავისუფლება ასეთი კემარსაგან და ჟითარება ეწ. „შერეული ატანტქვეე“, რასეე ზოგჯერ თან სღებს „ფუნქციის შეცვლას“. ე.ი. თაიდანეეეე ეუნქციური აქციეობა იყვლება ურო მიუღებელი, მერბილებული აქტიუობის.

**„გეო“-ს მიწნის სტრუქტურა** - *Эго-структура* (ანგლ. Ego str.). ფსიქოანალიზში დრაივებთან, აუქტებტან, ილეუბთან ან ქეეებთან დაკეშირებით „გეო“-თვის შეუთამბებელი, მიუღებელი ფსიქიკური მინაბარსები სუბიექტურად განიყდება „დამეერებელი ეგო“-ს შირი, როგორე „შე“-თვის უცხო. „გეო“-თვის უცხო „გეო“-დბტანტურბს სინონიზმარომლის საბირსპირა „გეო“-სტანტურბს.

**„გეო“-ს ფუნქციონება** - *функция Эго* (ანგლ. Ego Functions). ფსიქოანალიზში: „გეო“-ს სექსუოკური ეუნქციები შრადდრიცხოვანია: ჰერეკეუსული ამტანტაციული მარჯურელებული დამხუჯელი დამცველი ატანტანტურბა ამბეჭტთან დაკეშირებული და სხე.

**გეოგრაფიკული** - *географический*. შირი შირეულებული პრინციპი, როგორე პიროვნებათორის ურთიერობის სტრუქტურა, განსაკუთრებით დაბტრუნული სეგაეიების თაიდან აუცილების საშალებს. გა-ბ პრინციპებში წყაად არის მიღებული, არ მთაქრო სხვას ხოროგება, ორგანიზემფორ უსრეო სიქეთ არ მსიქე საბაბს მგრული დამოქედებულებისა. საშეშადა ეუნქციებლად ფსიქოპროფილტქტიკური და ფსიქოთერაპეული საშალებებებს კამბეღჭმს. რომელეე შმარობლია პიროვნების ოპტიმალური ეუნქციონირების განსახორციელებად.

**გეოგრაფიკული** - *географический* (ბერძნ. *gex* - თხა, *phos* - ხმა). ფსიქოანალიზში ხმა, რომელეე ეგებრით, სინამდით, მოდულაციით, ინგონაციით მოგაგონებს თესს კიკანს. აღნიშნება ისტერიის, მოხუეებ ელიზობით ფსიქომების, პროგრესული დახმადის დროს. შინაგან სნეულებათა ელნიკამ შეგაეხი ხმამგობა აღნიშნება ეუსუფიკური პოქერიცის დროს (ბრონქიოუნობის სახე).

**გეოგრაფიკული** - *географический*. 1) შირიუნული თაგებხერებებს, ხასათდება წინა ჰლანზე საკუთარი ფსიქიკური სოქორების მოციების, საკუთარი შეხერებლების, ინგერების წამაწვევით, გარშემოქოეთა შუეულებას და ინგერების იგნორირებით. აღნიშნება ენადეესით დაეაღებულებში, ფსიქოპათიურ პიროვნებებში. 2) შიდგეათა ე. აღმოყენება ხოლის წარმოქმნის პროექტში, როქა აეაღყოს, კონრადს (Conrad K., 1958) მიხედვით, არ შეუძლია

ეკოპირების განყოფილება შესრულება ანუ როცა იგი საკუთარი ფიზიკური გვევლინება. ავადმყოფის წარმოადგენით, მის ირგვლივ უკლებლივ მისთან ურულ კავშირშია. იხ. **მედიკალიზაცია** და **მედიკალიზაცია**.

**მედიკალიზაცია** - პროცესი (ლათ. medicina - ავადმყოფი, ბერძნ. genes - წარმოშობენი, გამოშვებუ) (Mintz C.C., 1968), ავადმყოფთა ერთი რაგვლის მეორეზე პარყოფითი ფსიქოლოგიური შემოქმედება განსაზღვრულ პირობებში, რაც განაპირობებს ნეუროზული ხასიათის ახალი სიმპტომების აღმოცენებას ან უკვე არსებულის გაძლიერებას. ფსიქოპედიის ერთერთი ვარიანტი.

**მედიკალიზაცია** სინდრომის შემოქმედების გამოწვევის მექანიზმის შესახებ - Эдвардс А.О. Синдромы и их патогенез (Эдвардс А.О., 1936) იხ. **მედიკალიზაცია** და **მედიკალიზაცია**.

**მედიკალიზაცია** სინდრომი - ანთონი ედვარდსი (Edwards J.H.). თანდაყოლილი ანთიბიოზი (გადაცემის ავტოსომურ-რეცესიული ტიპი, გროსოშია 18). დამახასიათებელია სხეულის მასის შემცირება, განვითარების, მათ შორის გონებრივის ჩამორჩენა, სივრცე, პერიფერიული წერტილის პარამები და დამხლები, მიკროგნაფია, მალალი სისხი, სინდრეტილია, ხასირიანი კონტრაქტურები, კნოთიანი აქილია, ეპიკანტი, გულის მრავლობითი ანთიბიოზი (პარკუთპირობის ძვლის დევეტი), ორმაგი თირკმელი, კრიკოტიფიზი.

**მედიკალიზაცია** ბიოქიმიური ანთონი ედვარდსი (Ewald G., 1924). პათოგენური გენეტიკური პროცესების (ბიოქიმიკალიზაცია) ერთობლიობა, განსაზღვრავს ადამიანის ფსიქიკური მოქმედების შესაძლებლობას, მის დევეტიანობას და ადექტორი რეაქციების დონეს. ბიოქიმიკალიზაცია მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ხასიათის სურათის და თვალის ინდივიდუალური ფსიქოგენური რეაქციის პროგნოზირების სამუშაოებს. ევალდის კონკრეტული წარმოდგენის კრიტიკა იხ. **მედიკალიზაცია** და **მედიკალიზაცია** კონკრეტული შემთხვევის განხილვისას.

**მედიკალიზაცია** ხასიათის სურათი - ანთონი ედვარდსი (Ewald G., 1924). იხ. **მედიკალიზაცია** და **მედიკალიზაცია**.

**მედიკალიზაცია** ხასიათის სურათი - ანთონი ედვარდსი (Ewald G., 1919). იხ. **მედიკალიზაცია**.

**მედიკალიზაცია** - დანაშაუნი (ბერძნ. euzeas - ჯიშისანი), მოხდრება ადამიანის მოცემის შემოქმედებით ბუნების გაუმჯობესებასა და სრულყოფილ გერმანი შემოღობა ინდ. ბოლოება ფ. კალტონმა 1862 წელს. ეს ხიზნება კუპანურია, კრძობი, უდავო სამედიცინო გენეტიკისა და გენეტიკური კონსერვაციების დანებებით რძელს. თუბა რეპროდუქციური და რასისგები დემოგოგურად მახინჯებდნენ მის დებულებებს და ქიდაგებდნენ უაღკრული ხალხების ბიოლოგურად არასრულგებობებს, ვროგნულ დისკრძიანობას.

**მედიკალიზაცია** - ანთონი (ლათ. evitas - ქალის მსგავსი) 1) შიდაკაცებში - გენეტიკური (თანდაყოლილი) კომპლექსუალური მამაკაციური ფსიქიკური თავისებების დაკარგვა, მათი შეცვლა ქალური - პრანევი, მანერულობა, დამახასიათებელი მიმიკური, პანგომიმიკური და ქვეითი რეაქციები; 2) ავადმყოფი მამაკაცი მოხდრებით დანაშაუნი, თითქოს მას აქვს ქალის სასქესო ორგანოები და შესაბამისი ფუნქციური გამოვლინებები (ორსულობა, მენსტრუაცია, დაქტაცია და სხვ.). აღინიშნება მემოგენების დროს.

**მედიკალიზაცია** - ანთონი (ბერძნ. euzeas - ევენია, საკურისი). ავადმყოფური მედიკალიზაცია, გამოშვებული სასქესო ქრომოსომებისა და მეორეული ხასქესო ნიშნების თანდაყოლილი ან შექმნილი განვითარებლობით. ვლინდება ძელიანი აპარატის დისპროპორციით (მოკლე სხეული, და გრძელ კიდურები), სასქესო ნიშნების კომპლექსი აქვს აქვს აქვს აქვს, უკლებლივ სხეულებით გულმკერდის, მუცლის არემი, მუხტრატული გ. ხასიათდება პუბერტატულ ასაკში გარდაზავილი უკლებლივ სიმუხებით ან დისპროპორციული გიგანტიზმი. მოგვითხებით გ. ხასიათდება სასქესო აპარატის რეგრესული განვითარებით და ნიშნებით. ფსიქიკური მხრივ - ხასიათის უკლებლივური ხასიათი, სივრცე, რეკტილობა, მორსხეობა, მოგვრე გრუნერივი განვითარებლობა, ხშირად - ეპილეფსიური გულმკერდის ევლერებია. **მედიკალიზაცია** - ანთონი იხ. **მედიკალიზაცია**.

**მედიკალიზაცია** - ანთონი (ანტ. თანდაყოლილი - საყლაპავი). ხალხობის დასქვნის, ხასიათისა და სივრცის სანაშეობით. აღინიშნება ნეუროზული მედიკალიზაციის - სივრცული და სივრცული ნეუროზების დროს ხიზნა: **მედიკალიზაცია**.

**მედიკალიზაცია** - ანთონი (ანთონი) დასქვნის ხასიათის სანაშეობით. აღინიშნება ნეუროზული მედიკალიზაციის - სივრცული და სივრცული ნეუროზების დროს ხიზნა: **მედიკალიზაცია**.

**მედიკალიზაცია** - ანთონი (ანთონი) დასქვნის ხასიათის სანაშეობით. აღინიშნება ნეუროზული მედიკალიზაციის - სივრცული და სივრცული ნეუროზების დროს ხიზნა: **მედიკალიზაცია**.

**მედიკალიზაცია** - ანთონი (ანთონი) დასქვნის ხასიათის სანაშეობით. აღინიშნება ნეუროზული მედიკალიზაციის - სივრცული და სივრცული ნეუროზების დროს ხიზნა: **მედიკალიზაცია**.

**მედიკალიზაცია** - ანთონი (ანთონი) დასქვნის ხასიათის სანაშეობით. აღინიშნება ნეუროზული მედიკალიზაციის - სივრცული და სივრცული ნეუროზების დროს ხიზნა: **მედიკალიზაცია**.

**მედიკალიზაცია** - ანთონი (ანთონი) დასქვნის ხასიათის სანაშეობით. აღინიშნება ნეუროზული მედიკალიზაციის - სივრცული და სივრცული ნეუროზების დროს ხიზნა: **მედიკალიზაცია**.

**მედიკალიზაცია** - ანთონი (ანთონი) დასქვნის ხასიათის სანაშეობით. აღინიშნება ნეუროზული მედიკალიზაციის - სივრცული და სივრცული ნეუროზების დროს ხიზნა: **მედიკალიზაცია**.

**მედიკალიზაცია** - ანთონი (ანთონი) დასქვნის ხასიათის სანაშეობით. აღინიშნება ნეუროზული მედიკალიზაციის - სივრცული და სივრცული ნეუროზების დროს ხიზნა: **მედიკალიზაცია**.

**მედიკალიზაცია** - ანთონი (ანთონი) დასქვნის ხასიათის სანაშეობით. აღინიშნება ნეუროზული მედიკალიზაციის - სივრცული და სივრცული ნეუროზების დროს ხიზნა: **მედიკალიზაცია**.



**პიპინობალიტიზმი** - **пипинобалистичность** (ლათ. *pipino* - თანხარი, *finalis* - საბოლოო). პრინციპი რომელიც აბტოციებს სხვადასხვა ფსიქიკური დაავადებების ფსიქოპათოლოგიური გამოვლენების შესაგებებს მათი განვითარების საბოლოო ეტაპებზე.

**პიკანტობა** - **пикантность** (ბერძნ. *eklampsis* - აფეთქება, უკუარი აღმოცენება). **ორხეულია შოტგანხაი** პოეტისიკოსის **შპაუ ფონმა**. აღმოცენდება ნეოროზების ფონზე, ჩვეულებრივ ორხეულობის შეიარე ნახეურში. პათოგენეზში ძირითად როლს ასრულებს გენის ხისხობარული საპაში და გოქსიკური შემუშება. დაშახსიათებელია ელექტროფორული ელექტრიტი (იხ. **პრინციპი პიკანტობა**) და ცნობიერების ამაღ ფსიქოპათოლოგიური აქტუალობით, მხედველობით და სხვათა ძალკონსტრუქციები. კრწჩხეები შეიძლება მიმდინარეობდეს სერების, სტაგუსის ფორმით.

შესაძლებელია კომპატიბური შდგომარობის განვითარება. ამ დროს აღინიშნება არტერიული შიპერტენია, უ-შეიძლება მიმდინარეობდეს კრწჩხეების გარეშე ცნობიერების ამაღლი, შემუშებით, შარდში ცელილებებით (პროტენურია), **პიპინობა** - **пипиноба** (ბერძნ. *ek* - ფარგლებს გარეთ, *meses* - მესხიერება) (*Blauc-Vontenille H.*, 1887) მესხიერებას **დარღვევის ფორმა**, დროის შეცნობის დარღვევა, რომლის დროსაც იმდება მღვირა წარსულსა და აწმყის შორის; ან წარსული ცხოვრების მოვლენები გადმოღის აწმყოში, ან მიმდინარე მოვლენები გადაღის წარსულში (იბტიკუაციის გადასაცვლება წარსულშია მოხუცებულობითი უკუასვლგობის, ალკსაიმერის დაავადების დროს).

**პისნი** - **писни** (ბერძნ. *ek* - გარეთ, *noos* - აღმეტი) (*Zelen Th.*). ერთი განსაზღვრული აფექტის გაბატონება ყველა ფსიქიკური გამოვლენისზე **გარეშის** (*Аришис* П.Н., 1933) ეს შიპიკუნენდა ფსიქოპათოლოგიური პიროვნებების ჯგუფს, რომელთაც იგი უწოდებდა გრძობათა ფანატიკოსებს. პირველ რიგში, ესენი არიან რელიგიური სექტების წარმომადგენლები, რომლებიც ადელად ექვემდებარებიან შთაფონებას, სხეების შეგავლენას, უნსაზრებთან არა იძღვნიდ იტას, არამედ გარკვეულ პირებს, მათი ერთგულებაში არიან და მხად არიან თავი შესწრონ მათ. შესაძლებელია აფექტით იდეების ასეთი შეუვლა აღინიშნება ეჭვიანობის პარანოიული ბოღვის დროს, რომლის არსი პირველად აღინიშნება განსაზღვრება უსაფრო, უსაფუძვლო ეჭვიანობის გრძობით და არა ახრით, ღალატის შესაძლებლობის შესახებ. უ-ს შიპიკუნენება მფოთისა და მიმისადმი მიერეკლი ფსიქოპათოლოგიური პიროვნებები, მათ ფსიქიკური ცხოვრებაში დომინირებს შიშის გრძობა, რომელიც თან ერთვის ყველაფერს, რაც ხდება გარემოში (*Kahn E.*). ამგვარად, ცნება უ- მოვლენება ერთგვაროვან ფსიქოპათოლოგიურ შინაარსს.

**პიროვნის ტესტობალიტიზმი** - **Пиронис** ანდფატი (Economo C., 1917). იხ. **შესაზღვრული პიროვნობა**.

**პიროვნის ტრამატიზმი** - **Пиронის** ანდფატი (Economo C., 1917). ელექტროური ენეგვალატის წყვეტ სტადიის ძირითადი და აუცილებელი ნიშნები: ცხელება, პათოლოგიური ძილანობა და თვალის შამოშრინებელი დარღვევება.

**პიროვნის შერბამბა** - **пиропия** ანდფატი (ბერძნ. *ekphros* - გამოგანა, *in* - შიგნით არსებული, *exanosa* ჩანაწერი). მესხიერებაში წარსულში დაშახსიურებელი კულის, მისი ფრგანტებებს (გნერკაში) გატოცვლება და მათგან შედარებით მთლიანი, სისვამაგებელი სურათის შექმნა. ენგრაფები ამ დროს გამოღის როგორც მესხიერების შემადგენელი ელემენტები. წერის, მეტყველების ნეოროფსიქოლოგიური გამოკვლევების დროს განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ავადმყიდის მერ ცხოვრების გამოყოფილების პიროვნული ავტომაგებებელი ენგრაფების (გვიარი, სახელი, მსამართლი და სხვ.) აღდგენას.

**შლესიკი** (გერმ. *Schulek*) ფსიქიკალბიში: შიშის აფექტური მდგომარეობა, აღმოცენებული საშობროების სიკუაციებში, რომლის შიშით არ იყო მხადეფა.

**პლანტრონესტალობალიტიზმი** - **плантронистичность** შრული, რომელიც ასახავს თავის გენის ბიოპოგენეციალების ცვლილებას. ჩაწერა ხდება ელექტროენცეფალოგრაფის საშუალებით სხვადასხვა განხრებიდან. სინონა: შპშ.

**პლანტრონესტალობალიტიზმი** - **плантронистичность** - ანექტოანდფატიოაფ. ხელსაწყო, რომელიც გამოიყენება თავის გენის ბიოპოგენეციალების რეგისტრაციასათვის.

**პლანტრონესტალობალიტიზმი** - **плантронистичность** თავის ტვინის ელექტრული აქტიუობის რეგისტრაციას მეთოდი, მდებელი ქალს დაშახსიურებული საფარეკლიდან, ფსიქიკარამი ძირითადად გამოიყენება თავის გენის ორგანული დაავადებების სადიაგნოსტიკოდ, ხელს უწყობს ცნს-ის ორგანული პათოლოგიური პროცესის არსებობის და მისი გობის აღდგენას. ბიოლენების ჩაწერა ხდება მოსვენებულ მდგომარეობაში (ფორუმი ევ) და სხვადასხვა დავტიროების დროს (იხ პრენენციალური, ბტრონი და მხედველობითი გამდახინებლის გამოყენება, ფრამალოგიური ნიუთიერების შეყვანა).

**პლანტრონესტალობალიტიზმი** - **плантронистичность** ელექტროგრაფიით გამოწვეული ენცეფალიოპათია.

**პლანტრონესტალობალიტიზმი** - **плантронистичность** - ანექტოანდფატიოაფ. ხელსაწყო, რომელიც გამოიყენება თავის გენის მოქმედების გამოსკვლევად **პლანტრონესტალობალიტიზმი** (იხ.) მეთოდით.

**პლანტრონესტალობალიტიზმი** - **плантронистичность** - ანექტოანდფატიოაფ. თავის გენის მოქმედების გამოკვლევას მეთოდი, დაშახსიურებული მისი სხვადასხვა ნაწილიდან ბიოპოგენეციალების ერთდროულ რეგისტრაციასათვის.

**პლანტრონესტალობალიტიზმი** - **плантронистичность** - ანექტოანდფატიოაფ. ხელსაწყო, რომელიც გამოიყენება თავის გენის მოქმედების რეგისტრაციის საშუალებით. გამოკვლევით შეიძლება აღდგინდეს დაშახსიების სენსორული, მოგორული ან სენსორულ-მოგორული ტიპი, განსაზღვროს მადემიელინიზებული ან აქსონალური დაშახსიება და გამოვლინდეს ნერველი იმპულსის გატარების ბოკის დოკალიზაცია.

**პლანტრონესტალობალიტიზმი** - **плантронистичность** - ანექტოანდფატიოაფ. ხელსაწყო, რომელიც გამოიყენება თავის გენის მოქმედების რეგისტრაციასათვის.

**პლანტრონესტალობალიტიზმი** - **плантронистичность** - ანექტოანდფატიოაფ. ხელსაწყო, რომელიც გამოიყენება თავის გენის მოქმედების რეგისტრაციასათვის.

**პლანტრონესტალობალიტიზმი** - **плантронистичность** - ანექტოანდფატიოაფ. ხელსაწყო, რომელიც გამოიყენება თავის გენის მოქმედების რეგისტრაციასათვის.

**პლანტრონესტალობალიტიზმი** - **плантронистичность** - ანექტოანდფატიოაფ. ხელსაწყო, რომელიც გამოიყენება თავის გენის მოქმედების რეგისტრაციასათვის.

**პლანტრონესტალობალიტიზმი** - **плантронистичность** - ანექტოანდფატიოაფ. ხელსაწყო, რომელიც გამოიყენება თავის გენის მოქმედების რეგისტრაციასათვის.

**პლანტრონესტალობალიტიზმი** - **плантронистичность** - ანექტოანდფატიოაფ. ხელსაწყო, რომელიც გამოიყენება თავის გენის მოქმედების რეგისტრაციასათვის.

**პლანტრონესტალობალიტიზმი** - **плантронистичность** - ანექტოანდფატიოაფ. ხელსაწყო, რომელიც გამოიყენება თავის გენის მოქმედების რეგისტრაციასათვის.

**პლანტრონესტალობალიტიზმი** - **плантронистичность** - ანექტოანდფატიოაფ. ხელსაწყო, რომელიც გამოიყენება თავის გენის მოქმედების რეგისტრაციასათვის.

**პლანტრონესტალობალიტიზმი** - **плантронистичность** - ანექტოანდფატიოაფ. ხელსაწყო, რომელიც გამოიყენება თავის გენის მოქმედების რეგისტრაციასათვის.

**პლანტრონესტალობალიტიზმი** - **плантронистичность** - ანექტოანდფატიოაფ. ხელსაწყო, რომელიც გამოიყენება თავის გენის მოქმედების რეგისტრაციასათვის.

**პლანტრონესტალობალიტიზმი** - **плантронистичность** - ანექტოანდფატიოაფ. ხელსაწყო, რომელიც გამოიყენება თავის გენის მოქმედების რეგისტრაციასათვის.

**პლანტრონესტალობალიტიზმი** - **плантронистичность** - ანექტოანდფატიოაფ. ხელსაწყო, რომელიც გამოიყენება თავის გენის მოქმედების რეგისტრაციასათვის.

**პლოცინის სინდრომი** - Елинек Е.М., 1960). დაწყებითი აღკომპლექსის სიმპტომი, ხასიათდება მძიმე სპირტული სინდრომის რადიკალიზაციის კონგრუის უნარის დაკარგვით ალკოჰოლის პირველივე პირის მძიმის შემდეგ. სპირტული სინდრომის დასრულების შემდეგ აღკომპლექსის გამოვლინება.

**ელისის სინდრომი** - Елинек Е.М., 1910). ხეშუბალური პერეგნისის სავ, რომლის დროსაც დაკავშირდება მიღწევა სითხეებთან შეხებით ან მანიპულირებით - წყალთან (ხანძარის დროს) ან მარლთან (დასუნვა ან დაღვრა). მეორე სიმპტომს წოდებენ უროლგინისა და განიხილება როგორც მამობის ან უფიზიონის გამოვლინება (იხ. **შეზღვევა**). სინდრომი: პაპილარო-პლუმის სინდრომი, უნდაცხი (უნდაცხი - ქალთებზე).

**ელპენის სინდრომი** - Элепен Е.М., 1910). მძიმე-ღვათის მდგომარეობის განიხილება ლემირინგირებით, გარემოს არასრული აღქმით. ხშირად აღინიშნება ალკოჰოლიზმით დაავადებულებში, რომლებიც უკუარს გამოვლინების დროს არასრულად ნათელი ცნობიერების მდგომარეობაში აქვთ აგრესიულ-დამპყრველ ტენდენციებს. ელპენო-„ოლისა“-ს პერსონაჟი. სასახლას სახურაზე მდინარე, უკრად გააღვიდა ანხანაჟების ხმა, ნახევრადმძინარე გაღმობრუნდა, გაღმობრუნდა სიმაღლიდან და დაღვრა სინონ: **ორბა** **მოდო**.

**ელუსი** - Элюсия (ინგლ. elusion - თავის არიდება) (Lain R.D., 1961). ფიქვალური თავდაცვის ხერხი, ამბროსული საკუთარი იმეუს-ს შენარჩუნებამე კონფლიქტურ სიტუაციაში რეალობის განცანების, ცენტრების საპაროში განსვლის გზით. უ-ს დროს სახლვარი უანგამიებსა და რეალობას შორის თითქოს იშლება, ერთი ცულის მეორეს. უ-ს მაგალითია ემა ბოვარის ცხოვრება ფლობერის რომანში ჟანდავანის ბოვარი. იხ. **მშენებელი**.

**ემასი** - Эмация (ლათ. emacia - მამაკაცური). მამაკაცური სქესის პირების კატრატკა სათესლე პირკვლების ორმხრივი მოყოლებით.

**ემბოლი** - Эмболия (ბერძ. embolion - სოლი). ერთი და იგივე სიტყვების, გამოთქმების ხშირი გამოყენება. იხ. **მეტაბოლიზმი** **ემბოლი** სინონ: **ემბოლიზაცია**.

**ემბოლიზაცია** - Эмболизация (ბერძ. embolion - სოლი, phasis - გამოთქმა). ფრანკის ხანტაქური კონსტრუქციის დარღვევა, რომლის დროსაც ხდება დამატებითი ბგერების, მარყელებისა და სიტყვების ჩართვა შეფუთვებში. ხშირად გვხვდება ენარობიკობის დროს როგორც კომპლექსური ბუნების შეფუთვების გამოვლენისას.

**ემბრიონალიზმი** - Эмбрионализм (ბერძ. embriion - ჩანასახი). მათოლოგიური მდგომარეობა, აღმოუენება ემბრიონალური ფორმაში. იხ. **ალკოჰოლიზმი** **ემბრიონალიზმი**.

**ემბრიონალიზმი** - Эмбрионализм (ბერძ. embriion - ჩანასახი). მათოლოგიური მდგომარეობა, აღმოუენება ემბრიონალური ფორმაში. იხ. **ალკოჰოლიზმი** **ემბრიონალიზმი**.

**ემილი** - Эмилия (ლათ. Emilia - მამაკაცური). მამაკაცური სქესის პირების კატრატკა სათესლე პირკვლების ორმხრივი მოყოლებით.

**ემილი** - Эмилия (ლათ. Emilia - მამაკაცური). მამაკაცური სქესის პირების კატრატკა სათესლე პირკვლების ორმხრივი მოყოლებით.

**ემილი** - Эмилия (ლათ. Emilia - მამაკაცური). მამაკაცური სქესის პირების კატრატკა სათესლე პირკვლების ორმხრივი მოყოლებით.

**ემილი** - Эмилия (ლათ. Emilia - მამაკაცური). მამაკაცური სქესის პირების კატრატკა სათესლე პირკვლების ორმხრივი მოყოლებით.

**ემილი** - Эмилия (ლათ. Emilia - მამაკაცური). მამაკაცური სქესის პირების კატრატკა სათესლე პირკვლების ორმხრივი მოყოლებით.

**ემილი** - Эмилия (ლათ. Emilia - მამაკაცური). მამაკაცური სქესის პირების კატრატკა სათესლე პირკვლების ორმხრივი მოყოლებით.

**ემილი** - Эмилия (ლათ. Emilia - მამაკაცური). მამაკაცური სქესის პირების კატრატკა სათესლე პირკვლების ორმხრივი მოყოლებით.





ცივის დიუბური და პროგრადიენტული დაზიანება. არანთებითი გენების ვ-მ მავალითა აღკრული ვ. შწეავე პერაქსიდალური ვ. (შეღვრეს დააგებება) და სხვ. ინფექციური ფაქტორებით გამოწვეული თავის ცივის ანთებითი დაავადებით ვ. დონტრულად გრამიზული, რეგმატული და სხვ.

**მცამეშობიტი ვეოლივიტი** - *Amphibiae Amphibolium* (Economid., 1917). თავის ტვანის ანთებითი დაავადება. გვხვდება ეილემების სახით. გამოწვევა უცნობა, თუმცა სპეციელთაგან მიღებული ეირუსული გვიროლოგიის თეორია. ელარდება შწევე და პრონიკული სტადიების სახით. შწევე სტადია ხასიათდება პიკეტიენგური და ფსიქიკური (დელირიუმი) დარღვევებით, უმეტესად ელანება პიკერსონიით (ლეოთარგია). ლეოთარგია შეიძლება იყოს შწეავე ფაზის საწყისი სიმპტომი, თუმცა ხშირად მისდევს დელირიულ ატონებს. ქრონიკული სტადია ხასიათდება ნეუროლოგიური (პოსტგენუვალგური პარკინსონიზმი) და ფსიქიკური დარღვევებით. კლინიკურ სურათში ფსიქიკური დარღვევების სიკვარის შესაბამისად (*Алсгоф* Ф. Ф., 1960) არჩევენ შემდეგ ფორმებს: 1) ფსეგლოპარალიზურა; 2) პარკინსონული - კრუნჩხვითი, ფსიქიკური ევოლივებით, ევოლუციონისმაგვარა, შიშის შეგვებით, კოლაფსის და კატაქსიკური, პიკერსონიული და ნარკოლეფსიკური ფორმები, სენსორული სინთეზის და რატაკურ-ევსტიკული დარღვევებით, ონირიული; 3) შალფტრენისმაგვარა - კატაქსიონიული, პალეინიკურ-პარანოიული, პეზიოიური და მიმოვიკური; 4) ფსეგლოპარალიზურა; 5) ნეკროზისმაგვარა. სინონ: *Amphibolium* *Amphibolium*, *Amphibolium*.

**მ. შამბონისირული ვირუსი** - *Amphibiae Amphibolium*, *Amphibolium* ფორმა (*Гурвич* М. О., 1941). ვადეზური ენცეფალიტის ფორმა, რომლის დროსაც პარკინსონიზმი, ხოლცა, ჭკუასტკობა არ აღწევს შინაგულთან გამოვლინებას. გავრცედა ფსიქოსენსორულ დარღვევებით, პარესთეზიებით.

**მცამეშობიტი** - *Amphibiae* (*Marchand* L., 1937). ამოტროფული პროცესის შესახებ (*Mejzhan*, 1932) კონკურსი თანხად, ელექტრული გაერთიანებული სენსორული და პრესენციული ასაკის თავის ცივის ატროფიული დაზიანებით მიმდინარე დაავადება (პიკის დაავადება, ალკამიერის დაავადება, მოხუცებლობითი ჭკუასტკობა). ასეთი გაერთიანება პირობითია და ეწყარება შილოდ კლინიკურ სურათს (*Mc Menamy* W. H., 1940; *Штерман* Э. Ф., 1967).

**მცამეშობიტი** - *Amphibiae*. თავისა და შერვის ცივის ანთება.

**მცამეშობიტი** - *Amphibiae*. თავის ტვანის ორგანული დაზიანება, ხასიათდება დისკროვიული ევოლივებით. ვის დიუბრენციაც ხდება ევოლუციონგური ნიშნების მიხედვით - ვ. ანოქსიური, პრეგნოსიკური, პოსტგენუვი, პიკერსონიული, პიკერსონიული, პიკერსონიული, პიკერსონიული და ა. შ. გერმინი. ძირითადი გამოვლინება მყარი და შეუქცევადი ფსიქიკური დარღვევების აღსანიშნავად, რომელიც აღმოცენდება თავის ცივის ორგანული (ევოლუციონ-ორგანული) დაავადების შედეგად. ამით იგი უმთხვევა ქრონიკული ორგანული ფსიქოსენსორის ცნებას. ხშირად გერმინი ვ. განმოყვება ქალ-გაივის გრავის ნარმის მოვლენების აღსანიშნავად. პოსტგენუვი ევოლუციონისგან გამოსეპებით, პოსტგენუვი ევოლუციონისგან დროს ასინთურ დარღვევებთან ერთად აღინიშნება კეროვანი ნეუროლოგიური სიმპტომები, ემოციური გაუხეშება, აფექტური რეაქციებისაში მიდრეკილება, ამგვარობა, კონვულსივობა, მოდარეობისაში გუნდისებობა, ხშირი ისტერიკური გამოვლინებები და სხვა დასახევა ევოლუციონის ინტელექტუალურ-მესეგური დაქვეითების ნიშნები. საზღვარი პოსტგენუვი ევა და პოსტგენუვი დემენციის შორის უარსებობს. პირობითი, განსაზღვრება ინტელექტუალური დაქვეითების სიღრმის მიხედვით. სინონ: *Amphibiae*.

**მცამეშობიტი სიგეროზი** - *Amphibiae* (*Angewandte* H., 1973). ხასიათდება გონებრივი განუვითარებლობა. ევოლუციონური გულყრბით და ნაბიჯადევი გამოვლინებებით (გრიძას, სიცილი). ენთოვანი გონუმი დაქვეითებულია, შორეაობები დატოვებული. სიარული არაშეაჩი. აღინიშნება მიკროეული, შიშის შედეგად გამოყოფა, პიკერსონული და უმეტესად ევოლუციონური ნიშნები. ავადმყოფის თავისუფალი მოგონებები მოგონებები მოგონებების მოძრაობას. დაავადების დასაწყისი - ადრულ ბავშვობაში 10-დან 42 თვემდე. პირველი გამოვლინება ბავშვთა კრუნჩხვების - გენერალიზებული კრამპი ან შოკოლიზური - სახით. ავადმყოფები საკვირებენ შედეგი შეთავაზურეობასა და მოვლას. ევოლოგია უცნობა. შილოდი დიფერენციალური აღწერა შეიძლება ორ შემთხვევაში აღინიშნებოდა ამინოცილურია (*Мендел* E. J., 1978). სინონ: *Happy puppet syndrome*.

**მცამეშობიტი** - *Amphibiae*. ზეშუალური ცვლენების, დაქვეითებებისა საკუთარი სექსის არასწორ აღქმასთან. ფსიქოსეპულიური ორინგაციის ევოლუცია საწინააღმდეგო სექსის შიარეს. ხშირად თან ახლავს მცამეშობიტი, უთვალის საკუთარი სექსი სასქესო ორგანოებზე ქარტრული ოპერაციის ფით, მოითხოვოს დოკუმენტები მისი საწინააღმდეგო სექსისაში მიკროციონის შესახებ. ხშირად ერთად გრანსეგნობთან. ფსიქოსეპულიური ტყვის ევოლუცია არ ექვემდებარება ფსიქოთერაპიულ კორექციას. დაშასასათებელია მკურნალობისაში უარყოფითი დადამოკიდებულება. სახელწოდება დაკავშირებულია ლეოლოფ XV-ის დიპლომატის შედეგად ' ვონ ლე ზიკონგის სახელთან, რომელიც დაავადება იყო სექსუალური გაკულმართებით. სინონ: *Amphibiae* (*Benjamin* H., 1954).

**მცამეშობიტი** - *Amphibiae* (*Amphibiae* *Amphibiae*). კოლექტიური ინტელექტუალი ფსიქოზები (იხ). გაერეული კოლექტიური იყო შუა საუკუნეების დასავლეთ ევროპაში და დაქვეითებული იყო რელიგიური ფანატიზმთან. ვრცელდებოდა დიდი ქალაქების მოსახლეობაში, მიმდინარეობდა ხშირად ფსიქოსეპულიური ატონებით, ავადმყოფთა გასწავლებების დამდინარება უნიბარის, მანიტიკური იდეები (იხ. *Amphibiae*). მკურნალ იდეებზედა რეკომენდირებული იყო შუა საუკუნეების დასავლეთ ევროპაში და დაქვეითებული იყო რელიგიური ფანატიზმთან. ვრცელდებოდა დიდი ქალაქების მოსახლეობაში, მიმდინარეობდა ხშირად ფსიქოსეპულიური ატონებით, ავადმყოფთა გასწავლებების დამდინარება უნიბარის, მანიტიკური იდეები (იხ. *Amphibiae*).

**მცამეშობიტი** - *Amphibiae* (*Amphibiae* - მემბრევი). ფსიქიკური დარღვევის მამდინარეობის ფორმა, დამბასათებელია შწევე დასაწყისი, სწრაფი განვითარება, სწრაფი დასასრული, ხშირად განცილდის ანეშია. მიმდინარეობა ხანმოკლეა. გამოვლინების ვ. აღმოცენდება გარე მიზეზთან კავშირის გარეშე. ვის გიკური მავალითა - ენთოვრების ევოლუციური ხინდისებური დარღვევა და დისფორია.

**მცამეშობიტი** - *Amphibiae* (*Amphibiae* *Amphibiae*). სინონ: *Amphibiae*.

**მცამეშობიტი** - *Amphibiae* (*Amphibiae* - ლეკრა, ევოლუციური გულყრა). ქრონიკული ენდოგენურ - ორგანული დაავადება, მიმდინარეობს განმეორებადი პაროქსიზმული დარღვევებით (კრუნჩხვითი და არაკრუნჩხვითი), ჭკუასტკობის ფორმებით, პიროვნების ხასიათობრივი ევოლუციებით. ვის დროს შემთხვევითა ნაწილი მოგვრე

















**მსტრამპრულო** • **экстремизм** (ლათ. **maus** - კედელი). შემოსაზღვრული სივრცის გარეთ არსებული. მაგ. ე. ფსიქიატრია - სააქადემიოსისგარეთა ფსიქიატრია.

**მსხვერპრი** **жертв** კვების, საქმიელის უშეულობა, უნაერობა. ელანდება მანერების. პონის ხელოვნერობით, უგრირებული უსტეგითა და მიმიკით, წერის და მეტეველების თაისუბური მანერით, ჩაცულობის ექტრავაგანერობით. აღინიშნება ისტეროლოგი ფსიქოპათიის დროს.

**მსხმტპნიბა** • **жесты** (ლათ. **exicio** - აგნება, მეწუნება). აგნების მდგომარეობა.

**მსაბავსიფინიზმი** • **актанзимизм** (ლათ. **exhibeo** - გამოფენა) (**Lasegue E. Ch.**, 1877). ხეწუადური პერტურსობი სახე. ფსიქოესტუადური ორიენტაციის დარღვევა ობიექტის მიხედვით. ხასიათება საწინააღმდეგო სქესის პირთან სასქესო ორგანოების გამომეღებისაგმი მისწრაფებით სექსუალური აგნების და სიამოვნების მიღვევის მიზნით. როგორც წესი, გხვდება შამაკიუებში. ეს აგრეთვე მიუკუთვნება ცნაკური გამორთქვაშებისაგმი მოღერეილება, საწინააღმდეგო სქესის პირისათვის პორნოგრაფიული სურათების წევენებას სურეილი. თუ ვ-ს თან ახლავს საღისტური მიღერეილებები, ამ დროს დაკმაყოფილება მიიღვევა დაზარალებულს შიშის და შორსტეობის რეაქციის დანახვით, ხოლო მამობისტური მიღერეილებების დროს - მისწრაფებით, თავად განიფაღოს დაჯრის შიშისა და სირსტეობას გრძნობა.

**მსტრამპრულო** • **актоном** (ლათ. **actio** - გარეთა, **genesis** - წარმოშობა). ფსიქიკური დარღვევების, დაავადების გამოწვევა გარეშე ფაქტორებით.

**მსტრამპრულო** • **актоном** გარეშე მანერ ფაქტორები, რომლებიც მონაწილეობს ფსიქიკური დარღვევების აღმოცენებაში.

**მსტრამპრულო** • **актоном** **патологическое** (**Pick A.**, 1902; **Ганнушин П.Н.**, 1907). მხეობრე-ეტიოკური ან იპოკორდრიული მონარისის მიმე მფოთიარე ქმევი, მოკლებული საუვეველს და აღვევატურობის. უშეგესად აღინიშნება ფსიქისთენიის, მოგვარე შიშიდური და ციკლოდური ფსიქოპათიის, ფსიატისთენიისმიტეგარის სიმპტომატაკით მიმდინარე შიშიფრენიის დროს.

**მსტრამპრულო** • **актоном** 1. გარეაღ, რომელიც ემყარება ყოყმანს, საკუთარი ან სხვისი საქციელის სისწორისა და კანონიერების; სხვათა სიყვევისა და განზრახვების, სამართლიანობისა და გულწრფელობის შეფასებისას. 2. არის განსაკუთრებული ფსიქიკური მდგომარეობა, ახასიათებს ემოციური და ინტელექტუალური დაგვირთვა. გადატანით მნიშვნელობით, ვ-ს შეიძლება ეწოდოს **„ტვლეკტუადური დეზია“** (ა. გავტრეილმე). ეს ცნონობა აღმოცენდება პიროვნისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების ხელშემშლელ პირობებში; ახასიათებს ხელშემშლელი ობიექტის (მოგვარე საკუთარ თავშიც კი) ძიება, ხოლო შემდგომში ამ ობიექტის მოქმედების ინტერპრეტაცია საკუთარი აზრის განმტკიცების მიზნით. 2. **დარწმუნების უქონლობა** რაიმეს (მოუღენა, ფაქტი, წარსულში მომხდარი ან მომავალში ქმელობა) არსებობის შესაბელებლობის შესახებ.

**მსტრამპრულო** • **актоном** 1. მანერეულ მემაწუნებელი **მსტრამპრულო** (იხ.) შეგანა ამა თუ იმ პიროვნების ერთგულებასა ან სიყვარულში. ნორმამე ემყარება ობიექტის ქვევის ანალიზს და მის ინტერპრეტაციას; მეგნაკლებად აღვევატურია; პათოლოგიაში როგორც ანალიზი, ასევე ინტერპრეტაცია არაადეკვატურია და გამომდინარეობს არა ობიექტის ქვევიდან, არამედ აღმოცენდება და ემყარება დაავადების სიმპტომებს ან პიროვნულ მახასიათებლებს, ან პათოლოგიური უნომენების არსებობას. 2. **მოგვარე-ეტიოკური მდგომარეობა**, განპირობებული ამროვნებითი დასკენით და ემყარება არსებული **მსტრამპრულო** (იხ.) ნიადაგზე განვითარებულ აზრს, თითქოს პიროვნებისთვის მნიშვნელოვანი მოუღენების გადაწყვეტას და ქმელობების შესრულებას ხელს უშლის ქვეის აღმერეული ობიექტი.

**მსტრამპრულო** • **актоном** **патологическое** **эгоцентризм**, მიმდინარეობს მელირებული იღვევის დონეზე. ხშირად - პარანოული განვითარების საწყისი ეტაპი. რიგ შემთხვევებში - შიშიფრენიული პარანოიადური ევეიანობის ბოღის ფორმირების სტადია.

**მსტრამპრულო** • **актоном** **патологическое** **эгоцентризм**, გამოისაგება სხედასება, ხშირად არაადეკვატური მიმეების გამო მფოთიანადმი მიღერეილებით. შესაძლებელია იყოს ასთენიანის და ნეერომული მდგომარეობის მიმეში, თუმცა უშეგესად კონსტიტუტურია. სუხანოის (**Суханов С.А.**, 1905) მიერ გამოყოფილ იყო მფოთიან-ექვენიული ხასიათი ფსიქისთენური კონსტიტუტის ფარგლებში. ექვენილობა ხელს უწყობს იპოკორდრის განვითარებას და გაყილებით დრმაველება დეპრესიების დროს (იხ. **ანალიზის რეპრეზმე**).

3

**ვაგაბონდია** - вагабондия (ლათ. Vagabondus - მოგზაური, მოხეტიალე). მოგზაურობის, ხედალს, საცხოვრებელი ადგილის გამოცვლასა და დაუბეჭდელი მიმწრაფება. ძირითადად ცხებება უსიოპათიების დროს, შესაძლოა ატარებდეს ნეუროზულ ხასიათს (აკვიატებულ მდგომარეობათა ნეუროზის დროს). სინონ: **დროშობა**, **პრონობა**.

**ვაგინიზმი** - вагинизм (ლათ. vagina - საშვი). საშვის ლორწოვანის მიმტაცებელი შეგრძობულობა შეხებაზე, საშვის შესაღლის და შინის კუნთების რეფლექსური სპაზმი. აინელებს ან ზოგჯერ შეუძლებელს ხდის სქესობრივ აქტს, გინეკოლოგიურ გამოკვლევას. ხშირად აღინიშნება ისტერიის დროს. სინონ: **ვაგინიზმი**, **ვულვიზმი**.

**ვაგენერ-იანერის ვაგინიტი** - Вагнер-Яанерга метит (Wagner-Jauregg J., 1917). პროგრესული დამბლს შეყრნალობა მალარიის აერით. სინონ: **ვალვარია**.

**ვაგენერ-იანერის სიმპტომი** - Вагнер-Яанерга синдром (Wagner-Jauregg J.). კატატონური ტემპორის მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთან შესაძლებელი ხდება კონტაქტის დამყარება თვალის კავებზე მსუბუქი ზეწოლით.

**ვაგინიტი** - вагинитი იხ. **ვავინიტი**.

**ვაგინიტი** - вагинитი (ანატ. vagina - ცლობი ნერი) **ვავატორი** - ნერული სისტემის მოქმედების დისოციაციის ერთ-ერთი სახე - პარანსიპათიური ნაწილის სიჭარბე სიმპათიკურთან შედარებით. ვლინდება ბრადიკარდიით, არტერიული წნევის დაქვეითებით, ჰიპოკლიემიით, ჰიპერპალდროზით და ა. შ. სინონ: **პარანსიპათიკიტი**.

**ვაიტბრეხტის ანტირეაქტიული დისტინი** - Ваитбрехта андрективные дистинии (Weitbrecht H.J., 1952). იხ. **დვარსაბ დისტინი**.

**ვაიტბრეხტის ფსიქოპათიკიტი** - Ваитбрехта психопатический (Weitbrecht H.J., 1967). კატათიზური წარმოშობის სენათი ფსიქოპათიკიტი ხშირად შექარის და საყვედურს შინაარსსაა. ძირითადად აღინიშნება შოკიანობითი ასაკის ფსიქოზების დროს, რომელიც მიმდინარეობს გამოხატული შოკით.

**ვაიტბრეხტის-ვილბერის სტაბი** - Ваитбрехтера-Вилберга стабиа (Weitbrechoffer A.M., Hilgard E.R., 1962). მოწოდებულა პანოზური მეტოპარკობის ხდრმის დონის განსაზღვრისთვის. მხეველობაში მიიღება ისეთი უაქტორები, როგორცა ადრე შთაგონებული აწეული ხელის გარკვეულ ღონემდე დამუება, შთაგონებული ქალკურნაყობი, შთაგონებული სიმრეების არსებობა, ასაკის რეგრესია, ანოსმია, ხელის უმოძრაობა, ნეგატიური პალეუსიანობის გამოწვევის შესაძლებლობა (სუგესტის გამო ავადმყოფი ვერ ხელავს რეალურ საგნებს), პოსტპანოზური ანეზია. სკალა ატებულა ფსიქომეტრიული ტესტების გამო, გამოყვევა გრძელდება დაახლოებით ერთი საათი. გამოყენებული იყო ინდივიდის ჰიპნაბელობას და სხვა პაროზულ თავისებურებებს შორის კავშირის გამოსაკვლევად (Hilgard E.R., 1965). სინონ: **სტაბი**.

**ვაიტბრეხტის სინდრომი** - Ваитбрехтера синдром метаморфозии (Weitzsäcker V.). იხ. **ვავარის ფორმის**.

**ვაიტბრეხტის ფორმის ვაგინიტი** - Ваитбрехтера форми вагинит (Weitzsäcker V., 1929). იხ. **ვავარის ფორმის**.  
**ვალდენსტრამის სინდრომი** - Вальденстрема синдром (Waldenström J., 1945). იარტოტოქსიკოზის ერთ-ერთი ფორმა, გამოირჩევა მწვავე მიმდინარეობით. დროული შეყრნალობის ჩაუტარებლობის შემთხვევაში შესაძლებელია ლეგალური გამოსაყვლა. აღინიშნება ფსიქოური მდგომარეობანი, პალეუსიანობი, უძილობა ან პირიტი, ძალიანობა.

**ვალტერ-ბიელის ვაგინიტი** - Вальтер-Биели вагинит (Walther-Bibel H., 1949.). იხ. **ვავარის**.

**ვალტერ-ბიელის სინდრომი** - Вальтер-Биели синдром преапонолезии (Walther-Bibel H., 1951). იხ. **ვავარის**.

**ვალტერ-ბიელის ტრიადი** - Вальтер-Биели триада (Walther-Bibel H., 1951). ორგანული ფსიქოსინდრომიანობის დაახსიანობული ნიშნები: შეხებების შეზღუბება, ვაგინის განუღება, აფექტების შეუკავებლობა.

**ვამპირიზმი** - вампиризм (ფრანგ. vampire; გერმ. Vampir - ურბული, მორეგება, მსხერაღის სისხლის შწოვლი). სექსუალური პერვერსიის (ხადიზმის) სახე, რომლის დროსაც სქესობრივი დაქმყოფილება მოაღწევა პარანორმის სისხლის წოვით ან ვეამის დაახსიანობით, ხშირად მისი ნაწილებად დანაწევრებით. სინონ: **ვამპირიზმი**, **ვამპირიზმი**, **ბერტრანდი**.



ასევე პირველი, რომელიც აქვთ წინაგანწყობა ამა თუ იმ დაავადების მიმართ. აქ მსმენელებს აცნობენ აუცილებელ სამედიცინო ზონირების სამეცნიერო-პოპულარულ ღონებზე, მიმდინარეობს ფსიქოთერაპიული მუშაობა.

**პლაზმის მემბრანული სისტემის სახეობათა ტიპობრივი** - Веществовое взаимодействие белки и их роль (Белачаძე Н.З. 1950) ფსიქოგენური და ფსიქოპათოლოგიური ღონისძიებთა კომპლექსი. მოიცავს წინასაშობარო მიზნების და შობარობის ფსიქოპათოლოგიურ წარმართებს. შეიცავს რაციონალური ფსიქოთერაპიის ხერხებს (განმარტება, დრწმუნება), მთავრებს ლიდელს მდგომარეობაში, რეაქტივის ხერხებს, სუნთქვით ვარჯიშებს.

**პლაზმის სინდრომი** - Беллет синдром расторможения (Weiss L., 1887). იხ. **სინდრომი** **პლაზმის** **სინდრომი** **1**.  
**პლაზმის სინდრომი** - беллет синдромი (ლათ. ventriculus - პარკული, ბერძ. ვენტრის - წარბ, გამოხატვა). თავის ტენიან კონტრაქციული რეტენციური ფუნქციონირების მეთოდით, იძლევა მოყვლობითი პროცესის გოპიის დადგენის და აღქმობის მიზნის დარღვევის ლოკალიზაციის საშუალებას. ამ მიზნით პარკულიდან სისხლში შეჰყავთ პარკის (პნეუმოციტული) უჯრედები, ნეგატორული ფუნქციონირების მიზნით, რომელიც აქვს რეტენციის გამოხატვის მიზნების უნარი (პლაზმის სინდრომი).

**პლაზმის სინდრომი** - Вегетусი (Vegetus O.). ღებრებული ავადმყოფის თავისებური მიზნები: ზედა ქუთითის კანის ნაკეცი და არამიზნობრივ წარბზე მიგა და შუა ზედა ნაწილის სახეობაზე იქმნება მეთით და რაკლის ნაცვლად ქნის კუბის, რაც ავადმყოფის სახეს აძლევს განსაკუთრებით მწუხარ გამოხატულებას.

**პლაზმის მემბრანული სისტემის სახეობათა ტიპობრივი** - Вегетусი (Vegetus O., 1904). კანის ელემენტური წინალობის დაქვეითება ან კანის ელემენტარული რეაქტივის ფსიქიკური ავზების მდგომარეობაში საოფლო ჯირკვლების სერვისის უკლებლივთან დაკავშირებით. იძლევა დაბინის ემოციური მდგომარეობის რეაქტივის რეგულირების საშუალებას. იხ. **პლაზმის მემბრანული**

**პლაზმის** - ვენიზი (ლათ. venis - სისხლქვეტი). ფსიქოლოგიაში გამოყენებული გერმანი, აღნიშნავს ნიშნულ მასალის ფორმას და აგრეთვე ამ მასალაზე ოპერირების პროცესებს, გამოხატულ სიკეთიერად არჩევნა და გაანარტვულ მახლად (არსებითი სახელები, მნიშვნე, ზედსართავი სახელები, რუსეთითი სახელების რიცხვი, გეგმების ნაწილები, დეკლარაცია და გ. გაუარტვულ მახლად (სამი სპონის რეგული, პარკული, რეაქტივის ნებისთან სხვადასხვა ხარისხით მიხალეული უპრო სიკეთი). გ. მახლად უპრობინებისა და გარტვული გასრული მახლად (ვერტიკული უპრობინი, ნახატები, უფროები, სახეები და ა.შ.) და არავარტვული უპრო მახლად (უნიველ გოპიკული უპრობინი, მუხლის დაქვეით). გამოყენებული მასალის მხლდითი არჩევნა: ვარტვული (სტრუქტურული) და არავარტვული (მაგ. ელემენტ) უნიველობის; ვარტვული (განსახატვული გ. ამოცნების გადარტვის საშუალებად) და არავარტვული (ხასიათდება ხატვანი, კონტრუქტული და სხვ. არავარტვული ამოცნების გადარტვის) ინტელექტუ; ვარტვული და არავარტვული ინტროპიის.

**პლაზმის სინდრომი** - ვენიზი (ლათ. venis - სისხლქვეტი, ვენი - ვენი). მათემატიკური თეორია. ვარტვული აქტიურობის ტენიან (იხ) მონათესავე. მათემატიკურ მახლად გამოიყენება ემოციურად დატვირთული და გარტვული მინარტის და სიკეთის ფორმები. ინტროპიკის დროს ხილბული მონათესავე ადსტრუქტის ემოციური დარტვებისაზე მთლიან განსაკუთრებულ მდგომარეობას, იძლევა მათი გამოხატულების ხასიათის და ხარისხის დაგნოსტიკის საშუალებას. მეთოდია არავარტვული ნევროზის და ნევროზისმიკური მთავრების მედარტვითი შესწავლის დროს.

**პლაზმის სინდრომი** - ვენიზი (ლათ. venis - სისხლქვეტი, ვენი - ვენი). მათემატიკური თეორია. ვარტვული აქტიურობის ტენიან (იხ) მონათესავე. მათემატიკურ მახლად გამოიყენება ემოციურად დატვირთული და გარტვული მინარტის და სიკეთის ფორმები. ინტროპიკის დროს ხილბული მონათესავე ადსტრუქტის ემოციური დარტვებისაზე მთლიან განსაკუთრებულ მდგომარეობას, იძლევა მათი გამოხატულების ხასიათის და ხარისხის დაგნოსტიკის საშუალებას. მეთოდია არავარტვული ნევროზის და ნევროზისმიკური მთავრების მედარტვითი შესწავლის დროს.

**პლაზმის სინდრომი** - ვენიზი (ლათ. venis - სისხლქვეტი, ვენი - ვენი). მათემატიკური თეორია. ვარტვული აქტიურობის ტენიან (იხ) მონათესავე. მათემატიკურ მახლად გამოიყენება ემოციურად დატვირთული და გარტვული მინარტის და სიკეთის ფორმები. ინტროპიკის დროს ხილბული მონათესავე ადსტრუქტის ემოციური დარტვებისაზე მთლიან განსაკუთრებულ მდგომარეობას, იძლევა მათი გამოხატულების ხასიათის და ხარისხის დაგნოსტიკის საშუალებას. მეთოდია არავარტვული ნევროზის და ნევროზისმიკური მთავრების მედარტვითი შესწავლის დროს.

**პლაზმის სინდრომი** - ვენიზი (ლათ. venis - სისხლქვეტი, ვენი - ვენი). მათემატიკური თეორია. ვარტვული აქტიურობის ტენიან (იხ) მონათესავე. მათემატიკურ მახლად გამოიყენება ემოციურად დატვირთული და გარტვული მინარტის და სიკეთის ფორმები. ინტროპიკის დროს ხილბული მონათესავე ადსტრუქტის ემოციური დარტვებისაზე მთლიან განსაკუთრებულ მდგომარეობას, იძლევა მათი გამოხატულების ხასიათის და ხარისხის დაგნოსტიკის საშუალებას. მეთოდია არავარტვული ნევროზის და ნევროზისმიკური მთავრების მედარტვითი შესწავლის დროს.

**პლაზმის სინდრომი** - ვენიზი (ლათ. venis - სისხლქვეტი, ვენი - ვენი). მათემატიკური თეორია. ვარტვული აქტიურობის ტენიან (იხ) მონათესავე. მათემატიკურ მახლად გამოიყენება ემოციურად დატვირთული და გარტვული მინარტის და სიკეთის ფორმები. ინტროპიკის დროს ხილბული მონათესავე ადსტრუქტის ემოციური დარტვებისაზე მთლიან განსაკუთრებულ მდგომარეობას, იძლევა მათი გამოხატულების ხასიათის და ხარისხის დაგნოსტიკის საშუალებას. მეთოდია არავარტვული ნევროზის და ნევროზისმიკური მთავრების მედარტვითი შესწავლის დროს.

**პლაზმის სინდრომი** - ვენიზი (ლათ. venis - სისხლქვეტი, ვენი - ვენი). მათემატიკური თეორია. ვარტვული აქტიურობის ტენიან (იხ) მონათესავე. მათემატიკურ მახლად გამოიყენება ემოციურად დატვირთული და გარტვული მინარტის და სიკეთის ფორმები. ინტროპიკის დროს ხილბული მონათესავე ადსტრუქტის ემოციური დარტვებისაზე მთლიან განსაკუთრებულ მდგომარეობას, იძლევა მათი გამოხატულების ხასიათის და ხარისხის დაგნოსტიკის საშუალებას. მეთოდია არავარტვული ნევროზის და ნევროზისმიკური მთავრების მედარტვითი შესწავლის დროს.

**პლაზმის სინდრომი** - ვენიზი (ლათ. venis - სისხლქვეტი, ვენი - ვენი). მათემატიკური თეორია. ვარტვული აქტიურობის ტენიან (იხ) მონათესავე. მათემატიკურ მახლად გამოიყენება ემოციურად დატვირთული და გარტვული მინარტის და სიკეთის ფორმები. ინტროპიკის დროს ხილბული მონათესავე ადსტრუქტის ემოციური დარტვებისაზე მთლიან განსაკუთრებულ მდგომარეობას, იძლევა მათი გამოხატულების ხასიათის და ხარისხის დაგნოსტიკის საშუალებას. მეთოდია არავარტვული ნევროზის და ნევროზისმიკური მთავრების მედარტვითი შესწავლის დროს.



**ვიტოტსკი-ლურისა და ვიტოტსკი-ლურის მეთოდის მიმოხილვა** - Витотского-Лурья методика психотрагм (Витотский Л.С., Лурья А.Р.) ექსპერიმენტულ-ფსიქოლოგიური მეთოდიკა განამუდლებითხული დამხსიერების შესასწავლად. გამოყენება ანროვნების და აუტენტურ-პროფილური სფეროს თავისებურებების დამხსიერების შესასწავლად. პიკოგრაფიკა-მანხანხი, განამუდლებითხული დამხსიერებისთვის. აქვს სერი მნიშვნელობა მემორების სადინოსტიკოდ.

**ვიტოტსკი-სახაროვის მეთოდი** ხმარობს ცნებების ფორმირების - Витотского-Сахарова методика формирования новых понятий (Витотский Л.С., Сахаров А.С., 1928-1930). ექსპერიმენტულ-ფსიქოლოგიური მეთოდიკა ანროვნების გამოსაკვებად, ამის მეთოდის ეარიანტი. გამოსაკვება პირს ქლასიფიკაციისთვის აძლევს გეოლოგიკურად უფერების ნარევის, რომლებიც განსხვავდება ფორმით, ფერით, მოთით და მათზე აღნიშნული ხელნერი ბგერააწყოხით. გამოსაკვება პირმა უნდა ამოარჩოს ერთი ქლასის ყველა ფერა. შედეგები ფასდება იმისა და მხედვით. თუ რამდენი სულ დახმარდა ავადმყოფს დავადების შესასრულებლად, რამდენად ლოგიკური იყო მისი მხედვობა, როგორ იღვდა შედეგების დამხარება.

**ვიტოტსკი-სახაროვის მეთოდი** - მეთოდიკა (ლათ. videt-ხედვებ, ვეუერებ). ვიდეომანჩერების გამოყენება ფსიქოტრაპიის მიხით. ავადმყოფს მიუძღებენ საკითარ ტყუას და როგორც უცხო, დამკვირვებლის თვალთ, ახანდინიზებენ ასეთი ტყუას შედეგების და თავისებურების გამოყენება ინდივიდუალური და კოლექტიური ფსიქოტრაპიის პროცესში.

**ვიდმარკის მემორიზაციის მეთოდი** - Видмарк методика (Vidmark E.M., 1932). გამოყენება სისხლსა და მარდში ალკოჰოლს შემყვებლობის რაოდენობრივი განსაზღვრისათვის და დამხარებელი ალკოჰოლსა და კალეუმის მიდროქრომის შორის ინტეგრალური რეაქტივი კალეუმის მიდროქრომის ნარჩენი რაოდენობის განსაზღვრება პიკოსულეფიით გიგრიზებით და კალეუმის იოდით. დასამუდება ქრომილები, რადგან კალეუმის მიდროქრომატი ავადმყოფს ავადმყოფს, ეთერს, ქლოროფორმს, პარალელურად.

**ვიზუალური - მეთოდი** იხ. პედაგოგია.

**ვიზუალური - მეთოდი** - визуальный (ლათ. visus-ხედვითობით). ფსიქოტრაპიაში ფსიქომის მიმდინარეობის კლასიკური მეთოდი ხანდაზღუდება, რომლისთვისაც მანამდე დამხსიერების იყო ანროვნების დარღვევები, ხოლო შემდგომში მხედვლობითი ქალეკონიუების დამატება ავადმყოფურ განყლებს განსაკითხებულ სახე შესმინა.

**ვიკის ბარბარუსი სინდრომი** - Вика барбаруса синдром (Wick H.H., 1956). იხ. ბარბარუსი სინდრომი.

**ვიკის რეაქტივი რეაქტივი** - Вика реактивный тест (Wick H.H., 1961). იხ. რეაქტივი რეაქტივი.

**ვიკის სისტემატიკა მემორიზაციის** - Вика систематика понятий (Wick H.H., 1961). იხ. მემორიზაციის სისტემატიკა.

**ვიკის რეაქტივი რეაქტივი** - Вика реактивный тест (Wick H.H., 1961). იხ. რეაქტივი რეაქტივი.

**ვიმერ-შტერნის სიმპტომი** - Вимер-Штерна симптом (Wimmer A., 1926; Stern R., 1927). აღინიშნება ქცევის დარღვევა და თან ერთვის სპსიქური სიმპტომატიკა და ნაძალადევი ყვირლის შეგუება: ავადმყოფები შემდგომად თვალდარბობ მდგომარეობაში. განიხილება როგორც სერიარული დამხარების ნიშანი. შედის ნაძალადევი აზრების და მოქმედების სინდრომის სერეტიკურად. სინონ: ტრენი მონოპროპილამინი.

**ვიმერ-შტერნის სიმპტომის სიმპტომი** - Вимер-Штерна-Симптом (Wick J.K., Cooper J.E., Sartorius N., 1974). 140 ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომის სიმპტომი აღინიშნება მემორიზაციის დარღვევაში, რეაქტივი მემორიზაციის სინდრომი და სინდრომი თითოეული სიმპტომი წარმოდგენილია სამი მკუყებით, რომელიც ასახავს მისი გამოხატულების სხეილსხვა ხარისხს. შედეგები და შედეგები კითხვების (MMPI) მხედვლად გამოიყოფილი, დამხარებელი თვითმეუბნებაზე. მოქმედება მიმოხილვის, პარანოისის, ცრუკლადური ფსიქომის მინიაკალური და დამხარებელი ფაზების, ნერვული დეპრესიის, პიროლოგიური განხითარების სადღეურნიყოლო.

**ვიმერ-შტერნის სიმპტომის სიმპტომი** - Вимер-Штерна-Симптом (Wickscheid, 1901). ცერებრული ათროსკლეროზის სიმპტომები, რომელიც აღინიშნება ინსულტისწინა პერიოდში: თავის გყოლო, თავისებურება და შესიერების შევითრი გაუარესება.

**ვიმერ-შტერნის სიმპტომი** - Вимер-Штерна-Симптом (ლათ. vir-მამაკაცი, ბერძნ. γυνή-ქალი). სქესის აღწების გაუკუდამართება, როცა მამაკაცი თავს გრძობს ქალად, თუმათ, ქალურების რაიმე ფიზიკური ნიშანი არ აღინიშნება.

**ვიმერ-შტერნის სიმპტომი** - Вимер-Штерна-Симптом (ლათ. vir-მამაკაცი). მამაკაციური ქალიშვილი.

**ვიმერ-შტერნის სიმპტომი** - Вимер-Штерна-Симптом (ლათ. vir-მამაკაცი, ბერძნ. γυνή-ქალი). სქესის აღწების დიდი ხნის (თვე, წელიწადი) განმავლობაში არ შეუძლიათ სქესობრივი ცხოვრების დაწყება. ხშირი მიზეზი ვადინოზი.

**ვიმერ-შტერნის სიმპტომი** - Вимер-Штерна-Симптом (ლათ. vir-მამაკაცი, მამაკაციისთვის დამახასიათებელი). ქალებში მამაკაციური ხაზების გამოჩენა. აღინიშნება ანდროგენური კორმონების მომატების შედეგად (კორმონული პრეპარატივით მკურნალობა), თირკმელზედა ჯირკვლის სიმპტომის დროს. სინონ: მამაკაციური სიმპტომი.

**ვიმერ-შტერნის სიმპტომი** - Вимер-Штерна-Симптом (ლათ. vir-მამაკაცი, ბერძნ. γυνή-ქალი). აღინიშნება მდგომარეობა განმარტებული პრენატალური პერადული ანდროგენების რაოდენობის მომატებით. ქალებში შეიძლება გამოვლენდეს კლადეობის ვადინოზი, მამაკაციის ნორმალური სასქესო ორგანოების თანაარსებობა ხაზობა და საშლადისნობა ერთად. დანარჩენი თვისებებით ისინი ნორმალურ ქალებს წარმოადგენენ. ასეთ დროს მნიშვნელოვანია მშობლების მიერ სქესის ინდიკატივობა და შესაბამისი აღზრდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ადგელი აქვს პერმთურილიდობის. სინონ: მამაკაციური სიმპტომი. აღინიშნება მამაკაციური სიმპტომი.

**ვიმერ-შტერნის სიმპტომი** - Вимер-Штерна-Симптом (ლათ. viscus-ფეხიანი). ქალებში მამაკაციისთვის: დამახასიათებელი სიმპტომი და ფსიქიკური თავისებურებების არსებობა (განხითი იტვიბი, ვიწრო მუხვი, უხეში ხმა, პარანოზიზმი, უხეში მოძრაობები, სპეციფიკური მამაკაციური ჩვევები, ჰიდროკლადები). სინონ: მამაკაციური სიმპტომი.

**ვიმერ-შტერნის სიმპტომი** - Вимер-Штерна-Симптом (ლათ. viscus-ფეხიანი). აღინიშნება მამაკაციური სიმპტომი.

**ვიმერ-შტერნის სიმპტომი** - Вимер-Штерна-Симптом (ლათ. viscus-ფეხიანი). აღინიშნება მამაკაციური სიმპტომი.

იხ. სიმპტომი.





**ვენიკინი** - ვანგ. რაი-დამკვირვებელი, მეთვალყურე. სექსუალური პერფორმის ხაზზე, სექსუალური ლტოლვის დაკმაყოფილების ნაბიჯების საშუალება, ვამიშვლებული სასქესო ორგანოების ან სქესობრივი აქტის თვალთვალსაღმ მიდრეკილება. სინონ: **ხმტრეხილმა, მხარხარა, ვენიკინი**.

**ველ-ნორმანის ხიზარები** - Вѣл-Норманн Остров (Wood N, Norman R.N., 1941). ამიგროზული ადოტივის თანდაყოლილი ფორმა. ელინება ბავშვის დაბადების პირველივე დღეებში და კვირაში. დამახასიათებელია პიდროცივება ან შეროცივება, კრუნჩხვები, კიდურთა დამბლები, სუნთქვის და ყდაკეის მოშლილობანი ნერვულ-უსტიკური განვითარება ხერხება. სიყოფის პირველივე თვეებში დეტალური გამოსავილი. შემკვიდრების ავტოსობურ-რეცესიული გამა.

**ველმინი** - ვ.ა.ა.ა. ი. **პაპინი**.

ფ

- ზაიმილიანისკაიას ვიზუალიზაცია კონტრასტული ფსიქოინაბილიტისა** - Займиланской методики контрастной психопластики (Займиланская Л.И., 1968). დაბეჭდვებია პათოლოგიური შეცვლილი აბსტრაქციულ პათოგენური როლის გათვალისწინებამე ფსიქოპათოლოგიური სტრუქტურების ფორმირებაში. გამოწვეული ასოციაციების ხასიათი სახეს იყენებს დაკავლების კლინიკური სურათის, დინამიკის და ავადმყოფის პათოლოგიური თავისებურებების მიხედვით. დადებითი ასოციაციების შეთოლვა გამოიყენება ნევროსთენის, ციკლოფრენიის, ციკლოთიმური დეპრესიის, ცერებრალთენიური სიმკვამთა კომპლექსის შეკრძალობის დროს. ალკოჰოლიზმის დროს გამოიყენება უარყოფითი ასოციაციების შეთოლვა, რაც ხელს უწყობს ავადმყოფის ხასიათობრივი თავისებურებების კორექტირებას და აწვევს ნეგატიურ ემოციურ რეაქციას ავადმყოფური მდგომარეობის გამოვლენებებზე.
- ზაიმილიანისკაიას სიმპტომი მარტინაჟისა ქიზანისა** - Займиланской системой психодинамической поддержки (Займиланская Л.И., 1977). იხ. **სამატარებო მარტინაჟის მხატვრობა**.
- ზაიმილიანისკაიას სიმპტომი ალკოჰოლიზმისა** - Займиланского симптома алкоголизма (Займиланская Л.И., 1956). შეკითხებზე, რომელი სიმტრეხი სასმელების გამოყენება უხდებოდა ავადმყოფს, აღინიშნება მხოლოდ გამოცდულდება, ღიმილი და ხშირად სიციყიერი პასუხის გაყვამდე, იგი გუზის დოკაჟს. ერთგვარი მიმდევრ-გემოვნებით რეფლექსი (იხ. **მრცხობის სიმპტომი**). ცხვლება ალკოჰოლიზმის დროს 50-60%-ში გამოხარხოებისა და ალკოჰოლური სასმელების სუროგატების გამოყენებისადმი გუნდუიასთან ერთად.
- ზახის ტესტი (სიწმინდობისა)** - Захарь тест животиных (Захарь В., 1960). პრაქტიკული მარტინული მეთოდია 5-12 წლის ასაკის ბავშვთა გამოსაკვლევად. შედგება კითხვების ნაკრებისაგან, რომელიც ადგენს, თუ რომელ ცხოველად სურს ბავშვს ვადაქვეს და რატომ. გამოიყენება ბავშვის პათოლოგიური ცვლენებისა და შესულობების, შიში ემოციურობის, რეაქტიულობის და პოზიციის გამოსაკვლევად.
- ზაიმილიანისკაიას პარამეტრი პარამეტრიზაციისა** - Займова параметрические параметрические реакции личности (Займова К., 1981). იხ. **კამატარებო მარტინული მხატვრობა ავადმყოფის მარტინული მხატვრობისა**.
- ზაიმილიანისკაიას მეთოდური პროცესი** (Займова К., 1979). იხ. **მეთოდური პროცესი მარტინული მხატვრობისა**.
- ზაიმილიანისკაიას მეთოდური პროცესი მარტინული მხატვრობისა** - Займова методика разрывности мышления (Займова К., 1961). იხ. **მარტინული მხატვრობა**.
- ზაიმილიანისკაიას სიმპტომი** - Займиланского синдром (Saitelberg F., 1952). იხ. **მარტინული მარტინული მხატვრობის მრცხობა**.
- ზაქის მეთოდი** - Захарь метод (Sabel M., 1935). იხ. **მარტინული მხატვრობის მრცხობა**.
- ზანბილიანის სიმტრეხი** - Занбуила синдром. იხ. **მარტინული მხატვრობა**.
- ზანდორფის ავადმყოფის იმპრესია** - Санддорфа амаротическая илюзия (Sandhoff K., 1968). იხ. **მარტინული მარტინული მხატვრობის მრცხობა**.
- ზანდორფის სიმტრეხის მრცხობა**.
- ზანდორფის იმპრესიის მრცხობა** - Зантеца илюкандрическая депрессия (Sattus H., 1955). იხ. **მარტინული მარტინული მხატვრობა**.
- ზანს-მარტინის რამპობა** - Зака-Гарри реакция (Sachs H., Georgy W.). სიმტრეხის სეროდაინგნოსტიკის რეაქცია. სისხლის შრატის დამატებული ციტოლოგიური ანტიგენი არ იყო კონცენტრირებული და რეაქცია მიმდინარეობდა ნელა, რაც საუბრებლად დავლი აღინიშნული რეაქციის მაქსიმალური რეაქციით შეუვლას.
- ზანს-მარტინის რამპობა** - Зака-Виттского реакция (Sachs H., Wittesky E., 1928). სიმტრეხის სეროდაინგნოსტიკის პრეციპიტაციის დამატებული რეაქცია. სინონ: **მარტინული მხატვრობის რამპობა**.
- ზანს-ლუვის ტესტი მარტინული მეთოდური პროცესისა** - Зака-Лувь тест некорректных предположений (Sachs J.M., Levy S., 1950). პრაქტიკული ფსიქოლოგიური მეთოდია გამოსაკვლევად აბილენი და მარტინული მხატვრობის, რომელიც მან უნდა დაამთავროს წინადადებები დაყოფილია 15 ჯგუფად, რომელთაგან თითოეული აბსტრაქციული გამოსაკვლევის დამატებული მანისაა, დღისაღმის, ოჯახისაღმის, ნაცონებისაღმის, თანამშრომლებისაღმის და ა.შ. წინადადებების მოგვრით უნდა აქვს დამოკიდებულება ავადმყოფის მიერ ვახვდელი შიშის, დინამიკის გრძობის

თ

**თაბრაცა შხიძობერო** - **табара хиджоба** (გერმ. Abwehr). **ფიქიანალიზში**: არაერთობერი უსიტიკრ: პროცესის ერთობლიობა, რომელიც მოწოდებულია დაიყოს "შე" რეალობისგან (როგორც წესი, ბავშვობაში) ან ლტოლუბან და (ან) "ზემე"-გან (მომრდილებში). თავდაცვისთვის შეიძლება გამოიყენებოდეს ნებისმიერი უსიტიკრ პროცესი ან მოღვაწეობის ფორმა (ბრომა, თამაში და ა.შ.), აგრეთვე სპეციალური **თაბრაცა შხიძობერო** (იხილეთ **თაბრაცა შხიძობერო** - **табара хиджоба** პარიზის სტალინის რეგლაციის საფუძველზე და დაკავშირებულია კონსულაციის გაყინვის რეაქციასთან.

**თაბრაცა შხიძობერო შხიძობერო** - **табара хиджоба** (გერმ. Abwehrmaßnahmen). **ფიქიანალიზში**: უსიტიკრ დაყვის საფუძველი ფორმები, გამოუმუშავებული "შე"-ს ძალებით. მათ მიეკუთვნება გამოდგენა, ხუბლიანობა, რევრუსა და სხვა იხილეთ **თაბრაცა შხიძობერო შხიძობერო** **თაბრაცა შხიძობერო**.

**თაბრაცა შხიძობერო შხიძობერო** - **табара хиджоба** (გერმ. Abwehrmaßnahmen). **ფიქიანალიზში**: უსიტიკრ დაყვის საფუძველი ფორმები, გამოუმუშავებული "შე"-ს ძალებით. მათ მიეკუთვნება გამოდგენა, ხუბლიანობა, რევრუსა და სხვა იხილეთ **თაბრაცა შხიძობერო შხიძობერო** **თაბრაცა შხიძობერო**.

**თაბრაცა შხიძობერო შხიძობერო** - **табара хиджоба** (გერმ. Abwehrmaßnahmen). **ფიქიანალიზში**: უსიტიკრ დაყვის საფუძველი ფორმები, გამოუმუშავებული "შე"-ს ძალებით. მათ მიეკუთვნება გამოდგენა, ხუბლიანობა, რევრუსა და სხვა იხილეთ **თაბრაცა შხიძობერო შხიძობერო** **თაბრაცა შხიძობერო**.

და ესება მხოლოდ ექსტრაკრანიალურ სტრუქტურებს. ბ) ენო- ან ევზოტენური ქიმიური ნივთიერებების ჩემოქმედება, რაც ამყარებს ცივილის წყურბლს. თავის ცივილი სხვალოდნურად შეიძლება დაიყოს რამდენიმე ჯგუფად: პულსირებელი ტყავალი - ცივილის შეგრძობის გაძლიერება და შემოიხრება პულსთან სინქრონულად. როგორც წესი, ცივილი აღმოყენდება არტერიული, ხშირად ექსტრაკრანიალური სისხლძარღვებიდან. ცივილის შედეგის დროს არტერიები გაფართოებულია და პულსური დარტყმის დროს დიზინტება ცივილისაში მგრძობისადრე დაბოლოებები არტერიის კედელზე, რაც იწვევს პულსირებად ცივილს. ცივილი ძლიერდება სისკოლის ვახშირ და სუსტდება დასკოლის ვახშირ. ცივილის ეს ტიპი გვხვდება კლასიკური და მარტოვე შაქვის პარტანის ხინჯრობის, ზოგიერთი ინტოქსიკაციის, ზოგიერთი ფორმის სახის ნევრალგიის დროს. ნევრალგიური ტყავალი - ცივილი აღმოყენდება უკუარად, წინამორბედი ნიშნების გარეშე, სწრაფად აღწევს მაქსიმუმს, გრძელდება რამდენიმე წამი და სწრაფად ქრება. ლოკალიზება სახის ან თავის ერთ მონაკვეთში. შედეგის შემდეგ აღინიშნება შავული (გრძელდება რამდენიმე წუთი ან დღე, რომლის დროსაც ცივილი არ არის. შემდგომ ცივილის შეგრძნება კვლავ აღმოყენდება. ასეთი ცივილი აღმოყენდება ნერვულ დეროში, განვლადში ან ნერვულ ფუნქცი. ცივილის ეს ტიპი დაძახასათებელია სამწვერა ნერვის ნევრალგიისთვის, ენა-ხახის ნერვის ნევრალგიისთვის, ჩარლზის ნევრალგიისთვის, სლუდერის ან პანტის ნევრალგიის ზოგიერთი სახისთვის, პორტონის სინდრომის ზოგიერთი შემთხვევისთვის. უმეტესე ტყავალი - ცივილის შეგრძნება მუდმივი ინტენსივის უმნიშვნელო ვარიაციებით. ჩვეულებრივ უფრო სუსტად ცივილის პულსირებად და ნევრალგიურ გამოთქმად შედარებით. ცივილი აღმოყენდება ცივილისაში მგრძობისადრე სტრუქტურების (ცივილის მკარა გარსი და მასი სინუსები, ცივილისაში მგრძობისადრე სისხლძარღვები) დაძახულობის დროს. ცივილი გრძელდება მანამ, სანამ სტრუქტურა განიყოს დაქიშულობის.

ცივილის ინტენსივობა შეიძლება შეიცვალოს თავის ან სხულის მდებარეობის შეცვლისას. ცივილის ეს ტიპი აღწერილია ცივის სიმუხვების, მენინგიტების, სუბარაქნოიდული სისხლძარღვების, პარანაზალური სინუსების დაავადებების, თავის ზოგიერთი დაავადების მოწამულის, პიპერტრული კრიზების და სხვ. დროს. უსაჭრელო ტყავალი - სმირად აქვს მუდმივი ხასიათი და მისი ინტენსივობა შეიძლება მნიშვნელოვანად შეიცვალოს ავადმყოფის აუტოტურ მდგომარეობისა და კავშირებით. ცივილი ხშირად ლოკალიზებულია თბების ან კუის არემი «მბრქანის», «საქარცხლის», «თავზე სიმძიმის», «სადვის» და ა.შ. სახით. ცივილი ხასიათდება როგორც «სისხე», «წვა», «ყინული» და ა.შ. ობიექტურად - ექსტრაკრანიალური სტრუქტურების და კნთების გონვის მომატება, რომელიც წარმოადგენს ცივილის მიზეზს ან შედეგს და ყოველივეს თან ახლავს მას. ნერვული სისკოლის დაავადებათა ნაყოფიერი ინტეგრების თავის ცივილის კლასიფიკაციის კომპიგების მიერ შემუშავებული და მოწოდებულია თავის ცივილის უმეტესე კლასიფიკაციასხსლმდარდგანია თავის ტყავალი შაქვის ტანასი (ბი. შანში), თავის ტყავალი აღმოყენებულია კუნიკოლი დაძახულობის შედეგად; თავის ტყავალი აღმოყენებულია კუნიკოლის შედეგად; სისხლძარღვოვანი თავის ტყავალი არაშაქვის ტანასი; თავის ტყავალი აღმოყენებულია დაძახულობის შედეგად; თავის ტყავალი აღმოყენებულია კანაალური სტრუქტურების ანთავის შედეგად; თავის ტყავალი აღმოყენებულია თავის და კუის სხვა სტრუქტურების პათოლოგიის დროს; თავის ტყავალი აღმოყენებულია კუის სტრუქტურების პათოლოგიის დროს; თავის ტყავალი აღმოყენებულია ცხენასა და პარანაზალური ხინჯების პათოლოგიის დროს; თავის ტყავალი აღმოყენებულია კილიების და ცხენას პათოლოგიის დროს; თავის ტყავალი აღმოყენებულია კანაალური ნევრალგიის დროს; თავის ტყავალი აღმოყენებულია კანაალური ნევრალგიის დროს.

მ. ტ. დაბსუღლიტის (tractio) უმეტესად - რ. ნ. ანთონიანოვი აღმოყენებდა ცივილისაში მგრძობისადრე ინტრაკრანიალური სტრუქტურების (ძირითადად მსხვილი სისხლძარღვების) დაძახულობის ან ქალსმობა წნევის კულაობის შედეგად ა) გვიანს, გარსების ან სისხლძარღვების პირველადი და მუცაგაბურნი სიმძიმეები; ბ) პემტომები (ეპიდურული, სუბდურული ან პარენქიმული); გ) ასსესები (ეპიდურული, სუბდურული ან პარენქიმული); დ) ლემბალური პუნქცია, რასაც თან ახლავს დიქტორის შეკეთი შემოყრება; ე) ფსევდოტუმორული პროცესები და გვიანს შემუშავება.

მ. ტ. მპრესტისი, კონვერსისი ან იპროქრისის უმეტესად - რ. ნ. ანთონიანოვი აღმოყენებდა ცივილის შეგრძნება თავში წარმოადგენს ფსიქიკური ფუნქციების პათოლოგიის გამოქმედებას. ჩვეულებრივ მუდმივად, იშვიათად არარეგულარული შედეგებით. მასი ინტენსივობა აღმოყენებულია აუტოტურ მდგომარეობისა და სერესული სივარციების არსებობაზე. ლოკალიზებულია მთელ თავში, უმეტესად კუის და მუცლის არემი და არასლოდ - სახის არემი. ავადმყოფები ცივილის შეგრძნებას აღწერენ შემდეგნაირად: «თავი არის ირ საგანს მორის, რომლებიც უკრენ თავზე», «თავში მარქის დარტყმის შეგრძნება», «თავი რადეით არის დატენილი. სინონ: მსტომბოჰამი თანამ ტიპიკალი, კონვერსიული თანამ ტიპიკალი, იპროქრისული თანამ ტიპიკალი, მპრესტისული თანამ ტიპიკალი.

მ. ტ. მამისი და კისრის სხვა სტრუქტურების პათოლოგიის - რ. ნ. პრი ნათოლოგი დრუჩი სტრუქტურ რადეა მ სხე. ცივილის არე განისაზღვრება მიმდინარე პათოლოგიური პროცესის ლოკალიზაციის მიხედვით, უმეტესად კისრის უკან ნაწილში და კუის მიდამოში. გვხვდება კუვა-კისრის ანალოგიების, სიმძიმეების, კისრის მალეში დავტრეაყული ან ანთიხიის პროცესების, კისრის სისხლძარღვების ანალოგიების ან ფუნქციური ცვლილებების დროს.

მ. ტ. მთვალის სტრუქტურების პათოლოგიის - რ. ნ. პრი ნათოლოგი სტრუქტურ რადეა მსხი გამომწვევი მიზეზებია: თვალშიცა წნევის მომატება; თვალშიცა ანთიხიის დაავადებები; რეფრაქტული ანომალიები და კნთების არიანაბარობა დაძახულობა; თვალის გარეთი ნაწილების ანთიხიის დაავადებები; გრძემება; თვალისა და თვალბუდის სისხვიებები.

მ. ტ. კამრისი და ცხენის პათოლოგიის - რ. ნ. პრი ნათოლოგი უიხი მ ხელოთა გვხვდება: კილიებისა და სხისის ცსოყილების ანთიხიის პროცესების; საფოტელ-ქედეაების სახრის დაავადებების; პირის, ყხების და სახის სისხვიებების და ამ სტრუქტურების გრავების დროს.

მ. ტ. პრენალური ნევრალგიის - რ. ნ. პრი კრახალაოვი იშვიათად აღმოყენებდა პირველადი ანუ ილიპათიური და მორეული ანუ სიმბოტური ნევრალგიის სახით. გვხვდება სამწვერა ნერვის ნევრალგიის (ნევრალგიური პრონოზალა); ენა-ხახის ნერვის ნევრალგიის; ფრთასასის კუნიკის ნევრალგიის (სლუდერის სინდრომი, lower half headache); ნაბოყლიარული ნერვის ნევრალგიის (ჩარლზის სინდრომი); დაშუბული კუნიკის ნევრალგიის

(ქანგის სინდრომი); ცლოზილი წერვის ნევრალგის; a. auriculotemporalis-ის ნევრალგის; კეფის ღლი წერვის ნევრალგის (სუბოქციპიტალური ნევრალგია) სახით.

**მ. ტ. ბრანდალური ნეპროპათიის** - რ. გ. при крапивных некрозах. აღნიშნულ შემთხვევებში თვ. განსირობებულა წერული ღრის, ბირთვის, ფეხის ან განგლის კომპრესიის, იშვიათად, ინტოქსიკაციური ცვლილებების ან მათში მძიმდინარე ანთებითი პროცესების ვაძრ.

**მ. ტ. ბრანდალური სტრუქტურების ანთიზის უპრინციპი** - რ. გ. воспалительные изменения структуры гоним. გაცივლის წარმოშობის მიხედვით კრანიალურ სტრუქტურებში წამდინარე ასეპტიური ან ინფექციური ანთებითი პროცესები: ა) ინტარკანიალურ პროცესები - ინფექციური, ქიმიური ან ალერგიული მენინგეტი, სუბარაქნოიდული სისხლჩაქვებები; პოსტანთიფექციური ანთებითი რეაქციები; არტერიტიები და ფლებეტიები. ბ) ექსტრაკრანიალური პროცესები - არტერიტიები და ცვლილებები.

**მ. ტ. ბანთონის დეპარტამენტის უპრინციპი** - რ. გ. воспалительная реакция мышц. გაცივლი ხასიათდება სხვადასხვა ინფიციოსის და ხანგრძლივობის დაქიშვობის; შემოჭერის, მჭვრის მგერძებით. რეულებზე ლოკალიზებულია კისრის შვდა ნაწილში და კეფში. მისი აღმოყენების პათოფიზიოლოგიური საუბუბელია კისრის და კეფის კუნთების სისხლჩაქვებობა და წარმოადგენს რეაქციის სახეს სტრუქტურული ცვლილებები არ ელინდება. სინონ.: muscle contracture syndrome. ნეპროპათიის მან ტანალი, მანტონის ტანის ტანალი, მანტონის ტანის ტანალი, სახეობრივი მანალი.

**მ. ტ. სისხლძარღვოვანი პრეპარატის ტიპის** - რ. გ. сосудистая реакция при аборте. აღმოყენდება ექსტრა- და ინტარკანიალური არტერიების გაფართოების შედეგად, მაგრამ არ არის დაკავშირებული მათ შორის დილაგაციასთან. აღმოყენების მიხედვით: ა) სისხლძარღვოვანი, წამდინარე სხეულის გემპერავრის ანთიზი; ბ) ქიმიკური მდგომარეობები; გ) ზოქმელა CO-ით; დ) ნეკროზების, ნეკროტიკის, სხვა ქიმიური ნეთიერებების გამოყენება, რომლებიც იწვევს სისხლძარღვთა დილაგაციას; ე) პოსტკონველსური მდგომარეობები; ვ) გამოზარბობების სინდრომი; ზ) რეაქტია უბო ცილებზე; თ) პათოლოგიური და პიპერკანია; ი) არტერიული წნევის მკეუთრი მომატება; კ) ესენციალური არტერიული პიპერკანია მოცუბითი შემთხვევა; ლ) ცერებრული სისხლძარღვოვანი უემბროსია; მ) სისხლს მოციერთი დაბადება; ნ) ნარკოზის ბენზოლის (კოფეინის) აღკვეთის სინდრომი (cafeine withdrawal); ი) კუნთრული ათეროსკლეროზის მოციერთი შემთხვევა.

**მ. ტ. შერის სტრუქტურების პათოლოგიის** - რ. გ. при патологической структуре уха. გაცივლი აღმოყენდება გარეთ, შვა ან შვდა კერის ანთიზში, გრძელდება ან სისიციური პროცესების დროს.

**მ. ტ. მანტონის და პრანდალური სტრუქტურების პათოლოგიის** - რ. გ. при патологической и крапивной некрозах. გაცივლი აღმოყენდება ცხვირის სტრუქტურების და პრანდალური სინუსების გრამული, სისიციური, ანთიზითი ან ალერგიული პროცესების დროს.

**მანუსუალი ასოციაციის** - союзная ассоциация ( ინგლ. Free Association ) ფსიქოანალიზში სუბიექტის ამბოყენების და ასოციაციების ვალმოყების მეთოდი, რომელიც გამოყენება როგორც ძირითადი პროცედურა ფსიქოანალიზის დროს. პაციენტი სისიციურ, საკუთარ ამბოყ მისივე თვისუბალი დინების საშუალება და თქვის ყველაფერი, რაც მას თავში მოეკა. ამბოყ თავის უბად ვადის ერთი საკითხიდან მეორეზე, მეორეზე რეალბისა და უანგამიას შორის, არასოლეს მთლიანად არ კარგავს მხედველობიდან რეალობას და ხანდახან მკეუთრად ახდენს მასზე ფოკუსირებას. თავისუბად ასოციების დროს წარმოქმნილი სინალებები (მაგ. ზლოკირება, თავის არილება, შიანის მოგება შესუბება) წმინდელიანა ფსიქოანალიზური ინტერპრეტაციისთვის.

**მანუსუალიზური** - мануальная. ადამიანის უნარი, განასოციელოს მოქმედება ისეთ მალემორგანიზებელ სიუუეაბში, რომელიც მხედველობის ახდენს მის ემოციურ სტრუქტურში. — თ ვლნდება ფსიქიკური პროცესების ცნობერი ინტისიციური ორგანიზაცია. ა. არს პირიქების ემოციურობის და სოყადური სმწიფის მარქენბელი.

**მანუსუალი მანტონის** - мануальная некроза. ფსიქოანალიზში მთლიან, იუენის ხადმის უნებრივ მოთბონილებებს თამშის დროს, რაც მისი პარმონული განხითარების წმინდელიანა შუბადგენელი ნაწილია (ჩვეუები, წარმოსახვა, თვითმომქმედება). გამოყენება როგორც დამოუკიდებელი მეთოდიც, ასევე სხვა ფსიქოთერაპიულ ღონისძიებათა თანამქმედება. თამშის მეთოდი ხართულია აგრეთვე პათფსიქოლოგიური ექსპერიმენტის სტრუქტურაში და მანუსუალურად უახლოებს მას ბუნებრივს (Мануальная А.Ф. 1918).

**მანუსუალი შვბა** - мануальная реакция. შვბა, გოქსიომონის ყველაზე ვაქცივებელი ფორმა. თ.წ.—ის დროს ორგანიზმში ხდება გოქსიური აღკალიდი ნეკროზი; ხანგრძლივი შრომად გამოყენება იწვევს გამოხატულ სომატურ პათოლოგიას (გულ-სისხლძარღვთა, სასუნთქი, საჭმლის მომხედველი გრატქის სისტემების შხრივ). დადგენილია თამბოქვის კანკროგენური გარდენა არსებობს ფსიქოლოგიური მიხვევა ნეკროზისადმი, მოციინებით ეტაბუბში - მისადმი ოლერანგობის დაქვიშობა.

**მანატრისი** - манат (ბერბ. Thasios-სიკელი). ფსიქოანალიზში გერმანი, რითაც ისახლერება სიკელიისადმი ღლოცვა. გერმანი «ფრისხ» საწინააღდეგო. ანთ ფსიქოანალიზი ცდილობს ხაზი გაუსვას ადამიანის ღლოლის დუალიზში.

**მანტონის მანტონის მანტონის მანტონის მანტონის** - мануальная реакция. ფსიქოანალიზში მთლიან, იუენის ხადმის უნებრივ მოთბონილებებს თამშის დროს, რაც მისი პარმონული განხითარების წმინდელიანა შუბადგენელი ნაწილია (ჩვეუები, წარმოსახვა, თვითმომქმედება). გამოყენება როგორც დამოუკიდებელი მეთოდიც, ასევე სხვა ფსიქოთერაპიულ ღონისძიებათა თანამქმედება. თამშის მეთოდი ხართულია აგრეთვე პათფსიქოლოგიური ექსპერიმენტის სტრუქტურაში და მანუსუალურად უახლოებს მას ბუნებრივს (Мануальная А.Ф. 1918).

**მანტონის მანტონის მანტონის მანტონის მანტონის** - мануальная реакция. ფსიქოანალიზში მთლიან, იუენის ხადმის უნებრივ მოთბონილებებს თამშის დროს, რაც მისი პარმონული განხითარების წმინდელიანა შუბადგენელი ნაწილია (ჩვეუები, წარმოსახვა, თვითმომქმედება). გამოყენება როგორც დამოუკიდებელი მეთოდიც, ასევე სხვა ფსიქოთერაპიულ ღონისძიებათა თანამქმედება. თამშის მეთოდი ხართულია აგრეთვე პათფსიქოლოგიური ექსპერიმენტის სტრუქტურაში და მანუსუალურად უახლოებს მას ბუნებრივს (Мануальная А.Ф. 1918).

**მანტონის მანტონის მანტონის მანტონის მანტონის** - мануальная реакция. ფსიქოანალიზში მთლიან, იუენის ხადმის უნებრივ მოთბონილებებს თამშის დროს, რაც მისი პარმონული განხითარების წმინდელიანა შუბადგენელი ნაწილია (ჩვეუები, წარმოსახვა, თვითმომქმედება). გამოყენება როგორც დამოუკიდებელი მეთოდიც, ასევე სხვა ფსიქოთერაპიულ ღონისძიებათა თანამქმედება. თამშის მეთოდი ხართულია აგრეთვე პათფსიქოლოგიური ექსპერიმენტის სტრუქტურაში და მანუსუალურად უახლოებს მას ბუნებრივს (Мануальная А.Ф. 1918).

**მანტონის მანტონის მანტონის მანტონის მანტონის** - мануальная реакция. ფსიქოანალიზში მთლიან, იუენის ხადმის უნებრივ მოთბონილებებს თამშის დროს, რაც მისი პარმონული განხითარების წმინდელიანა შუბადგენელი ნაწილია (ჩვეუები, წარმოსახვა, თვითმომქმედება). გამოყენება როგორც დამოუკიდებელი მეთოდიც, ასევე სხვა ფსიქოთერაპიულ ღონისძიებათა თანამქმედება. თამშის მეთოდი ხართულია აგრეთვე პათფსიქოლოგიური ექსპერიმენტის სტრუქტურაში და მანუსუალურად უახლოებს მას ბუნებრივს (Мануальная А.Ф. 1918).



**თავისუფლება** - გამოცხადება სუბიექტის მიერ საკუთარი მოქმედებების მართვა, რაც მიმართულია საკუთარი პიროვნების შეკლამებულ განცხადებულ დამსახურებულ მიზნებს შესახებ.

**თავისუფლება** - გამოცხადება საკუთარი თავისადმი ისეთი ქცევის და დანაშაულის მიწერა, რომელიც მას არ ჩაუღრია. მოგვიან იგი ატარებს მიზანმიმართულ ხასიათს და ხდება დასუსთ თავიდან აცილების მიზნით უფრო მძიმე დანაშაულის ვაშლად.

**თავისუფლება** - გამოცხადება (გერმ. Identifizierung). ფსიქოანალიზში: ფსიქოლოგიური პროცესი, რომლის დროსაც სუბიექტი მოითხოვს ობიექტს თვისებებს და ატარებს და მთლიანად ან ნაწილობრივად იღებს ამ ობიექტის სახეს. არსებობს პარკეტადა, პრაქტიკული და ატრეზიონი თვითგაფიქრება.

**თავისუფლება** - გამოცხადება პრობლემურ სიტუაციებში საკუთარი მოქმედების გამოვლენის და დაშვებების ცნობიერი აქტი.

**თავისუფლება** - გამოცხადება საკუთარი ფიზიოლოგიური და ფსიქოლოგიური კომპონენტების მდგომარეობის შეგრძობა.

**თავისუფლება** - გამოცხადება საკუთარი თავისადმი სხეულგანი დაზიანების შედეგად განხრახ ან გაურთხილებლობით, შემთხვევით. განხრახ ა. გვხვდება ფსიქიკურ დაავადებების, განსაკუთრებით დეპრესიით მიზნირებულ, ან სხვადასხვა წრის ფსიქოპათიების დროს.

**თავისუფლება** - გამოცხადება საკუთარ ფსიქიკურ ცხოვრებაზე დაკვირვება, რაც იმდენად მისი გამოვლენების (განქცობა, აზრები, გრძობები და ა.შ.) ფორმების საშუალებას.

**თავისუფლება** - გამოცხადება შესწავლა გაღმავებული თვითშეფასებისადმი, ამა თუ იმ ეთიკურებაში საკუთარი განსაკუთრებული როლის წარმოჩენისადმი გუნდურად. აღნიშნება პარანოიული და ისტერიული წრის ფსიქოპათიურ პროცესებში, აგრეთვე შეგლობანური ბოღეთი სინდრომის ფარგლებში.

**თავისუფლება** - გამოცხადება ავადმყოფის მიერ საკუთარი ფსიქიკური და მორალური თვისებების დაქვეითებული შეფასება, საკუთარი არარაობის, უნიშვნელობის ხანგახანა. აღნიშნება თვითდაპირვების ბოღის სტუქტურაში, განსაკუთრებით ხშირად - დეპრესიულ მდგომარეობების დროს.

**თავისუფლება** - გამოცხადება (გერმ. Kontrolle). სუბიექტის მიერ საკუთარი მოქმედებების რაციონალური რეგულაცია. შეფასება ხდება პიროვნულად მნიშვნელოვანი მოცილების და დაყენების საუბრეზე მიზნების, საშუალებების და მოქმედების შედეგებს შორის ანალიზის და კონკრეტული შეფერვა.

**თავისუფლება** - გამოცხადება საკუთარი ხელოვნების განხრახ ხელოვნება. აღნიშნება ძირითადად დეპრესიით მიზნირებულ ფსიქიკურ დაავადებების დროს, აგრეთვე ფსიქიკურად განმარტებულში (იხ. პარანოიკური პროცესები და სხვა). მოგვიან შემთხვევაში ა. სრულდება ეროდირულად ორი, მეტელებრივ, ახლობელი პირების მიერ (ა. თანხა). მოგვიან თ-ს წინ უსწრებს ახლობელი პირების შეკვლეობა, ავადმყოფის აზრით, იმ მიზნით, რათა მათ თავიდან აცილდნ მომავალ განჯვად (იხ. გაფართოვება). თვითშეფასებაშია რიცხვი შეკვლის ვახანგულზე, მახულზე; რასკი მაღალია 40-45 წლის, განსაკუთრებით ხანმისხულ; აგრეთვე მობარ და ახადგარდა ასაკში. მამაკაცები ხშირად, ედრე ქალები, ხოლო სუიციდური ცდები ს უბრთი. მამაკაცები მოხარავენ თვითშეფასების უფრო "სიძიმად" ხერხებს. სუიციდის დრე მაღალია აღმოსავლეთი ევროპის, სკანდინავიის, იაპონიის მოსახლეობაში, ხოლო უფრო მაღალია იმეარტებში. რისკის სხვა ფაქტორები: სუიციდური ცდა ან სუიციდური ქცევა ახლო წარსულში; სუიციდის მაღლის მდარებობა სამიში საშუალებების გამოყენება (მაგ., საწმადე, იარაღი); თვითშეფასების ისეთი შეთღობის გამოყენება, როცა ვადარტების ფექტური დაზიანების აღმოჩენის ალბათობა მინიმალურია; საგულდგულე შეუმავებელი გუნა; სიციდლის სურვილი; არსებული ფსიქიკური დაავადებები (დეპრესიული მდგომარეობა; ბიპოლარული აშლილობა; ფსიქოზური მდგომარეობა; აშლილობები, ეპილეფია); დაკავშირებული, ფსიქიკური ნეოთიერების გამოყენებისთანა; პიროვნების ანგისოიკალური დარღვევა; ცილომიზური დარღვევა; სუიციდური ცდები, მეტელებრივ, დეპრესიის და დემენციის საწყის სტადიაზე, შეიძლება თან ახლდნ პანიკური აშლილობა; იმეარტული სენითი პალეფიციები; უმეღობის გუნა; სუიციდური აზრები); გრონიკული ან უკრებელი სომეგური დაავადებების არსებობა, რომელთაც თან ახლავს ძლიერი ტივილება, გაროგება; ახლო წარსულის ცხოვრებისეული სტრესული მოვლენები (მაგ., მეტელებრივ გარდაცვალება); სოციალური პირობები (ქალაქის პირობები ცხოვრება, გადასახლება ჩვეული ადგილიდან, დაქვებობა); ოჯახური მდგომარეობა (განტორწინება, დაქვრება, მარტობა); პროფესიული სტაგუსი (უშევრობა, სამუშაოს დაკარგვა ახლო წარსულში, მაღალი პროფესიული დონე); ოჯახური ანაშენი (სუიციდები ოჯახში, შობილების ადრეული დაკარგვა, აფექტური აშლილობები ნათესავებში, ოჯახში მოწესრიგებული დამოკიდებულება). სინონ.: სუიციდი.

**თავისუფლება** - გამოცხადება (ლათ. resurrexerunt - წესრიგში მოყვანა). ცოცხალი სისცემების მიზანშეწონილი ფუნქციონირება სხვადასხვა სარტულის და ორგანიზაციის დონეებზე. ა. წარმოადგენს აქტიულის რეგულირების ერთ-ერთ დონეს, მათ შორის სუბიექტის რეგულაციის დონეს.

**თავისუფლება** - გამოცხადება სუბიექტის მიერ საკუთარი პიროვნული თვისებების და სხვადასხვა შეფასება. დამოკიდებულია აფექტის მდგომარეობაზე, ბოღეთი განქცობა და სხვ. ვაიციდის მიზნული ან იყოს ანაშენური მონაცემების ანალიზის დროს. ა. წარმოადგენს ექსპერიმენტულ-ფსიქოლოგიური გამოკვლევის ერთ-ერთ მეთოდს.

**თავისუფლება** - გამოცხადება ცნობიერების ერთ-ერთი მხარე - ადამიანის მიერ საკუთარი თავის, რეგორი პროცესების შესწობა მისთვის დამახასიათებელი ინტერესების, მიზნებით, მოცილებით, მოვლმხედვლობით. თ-ის დარღვევა ფსიქიკურიაში ლეკულობის დახსოვსი დაგნოსტიკურ მნიშვნელობას.

**თავისუფლების აქტიურობის დარღვევა** - расстройство активности самосознания. იხ. "შე" - აქტიურობის დარღვევა.

**თავისუფლების იდენტურობის დარღვევა** - расстройство идентичности самосознания. იხ. "შე" - იდენტურობის დარღვევა.

**თავისუფლების თვლანობის დარღვევა** - расстройство целостности самосознания. იხ. "შე" - თვლანობის დარღვევა.

**თავისუფლების გამოყენება** - გამოყენება ფსიქოანალიზში მეთოდი, მთავრების უმარტვა საკუთარი ფსიქიკური მოქმედების გარკვეულ მარტებზე, საკუთარი ნერვული სხეულის და მიზანმიმართული ფუნქციის მოგვიან თავისებურებაზე. იხ. მშენ გვირგი ფსიქოანალიზში.

**თიმიზმბერი ჩანატრევიზი** - *impressions digitate* (ანგ. impressions digitate). ჩანრბეებები ქელასარქელის მიგნითა მელაპირზე, რომელიც მოგვაცონებს თითებით ზეწოლის ეკალს. თავის გეინის ზოგიერთი დაუაელბის დროს (ძირითადად სიმოინებები) თ. წ. შუგად ღრბელება, რაც ჩანს რენგენგრაფიაში. პილროუტუაღლის დროს თ. წ. გაინლევა.

**თიმბერბაზია** - *timberland* (ბერბ. ხაუთა-გრბობა, გუნება-განწყობა, ხვასია-მეშაობა, მოქმელება) (Meyer A., 1908). ერგაშული რეაქციების სახე, შეესაბამება აუტეტურ დარღვეებს. იხ. *პარბის სრბაზოლბობა*.

**თიმბრანაუსტიზმი** - *timbrantizm* (ბერბ. leptikos-აღქმა, ხუთოს-გრბობა), იხ. *ანტიპარბიზმი*.

**თიმბრანაუსტიზმი** - *timbrantizm* (ბერბ. leptikos-აღქმა), იხ. *ანტიპარბიზმი*.

**თიმბრანაუსტიზმი** - *timbrantizm* (ბერბ. leptikos-აღქმა), იხ. *ანტიპარბიზმი*.

**თიმბრანაუსტიზმი** - *timbrantizm* (ბერბ. leptikos-აღქმა), იხ. *ანტიპარბიზმი*.

**თიმბრანაუსტიზმი** - *timbrantizm* (ბერბ. leptikos-აღქმა), იხ. *ანტიპარბიზმი*.

**თიმბრანაუსტიზმი** - *timbrantizm* (ბერბ. leptikos-აღქმა), იხ. *ანტიპარბიზმი*.

**თიმბრანაუსტიზმი** - *timbrantizm* (ბერბ. leptikos-აღქმა), იხ. *ანტიპარბიზმი*.

**თიმბრანაუსტიზმი** - *timbrantizm* (ბერბ. leptikos-აღქმა), იხ. *ანტიპარბიზმი*.

**თიმბრანაუსტიზმი** - *timbrantizm* (ბერბ. leptikos-აღქმა), იხ. *ანტიპარბიზმი*.

**თიმბრანაუსტიზმი** - *timbrantizm* (ბერბ. leptikos-აღქმა), იხ. *ანტიპარბიზმი*.

**თიმბრანაუსტიზმი** - *timbrantizm* (ბერბ. leptikos-აღქმა), იხ. *ანტიპარბიზმი*.

**თიმბრანაუსტიზმი** - *timbrantizm* (ბერბ. leptikos-აღქმა), იხ. *ანტიპარბიზმი*.

**თიმბრანაუსტიზმი** - *timbrantizm* (ბერბ. leptikos-აღქმა), იხ. *ანტიპარბიზმი*.

**თიმბრანაუსტიზმი** - *timbrantizm* (ბერბ. leptikos-აღქმა), იხ. *ანტიპარბიზმი*.

**თიმბრანაუსტიზმი** - *timbrantizm* (ბერბ. leptikos-აღქმა), იხ. *ანტიპარბიზმი*.

**თიმბრანაუსტიზმი** - *timbrantizm* (ბერბ. leptikos-აღქმა), იხ. *ანტიპარბიზმი*.

**თიმბრანაუსტიზმი** - *timbrantizm* (ბერბ. leptikos-აღქმა), იხ. *ანტიპარბიზმი*.

**თიმბრანაუსტიზმი** - *timbrantizm* (ბერბ. leptikos-აღქმა), იხ. *ანტიპარბიზმი*.

**თიმბრანაუსტიზმი** - *timbrantizm* (ბერბ. leptikos-აღქმა), იხ. *ანტიპარბიზმი*.





**მამკო-პროტოტოპოლოგის დამკვეთი** - Яков А. Креutzfeldt Г.Г., 1920). პრეტენდორი დემონსტრაციის იმეათი ფორმა. დაავადება იწყება მოწითალოების ასაკში მესხერების დაქვეითებით, გვირგვინით და სისუსტით ქვედა კიდურებში. ვითარდება კუთხოვანი რიგილობა, სიარულის დარღვევა, დიზართრია, ყდაპის მოძრაობა, პირამიდული ნიშნები, ეპილეფიურიზმი გულყრები, ცნობიერების აშლის მდგომარეობანი დელირიული ტიპით, მხარდ ღებუნება, კონვალსუტაციებისადმი გენდენციები, სმენითი პალეინაციები. არტევერ (Schilder P., Malamud N., 1963) დაავადების მიმდინარეობის ორ ტიპს: I ფრონტო-ცენტრო-ტემპორალური ტიპი ქერქის და პერიფერიული მოტორიონების ატროფიით დაავადების შედარებით ხანგრძლივი მიმდინარეობით. II გენერალიზებული ატროფია, პერიფერიული მოტორიონების დაზიანების გარეშე. მიმდინარეობა ქვეშეწევა. გერმინალურ სტადიაში - შუგომში, აქინებია, დეკრეტორაციული დარღვევები და ზოგადი - კომა. გუხუდება ძალიან იშვიათად არსებობს შიითიება დაავადების შემედიტობითი ხასიათის შესახებ. დეწერილია ერთი ოჯახის სამ თობაში. პათოლოგანატომიურად - ატროფიის კერები შემსფეროების ქერქში, ნათხებში, გენის დეროს ხირთებში, შერტის გენში, გლიის პროლიფერაცია.

**მანტარამის დინამიკური დინამიკა** - Янарица динамическое опустошение (Janzarik W., 1959). იხ. რეპროდუქციული პროცესები.

**მანტარამის დინამიკური პროცესები** - Янарица динамические процессы (Janzen R., 1961). იხ. რეპროდუქციული პროცესები.

**მანტარამის დინამიკური პროცესები** - Янарица динамические процессы (Janz D., 1955). იხ. რეპროდუქციული პროცესები.

**მანტარამის დინამიკური პროცესები** - Янарица динамические процессы (Janz D., 1955). იხ. რეპროდუქციული პროცესები.

**მანტარამის დინამიკური პროცესები** - Янарица динамические процессы (Janz D., 1955). იხ. რეპროდუქციული პროცესები.

**მანტარამის დინამიკური პროცესები** - Янарица динамические процессы (Janz D., 1955). იხ. რეპროდუქციული პროცესები.

**მანტარამის დინამიკური პროცესები** - Янарица динамические процессы (Janz D., 1955). იხ. რეპროდუქციული პროცესები.

**მანტარამის დინამიკური პროცესები** - Янарица динамические процессы (Janz D., 1955). იხ. რეპროდუქციული პროცესები.

**მანტარამის დინამიკური პროცესები** - Янарица динамические процессы (Janz D., 1955). იხ. რეპროდუქციული პროცესები.

**მანტარამის დინამიკური პროცესები** - Янарица динамические процессы (Janz D., 1955). იხ. რეპროდუქციული პროცესები.

**მანტარამის დინამიკური პროცესები** - Янарица динамические процессы (Janz D., 1955). იხ. რეპროდუქციული პროცესები.

**მანტარამის დინამიკური პროცესები** - Янарица динамические процессы (Janz D., 1955). იხ. რეპროდუქციული პროცესები.

**მანტარამის დინამიკური პროცესები** - Янарица динамические процессы (Janz D., 1955). იხ. რეპროდუქციული პროცესები.

**მანტარამის დინამიკური პროცესები** - Янарица динамические процессы (Janz D., 1955). იხ. რეპროდუქციული პროცესები.

**მანტარამის დინამიკური პროცესები** - Янарица динамические процессы (Janz D., 1955). იხ. რეპროდუქციული პროცესები.

**მანტარამის დინამიკური პროცესები** - Янарица динамические процессы (Janz D., 1955). იხ. რეპროდუქციული პროცესები.

ავადმყოფობის სიმძიმისა და ცული პროგნოზის შესახებ, ავადმყოფობის საშეღებო დოკუმენტაციის გაყენების შესახებ, სამეცნიერო-პოპულარული ლექცია, სხვა ავადმყოფებში ანალოგიური დაავადებების ცული გამოსავლის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და ა.შ.). იატრიკული დავადებები თითქმის ეფერდოლად იყო აღწერილი განჯლის, ზლოფაის, კრემკის (H. W. Grubbe, E. Bleuler, E. Kretschmer) მიერ. მისი კათოლიკური მათეოდა დახასიათებელი ხუმკეს (O. Bumke) მიერ, რომელიც აღნიშნავს, რომ ხშირად ექიმი ვერ კი ამჩნევს დაავადების ფსიქოგენულ საკუთარი როლის მომენტებს. ოთხის ყველაზე მეტად დამახასიათებელი დებრესული და იპოკრიტიკული მდგომარეობები (იხ. **მამრებრიბა მატრიტურბი**).

**პატრიკაპია** - патрисуа. იხ. **მატრიტურბია**.

**პატრიტრიტია** - патрисуатия (Шиховскаиа Н, 1963). მედიკოსების კათოლიკური შემოქმედების ერთ-ერთი ვარიანტი. ავადმყოფის ჯანმრთელობისაზე მიაჩნს მიყენება ხდება გეოგრაფიკულად არასწორი დანიშნული, დავასებებლად ჩაბატრებული ინსტრუმენტულ-ლაბორატორიული გამოკვლევებით, არასაბრკო ან არასაბრკო ოპერაციული ჩარევით. ხშირად ერთადდა იატრიტრიტია (იხ. **მატრიტრიტია**). სინონ: **მატრიტრიტია**.

**პატრია** - ПАТРИА (ლათ. patria - მშობლები). მობრახობითი ანტიკური არაკოორდინირებული მობრახობების ფორმი, ხშირად საწოლის ფარგლებში. აღნიშნება ცნობიერების ამეცხვებით და მიმდე დელირიული სინდრომის დროს. აგრეთვე გვეხება ბავშვთა ასაკში და აღნიშნება აკუთავებულ შემთხვევებით - თავის და სხეულის რითმული რხევა და მკვეთრი მოძრაობა. თავის ა. ხასიათდება თავის სწრაფი რითმული მოძრაობებით (ღახრა, ბრუნვა) და აღნიშნება მცირეწლოვან ბავშვებში ნეოროზების დროს, ხშირად დამბების წან.

**პაბი** (საშეღებო სიმბოლო) - паби (გრემ Es). ფსიქოანალიზში ფორმის მიხედვით, ფსიქიკის პიკოთეორი თეორიის საზიდან ერთ-ერთი ინსტანცია. "ფე" - არის პიროვნებაში ლგოლავათი პილესი; მისი მინარხი დავამოხრებული დგოლესის ფსიქური გამოვლენისთან, არაცნობიერი. არის თანაყოლილი და მემკვიდრეობითი, გამოდევნილი და შევლელი. ეკონომიკის თანაქმარისით, წარმოადგენს ფსიქიკური ნეურჯის პირველად რემედიურას. დინამიკის თანაქმარისით, კონფლიქტშია „ფე“-სა და „ფე“-სთან. გენეტიკურად, ეს უკანასკნელი წარმოიშობა მისგან.

**პაკეპია** ინტოპირენცია - инкогнисиа иди. იხ. **პატრია** პატრიტრიტია

**პაკეპია ზიგოტიპი** - ПАКЕПА ИДИ (ლათ. ბერძ. ψυχή ideum). აბრეგებლათი შემთხვევების მკვეთრი ატიკურად მისი დოვიკური წყობის, თანმიმდევრობის დარღვევით. ასახება შეგვევლებში. მეტყველების პირველადი ავარების ასოციაციითა ჯაჭვის ხასიათს, აღმოცენდება არაანნიმალურულად და არაპყარად ყურადღების გაფანტულობის ფორმე. თვით ასოციაციები შერეულია დეერადობის, მოსაღერეობის მიხედვით. აბრეგებების მიბანნიმალურულება არაპყარად. აღნიშნება მედიკოსის მანიაკალური ფაზის, მოსოურების მანიპოირებული მდგომარეობის დროს.

**პაკეპი შრი** - ИДЕАИДИ (ბერძ. idea - იდეა, სახე. ობიექტის ყოველგვარების განსაკუთრებული ხერხი, მისი ატიკური ასახვა ფსიქიკური საშეღებო და სუბიექტის ცხოველქმელებში).

**პაკეპი პატრიტრიტია** პატრ - ИДЕАТОРИИ ПАТ (ბერძ. idea - ცნება, წარმოადგენს, патер - მობრახობაში მოყენება). კენტთა გონების უნებლად ცვლილება, რომელიც მონაწილეობს რაიმე მობრახობაში ამ მობრახობის შესახებ აბრეგირივი წარმოადგენის დროს.

**პაკეპია** - ИДЕАИДИ იხ. **პატრიტრიტია**.

**პაკეპირენცია** - ИДЕОФРЕНИА (Каншинскаиа В. X, 1890). კანდინსკი მიერ გამოყოფილი ნობოლოგიური ერთეული. იყოთა შემდეგ ფორმებად: მარტივი, კატატორიული, ბერადული, შეგვევ ქრონიკულად პალესტრიატური, დუნედ მონდნარე იდეოფრენიის აღწერთ კანდინსკიმ განქერიტა კრუქლანს (E. Kraepelin) და ბლოფლანს (E. Bleuler) შემგებმა ნაბრებები. მის მიერ განსაკუთრებით სრულად იყო აღწერილი დაავადების ბოდივით და პალესტრიატური ვარიანტება.

**პაკეპია პაკეპირენცია** - ИДИ ПАКЕПИИ. აკუთავებულ მდგომარეობითა ერთ-ერთი სახე დამახასიათებელია უნებლიე, აღამიანის ნებისგან და სურვილებისგან დამოკიდებული წარმოშობა, აბრეგებების შემადგენლებთან კავშირის არარსებობა. ავადმყოფის მიერ ისინი აღიქმება როგორც უცხო, მაგრამ მათი თაიდან აკიდება შეუძლებელია. ი.ა. იქვეუს აბრეგებების ლოკური მიმდინარეობის დარღვევით. მათი ავადმყოფური ხასიათი განსობიერებულა ავადმყოფის მიერ, მთლანე არსებობს კრიკული დამოკიდებულება. მინარხის, აღმოცენების პირობების, ავადმყოფის პიროვნების მხედვით, შეიძლება მეგანკლებად მოიყვანს ავადმყოფის ცნობიერება, აისახოს ქვეყნება, მაგრამ არახლებს არ იქვეუა ძირითად შეხედვლებად, წარმოადგენს დავამყოფილებლობის, მინაგანი შემოქმედობის მუდამ წყაროს. ი.ა-ს მიკუთვნება აკუთავებული ექვიანობა, აკუთავებული ბრძნობა, კონგრასგული აკუთავებული აბრეგები.

**პაკეპია პატრიტრიტია** - ИДИ ПАКЕПИИ იხ. **პატრიტრიტია**.

**პაკეპია ბრიტოტი** - ИДИ БРИТОТИ. ავადმყოფური იდეები, რომელიც დამახასიათებლად ასახავს რეალურ სინამდილეს. მთლიანად მოიყვანს ავადმყოფის ცნობიერებას და არ ექვემდებარება კორექციას. იხ. **პაკეპია**.

**პაკეპია ბრიტოტიპარტი** - ИДИ БРИТОТИПАТИ. იხ. **პაკეპია** პაკეპირენცია

**პაკეპია დეინფრენცია** - ИДИ ДЕИНФРЕНЦИА. იხ. **პაკეპია** პაკეპირენცია

**პაკეპია შემოღებულტი** - ИДИ ШЕМОГНУТИ (Wernicke C., 1892). შეხედლობა ან შეხედლობათა ჯგუფი, გამოირჩევა აუქტრობით და ავარებს მყარ, ფსიქურულ ხასიათს. შეიძლება აღნიშნოს ფსიქიკურად ჯანმრთელებშიც (სამეცნიერო იდეებისაღმი ერთგულება) - დეინფრენცია იდეები (Александр Д. А., 1942; Гурьян М. О., 1949), რომელთა ზ.ა. აღმი მიკუთვნება სიდავითა. ი.ა. პათოლოგიურად, წარმოადგენს ფსიქიკის დისპარმონის გამოვლენების და დავამოხრებულია პარადოკური აბრეგებებათა. თუქმა დომინირებულ იდეის შევლელია განვიდობარება და ჰემიპარტი ზ.ა.ად გარდქმნა. ეს უკანასკნელი ავადმყოფის მიერ არ აღიქმება როგორც მდარი. განვითარებასთან ერთად სულ უფრო ნაკლებად ექვემდებარება კორექციას. ი.ა. იყავებს ერთგვარ შეადღურ მდგომარეობას აკუთავებულსა და ბოდივით შორის.

**პაკეპია პატრიტრიტია** - ИДИ ПАТРИТИИ. იდეები, რომლებიც ცამომდინარეობს აუქტურად შეუიერილი წარმოადგენების კომპლექსიდან, არ არის განსაზღვრული დოვიკური აბრეგებებით.

**ორბრძანება** - *ორბრძანება* (ლათ. *idionoma* - გათვალისწინებული). უსაქონლოდ უნდა იქნას ერთ-ერთი მეტიანი. მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ბავშვის სწავლება განვითარების პროცესში, როდესაც ხდება მისთვის ემოციური თავდაპირველი მნიშვნელოვანი აღმანიშნის პრობლემა თავისებურების შეთვისება. დასაწყისში აღნიშნული ხასიათის შექცევითი ხასიათის ათვისება, შემდგომში - პრაქტიკული გამოცდილების მიხედვით. პირველ რიგში, ხდება შრომის პრობლემა თავისებურების შეთვისება, მოგვიანებით თანაგოლების, აღმშრლებლების. ა. აღნიშნული ახლები წევრები წევრების მიწვევებით სიამოვნების განცდის სანაშაურებს, რამდენადაც ობიექტი ახლებს საკუთარი თავის გათვალისწინებით (გეხვრების გულშემატკვარა ფრომინგი). ფრომის (E. Fromm) მიხედვით, აის შექცევითი საკუთარი თავის გულშემატკვარა, რაც თითქმის ახლებს ახლებს მარტორების განცდის თავიდან აცილების სანაშაურებს.

**ორბრძანება** - *ორბრძანება* (ბერძ. *idios* - საკუთარი, *glossa* - ენა) (Perry K.G.). 1. ხასიათიერი და სასისხიერი ზღვრები წარმოიქმნება შეუძლებლობა შეცვალვებით აპარატის ორგანიზაციის და ფუნქციური დაზიანების არარსებობის დროს. 2. შეტყველებს დაზღვევით, რომლის დროსაც მოცივითი შეტყველებით სიფხვარე იცვლება განსაკუთრებული, ამის მოკლებული ზღვრებით (აღინიშნება მუცელში და ოლიგოფრენიის დროს).

**ორბრძანება** - *ორბრძანება* (ბერძ. *leitai* - მსახურება). თვითგაღებულება, საკუთარი თავის თავყვანისუცხა.  
**ორბრძანება** - *ორბრძანება*. იმ მოვლენათა აღნიშნვა ცნება, რომელიც აღმოცენდება თავისთავად, რაიმე მიზეზის გარეშე, აქვს უნებო წარმოშობა.

**ორბრძანება** - *ორბრძანება* (ლათ. *idiotia* - ძილი, *ambulare* - სიარული, სიერობა). სიმტკანური სიმპტომების, აღმოცენდება პირობითების გარეშე აღინიშნება ეპილეპსიის, ნევროზების დროს.

**ორბრძანება** - *ორბრძანება* (ბერძ. *idiosia* - უზერება). ოლიგოფრენიის, გონებრივი ზომიერების ყველაზე მძიმე ფორმა. პრაქტიკულად სრულიად არ არის შეტყველებს, ფსიქიკური რეაქციები, არ ხდება ელემენტარული ჩვეულების გამოშვება. ავადმყოფები წარმოიქმნებიან ცალკეულ ზღვრებს, სიარული იწყება ძალიან გვიან და გვიანვე უხეშდებიან სისიამის. მორბინობის მოუქმელი, არა კოორდინირებულია. ხშირია მოძრაობითი სტეროლიგი პიეტი. ავადმყოფები არ შეუძლებს საკუთარი თავის მომსახურება, საჭიროებენ მუდმივ მეთვალყურეობას და მოვლას.

**ორბრძანება** - *ორბრძანება*. *ორბრძანება* - *ორბრძანება*. თვალში. გეგმურად განპირობებული დაავადებები (გადაცემის ავადმყოფი - რეცედიული გეგმური), დაკავშირებული განვითარების ექვსი მომდართან. ყველა ფორმისათვის დაზიანებისათვის: შეტყველების დაქვეითების სრულ ანაბრებში, კიდურთა დაზიანება, პროგრესირებადი ჰუპასუსობა, გამოსავალი სგადამი - მარამი. ყველა ფორმის პისკოპათოლოგიური სურათი მსგავსაა - განვითარებული უკრძალვის გენერალიზებული და მუცლი, ნევროზების მომის მომსახურება, მათი გავრცელება, ნერვული უკრძალვის და მისი მორბინების ტენდენციები გახვრება, გლისი, დეცენდენცია, უკრძალვის ხარისხის შემცირება.

**0. ა. ბავშვთა არბრძანება** - *0. ა. ბავშვთა არბრძანება* (Thy W., Sachs B., 1881). შეტყველებს აღრული დაქვეითება შეტყველების ნერვების ატროფიის შედეგად, რაც იწყებს სრულ სინიშნებს. ასობა ორიენტირების და თავდაცვითი რეაქციები. მაგალითს რეაქცია სწებით განვითარებული აღინიშნება უმორბინება. ვითარდება ჰუპასუსობა იდიოტის ხარისხში. სიკვდილი - კანკისის და დეცენდენცია რეაქციის მოვლენების დროს. დაავადება იწყება სიუცხლეს პირველი წლის მეორე ნახევარში. მიმდინარეობის ხანგრძლივობა 2 წელს აღემატება. სინონ: **რბრძანება ტან-ხასისობა**.

**0. ა. ბავშვთა არბრძანება** - *0. ა. ბავშვთა არბრძანება* (Sandhoff K., 1968). გამოირჩევა ავთვისებიანი მიმდინარეობით; საწყისი გამოვლინება სიუცხლეს პირველ ექვს თვეში. დაზიანებისათვის თანაგოების სხვა, შერეულია. თვალის ფსტრები - მკულის ცენტრში აღუბლის ფორმითელი დაქვე მონაქრისტიკო-თვითი არმითი (წაღულები უკრძალვის სიმპტომი).

**0. ა. ბავშვთა არბრძანება** - *0. ა. ბავშვთა არბრძანება* (Bielschowsky M., 1914; Janaky J., 1910). პირველი გამოვლინება 3-4 წლის ასაკში. მხარზე დეცენცია. დაზიანებისათვის კრუნჩხვითი გულყრები, ავადმყოფი, ექსტრამორბიდული დარღვევები, შეტყველების ნერვების ატროფია. ფსიქიკური დეგრადაცია მიმდინარეობს უფრო ნელა, ვიდრე ტვინის დაავადების დროს. დაავადების მიმდინარეობა შესაძლებელია დროებითი შესწორებით. დეცენცია გამოსავალი სიუცხლეს პირველი ათწლეულის ბოლოს.

**0. ა. ბავშვთა არბრძანება** - *0. ა. ბავშვთა არბრძანება* (Seitelberger F., 1952). ელინდება სიუცხლეს 1-3 წლებს შორის, უწყვეტად პროგრესირებს, სიკვდილი - 10 წლის ასაკში.

**0. ა. ბავშვთა არბრძანება** - *0. ა. ბავშვთა არბრძანება* (Norman R.N., Wood N., 1941). გამოვლინდება დაზიანებისთანვე პროგრესული პირობითი კანკისით, კანკისით, კიდურთა დაზიანებით, ნერვულ-ფსიქიკური განვითარების შეტყველებით. დეცენცია გამოსავალი - სიუცხლეს პირველ თვეებში.

**0. ა. ბავშვთა არბრძანება** - *0. ა. ბავშვთა არბრძანება* (Batten F.E., 1903; Spielmeier W., 1908; Vogt H., 1905). პირველი დროებითი 6-10 წლის ასაკში. ნელა პროგრესირებადი მიმდინარეობა. პიგმენტური რეცედიული შეტყველების თანდათანობითი გავრცელება და მხარზე დეცენცია. პრაქტიკითა ეპილეფსიოგორმული სინდრომი. მაგალითს სხესტე, აპათია, ხდება შეტყველების გაღარბება. ქვეითდება ნებისებრება და ინტელექტი. გამოსავალი მდგომარეობაში - გამოხატული ორგანიზაციის დეცენცია. სიუცხლეს ხანგრძლივობა 20-30 წელი. გავლენის გვიან - ავადმყოფი - რეცედიული. (Zeman, Dyken, 1962). სინონ: **რბრძანება-მტკანობა რბრძანება**, **რბრძანება-მტკანობა-რბრძანება**, **რბრძანება-რბრძანება**, **რბრძანება-რბრძანება**.

**0. ა. ბავშვთა არბრძანება** - *0. ა. ბავშვთა არბრძანება* (Kahn H.H., 1925). ელინდება მოწვეულ ასაკში. მიმდინარეობა დეცენცია. პიგმენტური რეცედიული შეტყველების ნერვების ატროფიით, ორგანიზაციის ფსიქოსინდრომი, პროგრესირებადი დეცენცია. გამოსავალი - დაზიანებით, ეპილეფსიოგორმული გულყრები, ეფორია, აპათია, თვითმომსახურების ჩვეულების დაქვეითება. მოცივრ - ხილავა და კატაგორიული სიმტკანობა.

**0. ა. ბავშვთა არბრძანება** - *0. ა. ბავშვთა არბრძანება* (van Bogaert L., Rousseau P., 1937). ანაბრებული გამოვლინების მოცივრებით (პრესენილური) ფორმა; სიმტკანობით მოცივრების უკუის დაავადება. იწყება 35-41 წლის ასაკში, მოცივრ უფრო აღრუ. აღნიშნება უწყვეტი პროგრესირებადი მიმდინარეობა, სიკვდილი - 37-62 წლის ასაკში. სინონ: **რბრძანება-რბრძანება**, **რბრძანება-რბრძანება**.

**0. ა. ბავშვთა არბრძანება** - *0. ა. ბავშვთა არბრძანება* (ლათ. *idiotia* - გათვალისწინებული). რომელიც გამოიყვება მკერდუკანა ჯირკვლის თანდაყოლილი დისფუნქციით.

**ილირიტა მიტაქსიმიტი** - ИЛИРИТ МИКСЕЛИТОИДА. იდოტა, რომელიც გამოწვეულია უარისებრი ჯირკვლის თანდაყოლილი დისუნქციით (მიქსელმა).

**ილირიტა მიტაქსიმიტი** - ИЛИРИТ МИКСЕЛИТОИДА იდოტა თავის გინის თანდაყოლილი წყალმანკის დროს, მიდინარეობს გინის ნეიტრების ატროფიის.

**იანსენის ცრებაში შერამბიზმი** - ИЕНСЕНА ДИОКСИДЕ СУЩЕСТВЯ (Jensen G., 1868). იხ. **ცრებაში შერამბიზმი**.

**იარა-დოდსონის კანონები** - Иеркс-Додсона законы (Jerck R., Dodson G., 1908). შესრულებული მოქმედების ხარისხი (პროლეტული) დამოკიდებულია მოტივაციის ინტენსიუბაზე (ლონგე). პირველი კანონი ამტკიცებს, რომ მოტივაციის ინტენსიუბის მრავალხან ვრცელ მოქმედების ხარისხი იცვლება: მაგვლობს, შემდგომში, წარმატებული მოქმედების ყველაზე მაღალი მაჩვენებლის მიწვევის შემდეგ, თანდათან მცირდება. მოტივაციის ღონის, რომლის დროსაც მოქმედება სრულდება მაქსიმალურად წარმატებით, ყოველმა მოტივაციის თავიშემ. მეორე კანონის თანახმად, რაც უფრო რთულია სუბიექტისთვის შესასრულებელი მოქმედება, მოტივაციის მით უფრო დაბალი დონეა მისთვის თანაბალური.

**იანსენის მეთოდისა შესაბამისი პარამეტრებისა** - Иансена методика анализа эксперимента (Иванова А. Я., 1965-1969-1976). ექსპერიმენტულ-ფსიქოლოგიური მეთოდიცა ბავშვთა გონებრივი განვითარების შეფასებისათვის. საფუძვლად უდევს ვიგოტსკის იდეა ბავშვთა ინტელექტუალური ღონის შესწავლისას განვითარების უახლოესი მიზნის გათვალისწინების შესახებ. განისაზღვრება შესწავლის უნარის დარღვევის ხარისხი და სახე. გამოკვლევისას დამხარების დონის შესახებ ხდება ვაქუიტილ-ი-კანონის რაოდენობით. გამოიყენება გეომეტრიული ფიგურების კლასიფიკაციის ხერხები, კოიბის კუბები, მეთოდსა იძლევა ბავშვთა გონებრივი განვითარების ანომალიის სხვადასხვა ფორმების დიფერენცირების საშუალებას.

**იანსენის კლასიფიკაციისა შერამბიზმისა ბოლოში ფორმებისა** - Иансена классификация форм шизофренического бреда (Иванов В., 1981). აცხადებს პათოკენზურ პრინციპზე არჩევენ შემდეგ ფორმებს: I პერიოდული ბოლოცა, დამახასიათებელია ფლექტირებადი მიმდინარეობა, აუქვიური აბილიტები (მუთუის, შიშის გრძობა), სენესკოპათიები, ბოლოთი აზრების მრავალფეროვანი და ელვადი შინაარსი, პოლიტიმეტრობა. II ფსიქოტიკო ბოლოცა, ატარებს ინტელექტუალ-ინტერპრეტაციულ ხასიათს, უთარდება ნელ და პოლიტიმეტრობა, აქვს სისტემატიკისა და სტახილიტიკისაში ტენდენცია. პერიოდული ბოლოს სინდრომები - მწვავე პარანოიდი, დეპრესიულ-პარანოიდი, მანიაკალურ-პარანოიდი, მწვავე პარანოიდი, პალეოსინიურ-პარანოიდი, კატაგონიურ-პარანოიდი, ონიროიდი, მწვავე ფსიქოკურ ავტომატიზმის სინდრომი. უწყვეტი ბოლოს სინდრომები - პარანოიკალური, პარანოიდი, პალეოსინიურ-პარანოიდი, ფსიქოკურ ავტომატიზმის სინდრომი. შიშოვრენული ბოლოს ფორმები ძირითადად განსხვავდება დანაწილებით, და ნაკლებად - საბოლოო შედეგით. განსხვავდება აგრეთვე განვითარების ტემპით, მოძრაობა სწრაფ ბოლოცა.

**იანსენის მეთოდი მაქსიმალური ფსიქოპარანოიისა** - Иансена метод активности психопатии (Иванов Н. В., 1963). მოტივირული ფსიქოლოგიკუბი სწავლება დაავადების განსაზღვრულ სიმპტომებზე შემოქმედების მიზნით.

**იანსენის მეთოდი კლასიფიკაციისა შერამბიზმისა** - Иансена метод классификации шизофренических форм (Иванов Н. В., 1958). ფსიქოტიკოპოლი მეთოდი ნეგრომებით დაავადებულთა სამედიკალურ. შეიცავს სამ ეტაპს: პირველ ეტაპზე ხდება ავადმყოფის ინდივიდუალური, მისი ცხოვრების პირობების, დაავადებისაში დამოკიდებულების გამოკვლევა. მინია - დაავადებისაში არასწორი დამოკიდებულების დამლევა. მეორე ეტაპზე იმ არაკეთილსამიქლო გაყენების და მატრემირებული მომზადების გამოკვლევა, რაც სწრულდება როდეს ნეგრომის პათოკენზიში. ხდება ავადმყოფის ემოციური განაწყოება, მყარდება ახალი ინსტიტუტი სერუოკოპება. დამახათებულ მესამე ეტაპზე პროპაგანდა უწევს საავადმყოფო და საწარმოო სამუშაოში აქტიური მონაწილეობის. ავადმყოფი სწავლებულ მოტივრით ნეგრომულ სიმპტომზე შემოქმედების ხერხებს. კოლექტიური ფსიქოტიკაპია ვრწყმის ჯგუფის თითოეულ ავადმყოფთან ინდივიდუალურ მუშაობას.

**იანსენის სტრუქტურული-სინდრომული პარანოიისა** - Иансена структурно-синдромальная психопатия (Иванов В., 1963). ანოტიკალური ექსპერიმენტის ეარიანტი, მიზანია - მეტყველების (აზროვნებით მოქმედების) გრამატიკული და ლოკური სტრუქტურებისა გამოკვლევა. სიყვიერი გამომიანებლის სახით გამოიყენება დამთავრებული წინადადებები, რომლებიც გამოირჩევა სინტაქსური სტრუქტურით და მეტყველების ცალკეული ნაწილის უქონლობით. იძლევა წყვილი, დარღვეული აზროვნების, რემინორობის და მეტყველების დაწყებულ რღვევის ლაგენტურ გამოყენებულთა საშუალებას.

**იანსენ-შეპერისის სიმპტომები** - Иансена-Шепера симптоми (Иванов-Шепера И. Г., 1934). კატაგონიურ სეკუპირი მყოფ ავადმყოფს შეუძლია მკერ კითხვის უპასუხის წერილობით.

**იარასკის ტრანტი სისტიკის სიმპტომები** - Иараса трагический синдром (Ирзакс Ж., 1968). ესტე საზღვრავს ბავშვის შავიფოტის სეკლამი სწავლისათვის. შეიცავს სამ დაავადებას: აღმზანის ფიგურის დახატვა, ასობის ვადიქრა და წერტილების ჯგუფების გადახატვა. უარდება ხუთქლავანი სისტიკებით. ესტე იძლევა საშუალებას, გამოკვლევდი იქნას ნაიკო მოტივრაცა, მუქელოობით ანალიზაციონის და მარჯვენა ხელის მოძრაობის ერთობლივი უნტიკონიონება, ნიშების მიხატვის უნარი. მახატების უარდება აგრეთვე კონტრივი განვითარება. ეამოყენება 6 წლის ასაკის ბავშვთა გამოკვლევად. დავადების მიხევეთ, მოდოციკოპია ანალიტიური კენზის (Kern A., 1963) გენეისა.

**ილუსტრაცია (ირმულისა)** - Илюстрация (ирмулы). იხ. **სამბრას სინდრომი**.

**ილუსტრაცია** - Илюстрация (ბერძნ. Illusio - შეყვობა). რეალურად არსებულ საგნებს და მოვლენებს დამახინჯებული აღქმა. განმრთულ პირებს აღქმებებთ ფსიქოლოგიური და ფიზიკური, რაც პათოკენზურად არ არის და კემირებული აირონების ვა ცნობილობის აბილიტობათან. ფიზიკური ილუსიის მაგალითი: წყლიან შუქში მიღებული კოპი აღიქმება როგორც ვადატებილი; ფიზიოლოგიური ილუსია: ორი თანხადარი სავრძის წრფიდან, რომლებიც ბოლოებში მომდარგულია მიწით და ვარით მიმართული ისრით, პირველი აღიქმება უფრო მოკლედ.

**ილუსტრაციისა** - ი. აბილიტობა. აღმოცენდება ავტოცენტიკის ეველინტი - შაშის, მუთუის, დეპრესიის დროს.

**ი. ბავშვიობისა** - ი. უსალონი (უზნაქე). 1930). ფსიქოლოგიური ილუსიისა. მისის, მოყულის, შიშის აღქმის ილუსიის ერთ-ერთი სახე. აღმოყენდება წყვილი საგნების მრავალჯერად შედარების დროს; ამ დროს წინასწარი ცდების სერაში იქმნება წინაგანწყობა ილუსიების აღმოყენებისათვის, რომელაც ელინდება ცდების ძირითად





**06სტანცია** - ИСТАНЦИЯ (კრძ. Instanz) ფსიქოანალიზში: ფროიდული გრაიკით და დინამიკით, ფსიქიკური ასარაგის ქვეტერტერა. მაგ. ცენტრის ინტანცია (პირველი გრაიკი), "ზემე"-ს ინტანცია (მეორე გრაიკი).  
**06სტანცია** - ИСТАНТ (ლათ. instans - სურველი). ქვეყნის და ფსიქიკის თანდაყოლილი ფორმები, ხასიათდება

სახეობრივი ერთიანობით. მივლინებს მხედველობა, რომელიც უპირველესად, რომელიც უპირველესად სხვაობის მისთვის სასიყვარულო მნიშვნელობის ფიზიოლოგიური ფუნქციების განხორციელებას, რაც აკლავს დინამიკის სახეობის გადატანის და შთაბეჭდილობის გაგრძელებისათვის. გადამიანებს, ინსტანტური რეაქციების გამწვევს წარმოადგენს მარტივი ფსიქიკური და ქიმიური ნივთები, რომელიც მნიშვნელოვანია ცხოველის, მეცნიარის რეაგირებისათვის და არაკეთილად ბუნების ობიექტებისათვის - მათი ფორმა, ფერს, სუნს, გემოს, შეფერილობას და ა.შ. (კრძ. Instanz) ფსიქოანალიზში 1) განსაზღვრული სახეობის ცხოველისთვის დამახასიათებელი მემკვიდრეობით მიღებული ქვეყნის სქემა, თითქმის არ იყვლება ანდიდიადიდან ინდივიდუალურ თანდათან იხსნება დროში, შეარსა და თითქმის უმორჩილება განსაზღვრულ მიზანს. 2) გერმანია, რომელიც გამოხატავს ლტოლვას (Triebe).

**06სულცო** - ИУЛЦО (ლათ. insulae palmarum - პანკრეასის კუნძულები). ცლოტან-პეტიდური პანკრეონი, პროდუქტობა პანკრეონის ლანგუანის კუნძულების ბეტა-ჯირელებით. არტეკლდების გლუკოზის დონეს ორგანიზმში (გლუკოზის უკლებლიყო გლიკოგენის წარმოქმნა, გლიკოგენის დამოკლება). ი-ის პანკრეატის გამოყოფნა მაქსიმალური დიამეტრის და ზოგიერთი სხვა დაავადების სამკურნალოდ, რომელიც მიმდინარეობს ნახშირწყლოვანი ცულის დარღვევით. ესეიტორიაში გამოიყენება ინსულინიკომპლექსი თერაპიისათვის.

**06სულცოპროტონი** - ИУЛЦОПРОТОН - ИСУЛЦОПРОТОНА (Sakel M. 1935). მიმოგრენის აქტიური თერაპიის ერთ-ერთი ძირითადი მეთოდი. მანამდე, 1912 წ. ეს მეთოდი მოწოდებული იყო მორფინის სამკურნალოდ უკანასკნელ წლებში, ნეიროლეგისი პარკინსონის ფართო გავრცელების მიზეზად. მაქსიმალური დოზის შემთხვევაში თანდათანობით შეიზღუდა პანკრეატის მუშაობა. მკურნალობა იწყება ნახშირწყლოვანი ცულის გამოკვლევის შემდეგ (შეერთი დაფიქრება) პარენტალურად ინსულინი შეყვანით (2-4 ერთობა კომპლექსი დოზაზე, ღამის თანდათანობითი მატებით). კუთრება თავდაპირველად ხდება პერორალურად შერჩეული სიროფის მიყვით, შემდეგ - გლუკოზის ინტრავენური შეყვანით. მკურნალობის კურსი შეადგენს 15-20 (40-მდე) კომპლექსი მდგომარეობის, შედეგის შესაბამისად უკანასკნელ წლებში გამოიყენება ფორსირება. მაქსიმალური დოზა - 1 ს. მეთოდი, რომლის დროსაც ინსულინი შეესაუბრება წვეთოვნად, სიტყვით 1,5 ერთობ (Архив Г.Я. Хельга А.А., და თანავე, 1984).

**06სულცო** - ИСУЛЦО პანკრეონის პროტონი და აქტიური სიმბოლო, ვითარდება პანკრეასის ლანგუანის კუნძულების ბეტა-ჯირელებისაგან, ინსულინის სახე. დამახასიათებელია ინსულინის პანკრეოლუქსია, რაც აღნიშნავს ელანდება პერიოდული პანკრეოციტური მდგომარეობების აღმოცენებით და ცნობიერების კომპლექსი დარღვევით.

**06სულცო** - ИСУЛ (ლათ. insulae - შედეგი). თავის ტვინში ხსნდება მამოქვეყნებს მწვეტი მოხლა ცნის დამინების შეარ სიმპტომების განვითარებით, რომლის ხასიათი დამოკიდებულია ი-ის ლოკალიზაციაზე. პათოგენეტიკური თავისებურებების და კლინიკური სურათის მიხედვით, არჩევენ: 1) მემორიატულს (ამბლიუქსიურს), 2) მემორიატულს და ეპილეპსიას.

**06სულცოქმინა** - ИСУЛЦОКМИНА - ИСУЛЦОКМИНА (ლათ. insulae cyminae). აღინიშნება პანკრეონული დაავადებით და ცერბრული ათროსკლეროზით დაავადებულში; ხასიათდება შხარი თავის კავილით, თავისებურებით, გულისრევიით, ელბინებით. ატროფიული წნევა ან დროს ან შეერთადაა მომატებული ან ეცემა. მაქსიმალური დოზის დროს სისხლის მიმოქცევის მწვეტი მოხლა.

**06სულცოქმინა** - ИСУЛЦОКМИНА - ИСУЛЦОКМИНА (ლათ. insulae cyminae). აღინიშნება პანკრეონული დაავადებით და ცერბრული ათროსკლეროზით დაავადებულში; ხასიათდება შხარი თავის კავილით, თავისებურებით, გულისრევიით, ელბინებით. ატროფიული წნევა ან დროს ან შეერთადაა მომატებული ან ეცემა. მაქსიმალური დოზის დროს სისხლის მიმოქცევის მწვეტი მოხლა.

**06სულცოქმინა** - ИСУЛЦОКМИНА - ИСУЛЦОКМИНА (ლათ. insulae cyminae). აღინიშნება პანკრეონული დაავადებით და ცერბრული ათროსკლეროზით დაავადებულში; ხასიათდება შხარი თავის კავილით, თავისებურებით, გულისრევიით, ელბინებით. ატროფიული წნევა ან დროს ან შეერთადაა მომატებული ან ეცემა. მაქსიმალური დოზის დროს სისხლის მიმოქცევის მწვეტი მოხლა.

**06სულცოქმინა** - ИСУЛЦОКМИНА - ИСУЛЦОКМИНА (ლათ. insulae cyminae). აღინიშნება პანკრეონული დაავადებით და ცერბრული ათროსკლეროზით დაავადებულში; ხასიათდება შხარი თავის კავილით, თავისებურებით, გულისრევიით, ელბინებით. ატროფიული წნევა ან დროს ან შეერთადაა მომატებული ან ეცემა. მაქსიმალური დოზის დროს სისხლის მიმოქცევის მწვეტი მოხლა.

**06სულცოქმინა** - ИСУЛЦОКМИНА - ИСУЛЦОКМИНА (ლათ. insulae cyminae). აღინიშნება პანკრეონული დაავადებით და ცერბრული ათროსკლეროზით დაავადებულში; ხასიათდება შხარი თავის კავილით, თავისებურებით, გულისრევიით, ელბინებით. ატროფიული წნევა ან დროს ან შეერთადაა მომატებული ან ეცემა. მაქსიმალური დოზის დროს სისხლის მიმოქცევის მწვეტი მოხლა.

**06სულცოქმინა** - ИСУЛЦОКМИНА - ИСУЛЦОКМИНА (ლათ. insulae cyminae). აღინიშნება პანკრეონული დაავადებით და ცერბრული ათროსკლეროზით დაავადებულში; ხასიათდება შხარი თავის კავილით, თავისებურებით, გულისრევიით, ელბინებით. ატროფიული წნევა ან დროს ან შეერთადაა მომატებული ან ეცემა. მაქსიმალური დოზის დროს სისხლის მიმოქცევის მწვეტი მოხლა.

**06სულცოქმინა** - ИСУЛЦОКМИНА - ИСУЛЦОКМИНА (ლათ. insulae cyminae). აღინიშნება პანკრეონული დაავადებით და ცერბრული ათროსკლეროზით დაავადებულში; ხასიათდება შხარი თავის კავილით, თავისებურებით, გულისრევიით, ელბინებით. ატროფიული წნევა ან დროს ან შეერთადაა მომატებული ან ეცემა. მაქსიმალური დოზის დროს სისხლის მიმოქცევის მწვეტი მოხლა.

**06 ტერმინი** - **ინფერ** შეეცნებათა მოთხოვნებს გამოვლენის ფორმა, უპრენეციუს პიროვნების მიმართულებას მოქმედების მიზნების შეუნახაზე და აბით ხელს უწყობს ორიენტირებას, ახალი ფაქტების დახატვის, სინამდვილის უფრო სრულ და ღრმა ასახვას. სუბიექტურად ე უბინდება უმოციური გონით, -ის ობიექტისაღმა უყრადლებით. -ის დაქაოციულება არ იწვევს მის გაქრობას, არამედ აღძრავს ახალ -ს, რომელიც უბნებათა შეეცნებითი მოქმედების უფრო შავად ღრვად. არსებზე უჭედად -ის, რომელიც გამოწვეულია ობიექტის მიმდევლობით, და -ის ობიექტისაღმა, როგორც მოქმედების მიზნის მიღწევის საშუალება. -ის სიმყარე გამოვლენება მისი შენარჩუნების ხანგრძლივობითა და ინტენსივობით.

**06 ტერმინობაცია** - **ინფორმაცია** (ლათ. informat - შინაგანი). 1. **ფსიქოატრიაზე** ფსიქიკური ავადმყოფის მიერ მისთვის მიმწველიანი მოვლენების განცდა გარემომყოფთათვის დაფარულად. 2. **ფსიქოლოგიაზე** ფსიქიკის შინაგანი სტრუქტურების ფორმირება გარეგანი სოციალური მოქმედების სტრუქტურების ათვისების გზით. ა. განიხილება როგორც საგნობრივი მოქმედების სტრუქტურის გარდაქმნა ცნობიერის შინაგან სტრუქტურად. რუბინშტეინის **ფუნქციონალური** (C. J. 1957) მიხედვით, შინაგანი პირობები ფორმირდება გარეგანი შემოქმედების შედეგად. (გერმ. **Verinnerlichung**). **ფსიქოანალიზზე** პროცესი, რომლის დროსაც პიროვნებაში არსებული ენთელოგია გარდაიქმნება შიგაპიროვნულ დამოკიდებულებად ცნებათა. გამოიყენება ინტერპერსონალური დამოკიდებულების როლის ასახვასადა არაკომპიტირის ფორმირებაში, რომელიც თავის შრიც, გაუქმნას ახლან ცნობიერის სტრუქტურაზე.

**06 ტერმინობაცია** - **ინფორმაცია** (ლათ. infor - შირის, ახალ - გულური, შეტევა). შეეკავთორისა.

**06 ტერმინობაცია** - **ინფორმაცია** (ლათ. informatio - შეფერება, შეადგენს). ორფსიქიკური შეტევათა შირის მდგომარობა, ხასიათდება ფსიქიკური მოქმედების სრული აღდგენით.

**06 ტერმინობაცია** - **ინფორმაცია** (ლათ. informatio - ხანგამოშეებითი, წყვეტილი). დაავადების შემდგომარობა, ხასიათდება ინტერმისიებით.

**06 ტერმინობაცია** - **ინფორმაცია** (ლათ. informat - შინაგანი, capio - აღება, მიღება). რუბინშტეინი, რომელიც გალიზინების დებულების შინაგანი ორგანიზმიდან, ღრუვიდან, სისხლძარღვებიდან. სინონ: **06 ტერმინობაცია**.

**06 ტერმინობაცია** - **ინფორმაცია** (ლათ. informat - შინაგანი, capio - აღება, მიღება). ინტროსპექტივობიდან წამოსული ობიექტების ცნ-ში აღმოცენების, გაგარების და გადაწყვეტების ფიზიოლოგიური პროცესი.

**06 ტერმინობაცია** - **ინფორმაცია** (ლათ. informatio - შირის, ახალ - გულური, შეტევა). შეეკავთორისა.

**06 ტერმინობაცია** - **ინფორმაცია** (ლათ. infor - შირის, ახალ - გულური, შეტევა). შეეკავთორისა.

**06 ტერმინობაცია** - **ინფორმაცია** (ლათ. informatio - შირის, ახალ - გულური, შეტევა). შეეკავთორისა.

**06 ტერმინობაცია** - **ინფორმაცია** (ლათ. informatio - შირის, ახალ - გულური, შეტევა). შეეკავთორისა.

**06 ტერმინობაცია** - **ინფორმაცია** (ლათ. informatio - შირის, ახალ - გულური, შეტევა). შეეკავთორისა.

**06 ტერმინობაცია** - **ინფორმაცია** (ლათ. infor - შირის, ახალ - გულური, შეტევა). შეეკავთორისა.

**06 ტერმინობაცია** - **ინფორმაცია** (ლათ. informatio - შირის, ახალ - გულური, შეტევა). შეეკავთორისა.

**06 ტერმინობაცია** - **ინფორმაცია** (ლათ. informatio - შირის, ახალ - გულური, შეტევა). შეეკავთორისა.

**06 ტერმინობაცია** - **ინფორმაცია** (ლათ. in - ში, ბერბ. mawid - შინაში). ორგანიზმის მოწამლვა მასში ენდოგენური ან ეგზოგენური წარმოშობის შინაშინი ნივთიერებების დაგროვებისთან დაკავშირებით.

**0. შტატინობაცია** - **ინფორმაცია** (Ziehen Th., 1924). ახალგაზრდა ასაკში გამოვლენილი პათოლოგიური მდგომარობა, ხასიათდება შედეგით, სინამდვილისაგან მოწყვეტად, ასტრაქციული ინტელექტუალური მოქმედებით, რომელიც ღრმინარებს ავადმყოფის ფსიქიკურ ცხოვრებაზე გამოხატულად ინტერესების ცალმხრივ კაპერტროფია შეეყენება პროცესში. ავადმყოფური განცდები შეიძლება ავარდებს ზღვრებულად თვების ხასიათის ბოლეთში (შეღრმეული ბოლა) გარდაქმნით. შინაგან თან ახლებს ავადმყოფი ხრწმობა, რუბინშტეინის, ავადმყოფის მოვლენა. აღინიშნება მართადად ახალგაზრდა ასაკის მამორენით, იშვიათად - შიშიდური ფსიქიათიის დროს სინონ: **0. შტატინობაცია**.

**0. შტატინობაცია** - **ინფორმაცია** (ლათ. in - ში, ბერბ. mawid - შინაში). ორგანიზმის მოწამლვა მასში ენდოგენური ან ეგზოგენური წარმოშობის შინაშინი ნივთიერებების დაგროვებისთან დაკავშირებით.

**0. შტატინობაცია** - **ინფორმაცია** (ლათ. in - ში, ბერბ. mawid - შინაში). ორგანიზმის მოწამლვა მასში ენდოგენური ან ეგზოგენური წარმოშობის შინაშინი ნივთიერებების დაგროვებისთან დაკავშირებით.

**0. შტატინობაცია** - **ინფორმაცია** (ლათ. in - ში, ბერბ. mawid - შინაში). ორგანიზმის მოწამლვა მასში ენდოგენური ან ეგზოგენური წარმოშობის შინაშინი ნივთიერებების დაგროვებისთან დაკავშირებით.

**0. შტატინობაცია** - **ინფორმაცია** (ლათ. in - ში, ბერბ. mawid - შინაში). ორგანიზმის მოწამლვა მასში ენდოგენური ან ეგზოგენური წარმოშობის შინაშინი ნივთიერებების დაგროვებისთან დაკავშირებით.

**0. შტატინობაცია** - **ინფორმაცია** (ლათ. in - ში, ბერბ. mawid - შინაში). ორგანიზმის მოწამლვა მასში ენდოგენური ან ეგზოგენური წარმოშობის შინაშინი ნივთიერებების დაგროვებისთან დაკავშირებით.

**0. შტატინობაცია** - **ინფორმაცია** (ლათ. in - ში, ბერბ. mawid - შინაში). ორგანიზმის მოწამლვა მასში ენდოგენური ან ეგზოგენური წარმოშობის შინაშინი ნივთიერებების დაგროვებისთან დაკავშირებით.



**ინტროვერსიზმი** - интроверсия (გერმ. Introversion). ფსიქოანალიზში ლიბიდოს განდგომა ვარე ობიექტებისაგან და მისი მიმართვა სუბიექტის შინაგანი საბუნებისადმი.

**ინტროვერსიზმის ტიპი** - интроверсионный тип (ლათ. intro - შიდაობა შენით, verso - შემობრუნება). პიროვნების თავისებურება. ხასიათდება განცდების შიგნით მიმართებით, საკუთარ აზრებისა და გრძნობების სამყაროში ჩაძირვით, ურთიერთობათა პასიურობით. იხ. **პროვინციის კამოცია** **მეზობის მიხედვით**, სინონ: **ინტროვერსიზმი**.

**ინტროსპექცია** - интроспекция (ლათ. introspecto - შიგნით ყურება). ფსიქოატრიაში: ფსიქოპათოლოგიური სურათის შექცევა თვითდაკვირვების, ავადმყვლის შიგნით საკუთარი შეგრძნებების, განცდების, მსგელოხის ანალიზის და მათი აღწერის გზით.

**ინტროსი** - интраин (ლათ. intrari - დაიჭრება, ყურადღებით ხედავს). უცურად, ლოკური მსუელებით გარემო კვებობიტივის დაღვანა, შინაგანი «გაბიფონანია», აზრთა ფეანაღვანა. სინამლეუენი ა წარმოადგენს რეალობის შეცნობის გზაზე ნახტომს, რომლის საფუძველია დატროიული ცოდნა, გამოიღვლება. ა. აღმოიღვლება ადრეული გრძნობადა გამოიღვლების საფუძველზე. ანგოიურად აღმოიენებული აზრი შიითხოვს ლოგიკურ შემოწმებას სხვა აზრებთან დაპირისპირების გზით.

**ინტროსი ბიოლოგი** - интросия биолога უცურად აღმოიენებული, წინა განცდებთან დაკავშირებული ბოღიით იღვები (ბოღეა ანტეცედსა) ანსტრებს (Jaspers K. 1913) მიხეღიით, ეს არის ბოღიით წარმოღვლები, რომლებზეც ხასიათდება რეალება მოგონებების რეკონსტრუქციული, ახლებერი გააზრებით ან უცურად აღმოიენით, «გაცისკრებებით», არ გამოიღვნარეობს წინამორბედი აზრებთან და აღმოიენება სრულიად მოუღვლებილად. ასეთი ანტეცედსი აზროვნება ხშირად აღინაშნება მიმოგრენების დროს და დაკავშირებულია ბროიგებში გაბეჭებათან (Bleuler M. 1972).

**ინფანტილიზმი** - инфантилизм (ლათ. infans - ბავშვი) ბიოლოგიური მეტამორფოზს ხასიათდება ფიზიკური და (ან) ფსიქური განვითარების შეგრძნებით, ბავშვთა ან შინაგანთა ასაკათვის დამახასიათებელი თვისებების შენარჩუნებით.

**ი. მიმართულებები** - iránylatlanak meghatározása (Homburger A., 1926). მიმართებით ფუნქციის განვითარების უმარისობის გამოიღვლება ფსიქიკური ინფანტილიზმის გამოიღვლებთან პარალელურად. ამ დროს არ არის გამოხატული თავის გინების ორგანული დაზიანების ნიშნები, პირამიდული ან ფესვანაზამოღული სიმპტომები, რითაც მიმართებით ინფანტილიზმი განსხვავდება მომართებით ღვბილობისაგან.

**ი. შინაგანი** - iránylatlanak iránylatlanak (Lasegue E.Ch., 1864; Allion G., 1906). ბროიგებში განვითარების შეგრძნებას განსაკუთრებული სახე იღვებელი საფუძველზე. პირველ რეღმი, აღინაშნება გმოიკური და ხასიათობრივი თვისებებზე, გუნება-განწყობის მერყობა, უცურად კონტროლირებად ლგოვდა, გაემოიერებული და გამოიღვლი აქტივობის უმარისობა, რიგ შემთხვევებში - შეგრძნება. ანტონე გამოიკურდა ე.წ. «ანტეცედსურ» ფსიქიკურ ანტეცედსში, რომელიც ხასიათდება რაიმე ინტელექტუალური ღვუქვის ანარქსიზმით და უღინდება მხოლოდ ტუკვის დარღუდვით. სუხარეაბ (Сухарев Г. Е., 1957) მიხეღიით, არსებებ ფსიქიკური ინფანტილიზმის ორგანული, ფსიქიკური და პარაფიზიკური ვარიანტების იმის მიხეღიით, რას შეუღვლება სიმპტომები - ოღვოფგრენას, ფსიქოპათიას ოუ ნორმას. ხშირად ფსიქიკურ ანტეცედსში თან ახლებდა ფსიქიკური ანტეცედსი.

**ინტროსი** - интрос (ლათ. in - ვარეუდა, extasus - სუფთა, უნიჭო). სისხლბის შეგრება, სქესობრივი ურთიერთობა ახლო ნათესავებს (შობლებს და შვილებს, ღებს და ძმებს) შორის.

**ინტროსი გვირგვინის უმარისობა** - интрос гомосексуальности. ანტეცედსი მამასა და ვაჟს შორის.

**ინტროსი გვირგვინის უმარისობის უმარისობა** (მარ) - интросия гомосексуальности (MAG). ანტეცედსი უმარისობაში უცურად, აკუებს ფუნქციონირებად მოიამინოოქსიდაზას აქტივობის და აბით ენადაღვლებს ბიოგენური ამინების (კატეკოლამინები, სეროტონინი და სხვა) დამდას. მათ მიღვუენება ფენილმინი (კატეკინი), ფენილმარინი (კატეკინი), ოპორბინილი (ოპორბინილი), იბოკარბოქსილი (ბენამილი), ნიაღმილი (ნერვალდი), ტრანილექსიკარბინი (პარნაგე), პარგეღინი (ტუგონილი) და სხვა.

**ინტროსი** - интрос (სანსკრ. yoga - შეგრება, აზრთა გაბახეღება, განგრება) აღამინის რეალოოქსიკულანდური რელოოქსიკულანდური სისტემა, დაკავშირებული ფსიქოფიზიკურ ეარეუმბით, რომელიც მიმართულია ყურადღების კონცენტრაციის უღღღესი ხარისხით მიღვლოს ცეღებებს ფსიქიკაში. შეღება მ გეგამისაგან: 1) კონტროლი საცეღებზე 2) მოიოიენებების და ცეღებების თვითდაღვება; 3) სხეულის სწორი მღებარეობა და მისი ამ მღეომარეობაში ხანგრძლივი შენარჩუნება; 4) სუნთქვის კონტროლი; 5) გრძნობათა აღკვეება; 6) ყურადღების კონცენტრაციის გაბახეღება ერთ ობიექტზე 7) მეღვდაუა; 8) ტრანსული მეღვდაუა.

**ინტროსი სინდრომი** - интросия синдромов (მარ) - Интросия синдромов (Мочалов В., 1981). იხ. **პათოზიზმი** **პროპროპოზიზმი**.

**ინტროსი სინდრომი** - интросия синдромов (Мочалов В., 1981). მოიკავს 6 დანაყოფს: სინდრომი და ნეგოლოლოგიური დარღვებები, ფსიქიკური დარღვებები, დისორბია, დესკომპოზიციის გრძნობა, მოიკავს სინდრომის დაქვეითება, გვერდითი მოღვლებები სიმპტომთა შეფასება ხეღება ქეღებით. იღვება ფსიქოსემულაციური მოქმედების პრეპარატების შეღარების და მათი ეფექტურობის რაღვლობრივი შეფასების საშუალებას.

**ინტროსი სინდრომი** - интросия синдромов (Мочалов В., 1979) მიერ როგორც ქრთნიკული ტასიკენჯის სახე ანუ მომაგებელი მომართებით აქტივობის მღვობარეობა. აღინაშნება თავის გინის ორგანული დაზიანების დროს ღვუქსეღვარეულ-ნეგოლოლოგიური და ქვერქვევა (ექსტრაპირამიდული) დარღვებებით, როგორც ნეგოლოლოგიური პრეპარატების შეგრძნობის გარეღება და იმითად პარქსიზმის და დროს. გასიკენჯია ამ დროს არ შემოღვარეობს მხოლოდ შენობით; ავადმყოფები ღვუქსეღვარეული გაღინ აბოზით კლოღებენ. სახეღვოღება დაკავშირებულია ორს სახეღვარეული; ძვეღვარეული მითის თანახმად, იგი გახება წვესისა და მისი კულის პერას უთანხმოების მიღვტი. ღვუქსეღვარეული მითის თანახმად, მტყპს იო გაღვარეული თეთრ მროხად და მუხსაჟა ხანგრძლივი ხეღაღვი. ეს ისტორია აქტიონდა თღვარეუბის იმეტიპროგნოზიზმი.

**ინტროსი სინდრომი** - интросия синдромов (ოოგა - ბერძნული ასო "i" - "i" - სხეღვოღება). თანდაყოლილი ანოზალია, ასო, "i" - ს გამოიკენს შეღვლებლობა.

ბრომონდრიბი - მოხიარული (ბერძ. hypochondriion - ნეკნეჭეში მდამო, ძველად თელიდნენ, რომ აქ არის ღოკალმხვებელი ამ დაავადების ავადმყოფური წყარო). თითქოსდა მისმე და განუკურნებელი დაავადების არსებობის უსაფუძვლო განცდი. ხშირად იპოქონდრიული სიმპტომის წარმოქმნა შიღრი კავშირშია სენსტივობათიბთან. ა. წარმოადგენს ფსიქოპათოლოგიურ სინდრომს, გემორჩევა კლინიკური გამოვლინების მრავალფეროვნებით და ვხვდებით სხვადასხვა ნონპოლოგიური ერთეულების სტრუქტურაში. ა. შეიძლება მიმდინარეობდეს ნევროზულ ღონეზე, მედიკური და ბოლითი იდეების სახით.

0. ბატონიზმონი - მ. ჰაიგელი (Higley H. 1928), აბოქონდრიული მდგომარეობა, აღმოცენდება არასწორ სავიბო კატეკასთან, სახველინო შემეპის გაუერთობლებდ ნათქვამთან, უარმაციბო კომპიუნულ გულენციეითან და ა.შ. დაკავშირებით. არჩევენ ფსევდოსიფილისურ, ფსევდოგებერკელოზურ, დიკვრ, რენგგენოგრაფიულ და ა.შ. ა. ბ-ს.

0. ბერსამპტორსული - მ. ჰაუპტმანი აბოქონდრიული სინდრომის მერწყმა შემოქმედების და დამოკიდებულების ბოლესთან, სენსტივობათიბთან, პალეუსინაციებთან. ეს ავადმყოფები წარმოადგენენ სამიმრობების სუიციდური და ხამეულინო მუშაკებზე მიმართული მოთიბილური გენდენციების (ადენილით ხდება «მდევეარი») გამო.

ბრომონდრიბული ბანაშორება - მოხიარულითი რანითი პაროგნების პათოლოგურად განვიტარება, ხასიათდება კლინიკურ სურათით იპოქონდრიული სინდრომის სიმპტომით, რაც განპირობების პაროგნების სოცილურ ღეზადაკაციის. თვანთავალითია დინამიკი იპოქონდრიულ შინძიბი იპოქონდრიულ-პარანოიულ სინდრომადღ.

ბრომონდრიბული ფიზიკალი - მოხიარულითი ფიზიკალი. საკუთარ განზრდილობაზე გულსაყურის მამართვა, ინტერესების შემტრება, ნორმიდან უპირესი ვალდარს რევისტრაციის სურვილი. ნევროზული მდგომარეობის და განვიტარების ხშირა ნიშანი, რომლის აღმოცენებამ წინაშეულივან რალს ასრულებს პაროგნების პრემობიბიბული თაგისებურებები (მაგ, პაროგნების ლენეულ-მეფოთვარე ხამები).

ბრომონდრიბული ფიზიკალიზმი - მოხიარულითი რეზივანთიბი. ნოზოფობიური ხასიათის მუოთიითი შინ. ფსიქიკულხი ხშირა ნიშანი. ხელს რწყება იპოქონდრიული ფიზიციების, იპოქონდრიული ნევროზის აღმოცენებას. ბრატისანი - ირატისანი (დათ. iratim - ნათება). ნერვული პრაციების უნარი, გატრედედეს მის აღმოცენების აღცილიდან სხვა ნერვულ ელემენტებზე.

ბრატისანი მამტიბი - ირატისანი აქტა (დათ. affectus - სულიერი მდევეარება). ავადმყოფის მიერ დაღებობი ან უარყოფითი აფექტის თანმიმდევრული, გარეგნულად უმშებო გადაწყველება ერთი პირიდან მეორებზე.

ბრატისანი მამტიბი მამტიბი - ირატისანი რეპრეზენტი (გრანგ. irrelevant - საუქეს არ ეხება). ასოციაციურ ელემენტებზე გამბლინანების სახით ჩართული სიგყეები, რომლებზე არ იწვევს აფექტურ რეაქციას. მათგან განსიფიციებთ, არანდირებზე გამბლინანებზე წარმოადგენს ისეთი რეაქციების სტოვება, რომლებზე ასახაბს მათ მიმუნებლობას გამოსაკლდეისათვის. აფექტური რეაქცია ჩვეულებრივ ედინდება საპასუხი სიგყეითი რეაქციის დაგნებური პერიოდის განატრბლებით, შრადსიგყეიანობით, ავადმყოფური განცდების ამრობრივი შესახამისობით.

ბრატისანი - ირტივი (ბერძ. hyster - საშვილისონ. მველ საბერძენითი ბს უკავშირებდნენ საშვილისონს ფუნქციის დარღვევას). ფსიქოპათოლოგიურ სიმპტომთი კომპლექსი, მეციას ფსიქიკურ, ნევროლოგიურ და სომატურ პოლიმორულ ფუნქციურ დარღვევებს, ხასიათდება ავადმყოფის მადლი შობავრბანლობით და თეოთმავონების უნართი, გარემოგობათია ყრადლების ში პერონისაში მდებეო მსწრავებთი. ამაზად ბოს, როგორც ნონპოლოგიური ფორმის ცნებას, ეწინააღმდეგება ისტერიული ნევროზის და მტერიადული წრალ ფსიქოპათო (იბ) გამოყოფის ცდები.

ბრატისანი მამტიბი - მ. ხაიპტმანი. პაროგნის ცდლებს ერთერთი უარიბი აღმოცენდება ღრის. ისტერიული რეაქციების ელინება როგორც ფიზიკალი მდგომარეობაში, ასევე სიმთრეობაში. დამახასიათებელი აქციის ხამესამული თვარბლობა, გარემომეფოთია ყრადლების ში პერონისაში მსწრავება, გრახაბი, გამვიადება, პოშორობა, ცრუობა ბრატისაციურ ფსევდოლოგებამდე.

ბრატისანი მამტიბი - მ. კოხლანი. მტერიადი რეაქტული ფსიქიკების ერთერთი ფორმა, აღმოცენდება საბრბოლო მოქმედებების სიგაციამი. დამახასიათებელია შევიწროებული ცნობიერება; უკვე შერტის სამკურნალო ბარეუბლებებში ევაკურებული ავადმყოფები რბიხან აგნებულ მდგომარეობაში და ხამაღდა წამობიბებენ ბრატისებებს.

0. ბრატისანი მამტიბი - მ. კოხლანი. იბ. ბრატისანი.

0. ბრატისანი - მ. პორელი (Kasperlin K. 1915). რეაქტული მტერიადი ფსიქიკების ერთერთი პირველი განმანდრება, რომელიც აღინიშნება სახამარო-ფსიქიატრიულ პრაქტიკაში. აღმოცენდება დაბამგმრების და დაგვისალების სიგაციამი. იბ. ბრატისანი მამტიბი.

ბრატისანი მამტიბი - ირატისანი გასტის (H. Gastel, 1975) მხებელი, გრამინი არასწორი და უმართებულოა. მის ეველ ივლისიხმება: 1) ევადესური გულკრები და ისტერიული შეგებების ერთობლივი არსებობა ერთი და იგივე ავადმყოფში, რაც თმეც შესაბლებელი, მაგრამ უსაფუძვლოა ასეთი ერთობლიობის უკვე ნონპოლოგიურ ერთეულად გამყოფი; 2) ევადესური ევადესურის მსგავსა, თმეცა, გამოიწვევა და წდება შობავრბანობით ანუ არსით ისტერიულია; 3) ისტერიული ევადესური გულკრება საქართველოში პირველად აღწერა ა. გულკრამ (1936 წ.).

ბრატისანი მამტიბი - ირატისანი (ბერძ. hyster - ხელის წადლება). მტერიადი გულკრია. მიმდინარეობს კავალესური უმართობით.

ბრატისანი მამტიბი - ირატისანი. ნევროზული მდგომარეობა, კლინიკურ სურათში ერთდროულად აღმოცენდება ნევრასიციების და ისტერიის სიმპტომები. უფრო მართებულია ნევროზის განსაზღვრა წამყვანი ეგოპათოგენური და კლინიკური თავისებურებების მიხედვით და დაპარაკი სხვა ნევროზის სიმპტომების ჩართვაზე.

ბრატისანი მამტიბი - ხან ირატისანი (გრამ. hysterogenic Zone). ფსიქიკალიზმი სხველის ესა თუ ის ნაწილი, სადაც აღინიშნება აწველა მგრმობიბლობა. ასეთ ნაწილში გამოხატულია ავადმყოფური მეგრბებები, ხოლო მათი გალიბანება იწვევს სეისრადური დაკაფიულებების გესის რეაქციას. მტერიადი წორტილის ისტერიით დავადებულს სხველზე (კევა, ხელები, დეიწვევებ, სარბევი ჯირკვლები, მუცლის ეველა ნაწილი და ა.შ.). რომლებზეც ზეწოლად შეიძლება გამოიწვიოს ისტერიული გულკრია. ასეთი გულკრის მეტბინიში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს შობავრბანის და თეოთმავონების.

ბრატისანი მამტიბი - ირატისანი ანორექსია. იბ. ბრატისანი მამტიბი.



დაკავშირებულია თვითკრიტიკის უკმაშრობასა და ავტოზმის გამოვლინებასთან. შედარებით ხანგრძლივი დროის განმავლობაშია შენარჩუნებული ამჟამა თვითრიტუული პროდუქციის, მაგ., კარკაგურის აღქმა. რაც შემთხვევებში მიმოფრენით დააბალებლებშია. **ე.ე. ავარის შარციალურ ხასიათის, ფსიქიკური დევექციის მნიშვნელოვანი კარნაშებისას** კი ხდება ტოტალურა თვითრიტუული ნახაგების აღქმისა ელჩილება ფორმალური შევადგენი შევადგენი შიდაში, საჯელომის შევადგენი კომენტარებულა ხასიათი, შრავაღმსრითი ახროვნება. ეთილესითი დაბაებლებშია. **გამოვლინება** კუკუსებისის სიღრმის შესახებშია. ამ დროს თავს იტენ რეზინორობისაღმი ტენდენციით, კომიკურის ევოცენგრული ინტერპრეტაცია საკუთარი ცხოვრებისეული გამოცდილებისა და საკუთარი დაუღვევი ინტეგრული წარმოდგენების გამოცხადებით, მნიშვნელოვანს გამოყოფის განხილვება და ლეგალიზაციისაღმი შირეკილება. აღკომოღმითი დაბაებლებშია თვითრიტუული გამოჩენება ბრეტალითი, ცინიკური, უბედო ჰუმორიზმით. ხშირად ავადმყოფი თავის ხუმრობაში საკუთარ თავსაე კი არ ინდოის, ამბებლებს საკუთარ ინგიმურ ცხოვრების, საკუთარ აბლობებს წარმოადგენს შავ ვერებში. დახასიათებელია ალკოჰოლიზმით დაბაებულთა ერთგვარი სოყოლონ. შათ თვითრიტუული უმეგესად აღნიშნება აგრესიულობის ელემენტები, რომელიც მომართულია გარემოშიყოთა შირით. სასაყოლო ენებებს ის, რაც სრულიად არ არის სასაყოლო ჟანრთელისათვის. შათი თვითრიტუული ხშირად წარმოადგენს ფსიქოლოგიური თავილესი ბუნებისშეხების გამოვლინებას.

**0756000 ასტრონომიური ასპექტები** - Юга астронимическая система (Jung C.). იხ. **0756000 ასტრონომიური ასპექტები**

**0756000 ასტრონომიური ასპექტები** - Юга астронимическая система (Jung C.). ხიღრმის ფსიქოლოგიკას ერთ-ერთი შირართულია. წარმოადგენს ფრთოლს თრთოლოჟიული ფსიქოანალიზის განხილვასა და უბაშბაშბრედა შას, თუშა შ. ფრთოლს და თუნებს შეხებებებს შირის განსხაეებხანს უნიშვნელოა: ორივე შირანშიაში პირველ პლანზე გამოშბს არანსიბიზის ღოშბბრეტება, თვითლოგიური ეოლუნგაციონში. ანალიზური ფსიქოლოგიის შირთოლი განსხაეება ფსიქოანალიზისაგან - არანსიბიზის არსის და ხუნების ასხნა. თუნგის მიხევეით, დაშაშბების ინსტინტებს აქეთ არა ბიოლოგიური, არამედ სიმოლოური ხასიათი. **საკუთარი არატენობური** (უვლდავერი დაბაეეებელი, ეამოღვენილა) განსხაეება კოლექტიური არატენობურისაგან, რომელიც შეეცება არქეტიკაშბებისაგან. არქეტიკაში ეუნდება სიმბოლოების სახით და ახასიაღებს არანობიერ მოღვეებს. არქეტიკების ანალიზისთვის გამოიყენება სიმბირი, შითოლოგია, რელიგია. არქეტიკებში თუნგი ხედალდა ადამიანთა წინაპრების განკლებს. ადამიანის ფსიქიკაში კოლექტიური, შათ შირის რასობრივი არანსიბიზი ღოშბბრეტება საკუთარ არანსიბიზიერზე. ფსიქიკის სტრუქტურაში შან გამოყოფილნიან (შანშიანის გავლენით) ევოცენგრული შეხელება საკუთარ თაებზე, **ანალიზი** (ქალური არქეტიკა შანშიანისაგან), **ანალიზი** (შანშიანური არქეტიკა ქალში) და **ანალიზი** (პირენების ევგრალური არქეტიკა, რომლის ორიღვე კეტელება ადამიანის ევოცენგრული თვისება). განსაკუთრებულად ღილი მნიშვნელობა ენიჭება კომპლექტებს, რთმლებს ფროიდისაგან განსხაეებში, ყოველთვის არ გათება ადამიანის სექსუალობის შირში. კომპლექტების ქვეშ თუნგი გულსხმობის არანსიბიზის სიღრმეში გადაქრულ ცხოვრებისეულ პრობლემას, რომელიც დამოკლებულია არა შირალედ ცხოვრებისეულ გამოცდილებებზე, არამედ არქეტიკაზე, რაც წარმოადგენს წინა თაობის ცხოველებების შეეცება. ფსიქოთერაპია, თუნგის მიხევეით, დაბაებულთა კომპლექტების თიგხასა და დაბელებას, რომლებსეუ წარმოადგენს არანსიბიზის სიმბოლოებს და ასახავს შირალურ კონფლიქტს.

**0756000 ასტრონომიური ასპექტები** - Юга астронимическая система (Jung C.). იხ. **0756000 ასტრონომიური ასპექტები**

**0756000 ასტრონომიური ასპექტები** - Юга астронимическая система (Jung C.). იხ. **0756000 ასტრონომიური ასპექტები**

**0756000 ასტრონომიური ასპექტები** - Юга астронимическая система (Jung C.). იხ. **0756000 ასტრონომიური ასპექტები**

**0756000 ასტრონომიური ასპექტები** - Юга астронимическая система (Jung C.). იხ. **0756000 ასტრონომიური ასპექტები**

**0756000 ასტრონომიური ასპექტები** - Юга астронимическая система (Jung C.). იხ. **0756000 ასტრონომიური ასპექტები**

**0756000 ასტრონომიური ასპექტები** - Юга астронимическая система (Jung C.). იხ. **0756000 ასტრონომიური ასპექტები**

**0756000 ასტრონომიური ასპექტები** - Юга астронимическая система (Jung C.). იხ. **0756000 ასტრონომიური ასპექტები**

**0756000 ასტრონომიური ასპექტები** - Юга астронимическая система (Jung C.). იხ. **0756000 ასტრონომიური ასპექტები**

**0756000 ასტრონომიური ასპექტები** - Юга астронимическая система (Jung C.). იხ. **0756000 ასტრონომიური ასპექტები**

**0756000 ასტრონომიური ასპექტები** - Юга астронимическая система (Jung C.). იხ. **0756000 ასტრონომიური ასპექტები**

**0756000 ასტრონომიური ასპექტები** - Юга астронимическая система (Jung C.). იხ. **0756000 ასტრონომიური ასპექტები**

**0756000 ასტრონომიური ასპექტები** - Юга астронимическая система (Jung C.). იხ. **0756000 ასტრონომიური ასპექტები**

**0756000 ასტრონომიური ასპექტები** - Юга астронимическая система (Jung C.). იხ. **0756000 ასტრონომიური ასპექტები**

**0756000 ასტრონომიური ასპექტები** - Юга астронимическая система (Jung C.). იხ. **0756000 ასტრონომიური ასპექტები**

**0756000 ასტრონომიური ასპექტები** - Юга астронимическая система (Jung C.). იხ. **0756000 ასტრონომიური ასპექტები**

**0756000 ასტრონომიური ასპექტები** - Юга астронимическая система (Jung C.). იხ. **0756000 ასტრონომიური ასპექტები**

**0756000 ასტრონომიური ასპექტები** - Юга астронимическая система (Jung C.). იხ. **0756000 ასტრონომიური ასპექტები**

**0756000 ასტრონომიური ასპექტები** - Юга астронимическая система (Jung C.). იხ. **0756000 ასტრონომიური ასპექტები**



რომელიც აუცილებელია კ-ის დასაორგნოვებლად. ცნება კ. ფსიქოანალიზში გამოიყენება აგრეთვე რიგი პირობითი ფსიქიკური პროცესების აღსანიშნავად, რომელიც დაკავშირებულია ფსიქიკური უნერგიის გადანაცვლებასთან - კათექორგება, დეკათექორგება, პლაქატექორგება (უკანასკნელი გამოიყენება ფსიქოლოგიური თავდაცვისთვის). პაპერ-კ. - ობიექტის გაყურება ფსიქიკური უნერგიით მაშინ, როცა მისი უკმარისობა აღინიშნება როგორც პაპერ-კ. არსებობის ცნება აფექტურა, ლებორერი, ეროტიკული ინსტანტურები კ. - აგრეთვე კ. - ზიტყვა, კ. - აზრი, კ. - ნივთი. გერმინ კ-ში ჩართული მრავალი ცნება ფსიქოანალიზში იმეორება ცნებებით: «ინტერესი», «მნიშვნელობა», «რეაქციონი» (Rycoff Ch., 1979).

**კაიზერ-ფლანდრის რბოვა** - Kaiser-Flannder Kolyo (Kayser B., 1902; Fieischer R., 1903). ელინდება რტოვანას გარეთა კალბა 1-2 მმ სიგანის წითლად შეფერილი. გამოწვეულია სპიდელისმეცველი ეიგმენტის მაღალი კონცენტრაციით. სიმკვრივე და მახასიათებელია ჰეპატო-ეერეზული დისკროფიისთვის.

**კამპრბაზია** - камеразия (ბერძნ. kamra-ყული, exgasia-მუშაობა, მოქმედება) (Meyer A., 1908). იხ. პარამპაზია. კამპრბაზი პრეპარირდება.

**კამპრეზია** - камерезия (ბერძნ. კამრა-ცემო). გემოვნების დაქვეითება. **კამპრეზიზმი** (იხ.) სუბიექტური შეგრძნება. მორიხად აღინიშნება ცნის ორგანული დაზიანების და ისტერიის დროს.

**კამპოზია** - камозия (ბერძნ. oamz-სენი, ყნისება) ფოსფატის შესუსტება სუბიექტური შეგრძნება.

**კალანტორი** - калантор (გრანკ. Calanthe, ლათ. calca-თხილა, ცხელი). ცხელებს დელაროზში, აღინიშნება მოყურადეებს გრონიკულ მონებში. ხასიათდება მოძირახობით აგმნებით, მუდღველობით პალეკინაციებით და რღვამი შესულის დაბეზღველი სურთით. განხილდება როგორც მისი ან სისხური დაკეთის შედეგი (Стойменко И., Райчев И., 1988).

**კალბაზ-მასპასტის პარამპოლიზმი** - Калбаза-Мастера паремизм (Kahlbaum K., 1866; Jaspers K., 1913). იხ. პარამპოლიზმი.

**კალბაზის ასტატორში პალეპინაციონი** - абстрактные галлюцинации Калбаума. იხ. პალეპინაციონი პარამპოლიზმი.

**კალბაზის აპერცეპტორი პალეპინაციონი** - Калбаума аперцептивные галлюцинации (Kahlbaum K., 1866). იხ. პალეპინაციონი პარამპოლიზმი.

**კალბაზის ვეზანია** - Калбаума везания (ლათ. vesania-მედილიზა). გერმინს აქვს ატოროული მნიშვნელობა. შემოდებელია კალბაზის (K.L. Kahlbaum) მიერ 1879 წ. ფსიქოზების აღსანიშნავად, რომლებიც ხასიათდება სახეშედეგით, თანმიმდევრულად ცვლილი სიმკვრივითა კომპლექსებით, ფსიქიკური მოქმედების გოგადური დარღვევით და ქუეკუსტობით. გეგზანაბს უპირისპირდება ვეკორლეა (ლათ. veeordia-უკუნურება), რომელიც ხასიათდება უმომრად, სტაციონარული სემპრომატიით და არ იწყებს პიროვნების დაშლას, ქუეკუსტობას. ფსიქიკური დარღვევები ეკორდის დროს არ აკარებს გოგადურ ხასიათს, და მახასიათებელია მიმართულია და მოთიყვან შესტიკის ერთობა რომელიც სვერის ცემოება, აპროვენება). თანამდროვე მუდღველებით, კ. გ. მუეზაბანება მუდღველებს ერთობა ფსიქოზის ფსიქოზის შესახებ მისთვის და მახასიათებელი ფსიქოპათოლოგიური ელიზმით (დენერესია, აგმნება, ხოცვა, ქუეკუსტობა). იხ. **ტალბა-ტანციონი-პარამპოლიზმი** (მრგველობა) პრეპარირდება **ფინიურსია**.

**კალბაზის ვეპორეზია** - Калбаума векорезия იხ. პალბაზის ვეზანია.

**კალბაზის ვერცერეზია** (Kahlbaum K., 1874). იხ. პარამპოლიზმი.

**კალბაზის კატატორია** - Калбаума катария იხ. კატატორია.

**კალბაზის კონსულუთი** (Kahlbaum K., 1866). იხ. პარამპოლიზმი.

**კალბაზის ნეოფრენია** (ბერძნ. neos-ახალი, phren-გონება) (Kahlbaum K., 1879). ზაცმეთა აბაკი თანდაყოლილი ან სუსტობის პირველ წელს შექმნილი ფსიქოზების საერთო აღნიშვნა, ელინდება დევექტრობის ან განუთიარებლობის სემპრომატი.

**კალბაზის რეფლექტორი პალეპინაციონი** - Калбаума рефлекторные галлюцинации (Kahlbaum K., 1866). იხ. პალეპინაციონი რეფლექტორი.

**კალბაზის სტერეოტიპული პალეპინაციონი** - Калбаума стереотипные галлюцинации (Kahlbaum K., 1866). იხ. პალეპინაციონი სტერეოტიპული.

**კალბაზის ფუქციონალური პალეპინაციონი** - Калбаума функциональные галлюцинации (Kahlbaum K., 1866). იხ. პალეპინაციონი ფუნქციონალური.

**კალბაზის ცილიროზია** - Калбаума цитория (Kahlbaum K., 1882). იხ. ცილიროზია.

**კალბაზის პეპოდი, პეპოდიფორენია** - Калбаума пеподия, пеподиферезия (Kahlbaum K., 1890). იხ. პეპოდი.

**კალბაზ-მეპარტის ვეპოფრენია** - Калбаума-Мехтер пеподиферезия (Kahlbaum K., 1863; Hecker, 1878). იხ. პეპოფრენია.

**კალბაზის სინდრომი «ბაპაზიზმი»** - Калбаума синдром "третью" (Калбаума Н.П., 1968). იხ. სინდრომი «ბაპაზიზმი».

**კალბაზის სტატუსი პეპოფრენია** - Калбаума статус пеподиферезии (Cabnel, 1824). იხ. სტატუსი პეპოფრენია.

**კამპრბა-ჰედიონის პრეპარული ბრეზა** - Каммерзон-Кудкова аргининская бреза (Каммерзон Е.Н., Кудков А.Н., 1938). იხ. ბრეზა პრეპარული.

**კამერონის კონცეპია «სერვიკლიუზი»** - Камерона концепция "сервиклюзия" (Cameron N., 1938). ფსიქოლოგიური თერაპია, მიმოფრენიის დროს აღწერილ მუდღველებით პროცესების დარღვევას ხსნის მიღებული ინფორმაციის სელექციურობის თავისებულებით, შეუძლებლობით, შეყავების მოცემულ აპრობრივ საზღვრებში. «შეზარდის» მიზეზად თელის ფილტვითების პირობითი შექანის და მემბრანული განწყობის დარღვევას, რომელიც უითარდება მიმოფრენით დაავადებულს აუტისტური პრობული პოზიციიდან გამომდინარე მღუეფერია (Блеклер В.М., 1981-1983) რეზარტობა თელის მიმოფრენით დაავადებულ ავადმყოფების პოეტიკის დონის დაქვეითების მიზეზად, რომელიც განაპირობებს პირობული მნიშვნელობის დაქვეითებას და სელექციურობის დარღვევას.

**კამპტორიზია** - камптокория (ბერძნ. kamtra-მოღუნება, kamtos-სხელი) (Brodie, 1837) ისტერიის სემპტომა. ხანგრძლივი დროის განმავლობაში სტულს შეიძლება მიეღებინოთ არანუნებრივი კობა, ზაე, წინ დახრა თითქმის

მართი კუთხით, გვერდზე ვადახრა. დამახასიათებელია ვამართის შეუძლებლობა, ვარემუ მარევისას ნორმალური პიხის მისაღებად წინააღმდეგობის გაწევა, ასეთი მდგომარეობის შენარჩუნება ნებისმიერი მოძრაობის, მათ შორის სიარულის დროს, ბლივნი შევიდომსაგარი გყოელი შერგსა და კიდურებში, ხელების ჩამოკიდვა, სიარულის დაჩქარება, თან ახლავს სხვა ისტერული სიმპტომები. შწოდარე მდგომარეობაში ხეულის ასეთი მოზრა ქრება და ხერხემალი ღებულის წყულებრივ კონფიგურაციას. ძირითადად აღინიშნება ობანონის დროს ჯარისკაცებში და წყუამდელებში, ქალებში-მეითათა.

**ქანაინის პანკალეზმის მდგომარეობა** - *Каннива эпилепсия с пиками* (Каннива Ю.В., 1914).  
იხ. **პანკალეზმის მდგომარეობა**.

**ქანაინის სინდრომი (საქარბოში) მდგომარეობა** - *Каннива синдром психопатической депрессии* (Каннива Ю.В., 1914).  
იხ. **ქანაინის სინდრომი**.

**ქანაინის-ლიონერის სინდრომი** - *Каннива-Лиозера синдром* (Каннива Ю.В., Лиозера С.А., 1934).  
**ფსევდოპულეკანდემბე უბო დახახახის სხით**, რომელიც კუთვინს სრულად უკბო აღამიანებს და ავადმყოფისაღმა მიმართული კინოზითი სხეულის. დაიხასიათებელია საწყისი ან რულიმენტული მიმინარე მიმოგრინების. განიხილება რაოორე მიმოგრინების სპეციფიკური ფსიქიკური ავგომამეგმის გამოვლინება ერთ-ერთ სენსორულ მდგომარეობაში (სმენით).

**ქანაინის-კლერანტის სინდრომი** - *Канникова-Клерант синдром* (Канникова В.Х., 1880; Clérambault G., 1920).  
**ფსიქიკური ავტომატიზმის სინდრომი**, მოიყავს ფსევდოპულეკანდემბე, დენის, ფსიქიკური და ფიზიკური შემოქმედების ბოლეთი იღებს, ფსიქიკური ავგომამეგმის მოვლენებს. ავადმყოფის აზრება თითქოს მივლენება მისი ნების გარეშე, თითქოს სხვისია. დამახასიათებელია აზრების, ქუეუების გაუხუიება, წმადლაღევის ამროვნების მოვლენები, ავადმყოფები რევიან, რომ მათი აზრება გასაგებ ხდება სხვებისთვის, გეითხება დისტანციანე (გახსნაღობის სემპტომი), წარმოდენის ან პირაქით უწერგავენ მათ. აღინიშნება აზრების ნამაღლაღევი მოზღვაება - შეგნობი. არჩევენ სინდრომის შემდეგ კომპონენტებს: 1. ფსევტორული - აზრების (გახსნაღობა); 2. ხენზორული - წმადლაღევი შეგნებებები; 3. მტორული - წმადლაღევი მოძრაობანი. შესახამისად, არჩევენ იდეატორულ, სენსორულ და მოგორულ ავგომამეგმის ბირითადად აღინიშნება მიმოგრინის, იწვათად - ორგანული ფსიქომების დროს. სინონ.: სემპტომიზმული სინდრომი, დენი-პალანის ბანუზორების სინდრომი, კლერანტის ურლანდერის მარევის უბოშეღობისმა, ნინამის პათოლოგიური ავტომატიზმი, შინდარის (ავრანკული ავტომატიზმი).

**ქანაინის ირავინის** - *Канникова исофрения* (Канникова В.Х., 1890). იხ. **ირავინის**.

**ქანაინის სინდრომი** - *Канникова синдром* (Канникова В.Х., 1880). ავტორის მიერ აღწერილია იდეატორინის დროს (იხ. **ირავინის**). ერთგვარი თავბრუსხვევის შეგუეები ფუხქვეშ შერის გამოვლის შეგრინებით, საკუთარი სხეულის ურნაღობის შეგრინება სერეუმი მისი მდებარეობის შეგუელთ. მიმინარეობს ამროვნების შეგრინით (იხ. **ირავინის მარევის**). ქანაინის სინდრომი, ამ შეგუეების გუნებში მნიშვნეღეღან როდს ასრულებს უესხეღური დარღვეუბა. სიმამში დამახასიათებელია საწყისი და შეგუევი მიმოგრინისთვის (*Синдром Канникова*, 1952). სინონ.: **კლერანტის მარევის**.

**ქანაინის ფსევდოპულეკანდემბე** - *Канникова псевдоэпилепсия* (Канникова В.Х., 1880).  
იხ. **ფსევდოპულეკანდემბე**.

**ქანაინის სინდრომი** - *Каннива синдром*. იხ. **ქანაინის მარევის**.

**ქანაინის ურავინის მარევის** - *Каннива феномен тождества* (Каннива Т., 1943). ზავშოა აუტიზმის სემპტომი, უინდება გარემოს შეგუელებად შენარჩუნების მცდელობით. განსაკუთრებით მკაფიოდ გამოვლინდება დარეულ ასაკში. ზავში, რომელიც თითქოს გამოყოფილია სინამდეღობისგან და არავურს არ აღდექამს ირეღეღე, მამორი პროეტგით რევიარებს უთარების უნიშვნეღლო შეგუეამე. განუთარებელი აგნების მდგომარეობის საფუღეღო ღუღეს მამი - მოუხენრობიდან ზანიხის გიხის რეაქციამდე.

**ქანაინის** - *канников синдром* (გრან. Kaninlsch). ფსიქოანალიზში: გერმინი განსამღერავს ორალურ მოქმედებებთან დაკავშირებულ ობიექტურ დამოკიდებულებებს და უანგამიებს. ორალური მოანქემის წარმოსახვითი საშუალებები და ასეღებები - ეს არის სიფურიული, განიღგურება, ობიექტოსთვის თვისების მინიღება და სხვ.

**ქანის პანკალეზმი** - *Кана атаксия* (Кана Е., 1928). იხ. **პანკალეზმი**.

**ქანის დისთიზმი** - *Кана дисметрия* (Кана Е., 1928). იხ. **მრავლობითი**.

**ქანის გრინოლოგიური ფამგამიზმი** - *Кана психофизиологическая депрессия*. იხ. **გრინოლოგიური ფამგამიზმი**.

**ქანის რეპტეზმი** - *Кана реакция* (Кана Е., 1922). ხეღობის ხადღენობტიკური კრეკპიკაციის სეროლოგიური რეაქცია. სოღიღსით დაავადებულს დეგორის ან სისხლის შრატის ქოღსტერინიზებულ ანტიგენთან შერევისას იღეღება ფუღები.

**ქანის უბოშეღობის ტიპის რეპტეზმი** - *Кана шизофренический тип реакции* (Кана Е., 1921). იხ. **რეპტეზმი უბოშეღობის ტიპის**.

**ქანაღაღა დამღაღა** - *дрожательная реакция*. იხ. **პარაბინინის დამღაღაღა**.

**ქანინი კლერანტის** - *закон Клерант*. იხ. **კლერანტის კანინი**.

**ქანინი გიტინის** - *закон Гитта* (Гитта А., 1897). პოღეღოტიკებში **ფუღობის დროს** შეიღება შენარჩუნდეს მბოლოდ ერთ-ერთ უნამეღ დამარევის უნარი. ხმირად ეს არის ზავშოების ენა ან სიღუეულისთან დაკავშირებულ ენა. ეს კონომომიერება აღინიშნება შეგუეულების აღგენისას აუაბის შემდეგ უპირველესად უბრუნდება ერთ-ერთ ამ უნამეღ დამარევის უნარს სინონ.: **ჟანის პიტინის**.

**ქანინი გრინოლოგიური** - *закон Рибо* (Рибо Т., 1881). **მუხიარებების რეგრესიის** (დახრუნული) კანინი პროეტესული ამნეზის დროს. პირეღად სუსტდება შეხიერება ახლო მოვლენებზე, შემდგომში უარებაღება რეპროდუქცია მეღ მოვლენებზე, თანდომან ამინდა მოიყავს მეღ გონებრივ შრატს, თუბა არ ურეღება გრინოლოგისა და აუღეღებზე. აუღეღური მესისერების დარღვევის შემდეგ გარკვეული დროის განმავლობაში შენარჩუნებულა მბოლოდ ავტიმადგური მოძრაობისი აქტება.  
**ქანინი ფსიქოპათიკული მარევის** - *закон о психопатической реакции* მიღებუღია 1995 წლის 21 მარტის საქართველოს პარლამენტის დღეღენობით.

**პანტორონიუმის დიანტროსტამური ფორმულა ალკოჰოლში** - Калторонител динантистическа форма на алкохолна (Калторонител Н.В. 1933). იხ. **ალკოჰოლის დიანტროსტამური ფორმულა**.

**პაპაინიზმი** - панацеизм (ბერძნული ასო "პაპა - კ" აღნიშნავს ხედას "კ"-ს). თანდაყოლილი ანომალია, ასო "კ"-ის გამოთქმის შეუძლებლობა.

**პაპირასი ილუმინიზმი** - Капиря илюминация იხ. **პაპირასი სინდრომი**.

**პაპირასი სინდრომი** - Капиря синдром (Carpenter M.J., 1923). ხასიათდება ცნობის, აღაზიანთა ინტელექტუალური დაზარალებებით. ავადმყოფები ვერ ცნობენ ნათესავებს, ნაცნობებს, მათ აღქვამენ როგორც ორეულებს, გყუპებს ან უცნობს პროვინციებს, როდესაც აქვთ გაკეთებული აბოლოლების გრძიმი (უპროვინციო ორეულად სიმპტომი) (Vie J., 1930). სხვა შემთხვევაში უცნობ ადამიანებს აღქვამენ ნაცნობებად (დადებითი ორეულად სიმპტომი) (Vie J., 1930). ამავე დროს ხშირია ბოლიეთის ინტერბრეგაციი, «უკეთ ნანახის» და ირასადროს ნანახის» ფენომენები, ფსიქიკური ავტონომიის მოვლენები. შუქსი (Шуштин Н.В., 1979) აღჩვენებს: 1. ცრუ ცნობა ინტელექტუალური ფორმა; 2. ინტელექტუალური-ბოლიეთი 3. ბოლიეთი (მასში აერთიანებენ ორეულად ბოლიეთს და ფრეზოლად სიმპტომი); 4. ცრუ ცნობა ბოლიეთი და სენსორული დანდრეგული (ანტიპეტაპორეზის ბოლიეთი) კ. ს. არ არის ნომოლოგიურად სასეიფიკური, იგი გვხვდება მრავალი ფსიქიკური დაავადების დროს (Sechid K.F., 1937), მაგრამ აღსანიშნავია, რომ ბოლიეთი ფორმა ავარებს ამორტევიტი ნომოლოგიურ ხასიათს; მაგ, ინტელექტუალური ფორმა დამახასიათებელია ასეთიური მდგომარეობებისთვის, ბოლიეთი - ინტელექტუალური მელანქოლია და აკრონული ინკრესიისთვის, მემორიანის დროს გვხვდება ყველა ფორმა გარდა ინტელექტუალური და ა.შ. სინონიმ: ძაბრები დეპრესიამ, სინდრომი აპროპრიუმობაში, სინდრომი ორეულად სიმპტომში, ილუმინიზმი, სინდრომი მულტაში სინდრომი და ა.შ.

**პარანაზალური ალკოჰოლის განსარჩევანი ფორმულიზმი** - Караназална формулационен метод отределения алкохола (Караназал С.И. 1964). გამოიყენება სისხლსა და შარდში ალკოჰოლის რაოდენობის განსარჩევანად. მეთოდი დაშვებულია ქიმიურ რეაქტაბზე ალკოჰოლსა და კალიუმის პერქლორატს შორის განცვა-ალდენებით რეაქციის დროს ქრომი ექსტრუქციონიდან გადღვას სამკვლევან მდგომარეობაში და ორგანიზმისათვის რეაქტივად შესული, ქრომი ექსტრუქციონის ქრომის სუფტადს. ალკოჰოლის რაოდენობა ისამიერება მიღებული ფერის გარდამავალი გრადიენტით.

**პარანაზალური ტანში - ნარკოზოლოგიის მეთ. გრუნდითი განწყობის გამოხატულებები** მეთოდი კარლიაშოლის 2 მლ სინარის ინტრავენურად შეყვანით გულურის პროვინციების მიწით. კარლიაშოლი წარმოადგენს ცხსის, პირველ რიგში, სუნქიისა და სისხლძარღვთა მამორბაბული ცენტრების სტიმულატორს. გამოიყენება როგორც კლინიკაში, ასევე ექვთი გამოკვლევების დროს.

**პარანაზალური-რენინობის მებრები** - параназална ренина тестის ფსიქიკური დაავადების მკურნალობის აქტიური მეთოდი (Meduna L.J., 1934). ინტრავენურად 3-4 მლ 10%-იანი კარლიაშოლის სერაში შეყვანისას 5-10 წამში ეითარდება გამოვლილი ეპილეფსიკორული გულური. ნამკვლეობა ინსულბით და ნეოტრეფსიური პრეპარატებით მკურნალობის მიზართ რეზისტენტული მიოტენიის თერაპიის, აგრეთვე გახანგრძლივებად დეპრესიული მდგომარეობების დროს. მეთოდი ამჟამად არ გამოიყენება.

**პარანაზალური-რენინობის მებრები** - параназална ренина тестის ფსიქიკური დაავადების მკურნალობის აქტიური მეთოდი (Meduna L.J., 1934). ინტრავენურად 3-4 მლ 10%-იანი კარლიაშოლის სერაში შეყვანისას 5-10 წამში ეითარდება გამოვლილი ეპილეფსიკორული გულური. ნამკვლეობა ინსულბით და ნეოტრეფსიური პრეპარატებით მკურნალობის მიზართ რეზისტენტული მიოტენიის თერაპიის, აგრეთვე გახანგრძლივებად დეპრესიული მდგომარეობების დროს. მეთოდი ამჟამად არ გამოიყენება.

**პარანაზალური-რენინობის მებრები** - параназална ренина тестის ფსიქიკური დაავადების მკურნალობის აქტიური მეთოდი (Meduna L.J., 1934). ინტრავენურად 3-4 მლ 10%-იანი კარლიაშოლის სერაში შეყვანისას 5-10 წამში ეითარდება გამოვლილი ეპილეფსიკორული გულური. ნამკვლეობა ინსულბით და ნეოტრეფსიური პრეპარატებით მკურნალობის მიზართ რეზისტენტული მიოტენიის თერაპიის, აგრეთვე გახანგრძლივებად დეპრესიული მდგომარეობების დროს. მეთოდი ამჟამად არ გამოიყენება.

**პარანაზალური-რენინობის მებრები** - параназална ренина тестის ფსიქიკური დაავადების მკურნალობის აქტიური მეთოდი (Meduna L.J., 1934). ინტრავენურად 3-4 მლ 10%-იანი კარლიაშოლის სერაში შეყვანისას 5-10 წამში ეითარდება გამოვლილი ეპილეფსიკორული გულური. ნამკვლეობა ინსულბით და ნეოტრეფსიური პრეპარატებით მკურნალობის მიზართ რეზისტენტული მიოტენიის თერაპიის, აგრეთვე გახანგრძლივებად დეპრესიული მდგომარეობების დროს. მეთოდი ამჟამად არ გამოიყენება.

**პარანაზალური-რენინობის მებრები** - параназална ренина тестის ფსიქიკური დაავადების მკურნალობის აქტიური მეთოდი (Meduna L.J., 1934). ინტრავენურად 3-4 მლ 10%-იანი კარლიაშოლის სერაში შეყვანისას 5-10 წამში ეითარდება გამოვლილი ეპილეფსიკორული გულური. ნამკვლეობა ინსულბით და ნეოტრეფსიური პრეპარატებით მკურნალობის მიზართ რეზისტენტული მიოტენიის თერაპიის, აგრეთვე გახანგრძლივებად დეპრესიული მდგომარეობების დროს. მეთოდი ამჟამად არ გამოიყენება.

**პარანაზალური-რენინობის მებრები** - параназална ренина тестის ფსიქიკური დაავადების მკურნალობის აქტიური მეთოდი (Meduna L.J., 1934). ინტრავენურად 3-4 მლ 10%-იანი კარლიაშოლის სერაში შეყვანისას 5-10 წამში ეითარდება გამოვლილი ეპილეფსიკორული გულური. ნამკვლეობა ინსულბით და ნეოტრეფსიური პრეპარატებით მკურნალობის მიზართ რეზისტენტული მიოტენიის თერაპიის, აგრეთვე გახანგრძლივებად დეპრესიული მდგომარეობების დროს. მეთოდი ამჟამად არ გამოიყენება.

**პარანაზალური-რენინობის მებრები** - параназална ренина тестის ფსიქიკური დაავადების მკურნალობის აქტიური მეთოდი (Meduna L.J., 1934). ინტრავენურად 3-4 მლ 10%-იანი კარლიაშოლის სერაში შეყვანისას 5-10 წამში ეითარდება გამოვლილი ეპილეფსიკორული გულური. ნამკვლეობა ინსულბით და ნეოტრეფსიური პრეპარატებით მკურნალობის მიზართ რეზისტენტული მიოტენიის თერაპიის, აგრეთვე გახანგრძლივებად დეპრესიული მდგომარეობების დროს. მეთოდი ამჟამად არ გამოიყენება.

**პარანაზალური-რენინობის მებრები** - параназална ренина тестის ფსიქიკური დაავადების მკურნალობის აქტიური მეთოდი (Meduna L.J., 1934). ინტრავენურად 3-4 მლ 10%-იანი კარლიაშოლის სერაში შეყვანისას 5-10 წამში ეითარდება გამოვლილი ეპილეფსიკორული გულური. ნამკვლეობა ინსულბით და ნეოტრეფსიური პრეპარატებით მკურნალობის მიზართ რეზისტენტული მიოტენიის თერაპიის, აგრეთვე გახანგრძლივებად დეპრესიული მდგომარეობების დროს. მეთოდი ამჟამად არ გამოიყენება.

**პარანაზალური-რენინობის მებრები** - параназална ренина тестის ფსიქიკური დაავადების მკურნალობის აქტიური მეთოდი (Meduna L.J., 1934). ინტრავენურად 3-4 მლ 10%-იანი კარლიაშოლის სერაში შეყვანისას 5-10 წამში ეითარდება გამოვლილი ეპილეფსიკორული გულური. ნამკვლეობა ინსულბით და ნეოტრეფსიური პრეპარატებით მკურნალობის მიზართ რეზისტენტული მიოტენიის თერაპიის, აგრეთვე გახანგრძლივებად დეპრესიული მდგომარეობების დროს. მეთოდი ამჟამად არ გამოიყენება.

**პარანაზალური-რენინობის მებრები** - параназална ренина тестის ფსიქიკური დაავადების მკურნალობის აქტიური მეთოდი (Meduna L.J., 1934). ინტრავენურად 3-4 მლ 10%-იანი კარლიაშოლის სერაში შეყვანისას 5-10 წამში ეითარდება გამოვლილი ეპილეფსიკორული გულური. ნამკვლეობა ინსულბით და ნეოტრეფსიური პრეპარატებით მკურნალობის მიზართ რეზისტენტული მიოტენიის თერაპიის, აგრეთვე გახანგრძლივებად დეპრესიული მდგომარეობების დროს. მეთოდი ამჟამად არ გამოიყენება.



ამ დროს აღინიშნება ცნობიერების მძიმე დარღვევები და არასწორად გამოხატული აგნება საწოლის ფარგლებში აღინიშნება შესიგირებადი დღედიერების დროს, მძიმე სობაგური დაავადების გრძინადურ სვადიამი.

**კასპიის ხიდები** **სტრუქტურა** - **Каспийская структура** (Cassler R., 1912). ვევეტრონგროზი აკროციანობით, აკროსიციტობით, პიკროპროსიობით, თაბრუსებებით, გატყარილობით. პათოგენში საგანსელია ვარგები და შინაგანი გარემოსდაცვითი როლი, კონსტიტუციური წინაგანწყობის დროს.

**კასპიის ხიდები** **სტრუქტურა** - **Каспийская структура** (Casper, 1846). გარემომოქოებით თანდასწავებით გაწითლებს აკვატუბულია შავი. შიშის იმისა. რაში ვახლება შესაზნევი უხეობისთვის. სინონ: **სტრუქტურა**.

**კასტან-ვარკ-ბიუის ხიდები** **სტრუქტურა** - **Кастан-Варк-Бийская структура** (Castaigne, Houdart, Boze, 1952). ებლუგება შაქრიანი ლაბეტი.

**კასტან-ვარკ** - **кастан-варк** - შობრბობა შემოლან ქვეშობ (Lopez-Ibor J.J., Spiegelberg W., 1965). სობატური დაავადება დასაწყისი სერობული განვლტკერ განცდებით დაკავშირებით. კავატენებური დასაწყისი აღწერილას გორსილი დსგონის, გავანგული სკლეროზის, წყლულოანი კოლიტის დროს.

**კასტან-ვარკ** - **кастан-варк** (ბერძნ. **καστανή** - სული დაყვამ) (Miesler H.W., 1912). სტრუქტურა, რომელიც ასახავს ეპიდემიური ვევეტრონგროზის (ავეტეხის) და ახსავადგროვი გინდფეხების (გრინობა, ცრევილი, შიშ) გავლენას დამოანის ამროვნებით მოქმედებაზე ამ დროს ასოციაციური პროცესები, რომლებზე შემდინარეობს ავეტრონგროზ და მუხტული კომპლექსებით, ძლიერდება თავის გამოვლინებაში, ხოლო საწინააღმდეგო - შუბრუტედა. კატათომური ავეტრონგროზი დაახასიათებელია განსაზღვრული ჯგუფის წარმოადგენისთვის, რომელიდან თითოეული ერთიანდება ავეტრონგროზზე უფროდ კომპლექსში (Zischen Th.). ავეტრონგროზის ძალით აიხსნება კომპლექსური განვლტკერი მიზარტ ამროვნების ლოგიკროზის დაკარგვა. კ. კლინიკურად ვინდება ამროვნებითი პროცესების მიზინარეობის თავისებურებებით, ხაღვის, პარველ რიგში, პარანოიკულს, აღმოცენებით. კს ვინება შინდფლტკერი რომე პრიმოტივი (არტკული, მხეგროტი) ამროვნების ფორმირებაში (Kretschmer E., 1927). კ. ხაწინააღმდეგობა პოლითომობას. ზლოდურს (Bleuler E., 1906) აზრით, ავეტრონი განწყობა გავლენას ახდენს წარმოადგენის ხასიათზე, შატ, დეპრესიების დროს.

**კასტან-ვარკ** - **кастан-варк** (ბერძნ. **καστανή**-ხელის წავლება). შობრბობა დარღვევებს ხაწმტობით, ხასიათდება ავადმყოფის გამეჭვინტოვებით, მოჭერე უხერხულ კომპიში, რაყ ხინარე შობიხოვი შინიუნელოვან ენობოვან დაძახულობას. აღინიშნება კავატონიური შიმოფრენის დროს. სინონ: **სტრუქტურა** (ცხელსაშინარე) **სტრუქტურა**.

**კ. ნაბიკეშისა** - **к. набикешская** (Babinski J., 1899). მიყუმულ ჰობიში ხანგრძლივად გაქერების პათოლოგიური უწარა, გომეწყვლია ნათებების ღამბაქობი.

**კასტან-ვარკ-კასტან-ვარკ** - **кастан-варк-кастан-варк** (ბერძნ. **καστανή**-ხელის წავლება, **καταλεινή**-დაქიმივა). სტუპორი და კატატონება სტულებითი მდგომარეობის დროს, ეგმოდერნი გოახს მწეაე რეაქციის ერთ-ერთი გამოვლინება.

**კასტან-ვარკ** - **кастан-варк** (ბერძნ. **καταλεινή**-შობრბობა შემოლან ქვეშობ, შობრბობის დასრულება). შინდფლტკების კომპლექსი ავადმყოფის მდგომარეობის და დაავადების დინამიკის შესახებ დიაგნოსის დადგენის, მეურნალობის ჩატარების და სტაციონარობის დაწერის შემდეგ იხლევა დაგანოსტიკის შარტებულობის, სტაციონარობის და ამხუდგროვილი მეურნალობის ევეტკერობის, სოციალურ-შრომობითი აღაგაციის დადგენის საშუალება.

**კასტან-ვარკ** - **кастан-варк** (ბერძნ. **καταλεινή**-დაშინება) (Gelineau J.B.E., 1880). ვევეტრონგროზი მდგომარეობა, ხასიათდება ენობოვანი ტონუსის უეცარი დაკარგვით, რაყ მოიყავს ყველა გინიშობლიან ეუნის ან ენობთა ელკეულ ჯგუფს გინერალიზებულ მეტევის დროს აღინიშნება სრული უშობრბობა, ავადმყოფი ეცემა, ისობა დაძახულება; პარყიდურის დროს - აღინიშნება აქვს ელკეული ეუნის ან ეუნობთა ჯგუფის ხესუსტეს (მუხლები ევეტეობა, საგანი უჯარდება ხელადან). შარტსმეშხე აღმოცენდება ძლიერი ენობის დროს ვევეტრონი არ ირღვევა. ნარკოლეპსის სიმპტომი. არჩვეულ დაძახებს (ბრეპსიზმდეგვა, J.B. Henssler) და ვალეპებს (პიხტანობაღვევა) კს.

**კასტან-ვარკ** - **кастан-варк** (ბერძნ. **καταλεινή**-გამეჭვება, დაძახება) (Kahnbaum K.L. 1863). კალბაუში კატატონი აღწერა როგორც ერთიანი ფსიქიზმის სტადია, მიღინარე ფსიქოპათოლოგიურ სიმპტომთა კომპლექსის გიკური კვლობი: უბრალი მეღანქობა, შინი, აგრონიური მეღანქობა (საკუთრი კავატონობა), შიორეული კეკასუსტობა, კალბაუში მთერ კატატონი განიხილებოდა როგორც ფსიქიკური დარღვევის და ნებობთი სერვის პათოლოგიის საკმაოდ ინტენსიური გამოვლინება. კ. (ან კატატონური ექსანია) ე-ერებლებს (E. Kraepelin) მთერ ჩართული იყო ნაადრევი ტეკუსტობის მსიუელ ხისტადიკობაში, ხოლო შემდგომში, ზ. ზლოდურს (E. Bleuler) მთერ განიხილებოდა როგორც შიმოფრენის ფორმა.

**კ. სტეპან-ვარკ** - **к. степановская** (ლათ. **scidus**-ნათელი) კატატონური ხანდროზი, მიღინარე ცნობიერების დარღვევებზე ვარეუ.

**კ. სანსერ-ვარკ** - **к. шансеровская** ლენინარება (K. Losenhard, 1957) მიხედვით, განიხილება როგორც სტუპორი შიმოფრენის ფორმა და ხასიათდება მანერულობის რეაგულების არსებობით. შიით დარღვევის დროს არ წარმოქმნება სხვა შობრბობობა, აღინიშნება უშობრბობა, აქსიალან მანერული რეგალების შესრულებაში ხელის მეშლისას შესაძლებელია აგრესიული გამოვლინებები. მანერულობის გამოვლინება შეიძლება ყის საუბარზე უარის თქმა, ამ დროს ავადმყოფი ასუსტის წერადობით. შიორეული სპონტანური მოგორების გავარაგება, ვითარდება გამოშესული დგობა. შობრბობებზე აგრებებს სტერეოტიპულ ხასიათს. სინონ: **კ. სტან-ვარკ**.

**კ. შინდფლტკური** - **к. шандфелткерская** შიშობითი ანაკში შინაფლტკერი კატატონური ხანდროზი. შიგიერთი მეკლევარი შიაკუთენებს მოგვიანებით შიმოფრენიას, შიგი - ინვოლუციურ ფსიქიზმს.

**კ. შინდფლტკური** - **к. шандфелткерская** (Lambert P.N., Mindeser M., 1972) კატატონური ხანდროზის რედეფინებელი განიანტი. ხასიათდება შობოლო შიშობ ცალკეულ გამოვლინებებით (მანერულობა, შიშაუბრის შიგნის ათლება, ხელის ჩამორთმევის თაიოდან აუღლება, უშბეზო დიზონი, გამეჭვება, უეცარი მოულოდნელ შობრბობები, ეპიზოდური ექობაღვია, შობრბობის და შევეტელების ხანძიკულ არასისტემატიკური შეტერებები). უიეტებლ აღინიშნება საწყისი შიმოფრენის დროს, რომელიც შინიფლტკური ენობისა ნერვისის - და ფსიქოპათოლოგიური გამოვლინებების. სინონ: **კასტან-ვარკ** **სტრუქტურა**.

**კ. შინდფლტკური** - **к. шандфелткерская** (ბერძნ. **σινδρα**-სინდრა, **ειδωλα**-სახებ). ცნობიერების ინჟარიული დარღვევებს უბრეპსიზმად მიღინარე კატატონური ხანდროზი.

ბ. პერიოდიზმები - К. Периодизация. ლეონარდის (Leonhard K., 1957) მიხედვით, სისტიმური შთაოჯნების ფორმა ხასითება პიკეტინგების და აქინფიების არსებობით. ავადმყოფი უმობრად წეის საწოლში, მაგრამ ერთ-ერთი შედეგით ასრულებს სტრუტორკულ რიოდეს მოძრაობას. აგზნება შეიძლება შეუყუარის აქინფიით. შიშინარეობა მეტეისმადგარია, ზიპიდარეობა ეზანის (Gjvenz R., 1953) მიხედვით. კატატონიური აგზნებას ან სტრუტონის პერიოდში განასმდგრება აბოგის ეკლის დამასასათებელი ეკლბებში.

ბ. ბროსინგური - К. Прокаширование. ლეონარდის (Leonhard K., 1957) მიხედვით, ხასითება ბროსინგური (ბ.) სიმპტომის არსებობით, შეეკუთვნება ხსიტკუნა შთაოჯნების. პროხვინგურა - თანამონაწილეობისთვის შვადყოფნა, გარეგანი იმპულსებისაღმე პასიური აყოლა. დამასასათებელი საგნენისა სტრეკიტიკული მანიპულირება, რომელიუ შნიშვნელიანე გამოხატულიანს დროს ვეგანენს მოძრაობით იცერციყებს.

ბ. რბობა - К. Имитация. ხასითება ეკაეკული კატატონიური მარანგებით სისტიმური აბლორბების ეკინიკურ სურათში: სტაორი და უმობრობა არ ალწეის შნიშნელიანე გამოხატულებას და აგარებს ხანმოკლე, ეპიზოდურ ხასითს.

ბ. სანსიმპტომი - К. Скрытая (Sluder K., 1936). შთაოჯნების აბტონა ფორმა. იწეება მწეიველ კატატონიური აგზნებით. დამასასათებელი ანის პებორაგებია, მაღალი გეპერატურა, ეკლსისხლმარეობა სისეკემში პათოლოგიური ეკლბებში. შიშინარეობა და პროგნოზი აუთვისებინია. შედარებით კვლადსამელი გამოსავალს დროს აღნიშნება შიშორენული სმბგომავიკი. შიაკუთხევენ ფეხბლური შთაოჯნების აგონგებამ ფორმას (Scheld K.F., 1937; Turashvili A.G., 1970-1982). აღნიშნული ფორმის ეკს მიმდინარეობის თავისებურებს უკავშირევენ ან შიშორენიული პროცესით გამოწვეულ გოქიკოსმ, ან ინტერკურენტულ ინფექციას, რომელიუ ართულებს შიშორენიის შიშინარეობას.

ბატანზაზმა - капазан (ბერძ. καπαζαν-გეყიყება). შეტყვეულებათ სტრეკოტეობა. დასმულ კთხებზე პასუხის შირადეგარდი გამოეობება განიზიდავენ როგორუ აგეოქოლბობას. აღნიშნება კატატონიური შთაოჯნების დროს. ბატანზორნაზმა - капазанная форма при приступе эпилепсии (რომელიუ იმბექტის, ერთული იმბექტის, აბლორბის, განყლის შეკუთვნება რომელიუ კლასისაღმე, რომლის სახე შეიძლება იყოს ევრხაღური და არაეხაღური შნიშვნელობები, სიმბოლოები, სენსორიული და პერეკუტული ეგარობები, სოყიადი სტრეკოტეობები, ეყეუს სტრეკოტეობები და ა.შ. კის პროცესი წართულია აღმის, ამროენების, წარმისახვის პროცესები, რომლის იმბექტი ადოქნება და გაიანგრება არა როგორუ ერთულია, არამედ როგორუ რაიმე გენოგადებული კლასის წარმოზადგენული, აბსოლტ ან იმბექტზე გადადის მოყემული კლასისათვის დამასასათებელი შიშლენის თავისებურებები და დამასასათებელი ნიშნები.)

ბაუშან-ბარბროსი მიმოქროსი მსტანმის მკანაბროსმა - Kaufman-Kepera метод лечения истерии (Kaufman F., 1916; Keher F., 1916) აბტკრულია დახმება მეკრბლობის ერთ-ერთი რებრბხული მეოთხე ვაერეკლებული იყო I შლოლიო იმის წლებში. შიშინგენას, რომელიუ აგარებს ბრადლებს ხასითს, თან ახლავს პარალიზებულ კიდებე უარაღული ლენტი ზემოქმდება და აგადალბრა მეანგებულ ვარჯიშების კომპლქსის გამოყენებით.

ბაშბარი - капаз (ურბანგ, капаз-სუდა, ნალელი) გერმინი შრეკალი წლის წინ შემოღებულია საფრანგეთის ექსორი ლეკოზის სასხელიო მოსამსახურებების შიერ და აღნიშნავს აფექტიკული აშლილობას, რაუ ეკავიერებულია საშობლოთან განმორებასთან, არასასურველ კლბებთან და მძიმე სასხლობთან. შესეატარებში ცნება კ. გამოყენებული იყო I შლოლიო იმის ბოლოს (Held და Volvzel), მასში ნადებული იყო შნიშორიუ ეკერცისი ნიშნები, რაუ გამოწვეული იყო სახლდან მოწყვეითი, ჩეველი საშუაისი წართმეით, იშოდაკითი, ცხოვრების მძიმე პარბობით. კის მდგომარეობამ შეიძლება გამოიწვიოს დეპრესიის მძიმე შეტყეები, სეედანი გამბეინეარების რეაქციები. ამაზმად გერმინი გამოყენება ურანგულ შესეატარებში დეპრესიულ მდგომარეობის, ნოსტრლის აღსანიშნავი (Pott A., 1975).

ბახსპმა - какеция (ბერძ. каκος-ყოდი, ხახს-გემობარეობა). ხეკული გნოშოტებს უკიდრული მეგომარეობა სასოყოყლო შნიშნეობის ეპიზოლოკური ფუნქციების დექტიეობით, პროგრესული გახოზით (მოყვირ ბულიზიის დროსუ კე), შხარდი ასთენიით, რომელიუ დამასათებულ ეგაზე იყულება აპათიით. აღნიშნება ჩეველებრივ არაკეთილსამებლო შიშინარეობის რეგი სომბატური დავაებებების, ელოკინული პათოლოგიის, ხანგრძლივი შიშინობის, სხიურე დავაებების დროს. შესეატარეულ პრატეკიკაში უმეტესად აღინიშნება მოხეკებლობითი შესეებების მარამზულ სგადიანი, პროგრესული დამხლის დროს.

ბ. შიპროსი - С. Симондас (Simmonds M., 1914; Gilnald J.K., 1913) შთაოჯნური მეგამბის დახასინგბით შედეგე შიპოთების წინა წლის ფუნქციის გამოზარდნით. აღმოყენება ინექციური და სმბინგური პროცესბთა, თაგის ტენის გრავებთან დავექტებში. პირველად აღწერილია შნიშინარობის მეტეგომბ სეუსისის დროს პათოლოში აგზბლიკური მეგასტამბიოს და აუთისებობანი სმშინის მეგასტამბრბისას აღნიშნება აგრეთვე შიპოთის შიდაზომი სიოლდსური გავის დოკანბჰაისის დროს. გეპურია გამოხატული ასთენია, მოღუნება, აპათია, ანორექსია, საყვისი შეუღება, თმის ეყება, ეხებენია. შიში მეგომარეობებში - დეგრბია, ცხოვრების დარღვევა. ავადმყოფები ეპიპოურებთან ასაკთან შედარებით უფრო ხნიერად აღინიშნება სასქული ორგანოების ატროფია, ანეორევა (შირადე ეპადებთან ქალები). რენგენოლოგიურად - არაიმეითად თურქული ექვის გადღება და დესტრუქტია. სინონ: სიმპროს-ზალინგის მკანაბრმა, ზალინგ-პოლიოდრისი მკანაბრმა, სიმპროსი მკანაბრმა, პიპროსურმა მკანაბრმა, ნაპროსი მკანაბრმა.

ბბროსკაბზეზი - капазан (ბერძ. καπαζ-უქრევა, ვაჰანა-ერწხება). შროფეხულია ნეკრბო, აღნიშნებათ პარეპახებრებს და ელნდება თითების და შირის სარტყლის კუნთების ხამშებით.

ბბზეზი - капаз (არაბ. капаз-ენება, სასიაშოვნ უსაქურია). ფარფულია ეფორთის კმაყოფილებს, კოზფინტის სახააშინი სხიუჭების შეგრბების მეგომარეობა, თან ახლავს სასამოფბო ელოპორული გარცელები და ფანგაზიები. აღნიშნება პამშითი თორბის პირველ სგადიანში.

ბბპროსი გენდონევაშვაბი შუროსტინული მკანაბრმა - Кеpera конвульсы шатофенической реакцией (Koehler K., 1979) ბი. ბრბონევაშვაბი შუროსტინული მკანაბრმა.

ბბპროსი შთაოჯნის მკანაბრმა - Keleya metod pilyebri iksotepiazma (Kelly G.A., 1955). ფეხოტეობაების ფორმა, დაზარებულია ეყეუს შესეოლოტიკური კონექციებზე შესეოტრეაბევა ავადმყოფს აბღეუს საყეფოკური ინდეოლოკური პაროენული თეებების ესკოს, რაუ ოტემიზებულია საყეფების სოყილოკური როლისთვის. პაქეგებმა უნდა იმყვიდეს

როლის შესრულება რაბლებიზე დღის განმავლობაში მაკონკრეტოვებს ხახლის პირობებში ატარებს ხანმოკლე ექსპერიმენტს ხახლი პიროვნული თვისებების დემონსტრირებით. ამ დროს ხამფასიძელი, რომ შეყვანილობა ატარებს ექსპერიმენტის სახაით, რომ ავადმყოფმა შრომელ ენდა შეიძლება ფსიქოთერაპიუტის მიერ მოვლადირებული სოციალური როლის დემონსტრირება. გრენინგის ფსიქოთერაპიის ერთ-ერთი სახე.

**მაშპაპლის სიმპტომი** - Кешишвили С. (Campbell D., 1909). დაავადების შეუცნობლობა თავის გენის მუბლის წინაპი პათოლოგიის დროს (შუბლის როკალიმაციის სიმპტომები). შირ.: პანოქონიზმმა დაგამოსა ან სიმპტომისა ანდრ-პაპიანის სინდრომის დროს.

**მაშპაპლის თეორია ინფორმაციული მენტალიზმისა** - Кешишვილის თეორია ინფორმაციული მენტალიზმისა (Kepelisk A.). ნორმალა და პათოლოგიაში აღმანის ფსიქიკური მოქმედებას განხილავს ინფორმაციის თეორიის პოლიფილია. გარე სამყაროს განმარტობის მიხედვით შემოქმედებენ იქნა-შე ხანდროსი გაეილი, რომელიც გამოიყენებს შიგა სამყაროს გარეგანისგან; ეს პროცესი მიმდინარეობს სელექციის კანონებით ორი ძირითადი ტენდენციით - ასპირაციით და ევლანსიით. გარე გარემოებების ასიმილირება იწვევს შესახაისი ფუნქციური სტრუქტურების აღმოცენებას, რომლებიც განსაზღვრებს ამა თუ იმ ფსიქოლოგიურ რეაქციებს. გარე გარემოებების ასიმილირება ორგანიზაციის ატარება უარყოფითი ენტროპიის ხასიათის. სელექციური ტენდენციები შორის ერთმანეთს უკავშირდება განსაზღვრება ორგანიზმის მოთხოვნებებით ანუ მოთხოვნები განსაზღვრავს გუნდუნების და ფუნქციური სისტემის აღმოცენების ხასიათს. ასიმილირებული ტენდენციის მაქსიმალურ გამოხატულებას აღწევს სექსუალური მოქმედების ტრილიმ. გადართის ტენდენციის განხილვა რეგულაციის გამოხატავს და აქვს არა მარტო ანდიდელური, არამედ სოციალური მნიშვნელობა. ფსიქიკური დარღვევები განხილვა რეგულაციის ხანდროსი პათოლოგია, რომლის სამუდამოთაუ ხორციელდება ინფორმაციული კავშირები ორგანიზმისა და გარე სამყაროს შორის. ასე აიხსნება აუციმის, გახლებლის, დეპრესიის, ნევროზების დროს ემოციური დარღვევების გენეზი.

**მაშპაპლის სიმპტომი ვიქტორიანული წრისა** - Кешишვილის თეორია ვიქტორიანული წრისა (Kepelisk A., 1972).

ნევროზის ერთ-ერთი ძირითადი სიმპტომი. მდგომარეობს ნევროზული კავშირის - მიზნისა და შედეგის - შეყვარში. შიგა, ნევროზული მიზნი იწვევს რეგულაციურ დარღვევებს, ეს კი აღიქვამება მიზის გრანობის. ნევროზული პათოლოგიაში მიზნობრივი ფაქტორების კავშირის ასახავს თითოეული შემდგომი რეგულაციის პიქტოროვილ ხასიათს: ერთი ფაქტორის გაბლირება იწვევს შემდგომის გაბლირებას, რაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ნევროზული განვითარების შეზღუდვში. კუპანსის მიხედვით, ნევროზების შეყვარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა მოქალაქეული წრის გარღვევა.

**მაშპაპლის სინდრომი** - Кешишვილის თეორია (Kennedy F., 1911). აღიზნება შუბლის წილას სიმპტომების დროს. ხასიათდება შედეგობის ნერვის დერლის შემუქებით პათოლოგიური პროცესის საწინააღმდეგო მხარეს და შედეგობის ნერვის პირველი ატროფიით კერის მხარეს.

**მაშპაპლის სიმპტომი** - Кешишვილის თეორია (Quelvenet Ch., E., 1841). ექიმის წინ გაწვილ ხლებზე მოთავსებული ავადმყოფის ხელის შეყვარების გრეფი. ანუ კომპლიმენტის სიმპტომი.

**მაშპაპლის თეორია ვიქტორიანული წრისა** - Кешишვილის თეორია ვიქტორიანული წრისა (Cannon W.B., 1927). ემოციის აღმოცენებაში ძირითადი მნიშვნელობა ენიჭება ენტრალურ ნერვულ შეყვარების და, პირველ რიგში, თალამუსს და ექსტრემებს ენტრალურს. ემოციური განცდის და ქვეყის საფუძვლად ითვლება თალამუსში აღმოცენებული ნერვული ინტერესის განთავისუფლება ქვეყის შემთავებელი გავლენისაგან. თალამუსში ნერვონების განმუხტვა იწვევს ამ დროს აღმოცენებული იმპულსების გავრცელებას აფერენტული და ეფერენტული მიხედვით. ორგანიზმში ევლაციების განხილვა რეგულაციური ემოციის შედეგი. ამაგარად, ემოციის აქვს მოხილიმაციური როლი დარღვეული პოტენციის აღდგენაში.

**მაშპაპლის სინდრომი** - Кешишვილის თეორია (ბერძ. Keats-სიმული). ან. მრავალკვანთა დაგამოსა.

**მაშპაპლის სინდრომი** - Кешишვილის თეორია (Keel G.H., Rosanoff J.). მრავალკვანთი სინდრომი (ან.) გამოხატულება ფსიქოლოგიური პათოლოგია. გამომდინარეობს სახით გამოიყენება 100 სიკვების კრებული, რომლებზე სიკვებიერი პასუხი სტანდარტიზებულია ფსიქიკურად კანონიერად პირველ პირებს. განსაზღვრება აბასტანდარტული შედეგებით რეაქციების ხედრითი წრისა. გამოიყენება ექსტრემალის, უქვეული ამროვნების გამოხატულება სიკვებიერი ექსპერიმენტის ვარაიდგა.

**მაშპაპლის სინდრომი** - იან ანთროპოლოგიის ნეიტონებს ვეფოვი, რომელიც მონაწილეობს ფოკალური ევლაციური გულყრის აღმოცენებაში. გავრცელებული ან ვეფოვიანი გულყრების დროს ეკავდ ითვლება ის ნეიტონები, რომლისგანაც იწვევა განმუხტვა. კერის არსებობა ჩანს ევფოვი გულყრის გარემოე შესახაისი განსრუბილ დოკალური ევლაციური ექციონობის არსებობის დროს.

**მაშპაპლის სინდრომი** - იან ანთროპოლოგიის ტენის დოკალური მინფოლოგიური დაზიანება (ნაწიური, სიმსიხე და ა.შ.), რომელიც ორგული ქენის ნეიტონების გადამტენებას ანუ ერთ ან რამდენიმე ევლაციური კერის.

**მაშპაპლის სინდრომი** - Кешишვილის თეორია (ბერძ. Keranos-ლევა) (Charcot J.M.). ოქტრული დაზიანება, აღმოცენდება ჰეპაქუბილის და ელვის შემდეგ.

**მაშპაპლის სინდრომი** - Кешишვილის თეორია (ბერძ. Keranos-ლევა) (Charcot J.M.). ოქტრული დაზიანება, აღმოცენდება ჰეპაქუბილისა და ელვისთან დაკავშირებით.

**მაშპაპლის სინდრომი** - Кешишვილის თეორია (ბერძ. Keranos-ლევა) (Charcot J.M.). ოქტრული დაზიანება, აღმოცენდება ჰეპაქუბილისა და ელვისთან დაკავშირებით.

**მაშპაპლის სინდრომი** - Кешишვილის თეორია (ბერძ. Keranos-ლევა) (Charcot J.M.). ოქტრული დაზიანება, აღმოცენდება ჰეპაქუბილისა და ელვისთან დაკავშირებით.

კერპიკოვ-შელიშვილის ბუნებრივი სისტემების შემოქმედების - Керпиков-Шелишвили естественная система психологии (Керпиков О.В., 1961, 1963, 1971; Шелишвили Н.И., 1965-1971). თორის მიხედვით, ესეიქიპიის ჩამოყალიბების მიზნულია კონსტრუქტორ-მეცნიერებითი ნიშნები, ვარგის უარყოფითი შემოქმედება (ესეიქიპიები, სიყვარული-ესეიქიპიები და ეგზოგენურ-ორგანიზმი) და ენდოგენური ფაქტორები. არჩევენ ესეიქიპიების ორ ძირითად ჯგუფს: ბუნებრივი (კონსტრუქტორი) და შექმნილი. უკანასკნელი იყო: პოსტრუქტურული, ორგანიზმი, განაპირა ესეიქიპიები თავისთავად იყოფა შიშობილი-ბუნებრივი და ესეიქიპიები განაპირების ფსიქოლოგიად. ესეიქიპიურ განვიითების მიუხედავად ნეგროლოგი (ტიპური დინამიკა: ნეგროლოგი რეაქცია - ნეგროზი - ნეგროზი დეპრესია - ნეგროლოგი განვიითება - განაპირა ესეიქიპიები, შედეგში შესაძლებელია განაპირა პაროქსიკური განვიითება) და პოსტრუქტურული (ტიპური დინამიკა: რეაქციული მდგომარეობა - დინამიკური უარყოფითად შეყვრილი წარმოადგენების გართულება და გაღრმავება, შეღივებული განვიითების კომპლექსების ფორმირება, ესეიქიპიებისმდგავარ რეაგირება - პაროქსიკის ესეიქიპიების თაიისებურების აღმოცენება). იხ. **სტრუქტურული**.

**კერპის ბრუნვა პრეტეპული სისტემა** - Керца брца претепулово шустелса - Керца брца ерпическог шустелса (Kehrer F., 1922). იხ. **ბრუნვა პრეტეპული სისტემა**.

**კერის შიშობილი სივრცეობა** - Керри фобия кооическог прострнства (Kerry R.J., 1960). იხ. **შიშობილი სივრცეობა**.

**კერის-ოლიფილ-პენინსულა-ვაიხრიკა-აქსონოლოგიური მუთხა** - Cairns H., Oldfield R.C., Pennybacker J.D., Whitebridge D., 1941). იხ. **შიშობილი სივრცეობა**.

**კეტლის ბიოგრაფია** - Кеттеса брца (Cattell R.B., 1950). პაროქსიკის თავისებურების შესაქალიფიკაციური მუთხაა. პაროქსიკის განვიითების სტრუქტურის დამახასიათებელი 16 ფაქტორის გამოადგენად. შემოქმედებულია ორი ძირითადი პარადეური ფორმა, რომელთაგან თითოეული შეიცავს 187 კითხვას. პაროქსიკის ფაქტორები ბიოგრაფიული, მან, სიკეთობა - მიხიობა, უარყოფა - დარი და ა.შ. გამოყოფილია აგრეთვე მეორე რიგის ფაქტორები (ექსტრა, ინტროვერსია, შფოთვა). არსებობს კ-ს ვარაგები ბავშვთა, მოზარდთა და მრდასრულთა გამოადგენად.

**კეტლის ტიპი პარანოიკობა** - Кеттеса тет перепрнства (Cattell R.B., 1946). პერსონალიტის გამოადგენით ესეიქიპიური მუთხაა, შედეგად შედეგად სუბსტრუქტურული (სუბსტრუქტურული და ესეიქიპიური) მუთხაა, დაწერა სელოზით და მოუფიქრო, გესტის წყობება, დაწერა პარადიკის და ესეიქიპიურებით, დამირინთის გულ მარევენების მიმართებით და მთი საწინააღმდეგოდ. საკუთარი სხეულის დაწერა პარადიკის და ესეიქიპიურებით, ცუდრების დაწერა აჩვეულებიად და გაღმობრუნებული სიბით, გაღრმავების სერის წარმოება გამოადგენების გამოების შესაძლებელია წინაწარ შედეგით მოეფიქრო შედეგური რგორებით). თითოეულ სუბსტრუქტურულ მუთხაზე ორი შედეგად - სწორი და არასწორი ასუბების რიგიევი წუთი. აღნიშნება პერსონალიტის ფაქტორის მადალი მარევენები ებილეფიით დაეადგენებში (Delsy G., Pichot F., Forze G., Jubart M., 1953).

**კეპსეიკის სისტემა** - Кезеиоа естелуа ფიზეიკი ნაქეს, სმრად თანდაყოლილი გარეგნული სიმახიხის და პარადეული ცვლილებების უბილეობა, რეი იქვეეს ეზოურ კონვიტეს და აღმაინს სოციალურ იზოლაციის. ეპსიპიო - ე. პოვეის რომანის პარანოის ელემენტობის გამირის გმირი, რომელიც გამოირჩევიდა სხეულის გარეგნული სიმახიხით. სიმონ: **მეცნიერების მუთხა**.

**კეპსეიკის სისტემა** - Кезеиоа (დად ვაქსა-შედეგად მომიხიანი). მადგობს დაუძლეველი სურვილი, ბრძოლა თითქმის წარმოებული უკლებლის აღადგენად. ავადმყოფები სისედავად მივიან სხეულები ინსტანციებში, სხეულებში, სხეულებში, არ ეთანხმებიან მათ გადაწყვეტილებას. დამახასიათებელია პარანოიკული გიკის ესეიქიპიებისთვის, აღნიშნება პარანოიკული განვიითების და შიშობილების პარანოიკული ფორმის პარანოიკული ვარანგისთვის.

**კილასი სიშობილი სისტემა** - Килас шитом интнхоси (Kielak L., 1960). იხ. **სიშობილი სისტემა**.

**კილასი სისტემა** - Килас естелуа истелуа (Kielholz P., 1957). იხ. **სიშობილი სისტემა**.

**კილასი სისტემა** - Килас естелуа истелуа (Kielholz P., 1970). იხ. **სიშობილი სისტემა**.

**კილასი სისტემა** - Килас естелуа истелуа (Kielholz P., 1970). იხ. **სიშობილი სისტემა**.

**კილასი სისტემა** - Килас естелуа истелуа (Kielholz P., 1970). იხ. **სიშობილი სისტემა**.

**კილასი სისტემა** - Килас естелуа истелуа (Kielholz P., 1970). იხ. **სიშობილი სისტემა**.





ენკორინული ენკეტატორი და ფსიქიკური დარღვევებით (ე. ზ. ბათოლოგური, კლამპტერული სინდრომი). 45 წლამდე ქალებში და 50 წლამდე მამაკაცებში ე. ზის დავიკომისის დაპარკია არეულ კლინიკურ ქალებში ნაღვრული კლიმაქსის მძიმე საშუალო-სიმწიფე და საკურსებზე წარმოებულ ოპერაციებში, ქალის სასქესო ორგანოების დაზარალება. ე. ზის ხშირი სიმპტომურ განმარტებით ნერვოსმატიული დეკომპარაციები. სინონ: **კლიმაქსი, კლამპტერია, კლიმაქსი, კლიმაქსი** (ბერძნ. κλιμαქსი, ლათინი). 1. უმაღლესი პროფესიული დონის **სამკურნალო-პროფილაქტიკური სპეციალიზებული დაწესებულება**. წარმოადგენს სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის (სამედიცინო უმაღლესი სასწავლებლების ან და ლაბორის შემადგენელი მოწოდების შესაბამისი კათედრის) ან სამეცნიერო-კვლევითი სასწავლო სახის. 2. ხანაში ცენტრი «დაავადებების კლინიკური სურათით».

**კლინიკური პრაქტიკა** - κλινική πρακτική (ბერძნ. κλινική-საქონი, ლათინი). **მკურნალობის დაწესება** წოდებით რევიზის დახიზებით. **კლინიკური პრაქტიკა** - κλινική πρακτική. საქონი, სპეციალური ჯანდაცვის დეპარტამენტი **მედიკალიზაცია**. აღინიშნება ნერვოსებით (ნეურასტიკა) დაავადებებში, ფსიქოსთენიურ ფსიქოპათიებში, იპოქონდრიული მდგომარეობების დროს. გარდა ამისა, ე. ზეიძლება იყოს როგორც აკუპუნქციის იმეოთი ფორმა (J.-M., Sutter, 1975). ფსიქოანალიზის მსვლეთი, განხილვება როგორც რეგრესიის გამოვლინება (აკანში ან დედის მუცელში დაბრუნებისკენ მსვლადება).

**კლინიკური მკურნალობა** - κλινική θεραπεία. საქონიში ყოფნისაში მდგრადი დახიზება დილის განხიზნულივით. წარმოადგენს ავადმყოფის ჰეპოქონდრიის დროს, შედარებით დაავადებულთა ახლია), ან ცენტრებისან დაპარკიების მიითი (მაგ, დილის ასტიკა) (J.-C. Scott, 1975).

**კლინიკური სინდრომი I** - Κλινική σύνδρομο I (Clippel M., 1892). სისხლძარღვოვანი, ათეროსკლეროზული ფსევდობაქსა სინონ: **ბიპარკიული დაავადება**, «**ბიპარკიული სინდრომი**».

**კლინიკური სინდრომი II** - Κλινική σύνδρομο II (Clippel M.). პოლინერვისტი და კორსაკოვის ახიზიურ სინდრომი თან ახლავს დევიდის ციროზის სურათი, კახეცია, ასციტი და **დაავადების დროს**.

**კლინიკური სინდრომი III** - Κλινική σύνδρομο III (Hutchinson, 1893; Klippel, Feil, 1912). შეუკვიდრებობა განხიზნული (ლომინანტური) განვითარების ანობალია. ორსულობის მე-3 თვის chorda dorsalis-გან ციროზი მალეობის დაზარალების შედეგება. ძელოვანი არმობალია მუცლის ახიზის სისხლძარღვებზე ან უშავალი მურგის გვიხის დედა წყარებისა და გვიხის დროს. დახიზნულივით: მოკლე სურათი, თავი დროში არის ჩამოყვანილი ხეჭებში. ციროზი მალეობის მომხიზნული შედეგება. თავის მოძრაობა შეზღუდულია; მალეობის ანობალია (სოლისტური მალეობა), კოოსტოლორია, დახიზნული ნეკნები, ანია ხიშმა carvulae, კეფის დიდი ხერვილიდან ან ქალის დროს გამოშავალი ხერვილის კომპრესიის დახიზნული, იმეოთად - ცქერის პარეზი, სიყრუე, გარეთა სასმენი ხერვილის ახიზნული, ოლიგორენია, სირინგომელია. აგრეთვე შესაძლებელია განვითარების სევა ანობალიები - foramen ovale aperitum, უკანა დახიზნული აგრეთში, მელის ხახა და სხვა.

**კლინიკური თეორია** - κλινική θεωρία (გრძნ. Klonke Theoria). ფსიქოანალიზში და ხეშური სექსუალური წარმოადგენის, რომლის დროსაც არ განხიზნულია საში და ახლი. ქალის გააჩნა ერთი დრო ერთი ხერვილი, რომელიც გამოიყვანება როგორც კოიკუსისთვის, ასევე ხეშობა მოხიზნული - ხშირად იგი უშვლებათ ახლი.

**კლინიკური კლინიკური პრაქტიკა** - Κλινική πρακτική (Claude H.). იხ. **სინდრომი-კლინიკური სინდრომი**.

**კლინიკური პრაქტიკა** - Κλινική πρακτική (Claude H., 1923). ეპიზოდური მწვავე ფსიქოზი. აღმოცენდება მიხილური ფსიქოპათიები და აქვს უკუგანვითარებისაში გენერალური ცხება ანალიზური პარკის მიხილური ნივთი, განის მიხილური გიპის რეაქციისა.

**კლინიკური პრაქტიკა (პრაქტიკა)** - Κλινική πρακτική (Claude H., 1924). იხ. **კლინიკური პრაქტიკა**. **კლინიკური პრაქტიკა** - Κλινική πρακτική (Claude H., Loyezes H., 1912; Lhermitte J., 1922). აღინიშნება ერთ-ერთი პლანეტარული არტერიის დახიზნული დროს და ხსიათდება თავის გვიხის III წყვილი ნერვის ცალმხრივი დახიზნული, ოლიგორენია სინდრომი დახიზნული საწინააღმდეგე მხარეს და შედეგობითი პალეურაქციებით (იხ. **პრაქტიკა კლინიკური პრაქტიკა**).

**კლინიკური** - κλινική (ბერძნ. κλινική-ქანობა, eidos-მსვლადება). კლინიკის მსვლადება მოძრაობა, გამოირჩევა არამკვიდრი გამოხატულებით, არამუღმიზობით და სწრაფი განვითარებით.

**კლინიკური** - κλινική (ბერძნ. κλινική-ქანობა, eidos-მსვლადება). კლინიკის მსვლადება მოძრაობა, გამოირჩევა არამკვიდრი გამოხატულებით, არამუღმიზობით და სწრაფი განვითარებით.

**კლინიკური** - κλινική (ბერძნ. κλινική-ქანობა, eidos-მსვლადება). კლინიკის მსვლადება მოძრაობა, გამოირჩევა არამკვიდრი გამოხატულებით, არამუღმიზობით და სწრაფი განვითარებით.

**კლინიკური** - κλινική (ბერძნ. κλινική-ქანობა, eidos-მსვლადება). კლინიკის მსვლადება მოძრაობა, გამოირჩევა არამკვიდრი გამოხატულებით, არამუღმიზობით და სწრაფი განვითარებით.

**კლინიკური** - κλινική (ბერძნ. κλινική-ქანობა, eidos-მსვლადება). კლინიკის მსვლადება მოძრაობა, გამოირჩევა არამკვიდრი გამოხატულებით, არამუღმიზობით და სწრაფი განვითარებით.

**კლინიკური** - κλινική (ბერძნ. κλινική-ქანობა, eidos-მსვლადება). კლინიკის მსვლადება მოძრაობა, გამოირჩევა არამკვიდრი გამოხატულებით, არამუღმიზობით და სწრაფი განვითარებით.

შოლოხოვი ქ. ა. ა. ლ. ითელი დახლოებით 500 ათას წევრს (Peters U.H.), კოპტებს (H.J. Koptar) და ხიდროვის (H. Chapiro, 1986) მუხებელეებით, კლების მთლიანი აფართოებას და აქვს ბლკოპოლიზმის მკურნალობის არსებულ მეთოდებს, იგი წარმატებით ვრცელს ფსიქოთერაპიას, ავადმყოფთან ხანგრძლივ მჭიდრო კონტაქტს, რომელიც ვრცელდება სამკურნალო დაწესებულებიდან გაწერის შემდეგ გადენას ახლეს რეზიზის-ხანგრძლივობაში, იძლევა ოჯახური და საზოგადოებრივი სოციალური რეაბილიტაციის საშუალებას.

**კლუბერ-ბიზმის სინერგია** - **კლოუპერ-ბიციტოვი** (Klopper H., Bucy P., 1937). **ფსიქოპედიკური დარღვევების სამკურნალო კომპლექსი**, აღმოცენდება საფეხური ორბირთვი ლობეტომის შედეგად რეჟის-მაკრეკებში. დამახასიათებელია ენოსტეკური დარღვევა ფსიქიკური სიბრმავეს გიპით, მოგადი განმეორეება, ეფორია, ეფიქური რეაქტივების გაქურდობა, პიკრესტულია, სირცხვლის და შიშის გრძობის და კრიტიკა, დაუკუბელი მძიმელი. არამედიკალური აღინიშნება აკინეზური მეტიზმი, აფექტური მეჩევობა, ევგეგადიური კრიზები აღმანებში ოპერაციის გვერდითი საფეხური წილის ამოკეთის შემდეგ აღწერილია ქ.-ბ. ს-ის არასრული სურათი, ჰარისობის კვანძების გამოვლინება (Tertian H., 1955). სინონ: **კლუბერ-ბიციტოვი სინერგია**.

**კლუბერ-ბიციტოვი-ტრანტიანი სინერგია** - **კლოუპერ-ბიციტოვი-ტრანტიანი სინერგია**. **კლუბერ-ბიციტოვი** (Klopper H., 1952). **ოგალბოლოვანი ნაშენის ერთობლიობა** თავის გვირის თანდაყოლილი ორგანული პათოლოგიის შიგვითი ფორმის დროს. თვალის კაკლებს ნებითი მოძრაობა გარეთ შევლებულია. თავის კომპლექსური შემორჩენების ხდება თვალის ეპიტელის ნაბადავი მიქცივა საწინააღმდეგო მხარეს. თვალის კაკლების მოძრაობა ვერცხვითი მხარეთულებით შენარჩუნებულია. პირველი გამოვლინება 3-5 წლის ასაკში. სინონ: **ბარბაძის თანდაყოლილი ნაშენობრივი თვალის მარბარბაძისა**.

**კონსტიტური დისონანსის მორბა** - **კონსტიტური დისონანსი** (ლათ. დისონანსი-ცოდნა). დასავლეთში გავრცელებული სიტყვაური **ფსიქოლოგიის** თეორია, პიროვნებათმრის კონფლიქტს განიხილავს როგორც გარდაუვალს, სოციალური ყოფის განყოფილ ნაწილს, იხილავს და ჩვეულის ურთიერთმეშველებას. თვლის, რომ კონფლიქტი მხოლოდ მაშინ ხდება რეალური, როცა იგი შეიცვობა მონაწილეების მიერ. დისონანსის მდგომარეობა განიხილება როგორც დისკორდია, რომლის თვალსა დათვალს ავიღებთ ილილია აღმანი. **დისონანსი** აღმოცენდება იმ სიტუაციებში, როცა აღმანი ერთ ობიექტზე აქვს ორი ურთიერთგამომრბივი (ცოდნა). ანგორა, შიში აღმოცენების იხილვმა ან უნდა შეუცალღოს დისონანსური «ყოღნის» ერთ-ერთი ელემენტი, ან მასში უნდა შეიცვან ახალი ელემენტი.

**კონსტიტური რბა** - **კონსტიტური რბა** (ლათ. დისონანსი-ცოდნა, შემეცნება). ნაყნობიხანგრძლივი გარემოცვის სახე. ქ. რ. აქვდება და სახეს იცვლის სუბთევის გარე საზგაროსთან აქვთური ურთიერთმეშველბის შედეგად. ამ დროს შიშილია შეაქნას სხვადასხვა მასშტაბის და ორგანიზაციის ქ. რ. ამაშად მას შესასწავლად გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდი: მარტივი ჩახატვა, მრავალმხრივი სკალირება, რომელიც იძლევა სახის სტრუქტურის აღდგენის საშუალებას რუკის წინაგედებს შორის მინიშლის მეტრული ან მიხედვური შეუსების შედეგების მიხედვით.

**კონსტიტური შემოქმედება** - **კონსტიტური ნაყნობი**. უსუბიის თანამეორვე ფსიქოლოგიაში ერთ-ერთი წაყვანი მმდნარეობა. აღმოცენდა XX ს. 50-იან წლების ბოლოს და 60-იანი წლების დასაწყისში. უპიროსპირდება ბიპეიორიზმს და ფსიქონალიზმს ძირითადი ინტელექტუალური და მენტალური კომპიენციდან. შიში წარმოადგენლები შეისწავლიდნენ სენსორიკი ინფორმაციის გადაზეუებას სტიმლის რეეკტივრებზე მოხვედრიდან შესაბამის ასუსხამდე და ელოდნენ აუხნათ აღმასიორების და აბროვების პროცესებს.

**კონსტიტუციური ინტელექტუალური (IQ) - კოეფიციენტი ინტელექტუალური (IQ)**. **ბ. ინტელექტუალური**

**კონსტიტუციური დისონანსი ტიპი პირველის ფორმირებისა** - **კოვალენა კოეფიციენტური ტიპი ფორმირებისა** (Kovaleva B.B., 1976). იხ. **პირველის ფორმირების დისონანსი ტიპი**.

**კონსტიტუციური კონსტიტუციური შემოქმედება** - **კოვალენა კონსტიტუციური შემოქმედება** (Kovaleva B.B., 1976). **ფსიქიკური დისონანსი** გამოყოფილია როგორც მრავალი დისონანსიგენების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ელნიდება განვითარების დარღვევით და გამოწვეულია როგორც ბიოლოგიური (გენეტიკური, ენდოგენურ-ორგანული და სხვ.) პათოლოგიური ფაქტორებით, ასევე მიკროსოციალური მომენტების ხანგრძლივი არასასაკეთი შემოქმედებით, აგრეთვე მათი სხვადასხვაგვარი შეთანაწყობით. ფსიქიკური დისონანსიგენების შემდეგი ძირითადი გიპები: 1. **რეტარდაცია** - ფსიქიკის ყველა მხარის ან უპირატესად მისი ცალკეული კომპონენტების განვითარების შეზღუდვა ან დეციაგენა; 2. **მასშტაბი** - დისპროპორციული, გაკუდმარებული ფსიქიკური განვითარება; 3. **შემოქმედება** - დეკომარებული ცნობის მორფოლოგიურ-ფუნქციურ ასაკობრივი უწიფარობასთან და თავის გვირის მოწიფეულ სტრუქტურებსა და ფუნქციებზე გარემოს არასასწრველი ფაქტორების შემოქმედებასთან. ფსიქიკური დისონანსიგენები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ფსიქიკური პათოლოგიის მრავალფეროვანი ფორმების განვითარებაში - მოგადი ფსიქიკური განვითარების მდგომარეობის დაბლაწევის და ვინებრივი ჩამორჩენილობის ხანგრძლივი პათოლოგიური ფუნქციონებამდე, რომელიც აღმოცენდება მომწიფების დისფუნქციის შედეგად - როგორც და შედეგებში სტერეოტიპობა, მშეშე, პათოლოგიური ფუნქციონება და სხვ.

**კონსტიტუციური პირველის შემოქმედება** - **კოვალენა კონსტიტუციური შემოქმედება** (Kovaleva B.B., 1968). განაპირა ფსიქოპათიების ფორმირების ერთ-ერთი ვარიანტი (იხ. **პირველის ფორმირების მნიშვნელოვანი მნიშვნელობის შემოქმედება**). ცნება აღნიშნავს ბიპეიორიზმს და მისი დარღვები სიტუაციური პათოლოგიური განვითარების. მიკროსოციალური გარე არაკეთილსაწრველი ფაქტორების გავლენით შექმნილ დანამიკურ დარღვევებს აქვთ გენერეცია ხასიათის და მთლიანად პიროვნების ხგენაკლება მყარი პათოლოგიური ცვლადებისაღნი. მოზრდილი პათოლოგიური განვითარებისგან განსხვავებით, ქ. ბ. ფ. შ. ფსიკოპედიკალ უღებს არა უკვე ფორმირებულ პიროვნული პათოლოგიური ძერა, არამედ არამომწიფებული პიროვნების ფორმირების ელვლება პათოლოგიური მამართლებით.

**კონსტიტუციური სინერგია** - **კლოუპერ-ბიციტოვი** (Klopper H., 1955). ავადმყოფები მიიყენებენ აფექტორაგენტებს, რათა მათ თანავტობონ ამ მიზნით თხავერ ხელდასხვა ისტორიებს. წარმოადგენს მთლიანად სახეს.



**ძროტ შხმი** - *копыто* (ლათ. corium - შეუღლებია). **სქესობრივი აქტი** მიმართული სექსუალური სიამონების მისაღებად და შთაბამებლობის გასაგრძელებლად. არჩევენ **ეგტბულურს**, როცა მამაკაცის სასქესო ორგანო თავსდება საშვის შესასრებლში; **პეტრობეკეუალურს**, სხვადასხვა სქესის პარტნიორებს შორის; **პოთობექსუალურს**. ერთი სქესის პარტნიორებს შორის; **შეწყვეილს**, როცა ეკუთვნება ხდება საშობადნო მამაკაცის სასქესო ორგანოს გამოსვლის შემდეგ, და **პროლონირებულს**, როცა სხვადასხვა ხერხებით ხდება სქესობრივი აქტის განხორციელება.

**ძროტ შხმის შვედგოგო** **დოსტოინია** - *посткоитная дисфория* შოგ შემთხვევაში ნორმალური სექსუალური აქტის ჩასიათვის შემდეგ ევითარება **დემპრსიული**, **პშუთოფარეადაბული** **შდგომარეობა** გაზლიზიათებლობით და უსიკომოტორული ავტგაყით. იბლიდს წარმოშევა სურვილი. განიავსუღელს პარტნიორისგან, სდება უბეგი როგორც ვრხაბურად, ასევე უბიკურად უმეტესად აღენიშნებათ მამაკაცებს.

**ძროტ შხმის შვედგოგო შიპის ტამინიზმბი** - *посткоитная дисфория в виде* გაცილი აღმოცენდება კოტრის შემდეგ ახასიათებს პელსიონება, უბეტესად ლოკალიზება კუფის და შხლის მიღამიებში, გრმდელება რამდენიმე საათო.

**ძროტინე** - *кокаиин* (ინგლ. cocaine) პეტალიოი, რომელიც მიიღება მცენარე *Erythroxylon* კ ა.გან. ბუტილიანი მცენარეა, იბრდება დაახლოებით 15 მ სიმაღლის, რომლის ფოთლებსიც თადაპირველად მზადდება კოკაინის სასცა. გრალიყულად იბრდებოდა ბოლიფისა და პერუმბ, ამჟამად - სამხრეთ ამერიკის თითქმის ყველა ქვეყანაში. მის ფოთლებს ჰაეივენ მსახეობიურებელი ევფედის მისაღებლად. 1860 წ. პირველად აღებურქ ნაშაზნა გამოყო როგორც ნოთორება. 1894-იდან მას ეკუთ პირველი ადგილი, როგორც ადგილობრივად სანეტონებო საშუალებას. 1914-იდან შეგანდლია ნარკოეული ნოთორებების საშაო. კოკაინის ასაგადან ქიმიური გაღამუბაების გნით დებულობენ თორც შებეკ კრისსიბრი უბნობს, რომელსაც აქვს შწარე ვებო და იწყებს ენის აღებუებას. მას ფენლის სახით შეისუნთქევენ ან სხნარის სახით შევათენ ვენაში. კოკაინის პლარტიფორლის უბნიღმე სრლს ადამებით მიიღება კოკაინის თაფის უფალი უბუ. ე. წ. ავრეიო, რომელიც პოპულარულია ნარკომანებში, მოიბმარება მოწყვის გნით და მოცმეღეს სწრაფად. ვარგონულად კოკაინს უწოდებენ: «snou», «cokes», «grit», «Ladys», კოკა, კოქსი, კრეი, გრაფიკი. სანან: Benzoylmethylcocaolin, Erythroxilin, Colobin, Kokalin, Kokayeen და სცე.

**ძროტინით ბამრეფაული შსამრწინ** - *кашаеобразная масса* შეიბლება განვითარებს კოკაინის მოხმარების დაწყებდან რამდენიმე ღლის შემდეგ, დაზნახსიათებულა ევფიანობის გრმობა, თითქმის გარემომყოფები შეუღლებულენ და ადასტრეობა შათ, რაც ხნირად განაპირობებს შრისხანებას და ძალაღობას. ბოლიეო განწკმობა მიღუნად შეწავია, რომ ელემფრეობს ან გაურბოს წარმოღვნად თავდაშნებულს, ან თადაცის მიზნით ესხმად შათ თავს. აღქმის პათოლოგია კ. გ. ფ-ის დროს მოიყავს ყველა შვერნებათა პალკუნაბეებს: ესნით ღანბეღის, შუკრას ხებეი, ხნირად ღიალოკები, ხედავენ შიკროფიულ და შოლოგიურ პალკუნაბეებს. ნორმალური შობის პალკუნაბეით განსაკუთრებულად შემზარებათ; ხედავენ სხვადასხვა ადგილმე ნამოკიდებულ ევამების მოჭრად თავებს, ურჩხულებს (იხ. *შეღმრეშეშე ძროტინით ბამრეფაული*). განსაკუთრებით გამოხატულა გაქციღური პალკუნაბეები. შეიგარბობენ კანქეშ უცხო სხეულებს, შავლებს, შწერებს, კოკაინის კრისგალებს. პალკუნაბეები ხაგოვანი და «რუბლილი» და წარმოადგენს დეგნის ხოლმის საკეებს. აუქციური ფონი მჭვად დაბახული ან დაქციულებულია. დამახასიათებელია ის, რომ მიუხედავდ ზემოთ აღწერილსა, ავადმყოფებმა თითქმის ყოველთვის იყიან, რომ ყველაფერი ეს გამოწვეულია კოკაინის მოხმარებით. ძველი კოკაინოშენები წინასწარ უღლებიან პალკუნაბეურ-ბოლით მდგომარეობებს, რის გამოც, თითქმის არასოდეს არ კარგავენ უნარს, გაარკეონ სად იმყოფებიან და რას აქეთებენ (Joel E., 1913; Кутинин М.П., 1915).

**ძროტინის სინდრომი** - *Коккаинная интоксикация* (Cockayne E.A.) შემყვინდრეობათი დაავადება, გადაეცემა ავტოსურ-რეუქციული გიმა. დამახასიათებელია: ხახის წაქციებათებუი ნაკეთობ, ჩიუენებოთ თადავლი, თხელი ესურბი, პრეგნაცია, ხაღურის დეგერაცია, დახალი განი, დაგრძელებული კიღურები, მოხრის აღფექტი; პიპერგოქოში, ფოკოსენსიგურება, სუნების დარღვევა. უსიკომო შირიე - გონებრივი ჩამორჩენილიაბ.

**ძროტინის რეპრესიის კომპლარსი** - *Коккаинрепрессионная* (Карацупова А., 1976). ნეგროზების გამოსაკვლავი ბარეგული **კოხგარი**, შეიყავს მშ კოხხესა. შეუსახება ხედა მ სკალის საშუალებით - ევფეგაციური დარღვეები, ნეგრასთინია, უსიკომოთა, ისტერი, იპოქოზია, დებსესა. დეურსონალმაბეა და დერეალიზაბეა. რაოდენობრივი მამრეუბლებების მიხედვით არჩევენ: სუსტად გამობაგლ და გამობაგლ ნეგროზულ მდგომარეობებს და ნეგროზისმაგარი ტენდენციებს.

**ძროტინის** - *каштан* (ლათ. castanea-დასყავებელი, დეუმელი). მათოლოგიური **შდგომარეობა**, ხასიათდება ცნსის დათრგნებით, პრგრეოული და ვერური წწების შყვეთი დაყენით, ცირკულირებელი სისხლის მასის შემცირებით. თადაპირველად მოგჯერ ენობიურება შენარებულა, იყულება მოგინანებით ევაკებზე აღინიშნება ეკნობიანი გულსის დაქციუება, კანის სავრემტროლად, გულის ცირბი, პიპერგოქოში, სხეულის გემპრადგურის დაქციუება, გულის გონების შოკურება, გაქციარდა, სუსტა აესებებს ძაფისებრი პულისი, სუნთქვის შესუსტება, მოგჯერ ჩინის-სკოქის გიკოთ. აღინიშნება სისხლდენის, შუკის, ნარკოეული ნოთორებებით ინფორაციის, ინფექციების და ა.შ. დროს. **კ. არითმეტატეურა** აღინიშნება სხეულის მდებარეობის შეკეთისა - პირიზონტალურიდან და ეერტიკალური შინოქოვარება კოტრამახის (ნეიროლეფსიური პრეპარატებით) ერთ-ერთი შესაძლო გართობია.

**ძროტინის რეპრესიბი** - *кашаеобразная* (ლათ. coillaco-შეგროება). სხვადასხვა ხანების ავადმყოფური **შვეროგება**, კოტრეორიონება შათი მტვრიანი ღრუ ან მხატვრული ღრეხულებს მიუხედავად, ძირითადად სიამონების საფისი, რაც ეკუთვრება შათი აღმოშობით და შფენით. განსაკუთრება უბიკურად უანმონებლების კოდეკორინობისგან. გაპური შავდათთა - თიბლოშანი. აღინიშნებათ უსიკომოთური პიროვნებას, მოგჯერ უსიკურად დაავადებულებს.

**ძროტ** - *кома* (ბერძნ. κόμη-ღრმა ძლი). ცნობიერების დრმა დაღრგებს **შდგომარეობა**. ხასიათდება ცნსის უწყნის დათრგნებით, თავის გინიმი სასიყოსლო ენგრების რეგულაციის დარღვევით, რაც გამლიზიანებულმე რეაქციის, რეულეუბების, შგრმობილების, ატეორი შობირობების არარსებობით. სიმძიმის მიხედვით არჩევენ კის საჩ სხვადას. თლი **კომატურული შდგომარეობა** გამოირჩევა შოგერთი რეულეუბის (წყებათ, პრეფიქსი) და რეაქციის სენარენებისთ. კლამაე ვამბელებულია, შგარამ შენარზნებულია. სუნთქვის და გულის შეშამობის დარღვევები ურჩიებოდა. დარღვეულა კორტეკულესი, კორტიკული შაღამის მოქმელება. **გამახატული** კ-ის დროს არ არის რამეღია ვარე გამლიზიანებულმე, რეულეუბები არ იწყება, კლამაე შობილია. აღინიშნება მათოლოგიური რეულეუბი. დარღვეულია მეზენის დრხს ორგანობთა უწყეიეა. აღინიშნება სუნთქვის მათოლოგიური ფორმები, არითმია, სუსტი

ჟელსი, არტერიული წნევის დაქვეითება. ქერქ-ქერქევემა ვუნქციების დარღვევას თან ახლავს ღეროს ვუნქციის დათრეგნება და სინანლური ვუნქციის დაქვეითება. ღრმა კ. ხასიათდება ქერქ-ქერქევემა, ბუღბური და სინანლური ვუნქციების დაზიანების სიმპტომებით. სუბიქტის და გულის მოქმედების, ყდაპის უბეში დარღვევები. 1-ს მიზეზები იყოფა 3 ძირითად ჯგუფად: **სპასტანტრონიკული ბუნხემა**, **სპეტანტრონიკული ბუნხემა** და **დოშუხური ტრონიკური** (იხ.).

**დ. სპასტანტრონიკული** - კ. **спазматорганизма** აინიზნება თავის ტვანის მოქმედებით ბრთველებს ღროს. რომელიც წვევის თავის გვირის სტრუქტურულ სტრუქტურის დამზანებელი სემსის დამზანებელი სემსის კონტრაქტორული დარღვევით; გუბელება ეპილეფსი, სუბლურული და ინტერკურულ კემაგომების, პარენქიმული სისხლბაგეების, ვაეროზოლი იმპერიური ინფარტის, გვირის სიმსივნის და ახსივნის, ქალაგვირის გრავების დროს.

**დ. სპეტანტრონიკული** - კ. **гипертангормонизма** დაზიანებულია ატაქსია, ნისგავგი, თავის გვირის ნერვების დაზიანება, სემი-ან გერაპარემა და გერბონებლობის პოპო-ან ხილაგერაღური გამოყარება თავის გვირის დროს დაზიანების უბეში სიმპტომაციის აღმოყენებაზე გუბეები არაქტივება, თვალის კაქლებს მოძრაობა და კორნეალური რეფლექსი მოსპობილია. გუბელება თავის გვირის ხილის და ნათებებს სემეგონის, ბაბილარული არტერიის ტრონიკიზმის, ნათებების იმეშიური ინფარქტის, სიმსივნების და ახსივნის დროს.

**დ. დოშუხური, ტრონიკური ან სპეტანტრონიკული** - კ. **моджауаи, токсикоза или метангормонизма**. გუბეების რეაქცია სნათლებზე და თვალის კაქლებს მოძრაობა მენახულად (ან აღინიშნება **მოთჯამის თვალბებს ფენომენი**), კორნეალური და ხაბის რეფლექსი იწვევა, გეკანეულად გაღიზიანებზე აღინიშნება კილერების მიზანმიმართული მოძრაობა. მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია გამოყარება იყოს თავის გვირის დროს და კილერების ვუნქცია, გუბეების რეაქციის უნარჩუნება მიუთითებს კონის მეგაბოლერ გენეზს. გუბელება ეპილეფსიური გულყრის, სუხარაქოილული სისხლბაგეების, მენინგეიტის, ენეფალიტის, პილაროყუალის, სამეკურნალოწამლი (ნარკოტიკული სამკალებები. ალკოჰოლი, ბარბიტურატები, ბენზოდამპინინები) და საყოფაცხოვრებო ქიმიის ნივთიერებებით მოწამულის, პიპო-ან პიპერეფსიების, იმეშიური ან ში პოქსიური ენეფალიტითის, პიპერკანთის, მიქსელეის, პიპოთერმის, დეიდის და თირქმლის მწვავე უკმარისობის, თიაბის დეფიციტის, გრაველი და ელექტროლიტების დროს.

**დ. ბლუბა** - კ. **амфа (ampha comae)**. თავის გვირის ანოქსიაზა და დარბილებებს შოქლება თან ახლდეს ღრმა კომა, რომლის დროსაც ეგე-ზე აღეარითმა რეგია პრეტეკულად ნორმალური. ამ დელომაროების წვლდება აღგუა კომა. საჭიროა მისი განსხვავება **ზეზღუნდოვანი კომისგან** (comae depressa). ღრმური სისგების, კერძოდ, საგუთლის წილბების შეღიზიანებელი არებების დაზიანებაზე შეიძლება განაპირობოს **დოშუხური კომისგან** (იხ.), რაც აღინიშნება ცხოველებზე ექსპერიმენტის დროს.

**დ. ბალსტარბული** - კ. **отравление амбула-кюмаტიზური** თრამაბის ვარაუდება, განმეორებითი პიპოლიკემიური კომა ვითარდება კომეგონური მეგამაროების ეკსპერიმენტის საათის შემდეგ, რაც უშუალოდ დაკავშირებულია ინსულირის შეყვანასთან.

**დ. შოლაზერბული** - კ. **зурпауаи (ურან, comae depressa) (Molaret P., Gonion M., 1959)**. ხომაგური ვუნქციის შეარჩუნება **ტვანის ხეკვლიანობა** და გვირის შემდეგ მოიწვევა ელექტრული ხელოვნური ენეტიკაციით, სისხლის მიმოქცევის შედიკამენტების ხგმელარებით. ამ დროს სრულად დარღვეულია პერეკსია, გნოსტიკური ვუნქციები, აღინიშნება არეფლექსია, შილრაბი, არ არის უკან რეაქცია, ეგე-ზე - ილიექტრული ბაბი.

**დ. სიგნოლანტრონიკული** - კ. **дншгоаи (დათ. amoclenia-პათოლოგიური ძილიანობა)**, კომეტიზური მდგომარეობაა ხახე, ხასიათდება ცნობარებაზე პურათული დაბნელობით, მისი ნაწილობრივი აღდგენის გრანზიგორული ეპიბოღებით. იოლა ხარისხის კ., რომელიც ხასიათდება მომაგებული ძილიანობით.

**დ. ღვინძილიანი** - კ. **Боардууаи (დათ. comae viride)**. იხ. **პრეპარის პპლური სინდრომი**.

**ქმპასტრონიკული** - კ. **компауаи (დათ. თან-თიად, maculosa-მამაკეური)** მამაკაცთა პიპოზუქუალიზში. **ქმპოცოფი თაბის ტპინისა** - კ. **компаиа мага (დათ. comatus cerebri)**. თავის ტვანის პერყევა ქალაგვირის გრავების შედეგად. მიმდინარეობს ცნობარების დარღვევით (გახრუებიდან სრულ გამოთმეამდე), მენსტიკური სარღვევებით, ასთენიით. მწვავე პერიოდში შესაძლებელია ფსიქოზური აპოლოღები მწვავე გეზოგენური რეაქციის ტიპით. მოგვიანებით ხშირად აღინიშნება შუარი ცერებრალსთენური სინდრომი.

**ქმპანტრონიკული** - კ. **компауаи (დათ. comatus-გაწინაწორება, ანაბლარება)**. 1. ორგანიზმის სისგების, ცალკეული ორგანოების, ქსოვილების დარღვეული ვუნქციის სრულ ან ნაწილობრივ აღდგენა კომპენსაციური მექანიზმების ხარყზე. ფსიქოპატრონიკული 1-ის მექანიზმზე სუბელსაბა ფსიქიკური პათოლოგიის ფორმების შესაბამისად. მაგ. თავის გვირის ორგანული დაზიანების დროს კ. დგება ვუნქციური, მექანიკური დარღვევების გამოხატულების მექანიზმების შედეგად. მოუკერი თავის გვირის დაზიანებაზე ნაწილებს უკარული მოქმედების ხარყზე. მიმოგრენის დროს კ. შილწევა ნივთიერების კონტრაქტორული პრეპარატების ანგეფსიქოზური მოქმედებით და სოყალური-პროზოტი რეაბილიტაციის ღონისძიებების გეგარებით; **ფსიქოპათია** დროს კ. სოყილური ავადგაყის შედეგია, რომელიც დგება გარე პათოგენური ფაქტორების ნივთიერების შედეგად და არაიშვიათად ასაკორივი კონის გეულს შემდეგ. 2. ფსიქოლოგური თვალბებს ვერ-რთი მექანიზმით, სპეცილებს ილბევა ცნობარად ან არაინბოტრად შემოტრენს დაძაბულობა, რომელიც ილბევენდება ერთი მიზნის მიღწევის შეუძლებლობის დროს, მასი შეუილეთ შეთრეფი(ბიზნის სუბტანყია). ერთი მუპიისის პერიოტი ჩანაყვება ადამიანს ანთაოსულებს საკუთარი არასრულფასოვნების, უუნარობის აღიარებისგან.

**ქმპალემპი** - კ. **комплекс (დათ. complex-კეშირი, ერთობლობა)**. 1. შესაბამის ან ასოცირებული ფსიქოტროპის ვეფუე. მაგ. სიმპტომა ჯგუფი, გაერთიანებული სიმპტომთა კომპლექსის, სინდრომის ცნებები; 2. ფსიქიკების ფსიქოლოგიაში: შვიდრად დაკავშირებული ზოციტების ჯგუფი (Müller G.E.); 3. ხანთიან ცნებაა ფერბობით შეფერილი წარმოდგენების კომპლექსი (Zichan Th.); 4. (ერმ. Komplex). ფსიქიანალიზში: ჩიწლობარე ან ძთიანად არაინბოტირში არსებული ანეგტიკურად დეგირთული წარმოდგენების და სოციონების ორგანიზაციული ერთობლობა. კ. მენდელს ბავშვობის ასტორის პიროვნებობის ურთიერებებზე შეუძლია არეგულიროს ფსიქიკის ყრთა და ბიბე - ემოციები, განწყობა, შეგუებით ქეეეები და სხვ. ცნობარის შიერ დათრეგნული ან გამოსდენილი ასოცირებული ემბოტიური მნიშვნელობის იდეების და იმბულსების ჯგუფი, რომლებიც კონფლიქტშია "გო"-თან და

(ან) "ზუპერ-ეგო"-თან. ცნება პირველად შემოღებულია ფროიდის და ბროიერის (S. Freud, E. Breuer, 1895) მიერ ისტერიაზე მუშაობის დროს: შეპლევ დაბუშაბებულია როგორც ორთოდოქსულ ფსიქოანალიზში, ასევე ეუნგის (C. Jung) სკოლაში.

**დ. ანტიტრანსი** - *კ. Антитеза*. უღირება ფიგურას გაუცნობიერებელი ხეშუაღური ლტოლვით შამის მიმართ. ძველებერძული მითოლოგიის მიხედვით, განდევნება ოიდიპოსმა, რომელმაც შეიწრო საკუთარი დანამაული და აისის გამო დღითხარა თვალზე, დაიღუპებოდა, თუ არა მისი ქალიშვილის ანტიგონის სიყვარული, რომელიც რჩებოდა ვეცხა შამის. განხილვება როგორც მოგიერთი ფორმის ნეეროზის და პერვერსიის მიხედვით.

**დ. არასრულ შესრულებასა** - *კ. неопиоженности* (გერმ. minder Wertigkeitstkomplex). ფსიქოანალიზში: არასრულდასრულების განცდა და მასთან დაკავშირებული რეაქციის შენიღბული გამოხატულება განწყობისაში, წარმოდგენებისა და ქვეყნებში.

**დ. არასრულ შესრულებასა** - *კ. უპირატესობასა* - *კ. неопиоженности* - *კ. превадство*. *კლდეობის დეკლარაციის უმარცხველი* (იხ.) ორი თანხლები ალტერნატიული ცნება; ორივე წარმოადგენს მყარ და არადაეკავებურ საშუალებას უფლები ადამიანისათვის დამახასიათებელი არასრულდასრულების განცდის დასაძლევად. ნეეროზიზმი დაუძლვლებს ბაჟის დროს სუბიექტურ გარბის ცხოვრებისეული სინდრელების დაძლევას აუცილებლობიდან და ცლილობს თაიდან აიცილოს იგი. ამ დროს ავადმყოფებში დომინირებს აზრები საკუთარი არარაობის, უუნარიობის და უცლახებ, რასაც იგი არ მალავს გამოუმოყოფიდან. ე.უ. განსახლებერება ავრთვევ არადაეკავებური პოზიციიდან, ასევე განსაზრების რთული პრობლემების გადაჭრის აუცილებლობიდან, მაგრამ ამ დროს პიროვნება ახდენს საკუთარი მასშტაბების უზღოვრობის დემონსტრირებას მოქმედებას სხვა სფეროებში. ხამგამულია იმპორტირებული პრობლემების აარარაობა. ეს არის თავისებური პიკეტოპენსიის შექანშიში. ადლერის (A. Adler, 1920) მიხედვით, არასრულდასრულების განცდა დამახასიათებელია ბავშვის განვითარების მთელი პერიოდისთვის, იგი შეიგრძნობს თავის ინადაეკავებრობის მშობლობს და გარე სამყაროს მიმართ. ნეეროზიზმი დაავადებულის მიერ არჩეული ბაჟის განსახლებრის მეთოდი განაპირობებს მთელი მისი ცხოვრების სტილს.

**დ. ბრძანებულება** - *კ. Исполнение*. ვლადებება შამის სურვილით, შეანარჩუნოს საკუთარი ქალშეგალი და უარს ეტყება ყველა მითხეველს. შამის ასეთი სახის ინტესტური ლგოლება ქალიშვილისადმი განხილვება როგორც ოიდიპოსის კომპლექსის მოციანებით ფორმა, რითაც იყვლება შამაკის ლგოლება საკუთარი ღელისადმი. ტროსტლად - *ჯ. ბოკისის (დეკაპტერიონა)* გმირი, წარმოადგენს ქალური სიკეთის და უსახლერო მოთბინების განსახიერებას.

**დ. დანახვა** - *კ. Духовная адаптация*. ვლადებება ფიგურას ღმირის განვითარებაში, ხანაათვება ქალბის სურვილის გრეხებით. ფსის შამაკიც. როცა გოგონა აღმოაჩენს, რომ მას არ აქვს პენის, აშბს ღებულობს როგორც სასურელს და უნდებდა მური ხიჯის მიმართ. განხილვება როგორც ნეეროზული მდგომარეობების და მოგიერთი სახის პერვერსიის მიხედვით. დანა (ძველებერძული ქალბიობის არგუმენტის ძველროშული სახელი) - ქალბერთი - მონადირე, რომელსაც უქონდა მამაკაცური მისწრაფებები და არაუთარი ინტერესი საწინააღმდეგე სქესისადმი.

**დ. ელექტრისმი** - *კ. Элекрия* (გერმ. Elektra-Komplex). ოიდიპოსის კომპლექსის გამოვლენება ქალში. ვიციევენს როგვე სქესის ბავშვების სიმეტირულ დამოკიდებულებას მშობლებისადმი. აღმოყენლება გოგონის ღმირიანი განვითარების ერთ-ერთი ეტაპზე, ხანაათვება სიძლეულით ღელის მიმართ და სექსუალური ლგოლებით შამის მიმართ. ულვეტრა - ძველ მითოლოგიაში მეფე აგამემნონის და ღელოფალ კლიტემნესტრას ქალშეგალი. შან დაარწმუნა საკუთარი ძმა ორესტო, რომ მათმა ღელამ და მამინაცვალმა მოკლეს აგამემნონი და აიძულა მური ექია მათზე. სინონი: *მალშინ გოგონაში* *ოდისპეოსის*.

**დ. იმპოსტისმი** - *კ. Иллюзия* (de Sansurre R., 1920). ვლადებება ღელის პათოლოგიური ლტოლვით საკუთარი ვაფის მიმართ. ოკასტა - ძველებერძული მითოლოგიის გმირი, რომელსაც შეუყვარდა საკუთარი ვაგი ოიდიპოსი. *მ. ჯ. დიდებროსის*.

**დ. კანონი** - *კ. Канон*. დამყარებელია შურზე მებბს შორის. ხიხლიური კანონი, ადამის და ევას უურისი შეილი, მოკლა საკუთარი ძმა აბელი შურის გამო. ე. ე. განხილვება როგორც ერთ-ერთი შეილის მიერ მშობლის სიყვარულის უგაღებარეყოფა. ფსიქოანალიტიკოსების მიერ ინტერპრეტირდება როგორც ნეეროზის აღმოყენების მიხედვით.

**დ. კასტრაციონული** - *კ. Икастрация* (გერმ. Kastrationkomplex). დაკავშირებელია ბავშვთა კასტრაციულ ფანტაზებთან. ბიჯს ემინა, სექსუალური აბეტიობის გამო მას დასვის მამა და მოაჭრის პენისი. გოგონა, რომელიც აღმოაჩენს, რომ მას არა აქვს პენისი, ოტნებობს ადაღებროს იგი. ეს ფანტაზები აღმოყენდება ბავშვის მიერ სქესის გარჩევის შემდეგ და მჭირროდა დაკავშირებული ოიდიპოსის კომპლექსთან.

**დ. კანონიზაციონული** - *კ. Канонизация*. იხ. *მალშინდროსის სინდროზი*.

**დ. ვასტისმი** - *კ. Väterkomplex* (გერმ. Vaterkomplex). ოიდიპოსის კომპლექსის ერთ-ერთი ასპექტი, გამხიხბაველი იმპიუალენური და მოკიდებულებით.

**დ. ვაშტისმი** - *კ. Матриальная*. ხანაათვება ღელის მისწრაფებით, მოკლას საკუთარი შეგლები და ამით ხამაგიერთი ვადებულის ქანის. ძველებერძული მითოლოგიის თანახმად, კოლხეთის მეფის ასული მედეა დაეხმარა ისოსს და არაყინავეებს ხელში ჩაეგლით ოქროს სწიშის და ისოსთან ერთად გაიქცა საბერძნეთში, მაგრამ ისოსმა იგი მოაკვება და დაქორწინდა სხვაზე. მედეა არ დასჯერდა მეტეის მოწმულებას, შან მოკლა საკუთარი შეილები, რომლებიც სკავებდნენ ისოსთან.

**დ. ოდიპოსისმი** - *კ. Эдип* (გერმ. Oedipuskomplex). ხანაათვება ღმირიანი ლტოლვით ღელის მიმართ და არაეკოლოგანწყობით შამის მიმართ. ფსიქოანალიტიკოსები განხილვენ ოიდიპოსის სიგუების (ოდიპოსური განაშთგონა) როგორც პიროვნების სექსუალური განვითარების გარდაუვალ სტადიას, რითაც მოციანებით ბავშვობის პერიოდში ბავშვს საკუთარი უნერვების ნაწილს გადააქვს სქესობრივ ლგოლებაში მშობლების მიმართ. ფროიდი (S. Freud) ე. კ. განხილვება როგორც ნეეროზების ძირითად იდეას, ბავშვთა სექსუალისმის უკლებინაქის. ნეეროზი კარხილვება როგორც ღმირის რეგრესია ინფანტლური სექსუალობის ერთ-ერთი სტადიაზე. ცნება ე. ო. ვრეკლებით ყველა ფსიქური დაავადებზე: შავ, მის განივლენებად ითვლება მიმოვლენით დაავადებულის მტკიულება, რომ იგი არ არის საკუთარი მშობლების მივი, მისი ღელა - მისი ცოლია, მისი და-ძმა - მისი შვილები და ა.შ. ოიდიპოსი - ძველებერძული მითოლოგიის გმირი - მოკლა ფიქანის მეფე ღაბი, არ იყოლა, რომ იგი იყო მისი შამი, დაქორწინდა

საკუთარ დედამე და ხელთ იგრო ფიანის გახტი. არჩევენ პოზიტიურ და ნეგატიურ ფორმებს. ზოზოტიური ფორმის დროს კომპლექსი ვითარდება ისევე, როგორც ოლიგოზის ისგორია და ეპიზოზიგება მუგოქის სიკეილის სურვილით და საწინააღმდეგო სქესის მოზღლის მიზარი სესკაღური მისწრაფებებით. ნეგატიური ფორმის დროს - ეს არის სიყვარული საკუთარი სქესის მოზღლისაში და ევზიანი სიძულელი საპირისპირო სქესის მოზღლისაში. კ. ო. წარმოადგენს პიროვნების სტრუქტურის და მისი სურვილების ფორმირების საფუძველს.

ბ. **ორნიტოსი** - კ. Орнита ელინება დათრეწული ან არაფინობიერი სურვილით, მთკლას საკუთარი დედა ბ. ბ. **კლავტრასი**

ბ. **პაპოსი** - კ. Папос ამასიათებს მაპაკეებს და გლანება სურვილით, თვის საკუთარი ბიზუა. დაკემირებული იმასთან, რომ შობალები სიხერეში სულ უფრო აგარაელებთან. აქედან - სურვილი, იღვს მამაზე შაღდა. ინტერპრეტაცია სხვადასხვაგვარია: მიუთითებენ დამოკიდებულებას ბ.კ-სა და გერონტოლოიას შორის; ჯონზის (E. Jones) მიხედვით, დაკემირებულია ინტეგრირ სურვილებთან.

ბ. **ფერასი** - კ. Фераს ელინება იღვს სექსუალური ღვლოლი საკუთარი გაეხ მამართ. განიხილება როგორც მოვიერთი ნეუროზული დარღვევის და პერვერსიის მიხით. ფერა - ათენის მეფის გესეას ყოლი, რომელსაც ყვარდა თვისი გერი იპოლიტი. ეს მითი სხვადასხვაგვარადა ინტერპრეტირებულ ვერიაშიღს, სხეეას და რასინის ამავე სახეწოლების დრამაში.

**კომპრესია ტამის ტიონა** - კомпрессия талионата იბ. **შეწულა ტამის ტიონა**

**კომპლემენტი** - комплемент (ლათ. complere-ვაიბულებ). 1 აკეატიული ღვლოლი, აკეიბებული პოელები (ობსესიონი) სხეე. დამასიათებელია დელოეული ღვლოლი, რბოლები აღმოეწებება გონის, ნების, გრძობის საწინააღმდეგო. არაიშვიათად ისინი ავადმყოფისთვის მუღებელა, ეწინააღმდეგება მის მორალურ-ეთიკურ თვისებებს. იმპულსური ღვლოლისგან განსხვავებით, კ. არ რეაღმდება. თე ავადმყოფის მიერ შეიწმობა როგორც არასწორი, ხლებ მამეე განუღის საგანს და მასში იწევის მიმის გრძობას. 2 უფრო ვართი გაგებით - მოძრაობითი სფეროს ნებისმიერი აკეატიუბულობა. მათ შორის აკეატიუბული რბოაღმდებუ.

**კომპენსაცია** - компенсация (ლათ. compensare-ეუართინებ, ეაბოაღებ). სოციალური ურთიერთქმედებას აზრობრიფი ასეუქე. რადგან ყოელი ინდივიდუალური მოქმედება სრულება სხვა ადამიანებთან პირდაპირი ან არაპირდაპირი დამოკიდებულების პირობაში, იგი მოიყვას კომპენსაციურ ასეუქეს. მოქმედებას, რომელიც ვაგნობიერებულად არის ოპოზიციურებული სხვა ადამიანების ამრობიერ აღმამე, უწოლებენ კომპენსაციურ მოქმედებას. არჩევენ კას პრთ-ეებს და მის შემადგენელ ბქტებს. კომპენსაციური პროცესის ძირითადი ფუნქციაა სოციალური ერთიანობის ინდუქცია თითოეული მისი ელემენტის ინდივიდუალობის შენარჩუნებით. კის ეალეული ბქტებში რეაღმდება მართვითი, ინფორმაციული, ემოციური და მეტეველებითი ფუნქციება.

**კომპორტი** - компорт (ინგლ. comport). სუბიექტისთვის მაქსიმალურად სასიამოვნო გარეგანი და შიგა პირობების, მათ შორის ფსიქოლოგიური ფაქტორების კომპლექსუა კის მდგომარეობაში არ აღიზნება ორგანიზმის ფსიქიკური და ფიზიოლოგიური ფუნქციების დაბახულობა. კ-ის ვრძობა მნიშვნელოვნადა დამოკიდებული კომპლესამის მდგომარეობაზე.

**კონდაშის რესტრუქტური ფსიქოთერაპია** - Кондаша дивергентная психотерапия (Konkdas O., 1969). იბ. **შეძირვარება დესტრუქტორი**

**კონდაშის მეთოდია** - Кондаша методика (Konkdas O., 1973). ექსპერიმენტულ-ფსიქოლოგიური მეთოდიკა სხვადასხვა კონკრეტული სიგუაციის სუბიექტური უსიამოვნების ხარისხის განსასაღვრავად. გამოსაკლეეს აბლევენ 31 სურათის სურათს, რომელზეც გამოხატულია სხვადასხვაგვარი სიგუაციები და ობიექტები, რომლებიც მასში იწევის უარყოფით ემოციურ რეაქციას. სპეციალური სკალის საშუალებით გამოსაკლევი განსაზღვრავს მიმის ემოციის უსიამოვნების ხარისხს, რომელიც მასში აღმოეწებება აღქმის დროს. სინონ: **საბაზ სრეაბლურში ხმტკასობრი მფრეშამის და შეშისა**.

**კონფლიქტის რესტრუქტურული ფაქტორები** - კонфликтный факторный анализ (ლათ. conflictus-პრობითი). რიც ქვერებში მათეოეაისა და შედგენაში გავრცელებული ფაქტორული მონიტორინგური მანდარეობა, რომლის თანახმად, მემების ცნება იყლებს მანსარნი მნიშვნელობის პირობების კომპლესის ცნებათ. ამით ნიეღორება ობიექტური მიზეზ-მულეობრივი კავშირის მნიშვნელობა. კოთხის ქვეე დეება დაეალებს ობიექტური მამების ძიების აუილებლობა, ეტოლოგიური ფაქტორების ნაყლად მესწელებს პირობების კომპლესებში. კ. მნიშვნელოვან განმარტობებს ეტოლოგიური მომენტების განსაკრებით ენლოგურის როლის უარყოფას, ანტირობოლოგიურ გენდრეებას. კის პოზიციადან ცნება ნოროლოგიური ფორმების წარმეებლობას, რადგან ყოელი შემთხვევაში დაეალებს განსხილება როგორც მრავლობითი პირობების გარე და შიგა ფაქტორების გარეურობებულ კომპლესების მუღე. კის კონსუაა აბლო ე. წ. მათეადმეათანადურ დანონტკატთან.

**კონფერია** - конферия (ლათ. confersio-მეუცება) (Freud S., 1895). ფსიქიკური გრამეს მინასრისდან აუქტური რეაქციის მოკლეეა და მისი მიმართება სხვა მიმართელებით. აკეუბაკ (A. Jankushk, 1979) მიხედვით, შესაბუნებელია კის ხამი ვარანტე: 1. კ. წარმოადგენს თეადეის საშუალებას მიმისგან, ფსიქოლოგიური თაედაცება შექმნაში. 2. კ-ის როლის სხვაა "ფსიქიკური ენტრეობა" (დესაბლ) გარდკემა სომეგურ სინდროში ან სიამეში. 3. კ. ელინება ხომეტური სანდრემების ან ხამეტრემების ხამიღნეაფითად და ასახავს მისი საუბულის შინაგან კონფლიქტს. თე გათივადრისნიეხი მსოქთანადიზური კ-ის ცნების ვართი დაეაშობს და შეეფოროლეობას. აკეუბაკ ან გერმინის ნაყელად გვაწეებს "გრძობით-მოძრაობით სფეროში ბქტრული დარღვევის" ცნებას, თუქეს ეს უკანასკნელი აფირრების კის ცნებას. სინონ: **რამამტა ბრეშრისმული, ბრეშრისმის მტბრეული, ბრეშრისმის ბრეშრისმული, ბრეშრისმის ბრეშრისმული**.

**კონფერია მტბრეული** - конферия мтбрелуа იბ. **ბრეშრისმული**

**კონფერიატორი** - конферентолог (ლათ. confertus-გამოზრეული). დაკემირებულია თაეხ ჭილას მათთან. მკე. მეხადის წილის კონფერიატორი მეგანობი.

**კონფერენცია** - конференция (ლათ. confere-კრეწხითა). პრეპარატა რომლის ორგანიზში მეუცაა იწეება კრეწხეებს, ძირითადად ეპილეუსურს (პენტეტარაზოლი, ბემეგრიდი, სტრეინინი).

**კონველსიზმი** - конвельсизм (ლათ. convellere-შერყევა, შეზღერევა) კლონური გრუნტიზა, რიხელიე მითიყას ქერითა ღელ ჟეაუესი. მკვ. ეპოლეუსიოი ან ელეტროკრუნხიოთი გულერის ღერო.

**კონვოლუსი რაზმორეპეზი** - конволюс репееза (Conolly J., 1794-1839). ფსიკიატრიული სააადამიოიოიებში შეუზღედადგობხ ხახტამხ შუიფლი. კერძოდ, სულთ ავადმყოფთა შოლის პროესში ასეთი მექანიური საშუალებების გასოყენების აერსილა. როგორიყა ავადმყოფის დაბხა საწოლმე, დამპორხნაღებელი პერანგი და ა.შ.

**კონვალსი რაღვრეპიი პარეპტიმნილი პრეტენსიბაღისა** - Конвалс редукция эпертментов похемияна (Conrad K., 1958). იხ. **პარეპტიმა პარეპტიმალე პრეტენსიბაღისა**.

**კონვალსი სიპიტოპი რესპირიბისა** - Конвалс сипитом дыкхури (Conrad K., 1949). იხ. **რესპირიბისა**.

**კონსილიუმე** - консилиум (ლათ. consilium). ერთი ან სხუაღსხუა საეკილიბის კვალიფიკირებული სპეციალისტების დაბაბარ დეკლარაბის დახაზუტებულად, ოპტიმალური შეკრახლობის დანიშების და პროგნოზული შესაძლებლობის განამარტობისოიის. კ. მედიკულიბისი იელხ კლინიკურ და ღებორაგორიულ გამოკლევებს, განსაღებოდავ აუთილეული გამოკლევების მეთოდიხ. ფსიკიატრიაში კ. წყვეტს ავადმყოფის იმელებითი პოსიტივიანი მაროუბელიბისა, სტაციონარში მოთაყენების, სოციალურად სამშრომლის, აგრეთვე შეკრახლობის შემდეგ სააადამიოიოდან გაქერის შესაძლებლობის საკითხს.

**კონსილიუმე** - консилиум (ლათ. consans (consensus)-შეღმივი). ფსიქოლოგიაში: ობიექტის ოღსაქმელე მხახსიათიბელს შუღარხითი დამოკლებლობა გრმობითა ორგანოების რეუქტორული შუღაბისის გაღმიანების პარამეტრებისგან. ობიექტის დახაზული მომხის კ. ეღინაღება იმეგარად, რომ დამკვირვებლის შიერ აღიქმება სიმორის შეუღეს ღერის.

**კონსილიუმე** - консилиум (ლათ. თი-ერთიად, შესაფარსკლავი, ასკროლოგიაში: ვარსკლევების ურთიერთგანღავება სახე) თანარხებულე ფაქტორების ურთიერთქმედება, რომელიც გაღვენახ ახღენს წარმოღვენის სიმღინარეობის ხახსიათი. ფსიქიური კის კონსილიუმე ავგორი ტენი (Th. Ziehen) თელიდა, რომ წარმოღვენის სიმღინარეობა გამოწვეულია ვარს (ავტორეგული) წარმოღვენის ასოციაციური კავშირების ხარისხით, მათი ინტენსიოობით და ბოლის, კონსტელაციით. განღმიანებულე რეაქცია დამოკლებლობა არა მარტო გაღმიანების, გაღმე არაღმე სუბიექტის მელეომარეობაზე, გარკვეული ასოციაციის გამოღვენაზე მოქმედებს დამატებით ასოციაციის ორგანოების წინა ან ამჟამინდელი მდგომარეობის მიხედვით, ერთი და იგივე გაღმიანებულე შეიძლება გამოიწვიოს სხუაღსხუა კონსილიუმე, კის ასოციაციური ტენენციების არეპაბისად. ამამი მდებარეობა როღს ახრკლებს როგორც აბლო წარსულის, ასევე მოკლეული ასოციაციები.

**კონსტრუქტივი პლაპსიბისა** - конструктивный психизм (ლათ. constructiv-ავება, ორგანიზაცია). ორგანიზმის შორეოლოგეფორა და ფუნქციური თაყახებურებებხს ერთობლობა, იქმნება მეშვეიღერეობის საუფქველმე და გარემოს ხანგრძლივი გაღვენის შედეგად. კონსტრუქტივის ტიპოლოგორი ვარსიანები შემუშავებულა აღნაგობის ფორმის და რიგი ფუნქციური ნიშნების, მათ შორის ფსიქიურის საუფქველმე.

**კ. ბიოქიმიური** - к. биохимическ. სინონ.: **კ. ბიოქიმიკონსტრუქტივი**.

**კ. კსიქიკონსტრუქტივი** - к. психическ. აბიფორაი აღნაგობა მოხაგებული აბნებულობით და ფსიქიკის სისუსტით, საკეთორ თაყი დაერწმუნებლობით.

**კ. გენეტიკონსტრუქტივი** - к. генетическ. იხ. **ბიოქიმიკონსტრუქტივი**.

**კ. რესპირტორი** - к. респираторн. იხ. **კონსტრუქტივი პლაპსიბისა პარეპტიმალე**.

**კ. რესპირტორი** - к. зношитель (Dyrup E., 1910). გამოყოფილა განიხაგული ფიოციური ღაბლობის ნიშნით. შეესახაბება ურბებს ფიციური (რეაქტიურ-ღაბლობური) ფსიქოპათია (Лавушова П.Е., 1933). ფიციური (აფექტიურ-ღაბლობური) ტიპი პარეპტივის აქტიურეგული (Leonhard K., 1968). დამახასიათებელი ნიშნები: მუსკლა, გუკის და კანის რეულესების გახსობებება; ღიუზური და ყუაღებელი სენსორული პიპერესთეზია; მოძრაობითი და სერეგორული რეაქციების გაქერსაწერებლობა; შინაგანი ორგანოების და სხხლმარღეთა სამშებლობის აღმი ტენენციი; სხუელის, ცაქრღილი ხელების კახკალი; ფსიქიური პიექტების, ფიციების არაშორმალური ინტენსიოობა და გაქრეკლება.

**კ. რესპირტორი** - к. зухотворная (ბერძ. - თეხმ-შეღერებება) (Maue F., 1937). აქტიფიური კის სახე, რომლის ღეროსაც წინა ჰღანეა პერსექტრეის და სხხლანგის მოვლენები.

**კ. პიოქსიკონსტრუქტივი** - к. психическ. იხ. **კ. მატაქსიკონსტრუქტივი**.

**კ. მატაქსიკონსტრუქტივი** - к. матаксихическ (Maue F., 1937). ეღლეფობიღური კონსტრუქტივი, განიხილებოა როგორც ეიღლეფსორი პერერესხასადე წინაღენწყობის გამოინენება. კ. თის ვარიანტი, რომელიც ხახსიათებუა პიროვნულ ხანგმში გულეფერეობის და ახეპრობის დომინირებით, გამოყოფილა როგორც ენექტიური კონსტრუქტივი. ელეფერებისადმი წინაღენწყობა - აქტიფიური ღაბთიში. თან ახლავს ათლეგურ აღნაგობას. სინონ.: **კ. პიოქსიკონსტრუქტივი**, **კ. პიოქსიკონსტრუქტივი**, **კ. მატაქსიკონსტრუქტივი**, **ბლენფორმობა**.

**კ. მაროუბიკონსტრუქტივი** - к. марочный психизм იხ. **კ. მატაქსიკონსტრუქტივი**.

**კ. კუპოქსიკონსტრუქტივი** - к. кучупсихическ. დაბახსიათებელია კანქეემა ციბოფანი ქსოვილის ჰვარხი ვანეთორება და ელეფერ-კუპუნების დაეაგებების (ხანღრობის) მსგავხ გარერეობა.

**კ. მატაქსიკონსტრუქტივი** - к. матаксихическ. დამახსიათებელია ევგეტატიური დარღვევების, ნეუროზული ასთენიური მდგომარეობების, ასევეული რეაქციების, აწული სენსიგორობის თლი ღაბოყენება.

**კ. მაროუბიკონსტრუქტივი** - к. марочный психизм აღნაგობა ფსიქიურ განწარმორებულობასთან, ათლეგურ რეაქციობთან, საკურ თაყი და შესაღებლობებში დარწმუნებლობასთან, საკმაო სებაბიურ; ურბებაღმწყობისადმი ერთად.

**კ. პიოქსიკონსტრუქტივი** - к. психическ. იხ. **კ. მატაქსიკონსტრუქტივი**.

**კ. სპაქსიკონსტრუქტივი** - к. спехическ. იხ. **კ. მატაქსიკონსტრუქტივი**. სინონ.: **კ. რესპირტორი**.

**კ. სტრუქტივიკონსტრუქტივი** - к. структурный психизм (ბერძ. structo-შეღერებელი, უძრავი, thymos-გუნება-განწყობა, გრმობა). დაბახსიათებელია სეროზულობა, შრომისსიყუარეობა, პერანგეობა. აქვს მიღრეაიღებება ენლიგენურს მობოიოღარული ღებრეხისადმი. იხ. **პლაპსიბისა რესპირტორი ტიპი პარეპტიმალე**.

**კ. შიღრეკონსტრუქტივი** - к. шихическ. დაბახსიათებელია შიღრეკების ატკის ტენი მამაროულეობა, რაციონალიზებისადმი შიღრეკიღებება, ეფსიური მონოგირურობა. აღნაგობა ღებგისიფური ან ღიხლაიფური გიპით. კ. შის იწიშენულიყანა ეაზობაგვლებს ღერის ღაბარაკიბხე შიზოპათიაზე (Bleuler E.).

- d. (ნიპლოიდური კ. შიკლიძისა. მაქნიური აღნაგობა და ხასიათობრივი მერყეობისაძირ ტენდენცია. დამახასიათებელია ციკლოთიმიტი და მღვითი დაეიდებულათი.
- ბ. პიპარსონიერი - K. Ruxtonianian დამახასიათებელია მაქნიური აღნაგობა, მიკროთიშიური, მღვითი სინგონიური და ენერგიულია. სინონ: ბ. პიპარსონი.
- ბ. პიპარსონიერი - K. Ruxtonianian (Kleist K., 1913). წინაგონება ბოლოთი ფსიქოზებისა. დასაწყისში გაებული იყო როცირე წინაგონება მხოლოდ მხოლოდური პარანოზისა. დამახასიათებელია პიროვნების ისეთი პრეპარატიული ხაზები, როცირეა გამომიანებლობა, ადვილად წყება, უნდობლობა.
- მონსტიტუციონალიზმი - конституционализм (ლათ. constitutio-დამყარება, მოწყობა, ორგანიზაცია). მმდნარება მედიცინაში, დაეიდების აღმოცენებასა და მიმდინარეობაში ძირითად მნიშვნელობას ანიჭებს ორგანიზმის კონსტიტუციურ ფაქტორებს და არ ითვალისწინებს ბიოლოგიური და სოციალური ფაქტორებს როც. დაეიდება განიხილება როცირე მედიცინაში გადაცემული გენოტიპის არასრულფასოვნების შედეგი.
- მონსტიტუციონალიზმი სინკლამი - конституционализм гниоты (Глушак П.Б., 1933). ფსიქიკის თანდაყოლილი შეზღუდვლობა, რომლის დროსაც ინტელექტუალური დონე არის ნორმასა და ფსიქიკური პათოლოგიის მდგომარეობა ადამიანები ევგენიკის მხოლოდ სახლის პირობებს და იღვივებს შატეირალიური კეთილდღეობისათვის. ზრავ შექმნევაში ადვილად ითვისებენ შრომითი ჩვეულებს - შეუძლიათ შატე, ვიღვე იყინ. ცნება ახლოა ფონოლოგიურ ხიხულელებთან (Bilikiewicz T., 1960; Lemke R., 1960); ხალხურ ტუეახსტობასთან (Hoche A).
- მონსტიტუციონალიზმი ტანოლოგიამ პრეპარატი - конституционализм типологии Крешера (Krauscher E., 1921). დამყარებულია კორელაციამ ავტორის მიერ გამოყოფილ აღნაგობის ტიპება (პიქნიური, ლანგსომური, ათლეტური და ისინიანიური) და ფსიქოლოგიურ კონსტიტუციას (მიზილიური და ციკლოიდური) შორის. განსხვავება ნორმისაგან მიზიტიშიურ და ციკლოთიშიურ ეარანსებას, ფსიქიკის მიზილიურ და ციკლოიდურ ფორმებს, და მიმოურენებას და ციკლოიდურ ფსიქიკის შორის, კრეშერის მიხედვით, განისაზღვრება რაოდენობრივი კრიტერიუმების საშუალებით. მედიკოში ფსიქოპათიის სისტემატიკა კრეშერის მიხედვით, შეესაბამება ეპილეფსიული ფსიქოპათიის, გლანოლიდის გამოყოფით (Minkovska F., 1923, 1925).
- მონსტიტუციონალიზმი ტანოლოგიამ პენდენი - конституционализм типологии Пенде (Pende N., 1912). დამყარებულია კორელაციამ აღნაგობის ტიპს, ენდორინული ფორმულას და ნერვულ-ფსიქიკურ რეაქციონების თავისებურებას შორის. ავტორი ფსიქიკური თვისებების მიხედვით გამოყოფს 4 კონსტიტუციურ ტიპს: 1. აგნებადა, აფექტური, სწრაფი, მოძრაობა, ანტიკლექტულიად ნიჭიერი; 2. ფლეგმატიკური-დენერგულიად; 3. აქტიური, აქტიული, აქტიული, ნიჭიერი; 4. უნდობლივი, ზოგჯერ იმპულიური, ხაზოლი ანტიკლექტული.
- მონსტიტუციონალიზმი ტანოლოგიამ შელდონი - конституционализм типологии Шелдона (Sheldon W., 1940). დამყარებულია ანთროპომეტრიულ გამოკვლევებზე თანფარლობაში ემბროლოგიისთან. წარმოადგენს კრეშერის იდეის შემდგომ განვითარებას. შედგობის მიხედვით, იგი შეესაბამება კრეშერის მიერ გამოყოფილ ტიპებს: ენდორინული-ბიქნიური, შრომითი-ფილიური, ეგზოტიკული-ბიქნიური.
- მონსტიტუციონალიზმი მეთოდოლოგიამ აქტიური-პროტეინური - Конституция метод активной и протеиновой (Конституция СИ, 1930). დონსტიტიზმი ერთობლიობა, მმართულია ავადმყოფური მოვლენების თავიდან ასაცილებლად ავადმყოფის მოქმედების გააქტივების ტიპით. შრომითი მოქმედების პროცესში ავადმყოფი იტენ ახალ გამოკვლევებს, რაც ხელს უწყობს ფსიქიკური დარღვევის კომპენსაციას ავადმყოფური რეაქტიის დადევნაში ურადებას ქვეყნა ავადმყოფის საფაროსთან დამოკიდებულების კორექტივებს, რაც თავის მხრივ გადუნებას ახდენს მის ინტელექტსა და ემოციურ სფეროზე ანუ მის მსოფლმხედველობასა და სამყაროს შეცნობაზე. შეცნობის აქტივობის კონსტიტუციონალიზმი, შეიძლება დაეასკნება, რომ მოგორულ-განწყობითი სფეროს ეარქიზით და აღმრდით ფსიქოთერაპეტიკო მოქმედებს ცნობიერებაზე.
- მონსტიტუციონალიზმი პრეპარატიზმი მონსტიტუციონალიზმი პარა - Конституция протипологическая чувствительная типа (Конституция СИ, 1940) იბ. პარა პრეპარატიზმი მონსტიტუციონალიზმი.
- მონსტიტიზმი - конституционализм (ლათ. constitutio-შერევა). რადენამე სიტყვებს ნიჭილებს შეერთება. აღნიშნება ნორმაში ამ სიტყვების ამობორივი და ფონეტიკური სისხლოის დროს და პათოლოგიაში - მიმოურენიული ნეოლოგიზმების დროს და პარაფიზიური დარღვევების ფარგლებში.
- მონსტიტიზმი - конституция (ლათ. constitutio-წვევება, ერთიანი). პრეპარატიზმი, განუყოფლობა, უწყვეტი ერთიანობა.
- მონსტიტიზმი შინოფრენიული დარღვევებისა - конституция шизофреническая расстройств (Koeher G., 1979). შინოფრენიის სიმპტომისა სანი კვლევა, წარმოადგენს შინოფრენიის პარეფლ რატეს სიმპტომთა ფუნდამენტოლოგიის მილიეკაციას (კონსტიტუციის მიხედვით სიმპტომები განლაგებულია მათი განვითარების, დინამიკის ხასიათის შესაბამისად).
- ბ. გრედიტი - K. Ruxtonianian 1. ბოლოთი გუნება-განწყობა; 2. ბოლოთი წარმოადგენება, დაეიდებელი აღქმისთან ან პროყოფიერებულია მათ შორე; 3. ბოლოთი აღქმა.
- ბ. შინოფრენიის, ბაგსონობის, ბაგსონობის, ბაგსონობის - K. Ruxtonianian, отуждения, ослабления 1. დაუფლებს შეგრძნება; 2. შეპიქმელებს ზოგადი შეგრძნება; 3. შეპიქმელებს სეციფიკური შეგრძნება; 4. გარე შეპიქმელებით ხეკუთარი ცვლადობა შეგრძნება; 5. საკუთარ თავზე შეპიქმელებს განცდა საკუთარი აზრების დეცლითი შეცვლას შეგრძნებაში; 6. საკუთარი თავზე შეპიქმელებს განცდა საკუთარი აზრების და გრძნობების დაკარგვით (არე მემორიზებითი თითქმის ავადმყოფი კარგავს თავის ფსიქიკურ უნდობას); 7. გარე შეპიქმელებს შეპიქმელებს ანლოგიური განცდების გარე საყაროში ავადმყოფის აზრების და გრძნობების გახსნის განცდით.
- ბ. (პრეპარატიზმი - K. Ruxtonianian 1. ფუნდამენტული-ბიქნიური სეპია და საკუთარი აზრების განმარტანება; 2. ტუეპიქმელებს სეპიას ბიქნიური-ბიქნიური, ბიქნიური სეპია, რომლებიც ავტორებს ავადმყოფის აზრებს.
- მონსტიტიზმი - конституция (ლათ. constitutio-ბრუნვა, გრუნება). გადაგრუნებითი მოძრაობები სხვადასხვა (მართობი) დიდი ისტერიული გულყრის დროს.

**კონტრასტობრუნვა გოლგოთა იდეებისა** - контрастность гнозиса идей (ლათ. contra-წინ, punctum-წერტილი. პუნქტი, არგუმენტი). ერთი და იგივე აუადყოფი შიდათი იდეების შინაარსის სხვადასხვა, **პროტონატივალური შიდათი იდეებისა**. შავ, განილები იდეების თან ახლავს ღვიძი იდეები. აღინიშნება პარანორმალური და პარანორმალური ბოლვის, პარანორმალური შიდათი იდეების დროს.

**კონტრასტობრუნვა** - контрастность (ლათ. contra-წინა-შეიწროება, შეიწროება). სახარში შიდათი იდეების შეზღუდვა (ის არცეული მდებარე რიბილი ქსოვილის და წერტილოვანი აპარატის ცვლილების შედეგად აღინიშნება სახარების სხვადასხვა დაავადების, წერტილი სისტემის ორგანული დაზიანების, აგრეთვე ისტერიული რეაქციული ფსიქოზების დროს).

**კონტრასტობრუნვა** - locus cornutus (ლათ. locus-ადგილი, ადგილები, ფრანგ. cornus-მეჩვიწმე). ცნება შემოღებულია აგრეთვე ფსიქოლოგის **ჯ. როტერის (Rottler J.)** მიერ და ნიშნავს **ფიქსაციას**, რომელიც ახასიათებს ალბანის მდგრადობას, საკუთარი მოქმედების შედეგები შიდათი იდეების ან გარეშე ფაქტორებს (ტექნიკური, გარეშე ელ.) ან საკუთარ თვისებებს და ძალისხმევას (ინტენსიური, შიდათი ელ.).

**კონტრასტობრუნვა** - контузия мозга (ლათ. contusio cerebri). ტვინის დაზიანება ქადაგების ტრავმის შედეგად. უფრო სწორია - კონტრასტობრუნვა ერთობლივად დაპარაკი (კონტრასტობრუნვა-კონტრასტობრუნვა). დაზიანების შედეგად უფრო სწორია სინდრომის გარდა, ალბანის ნეგროლოგიური ნიშნები; სისხლჩაქევა ვარსება და გინის ქსოვილი. მწვავე პერიოდში შესაძლებელია ფსიქოზური მდგომარეობები მწვავე ეპილეფსიის რეაქციების გამო. რეზიდალური პერიოდში - პოსტტრავმული ენსეფალიოპათიის მოვლენები, ხშირად მკურნალობის რეაქციული-მდგრადი დაზიანება.

**კონტრასტობრუნვა** - контрастность (ლათ. contrastus-დასახი, მოყვლა) (Kahnbaum K.L., 1866). ცნება მოგონებებს ხახვ, «მოგონების პარანორმალური». აუადყოფი მოვლენების გამოწვეული მოვლენები, რომელთაც სინდრომული და პარანორმალური დროს აღნიშნავს პერიოდში. ფსიქონატივალური ფაქტორები დაზიანება რეაქციული დაზიანების დარღვევებთან კავშირის გარეშე.

**კონტრასტობრუნვა** - კონტრასტობრუნვა (ლათ. contrastus-დასახი, მოყვლა) (Kahnbaum K.L., 1866). ცნება მოგონებებს ხახვ, «მოგონების პარანორმალური». აუადყოფი მოვლენების გამოწვეული მოვლენები, რომელთაც სინდრომული და პარანორმალური დროს აღნიშნავს პერიოდში. ფსიქონატივალური ფაქტორები დაზიანება რეაქციული დაზიანების დარღვევებთან კავშირის გარეშე.

**კონტრასტობრუნვა** - კონტრასტობრუნვა (ლათ. contrastus-დასახი, მოყვლა) (Kahnbaum K.L., 1866). ცნება მოგონებებს ხახვ, «მოგონების პარანორმალური». აუადყოფი მოვლენების გამოწვეული მოვლენები, რომელთაც სინდრომული და პარანორმალური დროს აღნიშნავს პერიოდში. ფსიქონატივალური ფაქტორები დაზიანება რეაქციული დაზიანების დარღვევებთან კავშირის გარეშე.

**კონტრასტობრუნვა** - კონტრასტობრუნვა (ლათ. contrastus-დასახი, მოყვლა) (Kahnbaum K.L., 1866). ცნება მოგონებებს ხახვ, «მოგონების პარანორმალური». აუადყოფი მოვლენების გამოწვეული მოვლენები, რომელთაც სინდრომული და პარანორმალური დროს აღნიშნავს პერიოდში. ფსიქონატივალური ფაქტორები დაზიანება რეაქციული დაზიანების დარღვევებთან კავშირის გარეშე.

**კონტრასტობრუნვა** - კონტრასტობრუნვა (ლათ. contrastus-დასახი, მოყვლა) (Kahnbaum K.L., 1866). ცნება მოგონებებს ხახვ, «მოგონების პარანორმალური». აუადყოფი მოვლენების გამოწვეული მოვლენები, რომელთაც სინდრომული და პარანორმალური დროს აღნიშნავს პერიოდში. ფსიქონატივალური ფაქტორები დაზიანება რეაქციული დაზიანების დარღვევებთან კავშირის გარეშე.

**კონტრასტობრუნვა** - კონტრასტობრუნვა (ლათ. contrastus-დასახი, მოყვლა) (Kahnbaum K.L., 1866). ცნება მოგონებებს ხახვ, «მოგონების პარანორმალური». აუადყოფი მოვლენების გამოწვეული მოვლენები, რომელთაც სინდრომული და პარანორმალური დროს აღნიშნავს პერიოდში. ფსიქონატივალური ფაქტორები დაზიანება რეაქციული დაზიანების დარღვევებთან კავშირის გარეშე.

**კონტრასტობრუნვა** - კონტრასტობრუნვა (ლათ. contrastus-დასახი, მოყვლა) (Kahnbaum K.L., 1866). ცნება მოგონებებს ხახვ, «მოგონების პარანორმალური». აუადყოფი მოვლენების გამოწვეული მოვლენები, რომელთაც სინდრომული და პარანორმალური დროს აღნიშნავს პერიოდში. ფსიქონატივალური ფაქტორები დაზიანება რეაქციული დაზიანების დარღვევებთან კავშირის გარეშე.

**კონტრასტობრუნვა** - კონტრასტობრუნვა (ლათ. contrastus-დასახი, მოყვლა) (Kahnbaum K.L., 1866). ცნება მოგონებებს ხახვ, «მოგონების პარანორმალური». აუადყოფი მოვლენების გამოწვეული მოვლენები, რომელთაც სინდრომული და პარანორმალური დროს აღნიშნავს პერიოდში. ფსიქონატივალური ფაქტორები დაზიანება რეაქციული დაზიანების დარღვევებთან კავშირის გარეშე.

დ. სიტუაციონალიზმი - конфликт ситуационизма ანდა ანდა კონფლიქტი გარემოსთან ან გარემომყოფებთან (კ. პაროტეხათორანო). შეიძლება გახდეს სხვადასხვა ფსიქოგენური მდგომარეობის აღმოცენების ეტიოლოგიური ფაქტორი.

ე. სიმბიოტიზმი - конфликт симбиотизма ურთიერთსაწინააღმდეგო და ერთმანეთთან შეუთავსებელი ტენდენციების ერთდროული არსებობა ცალკეული ინდივიდის ცნობიერებაში (შეფხვნილი კონფლიქტი) ან ადამიანებს შორის, ცალკეული ინდივიდის ან ჯგუფის პიროვნებობის ურთიერთობის სტრუქტურაში. მიმდინარეობს უარყოფითად შეფასებული მწვედ ემოციური განვლით და შეიძლება გახდეს ფსიქიკური გრამმატიკის წყარო.

ბ. შიშობილობა - конфликт шизофобии ფსიქიკური კონფლიქტის ხასხე დაახლოებით თანაბარი ძალის შედეგებაა; მას ურთიერთსაწინააღმდეგო მოგვიების, მოთხოვნისებების, მიზიდულობების და ა.შ.

კონფლიქტოლოგია - конфликтология პაროტეხათორანო რეაქტა, აღმოცენებული სიტუაციური ან ფსიქიკური კონფლიქტის შედეგად რეაქტიული მდგომარეობის ერთერთი ფორმა, შეიძლება მიმდინარეობდეს ავტონების, ცნობიერების შეცვლის, პარანოიის, დეპრესიის სიმპტომებით.

კონფორმულიზმი - конформизм (ლათ. conformis-სწავსი, შესაბამისი). სოციალური ფსიქოლოგიის ცნება, აღნიშნავს ადამიანის გენდენციას, შეუწყობს საკუთარი ქცევა სხვა ადამიანების გავლენის შესაბამისად ისე, რომ ეს ქცევა შესაბამისობაში იქნება გარემომყოფთა ან მის. კ. არ არის საყოველთაოდ აუცილებელი, შესაბამისი ნაკლებად კონფორმული პიროვნებები. არაკონფორმულობა წარმოადგენს თანდაყოლილ თვისებას, მის ფორმირებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ადამიანის ცხოვრებისეული გამოცდილების ელემენტები. ფსიქოლოგიაში არსებობს ანტიკონფორმული ტენდენციები ხან სერვის ვეჯუფის, ხან სოციალიზმის შეწყობაზე: 1. ჯგუფის ან მისი არაკონფორმული და არაადამიანური აღქმა (შთაბრუნებლობა), 2. გაყნობიერებული გარეგანი თანხმობა მინაკანი მიუღებლობის დროს (კ.), 3. ინდივიდის გაყნობიერებული სოლიდარობა კოლექტივთან, მისი პირობის აქტუური მიღება, პირობა მათთვის (კოლექტივისტური თითგამორეკევა).

კონსოციო-დრუჟბინო რუმენტარული კონსოციო-დრუჟბინო რუმენტარული მდგომარეობები - Консоло-Дружбинный рудиментарные психосостояния (Консолой В.А., Дружинина Т.А., 1973). იხ. პალეონტოლოგია რუმენტარული.

კონსტრუქტივიზმი - конструктивизм (ლათ. con-თან, constare-ცნება). ანალიტიკური საწინააღმდეგო მოგონება, ნერეული პროცესების უნარი, საკუთარი გარკვევების სევირო შემოფარგლს აღმოცენების საწყისი ეტაპი.

კონსტრუქტიული სპალიზმი - конструктивный спализм იხ. პალეონტოლოგია რუმენტარული.

კონსტრუქტიული მეთოდოლოგია - Конс конструктивный методика (Kobs S.C., 1923). ფსიქოლოგიური მეთოდიკა, მიმართული კონსტრუქციული პრაქსისის, სივრცითი ორიენტაციის, ყურადღების, კომპანაგორიკის გამოსაკვლევად. გამოიყენება ნიროფსიქოლოგიაში ადამიანების კერის ლოკალიზაციის გამოსაკვლევად. გამოიყენება აგრეთვე მექანიკური მოქმედების ექსპერიმენტული პირობების თვისებებზე გამოსაკვლევად ემოციური რეაქციის ხასიათის მიხედვით (Рубинштейн С.Я., 1970). მდგომარეობს საეკოლოგიურად შეღებილი კუბებისგან აღმავალი სიძნელის ორნამენტების შექმნაში. ხდება დაშვებული შედეგების თვისებრივი კვალიფიკაცია. გამარტივებული-სახით შედის შრავალ ფსიქოგენიკულ ტესტში, მას, გავსდების ტესტი. ამ დროს რეაგირებულად დეკლარაციის შესრულების დროს.

კონსოციო-დრუჟბინო - консоциально-дружбинный (ბერძ. консო-განავალი, სხიზნურ, სევს-სიაშიშვლება). სექსუალური გაუკავშირებლობის ხასხე, რომლის დროსაც ურთიერთი ავტონება მიიღწევა პარტნიორის ექსტრემულებით მანიაკალიის ვითი, მათი სუნის შესუნთქვით, დათვალერეობით, მეჭვით. მანისიზმის გამოვლინება.

კონსოციო-დრუჟბინო - консоциально-дружбинный (ბერძ. консო-განავალი, სევს-სიაშიშვლება). ავადმყოფური, სოციალური დაუდევლობის ხასხე, რომელიც უწყობს სივრცითი უნიშობის მანიაკალიურად გამოსავლების აღწევს ტრანსპონსიციონალიზმს (იხ.) დროს, თუცა, აღინიშნება სხვა დაავადებების დროსაც. მდგომარეობს, პროგრესული დამბლა, იშვიათად - მანიაკალიური მდგომარეობით.

კონსოციო-დრუჟბინო - консоциально-дружбинный (იხ. სპალიზმი).

კონსოციო-დრუჟბინო - консоциально-дружбинный (ბერძ. консო-განავალი, სხიზნურ, სევს-სიაშიშვლება). სექსუალური პერფორმის (ქსიანოციონიზმის) ხასხე, დევიაციის აქტის სახალხო შესრულებისადმი მისწრაფება.

კონსოციო-დრუჟბინო - консоциально-дружбинный (ბერძ. консო-განავალი, სხიზნურ, სევს-სიაშიშვლება). სექსუალური პერფორმის, ხშირად საკუთარს, ქსიანოციონიურად აღინიშნება ფსიქიკური მარამის მდგომარეობაში, მოგვარე-ყნობიერების დარღვევის მდგომარეობაში და კატატონური სიმპტომებით დაავადებულში.

კონსოციო-დრუჟბინო - консоциально-дружбинный (ბერძ. консო-განავალი, სხიზნურ, სევს-სიაშიშვლება). სექსუალური პერფორმის ხასხე, რომლის დროსაც სექსუალური დაქვეითება ან მიღწევა უცნებო სივრცის წარმოქმნის გარეშე საწინააღმდეგო სქესის პირის თანდასწრებით.

კონსოციო-დრუჟბინო - консоциально-дружбинный (ბერძ. консო-განავალი, სხიზნურ, სევს-სიაშიშვლება). სექსუალური პერფორმის ხასხე, რომლის დროსაც უცნებო სივრცის წარმოქმნის გარეშე საწინააღმდეგო სქესის პირის თანდასწრებით.

კონსოციო-დრუჟბინო - консоциально-дружбинный (ბერძ. консო-განავალი, სხიზნურ, სევს-სიაშიშვლება). სექსუალური პერფორმის ხასხე, რომლის დროსაც უცნებო სივრცის წარმოქმნის გარეშე საწინააღმდეგო სქესის პირის თანდასწრებით.

კონსოციო-დრუჟბინო - консоциально-дружбинный (ბერძ. консო-განავალი, სხიზნურ, სევს-სიაშიშვლება). სექსუალური პერფორმის ხასხე, რომლის დროსაც უცნებო სივრცის წარმოქმნის გარეშე საწინააღმდეგო სქესის პირის თანდასწრებით.

კონსოციო-დრუჟბინო - консоциально-дружбинный (ბერძ. консო-განავალი, სხიზნურ, სევს-სიაშიშვლება). სექსუალური პერფორმის ხასხე, რომლის დროსაც უცნებო სივრცის წარმოქმნის გარეშე საწინააღმდეგო სქესის პირის თანდასწრებით.

კონსოციო-დრუჟბინო - консоциально-дружбинный (ბერძ. консო-განავალი, სხიზნურ, სევს-სიაშიშვლება). სექსუალური პერფორმის ხასხე, რომლის დროსაც უცნებო სივრცის წარმოქმნის გარეშე საწინააღმდეგო სქესის პირის თანდასწრებით.

კონსოციო-დრუჟბინო - консоциально-дружбинный (ბერძ. консო-განავალი, სხიზნურ, სევს-სიაშიშვლება). სექსუალური პერფორმის ხასხე, რომლის დროსაც უცნებო სივრცის წარმოქმნის გარეშე საწინააღმდეგო სქესის პირის თანდასწრებით.

კონსოციო-დრუჟბინო - консоциально-дружбинный (ბერძ. консო-განავალი, სხიზნურ, სევს-სიაშიშვლება). სექსუალური პერფორმის ხასხე, რომლის დროსაც უცნებო სივრცის წარმოქმნის გარეშე საწინააღმდეგო სქესის პირის თანდასწრებით.



სარძევე ჯირკვლების შეზრუნვას მეტრები და მათ გაეჩინარებას. ეგიოლოგია უცნობია. ძირითადად იტყვება ჩრდილო და ჩრდილო-აღმოსავლეთი იმის ქვეყნებში.

**მტრსაქმობის** - *აღარაჟია* (ბერძ. *κατ'ελαθισელი*, *philis-ღვოლა*, სიყვარული). ხეშუადღური. პერვერსიის სახე, ქალთა პოოსტექუალბიის ფორმა, ხასიათდება ღვოლეთი ცოცრონების მიხარით.

**მტრსაქმობის ანტიპოდი** **მტრსაქმობის** - *Корсакова эффект недоумения* (Корсаков С.С., 1893). იხ. **საქმობის მარტობის**.

**მტრსაქმობის რეპროდუქცია** - *Корсакова болезнь* (Корсаков С.С., 1887). მწვავე ალკოჰოლური ენცეფლოპათიის ვარიანტი. რეპროდუქციით ვითარდება აგეიაური ალკოჰოლური დელაირიუმის შემდეგ დახასიათებულია პირდაპირი ალკოჰოლი კენოზის ხსებადსხვა გამობადულების აგროფით, მეტათა რეულებების დაქვეითება ან მოსობა და ფსიქიკური ანლილობები (ანშენია, ხშირად ანტროპოგეოგრაფული, რეგროგრაფული და ფიქსაციური, შეპროიენტირება, კონსტრუქციები და ფსელორემისსენსიტივობა). პათოლოგანაგომორფა - მწვავე ან ქრონიკული ხასიათის დუჟურული ელილები ხერველ უკრებლები, მათი სიკვდილი (განსაკუთრებით ქერები III შრეები), წერილი სისხლწაქვევები ქერები, გვიანს დროში, III პირკულის არება, შერგის გვიანს და პერიფერიულ ნერვებს. მსუბუქ შემთხვევებში მიმდინარება შეიძლება იყოს რეპროდუქციული, ფსიქიკური მდგომარეობის შედარებით გაუმჯობესებით I წლის განსაზღვრებაში, მოგვიერ შესაძლებელია გამორჩეულიყოფილება. შედარებით მძიმე შემთხვევებში ყალიბდება ქუცისუტობა. ავთვისებიანი მომდინარეობის დროს - დეგადური გამოსავალი შემორავადული ელილებების შედეგად, გაერყობითა დაფილების ქრები დიდი გვიანს შეესაფერება.

**მტრსაქმობის რეპროდუქცია** - *Корсакова болезнь* (Корсаков С.С., 1891). იხ. **რეპროდუქცია**.

**მტრსაქმობის სინდრომი** - *Корсакова синдром* (Корсаков С.С., 1887). მუხსაყრების დარღვევის ხამტობითა კომპლექსი, პირველად აღწერილია მწვავე ალკოჰოლური ფსიქოზის დროს (იხ. **მტრსაქმობის რეპროდუქცია**). აღინიშნება ეგემოგენური სიკვდილი. სინდომი: **სინდრომი ანტიპოდი-პარანტიპოდი**.

**მტრსაქმობის ანტიპოდი-პარანტიპოდი** **მტრსაქმობის სინდრომი** - *Корсакова-Пинкертон дуэлитическая комбинированная психопатология* (Корсаков С.С., Пинкертон И.П.) ცნება ფორმულურად უნდა შევარაზდებოდეს (Мерлин А.А., 1959-1962-1972) მიერ. ფსიქოლოგიისა და ფსიქიატრიაში შემუშავებული თეორია, ფსიქიკური მოქმედების ცნობიერ და არანაბლად ფორმებს განხილავს როგორც ორ დინამიკურ მონას, რომლებიც ერთმანეთს და ერთმანეთს ერთმანეთს (ფსიქოანალიტიკოსების აზრით, მედშიე ანტიპოდიშიში). ნათილი ცნობიერების ოპტიმალური მონას და არანაბლებების, ფსიქიკური ავტომატიზმის მონას შანაინი კავშირი, ერთმანეთს და ერთმანეთს განპირობებს ცნობიერების პროცესის განვითარებას. ავტომატიზებული ქვედურბოლიანი ფსიქიკური პროცესების მონას პიროვნების ინტეგრირებული განვითარების პროცესში გაანარა და განვითარდა ოპტიმალური ნათილი ცნობიერება (Мерлин А.А., 1972).

**მტრსაქმობის ანტიპოდი-პარანტიპოდი** **მტრსაქმობის სინდრომი** - *Корсакова-Штернхау комбинированная оптопатологическая в психопатрии* (Корсаков С.С., 1893; Штернхау А.Е., 1901). ისტორიული ასპექტით წინ უსწრებდა პინკ (Hochs A.E., 1906, 1912), პინკერტონის (K. Bonhoeffer, 1908, 1910), კრეკელის (E. Kraepelin, 1920) გამოკვლევებს. კორსაკოვი და შერნჰაუი სიმპტომთა კომპლექსებს განხილავდნენ კლინიკურ-ნოზოლოგიურ სისტემატიკასთან კავშირში და არ უპირისპირებდნენ ნოზოლოგიურ ფორმებს, სტერეოტიკულად განმეორებადი შედარებით მყარინიზებულ განსაზღვრულ ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომების ერთობლიობას, ფსიქიკური რეაქციების გი.პურ ფორმებს. სხვადასხვა ფსიქიკურ დადავლებას აქვს სიმპტომთა კომპლექსების სხვადასხვა ერთობლიობა და სხვადასხვა თანმიმდევრულობა.

**მტრსაქმობის სინდრომი** **სინდრომი** **სინდრომი** - *кортикальные синдромы* *синдром*. იხ. **მტრსაქმობის სინდრომი**.

**მტრსაქმობის სინდრომი** - *характерологический* (ანგ. *th. character supercilii*; წარების შემგუზუნაი ქუთი) (Frankl V.E., 1931). პარანტიპოდი ერთერთი სიმპტომი მთიფრენით დაავადებულებში, გამოწვეული კუნთოვანი მუკეშვებით მუხლის მიღამში, ძირითადად იხ. კუნთის მუკეშვები, რომლებიც იწვევს წარების მუკეშვებას. განსაკუთრებით კარგად ელანდება მუკეშვების დროს. გარეგნულად მიიჩიეს იმიტაცია, რომელიც დახასიათებულია აწვეული ყვარადების მდგომარეობისთვის.

**მტრსაქმობის მეთოდური აღმკვლევების მეთოდი** - *Коса-Вирманна методика исследования семьи* (Kos M., Virmanna G., 1973). პრეკტიული მეთოდი და მეთოდი გამოსაკვლევად. ინსტრუქცია: «წარმოადგინე, რომ მოვიდა ხასწავლობილი და მოაქვდა მთელი ოჯახი, დიდები და პავეშები. დახავე, რა მოხდა». შემდეგ - გამოკითხვა მოკლედ ოჯახის ისტორიის შესახებ და თხოვნა, დაწეროს მოთხრობა. სანდგროვითა მოკლედობის მიხედვით და პავეშების წარმოდგენით, თუ რა მხარე შემდეგ იხსნება ხავეშის ოჯახის კონფლიქტი. მეთოდიც აქვს მხარე მხარე კორელაციის პათოგენურ ოჯახურ სიტუაციასთან, ეხმარება ნეეროზების, განსაკუთრებით ისტერიულს. დიაგნოსტიკაში (Sulestrowska H., 1984).

**მტრსაქმობის მეთოდი** - *коллапсозная процедура* (ბერძნ. *κολλαпс-სამეარო*). მწვავე ალკოჰოლური მდგომარეობის ზოლითი და პალკუბიკური ვარდებით, გამოიჩნევი ავადყოფის ირვლიე მომხარის განდომობლიობით (მსოფლიო კაციატრია).

**მტრსაქმობის სინდრომი** - *Котара синдром* (Cotard J., 1888). გამოუღებელია მსოფლიოგრაფიკული დეპრესიის და ავადყოფის და განდებების აპოქინდრულ-დეპრესიული ბოდეგის თანაარსებობით, რომელიც ვრცელდება უნდყოფის მარადურ და ფიზიკურ თვისებებზე, გარემოში მიმდინარე პროცესებზე ან ყველაფერზე ერთდროულად. სინდრომის დროს აღმოცენებული უარყოფის და განდებების ზოდად ვრცელდება აღამიანურ თვისებებზე, მის ორგანოებზე ფიზიკური "შე" ს. უარყოფის შემთხვევაში გამოყოფენ ბოქინდრულ-ნაოლისტურ ან უნდალთე, ნაოლისტურ ან ბოდეგის: შიჯურე ავლით აქვს ინდივიდუალური თვისებების და კატეგორიების უარყოფის (სასიკ, განათლება, სპეციალიზა და სხვ.). უარყოფა ხშირად ეხება გარე სამყაროს ("ყველაფერი დაინერა", "ქალანგა განადგურდა", "ღრი დაიკარგა"). ფანტატიკურ-რეგნებზე ზოდეგს ხშირად თან ახლავს თეობრალიზმის ფეხობა. არამონათვარ გრეკოსიკურად. ავადყოფის განმარტებებში აღინიშნება მომავალი "მგარეული სიკვდილი" მოლოდინი. ამავე დროს გამოიყოფება უედეტების ოდეგები; ეს უკანასკნელი ხშირად აგარებს მუტაშირფოზის ბოდეგის ხასიათს. სინდრომის გამოხატულების მიხედვით არტევენ კ. სის ნაოლისტურ ან დეპრესიული გარანტიკები; განვითარების

თავისებურების მიხედვით - შვებავს და ქრინიკულს. სინონ: შილაინილიში ბარბარინი, შარბინიანი შილაინილიში ბარბარ, შილაინი-შილაინილიში ბარბარ, იხ. ბარბარ მტარობა.

პოქსინიზმი - კოხლეთი კოეფიენ მიეყოფება ჰანტანებს და წარმოადგენს ცხის სტიმულატორს. თიობრონიდან და თიოპროლინიდან ერთად შედის სტიმულატორს სავსე პროექტში და სამკურნალო საშუალებებში. ყავა შეიცავს 80-140 მგ კოეფიენს | ჩაის ჰიტინზე ჩაისი კოეფიენს რაოდენობა აღწევს 30-100 მგ კაპო მცირე რაოდენობით შეიცავს კოეფიენს, მისი შილა თიობრონი. კოლამბიტული საშუალებები შეიცავს 25-55 მგ კოეფიენს. კოეფიენს ან კოეფიენსიმეტაბოლი ნივთიერების გამოყენებისას ვითარდება ცოლანგობა. ზეუღბრებელი ქარის მოუკარულები დაღმე დაღმეობენ პინიუმ 500 მგ-იდან 3 გ-მდე კოეფიენს. კოეფიენს ნერულ სისტემაში იწვევს გარკვეულ ფარმაკოლოგიურ ცვლილებებს: ღრუბინურიული რეცეპტორების სენსიტიზაცია, აღნიშნული და ბენზოდიამპინური რეცეპტორების ანტიგონისტია. გარდა ამისა, ყავა შეიცავს არასტეროიდურ ნივთიერებებს, რომლებშიც აღმოჩენილია მოსაგერი რეცეპტორების ანტიგონისტები. კოეფიენით ინტოქსიკაცია შეიძლება გამოიწვიოს 250 მგ კოეფიენს. 1 გ კოეფიენს შეიძლება გამოიწვიოს არჩების და შეკველების ამქარება, გულის რითმის დარღვევა, დადლიოზის გრძობის გაქრობა, ავიტაციური მდგომარეობა. უფრო მაღალი დოზები იწვევს კრუნჩხვით ვანგეირებს, სუნთქვის უკმაყოფილებას და სიცილს. კოეფიენით ინტოქსიკაციის ნიშნებია: შფოთვა, ესტიმოლოგიური ავიტაცია და მოუხერხება, ადული გამლიზინებლობა, სახის გაწითლება, გულისრება, განხრებალი დროულზე, უსამოქმეო მტარანებები უკმაყოფილ არემო, უძილობა, უტოთაიანი შერთობები. ასტანტინური მდგომარეობაში გამოხატულია თავის გაიოლი, უხედავის შეგრძობა. შეიძლება ადული აქირღეს ლეთარგიულ ძილოზობას, გამლიზინებლობას, ანაღლოზის და ღებრსას. იგი ვითარდება კოეფიენს უკანასკნელი მიუხედავად 15-18 სთ შემდეგ, ტრადიციულ 1-2 ღამე ქრინიკული გამოყენებისას - სომატური ცვლილებები: უკუშე შეფარბობის მოხატება, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მხრივ ართიზის მოვლენები. იხ. Diagnostic criteria for caffeine intoxication.

პოქსინიზმი - კოფეინოზია იხ. ბარბარინი.

პოქსინიზმი - კოფეინოზია იხ. ბარბარინი.

პოქსინილი ლიშიში - კოქსინ ლიშიში (Laborit H., Huguenar P., 1951) ნარევი რომლის შეზადენლობაში შედის 25 მგ ლიგანები (ქლარობინი), 25 მგ პროტეაზინი (აგობლი) და 50 მგ ლიდაგინი (აგობლი). გამოიყენება გამოხატული ფსიქომოტორული აუნების ან ძალით მკურნალობის დროს ინტარბესკულარული ინექციის ან ინტარეპურე რეჟიმების ინტენსივ, 500 მგ (აღსკობის სხანართან ერთად, სახით).

პოქსინილი - კოქსინოზია (ხეც ცოცხა-უკვუსი, ზერმ. odin-ტივილი) ტივილი კვდუხუნას მიდამოში. აღმოყენდება და ბიფირება ჰლემის, საიარლის, ღეუკაიის, სქესობრივი აქტის დროს. ხშირად აღმოყენდება გაგა-უკვუსუნას მიდამოს გრავის შემდეგ მშობიარობის შემდეგ უპირატესად აღინიშნება ქალებში. არამიეთაოდ წარმოადგენს ისტერიულ სიმპტომს.

პოქსინი - კოქსინი (გრანგ ცაიხემა) უიღურესად მძიმე მგანწყელი, ემოურად უგრეფოდ შეფერლი ხეშარო. რამდეში ავიდმყოფი თითისი მონაწილეობის, ხლედა ღვინის მხებეობის, სიღად მორადურად მიღებულ სატყეობს. ხშირად აღინიშნება მძიმე ნეროლოგი მდგომარეობის დროს, მძიმე ფსიქოგენის შემდეგ. ბავშვთა ასაკში იწვევს მძიმე და გირილს გაღვიძების შემდეგ ბავშვი მაშინვე ვერ ორინტადრება დროსა და გარემოში, უკირს სახეურის დაღება ხეშარასა და უხადს შორის.

პ. რანგინი შილაინიზმი - კ. ნოდინი არაინოზიანი ცასკის (Gastaut H., 1975) მიხედვით, ტრინი არასწორად, რადან აღმის კ არ შეიძლება იყოს ენაღურსური გენების თქმა: 1. უფარ იალუბის აღმის გუარის (რეულებრივ, საფეთქლის) შემდეგ თან ახლებს შფოთვის, მძიმე გრძობა, პოქსინოზა, შეშარავი მხეულებობითი პალესიკაიუბი გუარის დროს, რამდელი შილაინი რიოურე დაღის კოქსინი 2. აღმის კოქსინი შეიძლება იყოს გამშვები შექნებში ენაღურსურ; გუარისთვის. პოქსინი ბატონობა - კოქსინოზია იხ. ბარბარინი.

პოქსინი სინდრომი - კოქსინოზია (Kocher). შეკვედრებითი დაადება, საიარადოდ გადაყმის ავგოსოპური განი, ეიწრო კიდურები; სინექტი; პოქსინი. ფსიქის მხრივ - გოქსინოზია ჩაბრანტეობა.

პოქსინი ტინტი სინა - კოქსინოზია (Koch K., 1949) ექსპერამენტულ-ფსიქოლოგიური შფოთდეკა აუექტური პაროენული თვისებების გამოსკედეად გამოიყენება ბავშვთა ფსიქოლოგიაში. გამოსკედეად ადლებს დაუალებებს, ანაგოს ხეობის ხე. ნახატის ინტერპრეტაციის საფუძვლად უღვის პოქსინური ანალოგია ხის მსგის გენდენციასა და ფსიქური განვითარების შორის. ნახატის დეკალები განხილება გრადოლოგიურ ასექტში, სეიყიითი სინსოლიის თვალთახეობით (შნიშნებლობა აუნება მარჯვენა-მარცხენას, შფოთ-ვეუბით და ა.შ. სიმარბეს). შუასხედა ხლედა ინტრო-ექსპერადირისი, სეგატი-აღინიშნის, ბანაურბო-ორიგინალობის ფაქტორების განსამდელებად. ზღეს უწყოს განსაკედევის პაროენული დიფრენცირებულობის ხარისხის, მისი გი პოლოგიური თავისებურებების განსამდევრას, პაროენული დისპორბიულობის, იფინგინიშის, დატორენული ღღოღვის გამოვლენას.

პრანკი რანგინიზმი - კრამერ-პოლოხი (Krammer K.H., 1916) დეოკობის ტროპის ფორმა, შემკიდრებითი დაადება. გადაყმის ავგოსოპური-რეუესიული გიპი. იწყება ბავშვთა ასაკში. კლინიკური სურათი ხასათადება კრუნჩხვებით, სასეიკური დამხეხებით, დემენციით, სინდრომი, სუნის დაქეთიობა. გრანინალურ სეადარში - ღუერბარაიული რიგიობა. პათოგენეში - გენგეკურად განპარობული ნაფთიეებათ ცულის დარღვევა ენტრობობის სინთეზის მომდით და თავის გენიში ნერეული ბოქციების დამიგენინიზაციით. სინონ: ბრანკი რანგინიზმი ინტინტილიში შილაინიზმი. ბრანკი შილაინიზმი-შარბარინი ლიშინოზოზია, ბრანკინიზმი რანგინიზმი, ინტინტილიში შილაინიზმი.

პრანკი-კოლნიკოსი რანგინიზმი - კრამერ-პოლოხი (Krammer T., Pollnow H., 1930). გარკვევილი ენაღურება ფსიქოგრა დაადება. საიარადო ინექციურ-გოქსინური ფაქტორების როლი. იწყება 3-4 წლის ასაკში იხელებითი მდგომარეობის ან ენაღურსური გუარის შემდეგ უკვირება ხშირდება. ავარბის დად და მირე ხასოთის. დაშახასათებელია მობრობობითი მოუხერხება პეპტიკინეზითი. შობიარობები სწრადია, ემინსო. ბავშვს უბო რეჟიმით აღ შეუძლია მოხედევა. დაშახასათებელია მეყენიანი აუნება პერსვერაციებით, გოლოვიური დაზიანება, გამლიზინებლობა, მრისხანების შეგეები. გონგეივი განვითარების შეგრძობა, ფსიქომოტორული გონგეივი ჩაბრანტეობის სურათი. შეკვედეების განვითარების შენდება ან ჩაბოჩება. სიმპტომატიკის გარბატება პაქსინუმს აღწევს 6 წლისთვის შემდეგში 1 წლის განმავლობაში დაღება მისი შექცობა. შესაძლებელია სრული

კლინიკური გამოყენებები, ზოგჯერ რჩება რემიდეური სრულყოფილი დევექტი (ინტელექტის დაქვეითება, ესპანური სიყვარული გულები).

**პრანდო** - *არაქო* (ინგლ. *ampro-რენინი*, სპან. *პერიოდულად აღმოცენებულ ხანმოკლე ტონური მტკიცეული კრუნჩხვები*, ხშირად ორმუცელ კუნთში. უმეტესად აღინიშნება კამბარული სინხლის მიზოქევიის პათოლოგიის, კალკიუმის ცვლის მოშლის, მაქრანია დაბადების, კუნთოვანი დაღლილობის, ინტოქსიკაციების, ათეროსკლეროზის დროსა ფსიქიკაში კთან აბლო ფსიქოსთიკური კრუნჩხვების დასახელების ქვეშ აღწერილი (Oppenheim H., 1906) ცალკეულ კრუნჩხვით გვლერები, რომელიც აღმოცენდება ხასიათის უზიოპოტისტიური ხაზების მაგარებულ პირობებში და შიდაინარების მიხედვით გრძობით. კ-ს პიკეტუბებდნენ რეაქტიულ ან ფუნქციურ ეპილეფსიას. ამჟამად, ასევე მღვიპაროვანი არ განიხილება როგორც ეპილეფსიის გამოვლენა, მიეკუთვნება ეპილეფსიურ რეაქციებს (*ხაუდაო* A.J.J., 1971).

**პრანდოტრისტი** - *კრანოტრია* იხ. **პრანდოტრია**.

**პრანდოტრია** **გობტარული** - *კრანოტრია მემბრანული* იხ. **პრანდოტრია**.

**პრანდოტრია** **ნეპროტოტრია** - *კრანოტრია ნეპროტოტრია* იხ. **პრანდოტრია**.

**პრანდოტრია** - *არაქოტრია* (ინგლ. *craniotonia*-თავის ქალა, *stenosis*-შევიწროება) თავის ქალის დეფორმაცია მისი ნაკერების ნაადრევი გაძალების გამო. გარეგნულად ელენება კომპლექსური თავის ქალის სხვა სხვაობა და ენკეფალიტი და ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომებით (სიღებე, ნისბადები, ეგზოფთალმი, თავის ტვინი, ეპილეფსიური გულები, ეპილეფსიური დაზიანება და ა.შ.). სინონ: **პრანდოტრია**, **პრანდოტრია**.

**პრანდოტრია** **სიმპტომი** **ნეპროტოტრია** **რატრისტიკული** **რანდოტრია** - *კრანოტრია რეტროსპექტიური* *არაქოტრია* (*კრანოტრია* B.H., 1976) იხ. **პრანდოტრია**.

**პრანდოტრია** **ქალაქობის** **ქალაქობის** **ქალაქობის** - *კრანოტრია ქალაქობის* (*კრანოტრია* E.K., 1929) არჩეულ შემდეგ რეაქციებს: 1. **შევიწროება**, მოიცავს პათოლოგიის დრო შრეებს; 2. **მტკიცეული**; 3. **ხასიათის ფუნქციონირება**, მოიცავს პათოლოგიის მალე შრეებს, აღმართის ხასიათის ფსიქოტრევიური რეაქციების პირველი ორი გიაზ მოკლებულია სექსუალური ინფორმაციური-პირველ თვისებას.

**პრანდოტრია** **ნარკოტიკული** - *კრანოტრია* (*კრანოტრია* E.C.) მოწოდებული ფსიქოპათოლოგიური აზრების ექსპრესიით. შეიცავს ნარკოტიკულ სიმპტომებს, ქლორალაიდრატს, ვალერიანის ნაყენს, ანთიმინს, ომნოპონს, ფენობარბიტალს. შეეყავთ *per os* ან ოქვის სისით.

**პრანდოტრია** - *კრანოტრია* (*კრანოტრია* A.C.) შეევიწროებათ ანომალიებს კომპლექსი (გადაცემის ავტოსომორეცესული გიაზ). დაზიანებულია: ხალერას დამლაშობა, ორმაროვი შიკროვალში, თვალის ფერადი ფარის ანომალია, ანოტიონი; მღრრეულები, გინის სეპალაშია, ნიანხის დამლაშობა; ფილეტის პიპოლაშია, ატლექტაშია, დიფრაგმული თიქარი, სეპტომეგალია; ჩონჩხის ანომალია (შიკროგნატა, გრეფების პათოლოგია, სის-ან პოლიპეტალია, სკოლიოზი); გულის თანდაყოლილი ხანჯები; თირკმლის კისეები; კროტორები; ოლფაქტორული **პრანდოტრია** **პრანდოტრია** **პრანდოტრია** **პრანდოტრია** - *კრანოტრია* (*კრანოტრია* E.K., 1890) იხ. **პრანდოტრია**.

**პრანდოტრია** **პრანდოტრია** **პრანდოტრია** - *კრანოტრია* (*კრანოტრია* E.K., 1886) იხ. **პრანდოტრია**.

**პრანდოტრია** **პრანდოტრია** **პრანდოტრია** - *კრანოტრია* (*კრანოტრია* E.K., 1896) იხ. **პრანდოტრია**.

**პრანდოტრია** **პრანდოტრია** **პრანდოტრია** - *კრანოტრია* (*კრანოტრია* E.K., 1869) იხ. **პრანდოტრია**.

**პრანდოტრია** **პრანდოტრია** **პრანდოტრია** - *კრანოტრია* (*კრანოტრია* E.K., 1898) იხ. **პრანდოტრია**.

**პრანდოტრია** **პრანდოტრია** **პრანდოტრია** - *კრანოტრია* (*კრანოტრია* E.K., 1898) იხ. **პრანდოტრია**.

**პრანდოტრია** **პრანდოტრია** **პრანდოტრია** - *კრანოტრია* (*კრანოტრია* E.K., 1920). **არჩეული**, რომლის თანხმად ფსიქოპათოლოგიური სინდრომების (კლანიკური სურათის) რეგისტრება ასახავს ცნის დევექტის სიღრმეს. თითო სინდრომები განიხილება როგორც წინაშარ მთმზადებული და თავისუფლდება ან თითვესა თა თუ ფაქტორებთან დაკავშირებით, როგორც ფილე და ონტოგენები გაყვლილი პრინციული ფსიქიკური სიორების შექმნისთვის გამოვლენები. აღნიშნული კონტრეპიკი ემპირიკა გულებს (კრანოტრია O.B., 1956). არჩეულ სინდრომთა შემდეგ რეგისტრები: ნეგროტრია, პალეოსიკური, ზოლითი, დიკინეტიკური და ფილეტოლოგიური. ეს რეგისტრები ასახავს ცნის დამიანების სიღრმეს - ფუნქციონირება ორგანულ პათოლოგიამდე.

**პრანდოტრია** **პრანდოტრია** **პრანდოტრია** - *კრანოტრია* (*კრანოტრია* E.K., 1904) იხ. **პრანდოტრია**.

**პრანდოტრია** **პრანდოტრია** **პრანდოტრია** - *კრანოტრია* (*კრანოტრია* E.K., 1898) იხ. **პრანდოტრია**.

**პრანდოტრია** **პრანდოტრია** **პრანდოტრია** - *კრანოტრია* (*კრანოტრია* E.K., 1886) იხ. **პრანდოტრია**.

**პრანდოტრია** **პრანდოტრია** **პრანდოტრია** - *კრანოტრია* (*კრანოტრია* E.K., 1915) იხ. **პრანდოტრია**.

**პრანდოტრია** **პრანდოტრია** **პრანდოტრია** - *კრანოტრია* (*კრანოტრია* E.K., 1910) იხ. **პრანდოტრია**.

**პრანდოტრია** **პრანდოტრია** **პრანდოტრია** - *კრანოტრია* (*კრანოტრია* E.K., 1913) იხ. **პრანდოტრია**.

**პრანდოტრია** **პრანდოტრია** **პრანდოტრია** - *კრანოტრია* (*კრანოტრია* E.K., 1881) იხ. **პრანდოტრია**.

**პრანდოტრია** **პრანდოტრია** **პრანდოტრია** - *კრანოტრია* (*კრანოტრია* E.K., 1915) იხ. **პრანდოტრია**.

**პრანდოტრია** **პრანდოტრია** **პრანდოტრია** - *კრანოტრია* (*კრანოტრია* E.K., 1915) იხ. **პრანდოტრია**.

7, 13 ან 17, გამოკლება. გამოიყენა აქტორი ყურადღების, შრომის უნარის გამოსაკვლევეად, აწვეულ განღებულობის გამოსაღწერად.

**კრეპელინის შირიშპი პარაზიტინის** - Крепелин фон Циррелин (Kraepelin E., 1913). იხ. პარაზიტინა.  
**კრეპელინის შირიშპიზამა** - Крепелин ширришама (Kraepelin E., 1913). იხ. შირიშპიზამა.

**კრეპელინის შირიშპი** - Крепелин ширришама (Kraepelin E.). თანამედროვე გაციობი, უკლებლივინის მიხედვით, მიმოგრებით დაბადებულბში ასრების შეგრება, შეწყვეტა. არაბიზილიად ავადმყოფების მიერ ამ სოილელები ინტენსივტუაია სხვა ბოილეით სისით. თავდასაბრეველად. შირიშპი აღნიშნულად იყო მიმოგრების კატაგორიული ფორმის დროს. გერმანი გამოიყენებოდა მოტორის ანალიტიკური დარღვეების აღსანიშნავად, შედეგობში ბლოილეებს გამოიყენებოდა ამოცნების დარღვეების კვალიფიკაციისთვის. იხ. *Sperrung*.

**კრეპელინის შირიშპი** - Крепелин ширришама (Kraepelin E., 1915). იხ. პარაზიტინა.  
**კრესტინიკოვის რეპროდუქტიული მეთოდი** - Крестников репродуктивный метод (Крестников Н., 1929).

ფსიქოთერაპიის ხსენ, ნევროზების კურნალობის ფსიქოთერაპიული მეთოდი, რომელიც ირთავს არ გამოიყენება. იხ. შირიშპი შედეგობა და დირექტიული შირიშპი. რეპროდუქციის სიანსები გარდება შედეგობითი სენსორული დერევიაციის პირობებში და მიმდინარეობს **სტადიალად**: ორგანულსულივლიად შეგრებებები (სითი, სიყვე, გულისკება, კნკალი), ავეტქურ-მყოფი რეაგირება (გაბევა, შიში, შიფთვა) და წარმოადგენს შინაარსი (განყდის კონსტრუქტიული შინაარსის გაყეყევა). შირიში - ფსიქიკური გრავიზის სრულად აღმოყენება და მისი ავადმყოფური გავლენისაგან განთავისუფლება. მოგვარ სენსის დროს ავადმყოფების განმრება ვადადანი პიპროზური ძილის მგომარობაში, შირიშპი მეთოდი მოქრებულად დიდილის მგომარობაში რეაგირებაზე.

**კრესტინიკოვი** - Крепелин (ფრანგ. *crispin*). ფარმებრი უარყვლად შექმნილ თანდაყოლილ უშარობაში, მიმდინარეობს ფსიქიკური ვანუეითარების შირიშპილად მართრებით. დაშასასიბთებელი არება განი, სხეულის დისპლასიური აღნაგობა, სასქესო ორგანოების განუეითარებლობა, თავის ქალის არასწორი ფორმა, უსიყის შირიშპი: ასათიური ვაშოვლინებები, ქვეაღრვობა დიდიამდე. შირიშპი თან ახლავს ყრუ-შენჯობა. კანის სიყვერქროთილე (აქვად სახელოდება). აღნიშნება ხსორადავად და უნდებურად (ხშირად შირიშპი აფიცილებში და გამოირჩევა ავადმყოფური სიმკომპოგიის მალად გამოხატულებით).

**კრესტინიკოვი** - Крепелин (ფრანგ. *crispin*, ბერძ. *crispin*-მსგავსი). ავადმობი კრესტინიკოვი ვარგეწული ნიშნებით. შირიშპი ფსიქიკური ვანუეითარების მკეოური ნიშნების გარეშე.

**კრესტინიკოვის პარაზიტინი სინდრომი** - Крепелин паразитарный синдром (ლათ. *parasita*-დაბადა) (Kretschmer E., 1940). სინდრომა კომპლექსი, აღმოყენება თავის გრების დროს, გვიის დროს და სხვა ცენტრების შირიშპი კანცერების დარღვევის შედეგად. დაშასასიბთებელი ცნობარების დარღვევის თავისუფალი სახე (ავადმყოფები იხიყოფიან დიდილის მგომარობაში და ამავე დროს კონტაქტისთვის მიუწელობები არიან), ძილის ნორმალური რითმის დარღვევა, ემოციური რეაქციების არარსებობა, კლტრება და სხეულის ენკენზია, თვალის კალკების საბრგანური ქანქარასებრი შირიშპი და კოორდინაციის დარღვევა, შირიშპილი მოგორული ავადმყოფების, ენცეფალოური ფუნქციების დარღვევა. ავადმყოფები არიან ასაბნებარებით, მთელ დროს ავარებენ საწოლში, შირიშპილი შედეგობებზე და შეხებაზე არ რეაგირებენ, შირიშპი ვერ ავიტარებენ. ენცეფალოგრამად დარღვევა რეველებების (გაციების, წოყის), აღნიშნება ელად-გვიის მძიბე გრავიზი, შირიშპილი ვანუეითარული ცერებრული ათეროსკლეროზის (თავის გვიის სისხლის მიმოქციების მიწვევ მოშლით და დარჩილების დიდ ყრებობ), პანენუფალიციების (შევავე აღმოყენება) დროს და აგრეთვე ფსიქიკების გერმინალურ სტადიაში (თანდათობობითი აღმოყენება და პროგრესივტული მიმდინარეობა). კ.ა.ს-ის მიმდინარეობა შეიძლება იყოს ხანგრძლივ, ხშირად წარმოადგენს გარამავად სტადიის ელვადური გამოსავლის წინ, შირიშპი შეიძლება იყოს შეწყვეტილ, განსკორტობით ხავემეში. სინონ: **პარაზიტინი სინდრომი**, **პარაზიტინი შირიშპი**, **პარაზიტინი სინდრომი**, **პარაზიტინი სინდრომი**, **პარაზიტინი სინდრომი**.

**კრესტინიკოვის პარაზიტინი** - Крепелин паразитарный синдром (Kretschmer E., 1922). იხ. პარაზიტინა.  
**კრესტინიკოვის პარაზიტინი სინდრომი** - Крепелин паразитарный синдром (Kretschmer E., 1948). იხ. პარაზიტინი სინდრომი.

**კრესტინიკოვის პარაზიტინი სინდრომი** - Крепелин паразитарный синдром (Kretschmer E., 1948). იხ. პარაზიტინი სინდრომი.

**კრესტინიკოვის პარაზიტინი სინდრომი** - Крепелин паразитарный синдром (Kretschmer E., 1922). იხ. პარაზიტინა.  
**კრესტინიკოვის პარაზიტინი სინდრომი** - Крепелин паразитарный синдром (Kretschmer E., 1922).

**ციკლოთიმური და შიზოთიმური კომპლექსების ფსიქოლოგიური ნიშნები**. ციკლოთიმურს მიეკუთვნება დიათიმური პროპორცია - შირიშპილებიდან ანტირეტობამდე. შიზოთიმურს - ფსიქოსთენური პროპორცია. პიკრესტინიკის (აწველა მგრანობილები) და ანტიციკლის (სიყვე) შირიშპი.

**კრესტინიკოვის პარაზიტინი სინდრომი** - Крепелин паразитарный синдром (Kretschmer E., 1922). იხ. პარაზიტინი სინდრომი.  
**კრესტინიკოვის პარაზიტინი სინდრომი** - Крепелин паразитарный синдром (Kretschmer E., 1918).

**კრესტინიკოვის პარაზიტინი სინდრომი** - Крепелин паразитарный синдром (Kretschmer E., 1918). იხ. პარაზიტინა.  
**კრესტინიკოვის პარაზიტინი სინდრომი** - Крепелин паразитарный синдром (Kretschmer E., 1922).

**კრესტინიკოვის პარაზიტინი სინდრომი** - Крепелин паразитарный синдром (Kretschmer E., 1922). თავის გრების ხსენებარდგობა ავადმყოფური უკარობის გომივლენება, მათი ფუნქციების მკეოთრად აღმოყენებულ მოსაგებულ მოთხოვნაზე სწრაფი რეაგირების შეუძლებლობა. დაშასასიბთებელი ამორჩეული მგრანობილებლის ფრნიკენი სხეულის დაზარის, სიყის მიხარო, აღკობილად გოლერანგობის დაცივობა. ფსიქიკური სეგრამო აღნიშნება ავეტქების შეუკვევლობა, ფსიქიკური ფუნქციონირების ფონის შოვად დაცივობა, დაქრესტის მოვლები, აწველი ვამბლიანებლობა. აღნიშნება დარღვეული ცერებრული ათეროსკლეროზის, გრავიზილი ენციფალითისის დროს.

**კრესტინიკოვის პარაზიტინი სინდრომი** - Крепелин паразитарный синдром (Kretschmer E., 1958, 1963).

ფსიქოთერაპიული მეთოდების კომპლექსი მოიყვის: 1. შემოქმედება, რომელიც არ არის დაკეშრებული ცნხარგებას და ანალიზთან (სეკსიტიკური თერაპია და ვარეობის მეთოდიც 2. მეთოდი, შირიშპილი ავადმყოფის ამოცნებისა და შეცნობის - განსარება, პერსონიკის, ფსიქოლოგია, ცხოვრების არის შეგრება; 3. შემოქმედება და ხელიყენებისთან დაკეშრებული დახებით განსუბის, სულიკური განთარება. ფსიქოთერაპიაში კულტურა ჩართულია როყირყ სპიკრინალი საშეალები. მეთოდი ავითარებს კრესტინიკის (Kretschmer E., 1934) ფსიქოთერაპიულ კონცეციას.



კრისტალანაზიტი ბრეკცია - кристалланазитная бречея. იხ. ბრეკცია კრისტალანაზიტისა.

კრისტალან-პანდ-შულტერის რეპარატაჟი - Кристаллан-Хелен-Шултера белая (Christian H.A., 1919; Hand M., 1893; Schüller A., 1915). შეჭედრობითი დაავადება (ვადეუმის ავტოსომურ-რეცესიული გეი). საუბედელი - ქოლენგერინის კულის მოშლა და ბრეკციე ძვლების, გენის მავარი გარსის, სისხლძარღვთა, კანის ინფლგრაციო ლიმფოიდური და ლამბერი უჯრედებით. ძირითადი სიმპტომები - ბრეკციე ძვლების დაზანება, ეგმოუთალში, უშაქრო დაბეგი, ფიბროკური და გონებრივი განვითარების ნაშრობა. ეთარღება ბავშვთა ასაკში.

კრიტიციზმი - критический (ბერძ. κριτικός - გარევის, მსჯელობის ხელშეწყობა). 1. ნორმალური ფიქციური მოქმედების ერთ-ერთი თვისება, საკუთარი შეფასების შეტობის უნარი, საკუთარი აზრების, წარმოდგენილი იქონიულების დადებითი და უარყოფითი თვისებების შეფასება და ყოველმხრივი შეზომების უნარი (Рубинштейн С.Л. 1958; Телиос Н.М., 1946). ზეფარხიეს (Зейфарх Н.В., 1986) მიხედვით, კ. გამოვლინდება უნარით, იმოქმედოს მოფიქრებულად, შეამოწმოს და შეასწოროს საკუთარი ქმედებები რეალურ პირობებთან შესაბამისად. პათოლოგიური ექსპერიმენტის სივსაყმაში აკრეციელობა ხასათდება ინტელექტუალურ პროცესებზე კონტრალის დაკარგვით. იხ. მალანტი-ხურანის მითრისმატი პარენიმის კრიტიციზმი მამრისპირაში. 2. კრიტიკულობა (ურო სწორად უკრეციობს) საკუთარ ავადმყოფურ განცდებთან (ზოლვა, პალეიციეია) დამოკიდებულებაში. ასეთი უროტიკობა აღინიშნება თავის გენის შებლეს წილებს უხეში ორგანული დაზიანების დროს. აგრეთვე ელინდება ფსიქიკურ ავადმყოფებში საკუთარი მდგომარეობის რეალური შეფასების აზრისუბოხით, ანომოგნობით.

კრიტიკის სინდრომი - критический синдром (Crichtley C.). იხ. მალანტი-ხურანის მითრისმატი.

კრიშ-პერცის სიმპტომური შიზოფრენია - Криш-Герца симптомотическая шизофрения (Krisch H., 1920; Herz E., 1928). იხ. შიზოფრენია სიმპტომური.

კრიტიციზმ-პანდ-შულტერის სიმპტომი - Криштон-Брауна синдром (Crichton-Browne J.). პირის და თვლების გართუა ეუსებების თლი ტრეფორი. აღინიშნება პროგრესული დაზიანების საწყის სტადიაში.

კროლ-ქლასტის კონსტრუქციული აპრაქსია - Кроль-Кляйста конструктивный апраксия (Kroth M., 1933; Kleist K., 1934). იხ. პარკინსონი კონსტრუქციული.

კრონფელდის ინტერპოქსიმალური სინდრომი - Кронфельд интерпоксималный синдром (Кронфельд А.С., 1938). ფსიქიკური დარღვევების ერთობლიობა უბლუხობით დაავადებულებში გულერთაშორის მდგომარეობებში. ხასათის ეპილეფიური დეგრადაციის მოვლენები და დემენია. აქვს უფრო მეტი ნომოლოგიურ-სეფიციური მნიშვნელობა, ვიდრე პარკინსონული, კრანზიგორული სიმპტომები.

კრონფელდის "რბალი" შიზოფრენია - Кронфельд "шаровая" шизофрения (Кронфельд А.С., 1928). იხ. შიზოფრენია რბალი.

კრონიტიზმი - хронизм (ბერძ. κρονιζμαთ-ბეჭის აზოგლეუა). მოხარობითი ავტოპათიზმის ხამქობა: ხელის თითების მოძრაობა მოგვეკონებს წყვილი სავებით მანაულებიას. აღინიშნება პარკინსონიზმის დროს. სინონ. სიმპტომური პრენიტიზმის სინდრომი.

კრუზონის სინდრომი - Крузон синдром (Cruzon L.E.O., 1912). ოდოლოგრენობ ფორმა, ხასათდება სტადიებითი პათოსით გამოხატულ გონებრივი ნაშრობელობით, ძვლების განვითარების მანქობა (ღონისგათობა). დადავების პათოლოგიაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს თავის გენის სისხლს მიმოქვეის დარღვევა, რომელიც ავტოცენდება ემბრიონული განვითარების ადრეულ ეტაპებზე. დამახასიათებელია თავის ქალას დეფორმაცია, პიკოგლონიზმი, ენთოთალში სხისის დისპლაზია, პოდოფეგალია ოფთალმოლოგიურად - სივლე, მხედვლობის სიმბხილეს დაქვეითება. მხედვლობის ნრუვის დროილების მეტაბოლე და აგრეთია. ფსიქიკის მხრივ - გონებრივი განვითარებლობა, ორგანული ფსიქოსინდრომის მოვლენები. მექიკურგნობით დაავადება, ვადეუმის ავტოსომურ-დომინანტური ან ავტოსომურ-რეცესიული გეი. სინონ. მალანტიზმის შიზოფრენია, მდომარეობა. პანდ-შულტერის სინდრომი.

კრუნჩხვები - судороги. კუნთების უბებლივ შეკუმშვა. მათი უწყვეტი ან წყვეტილი ხასათის მიხედვით არჩევენ კ-ტონურს და კლონურს, წარმოშობის მიხედვით - ცენტრურს და სხანდურს. გამოწყველად: ანოქსიით (მაგ. სინოქიეს დროს), გოქიკური შემოქმედებით (მაგ. სტრეტიზით მოწამელის დროს), ფსიქოგენური ფაქტორებით (მაგ. ისტერიული), ეპილეფიური.

კ. პანდ-შულტერი - с. дефективная დამოყენდება ძლიერი ემოციური ანგნების გეულენით, უმეტესად ბავშვებში.

კ. პანდ-შულტი - с. детанს (Hochsinger K., 1904). კრუნჩხვითი გულყრება, უმეტესად აღინიშნება პუბერტულ პერიოდში, აღმოყენდება განსაკუთრებულ დავიკრებისთან დაკავშირებით - ვიკიური დაბაბელობა, უბორობა, შინს ინტენსიური დასხივება, მნიშვნელოვანი ინტელექტუალური ან ემოციური დავიკრება დამახასიათებელია დიდი ეპილეფიური გეიკურა, უმეტესად ავტოცენდება სიციქლებში ერთჯერ და აღარ მეორდება. კრახი (Kreth H., 1967) ან შემთხვევებს პიკოკუნთების მწყვე ეპილეფიის თვისებურებისადმი გენდენსით. ცალკეულ შემთხვევებში ასეთი გულყრები წარმოადგენს განვითარებადი (რამდენიმე წლის განმავლობაში) დაქრონიული მიხედვარე ეპილეფიის წინამორბედს.

კ. პანდ-შულტი - с. аномалическая კრუნჩხვითი გამოვლენება, შედის როგორც გენერალიზებული, ასევე აკიპური. უმკალური ეპილეფიური გულყრის სტრუქტურაში.

კ. პანდ-შულტი - с. аномалическая უცნობა ზუნებს კ- გარგენულად მავს ეპილეფიურს. ვასტობ (Gastaut H., 1975) მიხედვით, ტრანში უმარობელობა - იმ შემთხვევებში, როცა უცნობა კრუნჩხვის ზუნება, საჭიროა ელექტარაკოთ უცნობი ზუნების კრუნჩხვები.

კ. შიპის რეპარატაჟი - с. рестелация იხ. პანდ-შულტი მალანტი.

კ. ოცობა - с. ипохондрия აღმოყენდება ნებისყოფითი მოძრაობის დასაწყისში ცნსის მოგვართო ორგანული დაზიანების დროს.

კ. ოცობის უცნობა - с. истеричная ისტერიული გულყრის გამოვლენება.

კ. კლონური - с. клоническая ელენება კუნთობანი ხამქობის და მოდუნების ხანმოკლე პერიოდების მონაცვლეობით. აღინიშნება თავის გენის მოგვართო ზონის დაზიანების დროს, უმეტესად - ეპილეფიის და ორგანული გენების ეპილეფიოგრაფული ხინდრომების დროს.

კ. მალანტიზმი - с. малантинизм (სადალაზ-მუსლიმანური მისაღება). თავის რითიული მოძრაობა წინა-უკანა მიმართულებით. თან ახლავს სხეულის ანალოგური მოძრაობები, მოკერ ხელების გამლა. შედის ვსტობ ბავშვთა

მიოკლონიური ეპილეფსიის სინდრომის შემადგენლობაში, რომელიც აღინიშნება ახალშობილებში ფსიქოპათოლოგიური და ნაწილობრივი შეზღუდვის და პოსტნატალური (პოსტ-გალდების დიფუზური წელი კომპლექსები ძალიან დადებითად გამოვლინდება და მკურნალები უნდა იყოს ხანმოკლე ინტენსიური თერაპია და დედა-გალდების სინდრომის ძირითადი რიგის ფონზე). საუბრელო - ნეონობი ბუნების თავის გვიან ირგანული დაიბინება. არ შეუიკრებება ეპილეფსიის სინდრომს: **მ. მანამ დაიბინება, მინიმუმ 3 წელი.**

**მ. რამპლარული** - **с. отекчатая** (ანატი, *отеччатая frontale-მულის სინდრომი*). ენა და ტუჩების რთიმული კონტრაქციები, სინდრომი მოძრაობების. თავის გვიან მუხლის ქვედა სეველის უკანა ნაწილის დაიბინების გამოვლიანება.

**მ. პრეფრონტული** - **с. префронтальная** აღმოცენდება იმ უბნების გადაღლის დროს, რომლებიც სინდრომის პროფილზე მოძრაობებში (წერა, ეოლინომე დაკრება და სხვ.).

**მ. რამპლარული** - **с. ретроградная** აღმოცენდება რამპეგალიზაციის შემთხვევების დროს, მაგ, დენსოგრაფიის მისი გამოვლიანება. სუბიექტის აწეული მგრძობილობის ნიშანი.

**მ. ხალტატორული** - **с. халтаторная** (ლათ. *халтатор*-საუკუყო). კლარული კ- აღმოცენდება უბნზე დგომისას.

**მ. ტონური** - **с. тоническая** ხასიათდება უბნების ხანგრძლივი შეკუმშვით. აღინიშნება თავის გვიანის ზოგიერთი ტონური დაიბინების (ხანდაზღუდვი ბიოტეხები, დეპრესი, გენიანის დროს, როგორც ეპილეფსიური ცუდების ერთ-ერთი ფაზა, ისევერის დროს.

**მ. შერბილული მიმდრეხილი** - **с. шаровидная мидриатическая** აღინიშნება ბაქმთა ახაკში ცხელებითი მდგომარეობის დროს კუნძნებითი მხალფონის ფონზე (ოქაბური წინაგანწყობის შედარებითი სინდრომი). ასაკთან ერთად ქრება.

**მ. შერბილული მარტინი** - **с. шаровидная норма** აღინიშნება ცხელებითი მდგომარეობების დროს და აგარებს ეპილეფსიის ხასიათს არ გოვებს შედეგებს, გამოიხატება კარგი პროგნოზით.

**მ. პირამიდული** - **с. пирамидальная** აღინიშნება მოტორული ცენტრის გადაიბინების დროს თავის გვიანის კემისფეროს ქერქის წინა ცენტრალური ხეველის მიდამოში.

**მ. პირამიდული** - **с. пирамидальная** აღინიშნება მამანებას წინ, ხშირად ცუდითი დარღვევებით, განსაკუთრებით ეპილეფსიური ცუდის დარღვევით დაიბინდება.

**მ. პრენსიპიტი სინდრომი** - **с. пренсипитический** არაბუნებრივად ხმამაღალი და ხანგრძლივი ხიცოდის შეტყვება, თან ახლავს უკრებელი მიმდრეხივი რეპეტეტივი აღინიშნება ნეგროზების, განსაკუთრებით ისტერიის, ორგანული ცენტრის ნეგროზისმდგარი მდგომარეობების და მიმოფრენის (აგარებს მანერულ ხასიათს) დროს.

**მ. რამპლარული** - **с. ретроградная** აღინიშნება რამპეგალიზაციის დროს, როგორც ეპილეფსიური ცუდების დარღვევითი თავის არეში (თავის დარღვევა კლელქე). აღინიშნება ოლიგოფრენიის, კატატონური მიმოფრენის, მიმდრეხივი მდგომარეობების დროს.

**მ. მანამ დაიბინება** - **с. маниакальная** (ბერძ. *μανια*-მოკვდა, *μανια*-მისწრაფება, ლგოლება). ცხელებების წყალების, მოკვდობადი დაუბრუნელი მისწრაფება. აღინიშნება ოლიგოფრენიის, ფსიქოპათიის ზოგიერთი ფორმის დროს.

**მ. მანამ დაიბინება** - **с. маниакальная** (ბერძ. *μανια*-მოკვდა, *μανια*-მოკვდა, *μανια*-ლგოლება, მისწრაფება). ახარტული თამაშობისადმი დაუბრუნელი მისწრაფება. აღინიშნება ფსიქოპათიური პიროვნების.

**მ. მანამ დაიბინება** - **с. маниакальная** (ბერძ. *μανια*-მოკვდა, *μανια*-მოკვდა, *μανια*-ლგოლება, მისწრაფება). ახარტული თამაშობისადმი დაუბრუნელი მისწრაფება. აღინიშნება ფსიქოპათიური პიროვნების. **მ. მანამ დაიბინება** - **с. маниакальная** (ბერძ. *μανια*-მოკვდა, *μανια*-მოკვდა, *μανια*-ლგოლება, მისწრაფება). ახარტული თამაშობისადმი დაუბრუნელი მისწრაფება. აღინიშნება ფსიქოპათიური პიროვნების. **მ. მანამ დაიბინება** - **с. маниакальная** (ბერძ. *μανια*-მოკვდა, *μανια*-მოკვდა, *μανια*-ლგოლება, მისწრაფება). ახარტული თამაშობისადმი დაუბრუნელი მისწრაფება. აღინიშნება ფსიქოპათიური პიროვნების.

**მ. მანამ დაიბინება** - **с. маниакальная** (ბერძ. *μανια*-მოკვდა, *μανια*-მოკვდა, *μανια*-ლგოლება, მისწრაფება). ახარტული თამაშობისადმი დაუბრუნელი მისწრაფება. აღინიშნება ფსიქოპათიური პიროვნების.

**მ. მანამ დაიბინება** - **с. маниакальная** (ბერძ. *μανια*-მოკვდა, *μανια*-მოკვდა, *μανια*-ლგოლება, მისწრაფება). ახარტული თამაშობისადმი დაუბრუნელი მისწრაფება. აღინიშნება ფსიქოპათიური პიროვნების.

**მ. მანამ დაიბინება** - **с. маниакальная** (ბერძ. *μανια*-მოკვდა, *μανια*-მოკვდა, *μανια*-ლგოლება, მისწრაფება). ახარტული თამაშობისადმი დაუბრუნელი მისწრაფება. აღინიშნება ფსიქოპათიური პიროვნების.

**მ. მანამ დაიბინება** - **с. маниакальная** (ბერძ. *μανια*-მოკვდა, *μανια*-მოკვდა, *μανια*-ლგოლება, მისწრაფება). ახარტული თამაშობისადმი დაუბრუნელი მისწრაფება. აღინიშნება ფსიქოპათიური პიროვნების.

**მ. მანამ დაიბინება** - **с. маниакальная** (ბერძ. *μανια*-მოკვდა, *μανια*-მოკვდა, *μανια*-ლგოლება, მისწრაფება). ახარტული თამაშობისადმი დაუბრუნელი მისწრაფება. აღინიშნება ფსიქოპათიური პიროვნების.

**მ. მანამ დაიბინება** - **с. маниакальная** (ბერძ. *μανια*-მოკვდა, *μανια*-მოკვდა, *μανια*-ლგოლება, მისწრაფება). ახარტული თამაშობისადმი დაუბრუნელი მისწრაფება. აღინიშნება ფსიქოპათიური პიროვნების.

**მ. მანამ დაიბინება** - **с. маниакальная** (ბერძ. *μανια*-მოკვდა, *μανια*-მოკვდა, *μανια*-ლგოლება, მისწრაფება). ახარტული თამაშობისადმი დაუბრუნელი მისწრაფება. აღინიშნება ფსიქოპათიური პიროვნების.

**მ. მანამ დაიბინება** - **с. маниакальная** (ბერძ. *μανια*-მოკვდა, *μανια*-მოკვდა, *μανια*-ლგოლება, მისწრაფება). ახარტული თამაშობისადმი დაუბრუნელი მისწრაფება. აღინიშნება ფსიქოპათიური პიროვნების.

**მ. მანამ დაიბინება** - **с. маниакальная** (ბერძ. *μανια*-მოკვდა, *μανια*-მოკვდა, *μανια*-ლგოლება, მისწრაფება). ახარტული თამაშობისადმი დაუბრუნელი მისწრაფება. აღინიშნება ფსიქოპათიური პიროვნების.

**მ. მანამ დაიბინება** - **с. маниакальная** (ბერძ. *μανια*-მოკვდა, *μανια*-მოკვდა, *μανια*-ლგოლება, მისწრაფება). ახარტული თამაშობისადმი დაუბრუნელი მისწრაფება. აღინიშნება ფსიქოპათიური პიროვნების.

**მ. მანამ დაიბინება** - **с. маниакальная** (ბერძ. *μανια*-მოკვდა, *μανια*-მოკვდა, *μανια*-ლგოლება, მისწრაფება). ახარტული თამაშობისადმი დაუბრუნელი მისწრაფება. აღინიშნება ფსიქოპათიური პიროვნების.

**მ. მანამ დაიბინება** - **с. маниакальная** (ბერძ. *μανια*-მოკვდა, *μανια*-მოკვდა, *μανια*-ლგოლება, მისწრაფება). ახარტული თამაშობისადმი დაუბრუნელი მისწრაფება. აღინიშნება ფსიქოპათიური პიროვნების.

**მ. მანამ დაიბინება** - **с. маниакальная** (ბერძ. *μανια*-მოკვდა, *μανια*-მოკვდა, *μανια*-ლგოლება, მისწრაფება). ახარტული თამაშობისადმი დაუბრუნელი მისწრაფება. აღინიშნება ფსიქოპათიური პიროვნების.

(პარტიზორო ქალის) ენით და გუნებით გაღიზიანებისას აღინიშნება პეტროსეფსუალური ურთიერთობების და ქალთა პოპოსეფსუალიზმის დროს. სინონ: ქაბიტაპაპ, შახოსინტაიონ, ჟანდლინტაპაპ.

კუნდილინტაპაპი - кундулинтцап. იხ. *ქანდილინტაპაპი*.

კუნდილინტაპაპი - кундулинтцап. იხ. *ქანდილინტაპაპი*.

კურბონის ანატომიზმი - Курбона анатомизм (Courbon F.), იხ. *ანატომიზმი*.

კურბონ-ტუსკა-დომუზონის ბრეა ინტერიმენტოზიზმი - Курбона-Туска-Домузона брея интериментозизм (Courbon F., Tusques J., 1932; Daumason G., 1937). იხ. *ბრეა ინტერიმენტოზიზმი*.

კურუ - куру. ნეოტოგრესული ინფექტია ახალ გენგაში. აღნიშნება პროგრესირებადი დემენცია ექსტრაპირამიდული სიმპტომებით. ავადდება ახალი გენების ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც კანინალური წეს-ჩვეულებების თანხმად ჭაშს დაავადებული აღამიანის გინსი.

კუსმაული ბრადილიზმი - Кузмаули брадилогия (Kussmaul A., 1876). იხ. *ბრადილიზმი*.

კუსმაულის სიმპტომი - Кузмаули симптом (Kussmaul A., 1876). შეტყუებაში სიკვდილის მარცხების გასოგოება ან გაორმაგება. განსაკუთრებით ადვილად აღინიშნება ძნელი სიკვდილის და ენის გასატების გამოკრების დროს პროგრესული დამბლად ტაპური ნაშანი.

კუსმაულის სინდრომი - Кузмаули синдром (Kussmaul A., 1876). იხ. *სინდრომი ქანდილინტაპაპი*.

კუტანდინის სინდრომი შინდის შინდის - Кутанна синдром многоточечности (Кутанна М.П., 1964). დაუბლევული მასწრაფება წერილებს წერისაგან, რომელთა შინდარსი ერთფეროვანია, შეიცავს ჩივილს, პრეტენციას, ასახავს ავადმყოფის ავადმყოფურ პოზიციას. მოგვიერ წერილს მიხედვით შეიძლება დადგინდეს განდობების, დენის, საკუთარი პიროვნების გადაშეგებული შეუასების ბოლოთა იდეების არსებობა; დამახასიათებელია მრავალსიკვდიანობა, პრეტენციულობა. წარმოადგენს გრაფომანიის სახეს და აღინიშნება პარანოიკური მდგომარეობების დროს. ხასიათით განსხვავდება შიშოვანით დაავადებულთა შედგევი წერითა პროდუქციასგან, რომელიც ასახავს ამროვნების გახლეჩის, სტერეოტიპის, მოუჯერ ვერხიერატივის მოვლებებს.

კუფის აპაპროზული ილიტიზმი - Куфа апапрозная иштия (Куфа Н., 1925). იხ. *ილიტიზმი აპაპროზული პრეპინეპროზი*.

კუჩინის ლანგაფაპი - Кушинга болеса (Cushing H.W.), იხ. *ილიტიზმი-პრეპინეპროზი ლანგაფაპი*.

კუჩინის სინდრომი - Кушинга синдром (Cushing H.W.), იხ. *ილიტიზმი-პრეპინეპროზი სინდრომი*.

კურბონის სინდრომი - Курбона синдром (Courbon O., 1970). მბეჭეფთა ექსტრაფალიკოთია ილითა. ცნება ანალოგიური აპაპროზი სინდრომი თაპის ტაპის უნდუნელოქო რეპანსული ლანგაფაპი (იხ.).







**შეპირების პათოლოგიური პროცესების ტიპი** - Либенхагено патологический процесс (Либенхаген МС. 1928) იხ. კომპოზიციური პრაქტიკის შესახებ.

**შეპირების** - ლათინური (ლათ. lego - კითხვა, a - არა, ethnos - ძალა). ფსიქიკური მომწიფების პათოლოგიის ავადმჯობის ნაბიჯები - ბავშვებს ინტელექტის ნორმალური განვითარების დროს აღინიშნება წერის და კითხვის ჩვეულების გათვლით გაზრდა. სინონ.: რეზიუმე.

**შეპირების ხელის ტრამბა** - Лепта до Солла трамба (Lepund du Saulle, 1886). სიმპტომთა ერთობლიობა, დამახასიათებელია რეგულარული ფსიქოზებისათვის - დემენციული ცენზო-განწყობა, სეპარირი და პალეოლოგიური კლინიკური სურათი ამ სიმპტომთა გამოხატულების ხარისხი სხვადასხვაა, რითაც განისაზღვრება კლინიკური გამოვლინების შრედაღწერილება (Khanov A., 1914). მწვავე რეგულარული ფსიქოზების კლინიკა ლ-დ.ს.ტ-ით არ შემოიფარგლება, მათში აღინიშნება ცნობიერების ფრაგმენტული დარღვევები, ფსიქოსეპსორული ამბიოლოპები, დევიის ბოლითი იდეები, ფსიქიკური ავტომატიზმის მოვლენები (Жахурова Е.К. 1958; Дюркхейм Н.И., 1975).

**შეპირების-პროცესის ტიპი შემოქმედებისა** - Либенфельд-Хененберг тест мироздания (Löwenfeld M., Bühler Ch., 1955) პროექციული მეთოდიცა ბავშვთა გამოსავლებზე. ბავშვს აძლევენ აღმაინის, ცხოველის, ფრინველის, სხვადასხვა საგნების ნაკრებს, რომელთაც იგი ხვდება ყველაფერს ცხოველებში. ამ საგნებისაგან ბავშვი აგებს საკუთარ «სამყაროს», საკუთარ ქალაქს, ომის სენებს. გათვალისწინებულია ბავშვის ასაკი, მისი ინდივიდუალური პიროვნული თავისებურების მეთოდისა აქვს ფსიქოთერაპიული მნიშვნელობა, რადგან იგი არა მარტო აძლევს ბავშვის ფსიქოლოგიურ კონტაქტებს, არამედ მათ გადაწყვეტას უწყის ხელს.

**შეპირების მონაცემების ტიპი** - Либенфельд тест (Löwenfeld M., 1930). მიზართულია სამი წლის ასაკის და ზევით ბავშვთა ინტელექტუალური განვითარების და ცალკეული პროცესული თვისებების შესასწავლად. დროის ხუთი გრომირება ფორმის და ექვსი ფერის 456 ფიგურის ნაკრები. დალევა არ არის შემოთარგვლილი დროში. გამოიყენება მხოლოდ ინდივიდუალური გამოკვლევისთვის განხორციელების წამოიწიების საღიგნისიკოლ. გამოიყენება რაბ-შეხის ტესტთან და ნერვობთ დაეაგებული ბავშვების გამოსავლები ტესტების ინტელექტის ხელახალი ერთად.

**შეპირების-პენეტრაციის სინდრომი** - Либенфельд-Хененберга синдром (Löwenfeld, Henneberg 1902). კატალექსის სახე. დამახასიათებელია კენტოზანი გონების უყარი დაქვეითება, ბოლი. ცნობიერება არ იძლება, ამხვია არ აღინიშნება.

**შეპირების ნარკოზი** - Либенфельд (Либенфельд ВМ, 1935) მოწოდებულია ელექტრონიკის, განსაკუთრებით პოლემორფული ხასიათის გვერდების ხაზურნალოდ. შლის: ფუნდამენტალური, კალიკოს ბროზი, ნატორუმის ბორაკი, კოფეინი, დიფენინი, ტრიპტანინი. ნარკოზის ინტენსივობის სხვადასხვა დოზების და კომბინაციების შერჩევა ხდება ინდივიდუალურად ელექტრონიკის ფორმის, გულყრათა სიხშირის და ხასიათის, ფსიქიკური ცვლილებების გამოხატულების, ავადმჯობის სხვადასხვა წარის და ასაკის, მისი კრუნისაწინააღმდეგო საშუალებებისაში მგრძობილების მიხედვით.

**შეპირების ნარკოზი ნარკოზი** - Либенфельд тест (Levy-Blanchini, 1953). იხ. ნარკოზი.

**შეპირების პანტოფილური პალეოლოგია** - Левт-Валенци пантофилური палеология (Levi-Valensy J., 1925). იხ. პალეოლოგია პანტოფილური.

**შეპირების სინდრომი პანტოფილური** (ლავი-ვალენცი) - Левт-Валенци синдром отчуждения (деперсонализм) (Levi-Valensy J., 1927). იხ. სინდრომი პანტოფილური.

**შეპირების პანტოფილური სინდრომი** - Левт-Валенци синдром отчуждения (деперсонализм) (Levi-Valensy J., 1927). იხ. სინდრომი პანტოფილური.

**შეპირების პანტოფილური სინდრომი** - Левт-Валенци синдром отчуждения (деперсонализм) (Levi-Valensy J., 1927). იხ. სინდრომი პანტოფილური.

**შეპირების პანტოფილური სინდრომი** - Левт-Валенци синдром отчуждения (деперсонализм) (Levi-Valensy J., 1927). იხ. სინდრომი პანტოფილური.

**შეპირების პანტოფილური სინდრომი** - Левт-Валенци синдром отчуждения (деперсонализм) (Levi-Valensy J., 1927). იხ. სინდრომი პანტოფილური.

**შეპირების პანტოფილური სინდრომი** - Левт-Валенци синдром отчуждения (деперсонализм) (Levi-Valensy J., 1927). იხ. სინდრომი პანტოფილური.

**შეპირების პანტოფილური სინდრომი** - Левт-Валенци синдром отчуждения (деперсонализм) (Levi-Valensy J., 1927). იხ. სინდრომი პანტოფილური.

**შეპირების პანტოფილური სინდრომი** - Левт-Валенци синдром отчуждения (деперсонализм) (Levi-Valensy J., 1927). იხ. სინდრომი პანტოფილური.



ერთად აღიზიანება ფსიქიკური დარღვევები - მანიაკალური და დეპრესიული მდგომარეობანი, მათ თან ერთვის ქალეურიანობა, ნეგატივიზმი, ბოღა. შესამდგებელია დეგალური გამოსავალი ერთი წლის განმავლობაში. პათოლოგნატიკურად - თავის გუნის შრალეობითი კროვანი დამაინებები, განსაკუთრებით შუბლის და სავუთქლის მითამობი, პირამიდულ გუნებში. ჟურნალის (Herman E.J., 1978) მიერ აღწერილ შემთხვევებში ასეთი სიმოფორმული სიმპტომაცია გამოწვეული იყო ენცეფალიტით.

**ლიტერატურა** - ირანსაღია იბ. **ლიტერატურა**

**ლიტერატურის სიმპტომები** - ლეონიძის მღვათი კრძელ ღვთისმშენი ბეჭ. VII ს. ბოლოს ცხოვრობდა ბერძენი პოეტი ქალი Sappho) ქალური პოეზიის უმთავრესი მწიგნობარი. სიმონ: **ლიტერატურა**, **ქალეურობა**, **ტრეპაქსა**.

**ლიტერატურა** - ლეტალია (ლათ. letalis - სასიკვდილო). სამედიცინო სტატისტიკური მანგუნული, გარდევლილია რაოლენობის შეფარება ამავე სწელებით დაეადებულა რაოლენობასთან, გამოხატული პროცენტებში გარკვეული დროის მონაკვეთში (ჩვეულებრივ 1 წლის მანძილზე). არჩევენ სააგადმეფოფოსზეა ღლს - სააეადმეფოფოში რაიმე დაეადებისგან გარდაცულობას რაოლენობის შეფარება იმავე სააეადმეფოფოში იმავე დაეადებით პოსიტივლიზებული აეადმეფოფობის რაოლენობასთან; სააგადმეფოფოზეა ღლს - რაიმე დაეადებით გარდაცუვილია რაოლენობის შეფარება ამავე სწელებით დაეადებულა რაოლენობასთან; და ხელოვნო ღლს - როგორც სააეადმეფოფოში ისე მის გარეშე რაიმე დაეადებისგან გარდაცუვილია რაოლენობის შეფარება ამავე სწელებით დაეადებულა რაოლენობასთან. ღ. თერაპიული პრეპარატების, სამკურნალო მეთოდებისა და სამკურნალო დაწესებულებებში სამკურნალო საქმის დაცვების ეფექტურობის ერთერთი მაჩვენებელია. ღ არ უნდა აეკრობოთ ხეცვადმეფოფობაში.

**ლიტერატურის სიმპტომები** - Лето-Хазанов Софий (Lezh M., Nyhan W.L., 1964) შეკვეთებით დაგადება აეადებისან უპირატესად მამაკაცები, გადაეფის აეგოსომურ-რეცესიული გიპი. დამახასიათებელია სიმპტომთა გრიად: ენცეფალიტისა (გონებრივი ნაშორქნილობა, მოძრაობითი მოუსვენრობა, ქორეული ან ათეოფორი პი პერკინგები), პარენის ცელს მომად (პიკურული კემა, პიკურული კურია, თირკმელკეპქოქანი დაეადება), ქვეითი დარღვევები (გარესული და აეგოარკეტიული გენდენებები). აეგოარკეტიული ქვეითი ვლინება გუნების, ფრჩხილების, ფაანგების კეტიკა. ფსიქიკური დარღვევები დაეადებულა გინის ქსოვილიში ბიოგენური ამინების პათოლოგიისთან (Mlanotomaxov A.M., Alexatopova J.A., 1979).

**ლიტერატურის დონესტაქსი** - Лехнера К., 1909. იბ. **ლიტერატურა**

**ლიტერატურა** - ლიბიდო (გერმ. Libido). ფსიქოანალიზში: სექსუალური ენერჯია, რომელსაც ფროიდი თვლის ყოველგვარი სექსუალური დტოღვის სახესხეობის საუბელად, მათ შორის ობიექტის, მისი მიზნების და სექსუალური აგზების წყაროდ.

**ლიტერატურის პლასტიკური** - пластическая либидо (გერმ. Plastischer Libido). ფსიქოანალიზში: ლიბიდოს თვისება, ოლიად შეიკვლის ობიექტს ან დაეადმეფოფობის ხერხი.

**ლიტერატურის სიმპტომები** - Kiebrickel der Libido). ფსიქოანალიზში: ღ. სხედასხეა ინდივიდის სხედასხეაგარად აქვს გამოხატული. ფროიდის მიხედვით, ეს არის მისი თვისება, განპირობებული ამა თუ იმ ობიექტზე ან სებადაზე ღლიბიდის ფიქსაციის უნარით.

**ლიტერატურის შემსებება** - либидостимуляция (გერმ. Libidostimulation). ფსიქოანალიზში: ენერჯიული პროცესი, რაიმე ფროიდის მიხედვით, შეადგება გამოწვევის ნევიროზი ან ფსიქოზი. დამახასიათებელია ღლიბიდოს ისეთ მდგომარეობაზე როცა იგი ვერ ახერხებს განმუხებას და აკუმულირდება. ენერჯიის ასეთი დტროვება იწვევს სიმპტომთა წარმოშობას.

**ლიტერატურის მარტივობა** - либидопривлекательность (სინიუ C.C., 1966). ერთი აეადმეფოფობის უარყოფითი ფსიქოლოგიური სიმპტომებია მეორეზე განსაზღვრული ჟგუფის პირობებში, რაც განაპირობებს ნევიროზული ხასიათის ახალი ნევიროზის აღმოცენებას ან ეფექტურად გაძლიერებას. ფსიქოანალიზის ერთერთი განაანტი.

**ლიტერატურის მეთოდები კოლექტიური ფსიქოთერაპია** - Либидо методы коллективной психотерапии (სინიუ C.C., 1967). 1. პათოლოგიური კოლექტიური ფსიქოთერაპია, შვისწავლის აეადმეფობის პირობებში თავისებურებას და არასწორად ფორმულირებულ დამოკიდებულებებს გარდაქმნის შემდგომი ეარქიზით და სოციულურ ფსიქოლოგიისა განგეკიუებით. 2. სამკტომური კოლექტიური ფსიქოთერაპია, სედაციური, გაბეცევილები, ყურადღების გადამგანო, რომლის დროსაც გალიბიდო შედარებით ეწრო ამოცანები და არ ეხება პიროვნების მდლიანობაში.

**ლიტერატურის პარკეტივიზმი** - либидопривлекательность (სინიუ C.C., 1966). ფსიქომაგტრადმერებული გაეღენა აეადმეფოფე ექიმის დუბლით ან არასაკმაარისი განმარტებით, ინფორმაციით.

**ლიტერატურის მარტივობა** - либидопривлекательность - либидопривлекательность

**ლიტერატურის მარტივობა** - либидо (ლათ. ligo - ვაკეობა). სექსუალური ენერჯიის ნეოთერაპია, რომლებიც აგზებს თავის გინის გარკვეული გიპის ურთულ რეკეპტორებს - აღრენერგულს, დოფამინერგულს, კოლინერგულს, სეროტონინერგულს, ბენზილალეპინერგულს, სეტიდინერგულს და სხვ.

**ლიტერატურის მარტივობა** - либидо (ლათ. ligo - ვაკეობა). სექსუალური ენერჯიის ნეოთერაპია, რომლებიც აგზებს თავის გინის გარკვეული გიპის ურთულ რეკეპტორებს - აღრენერგულს, დოფამინერგულს, კოლინერგულს, სეროტონინერგულს, ბენზილალეპინერგულს, სეტიდინერგულს და სხვ. 1) ჟგუფის წევრი, რომელსაც ჟგუფი აღიარებს გადაწყვეტილების მიმდებად მისთვის მნიშვნელოვან საგეფოფობში. 2) ინდივიდი, რომელსაც აქვს უნარი, შეასრულოს ცენტრალური როლი ჟგუფში, ურთიერთობებში და მის საერთო მოღეეეობაში.

**ლიტერატურის მარტივობა** - либидо (ლათ. ligo - ვაკეობა). სექსუალური ენერჯიის ნეოთერაპია, რომლის მართლმ წარმოადგენს ნეოთერაპია პარკეტივიზმი პარკეტივიზმი (იხ.). ღლიბიდოს მარტივობა (ნაშორქნიება) გამოიყენება პიპოზიტიკალური და საშუალო სიმძიმის მანიაკალური მდგომარეობების დროს. მიიშე მანიების, აგრეთვე მიიშე მანიაკალური სიმდროშების (ბოღებით, ქალეუნიაციურ და სხვა ფსიქოპათოლოგიური გამოფინების) დროს ღლიბიდოს პრეპარაციები ეფექტურია ფსიქოტროპულ პრეპარაციებთან ერთად ღლიბიდოს მარტივობის ეარქიზით გამოიყენება აფექტური ენერჯიის ფსიქოშემების პროფილაქტიკისთვის: ბიპოლარული მამდმარეობის დროს - მეორე შეტევის შემდეგ, მონოპოლარულ დროს - არანაკლებ შესაბის (Авдеев А., 1977). კონკრეტი ხორციელდება დამოფორმულად (ღლიბიდოს დოზის სისხლს მრეაქტი) და კლინიკურად (შეჯილის ვეში). შეერბლობა იწვება მანიაკალურ მდგომარეობაში ან ნათუე პირობებში.

**ლიტერატურის მარტივობა** - ликопекция (ბერძნ. lykos - შველს, თესხ - სიმბილი). ქიმიკადამე აეადმეფოფური ღტიოფე, ელინდება დღი რაოლენობით საკეების, ხმარად შეუთავსებელი საკეები პროლეტების, მიღებით. ამით იგი, განსხეელებ









განვითარების სხვადასხვა სტადიაზე. გამოკვნილება ღვინის ცალკეული გიჟებით (ორალურა, ანალურა, ხაფხუტურა, ღვინოთა თვალთვალთვალთვა და სხვ.), რომლებიც გენეტიკური ფაზის დასაწყისში ინტეგრირდება გენეტიკური მონაცემების სახით და ექვემდებარება სექსუალურ (სივრცით ვიწრო გაფიქრებ) ღვინოთა.

**7. ნიკტინიზმი** - **в к таянство** (გერმ. *Nightvision*). ფსიქოანალიზში ამ გერმანიის ფრაიდიხსნარის ბიოლოგიურ და ფსიქოლოგიურ მნიშვნელობით, სიცილიისადმი ღვინის აღსანიშნავი, თუმცა, ღ. იხმარება ზამინ, როცა სიცილიისადმი ღვინო მიმართულია გარეთ.

**8. სემსუალური** - **в сексуальность** (გერმ. *Sexualtrieb*). ფსიქოანალიზში: მინიგანი დაძაბულობა, რომელიც ხელდება მოცავდ მრაველი სექსუალური ქვეყის ჩარჩოებს და განსხვავდება სექსუალური ინსტიქტისაგან. მისი როლები ბიოლოგიურად არ არის განსაზღვრული და მისი მიღების ხაზუალებები (მიწინები) ცვალებადია - დამოკიდებულია სხვადასხვა ორგანიზმის ფუნქციებზე (ფრაგუნური ზონება). სექსუალური აგნების სხელოვანი პრადუალბობა მიუთითებს, რომ სექსუალური ღვინოთა თავიდანვე მოკლებულია ერთიანობას და გამომავალია ღვინოთა სექსუალური დაქმყოფილებით (მიღებული ამა თუ იმ ორგანოს მიერ). ფსიქოანალიზი თვლის, რომ აღმაინის ღვინო დაქმყოფილებულია წარმოადგენსა და ფანგაიიებზე, რომელშიც იგი ეღვებულის კონკრეტულ ფორმას, ევოლუციურ განვითარებაში ორგანიზმდება სექსობრები შახსათებულებით, იღებს სიმყარეს, მიმანდასხულობას და სალოლებს ინსტიქტს.

**9. სემსუალური** - **в к таянство** (გერმ. *Todestrieb*). ფსიქოანალიზში: ღვინოთა კატეგორია, ეწინააღმდეგება სიცილიისადმი ღვინოთა და მიმართულია დაძაბულობის მიღანად მოსახსენად ანუ ცოცხალი ორგანიზმის გარდასაქმნელად არაორგანულ მდგომარეობაში. მიმართულია, პირველ რაგში, თვითგანადგურებისადმი და შლოდ მდგომარეობა, გარეთ - ღვინოთა აგრესიისადმი, ღვინოთა ვანადგურებაშია.

**10. სემსუალური** - **в к таянство** (გერმ. *Lebenstrieb*). ფსიქოანალიზში: ღვინოთა გამომავლობის ღვინოთა, რომელიც უპირისპირდება სიცილიისადმი ღვინოთა. ფსიქოანალიზში აღინიშნება აგრეთვე გერმანიის - *Leben*. ეს არა მარტო სექსუალური ღვინოთაა ღვინოთა, არამედ გამომავლებს თვითმეწარმეობისადმი ღვინოთა. ფსიქოანალიზში: კრუპელინი (*Krupellen E.*, 1910) აღინიშნება ღვინოთა სერვის სერვისებისა და დინამიკის, გამოყენების თავისებურებებს და სხვა ფსიქიკურ ფუნქციებზე მის გავლენას განსაზღვრავს სუბიექტის ფსიქიკური ცხოვრების მთელ წყობას, მის ხასიათს. მისი შესწავლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ხასიათის აქტივაციის, ესოვრობის, თავის განის ორგანულ დაზიანების შედეგში პირიველი ცვლილებების, ნარკოტიკების კლინიკაში. იგი მნიშვნელოვანდ ეყვლება ფსიქიკების ღვინოთა, რომელიც მიმდინარეობს აქტივური დარღვევებით (მღვ, მშობრენია).

**11. ტრიბუნის მისიზმი** - **неп смешение** (გერმ. *Triebziel*). ფსიქოანალიზში: მოქმედება, რომელსაც წარმოშობს მინიგანი დაძაბულობა; მისი საფუძველია ფანგაიი.

**12. ტრიბუნის რემიზმი** - **неп смешение** (გერმ. *Triebregression*). ფსიქოანალიზში: ეღვებები და პროცესები, რომლითაც გამოიხატება ღვინოთა.

**13. ტრიბუნის მისიზმი** - **неп смешение** (გერმ. *Triebmischung, Triebtrennung*).

ფსიქოანალიზში: ღვინოთა მნიშვნის მათ შერევის სხვადასხვა პროცესებში განცალკევება - ეს არის პროცესი, რომლის ღვინოთა ღვინოთა სხვადასხვა ან განიყოფა ცალკე თავიანთი მიზნის მიხედვით. გარდა აღნიშნულისა, ფრაიდიხსნარის ხმარობს როგორც სიცილიისადმი ღვინოთა და სიცილიისადმი ღვინოთა ერთიერთადმოკლებულებს ამსახელებს.

**14. ტრიბუნის მისიზმი** - **неп смешение** (გერმ. *Triebquelle*). ფსიქოანალიზში: ყოველი კონკრეტული ღვინოთა მნიშვნის წყარო - ადგილი, რომელშიც წარმოიშობება აგნება, მგვ, ერთგვრული მონა, ორგანო, აპარატი ან სხეულში მიმდინარე ესა თუ ის სობაგური პროცესი, რომელიც ადგილებს აგნებად.

**15. ტრიბუნის მისიზმი** - **неп смешение** (ლათ. *ludus* - თამაში, ბერძ. *ludra* - მკურნალობა). ფსიქოანალიზში: მეთოდი, დაძაბულობის იმ ფაქტორების გამოყენებამ, რაც იწვევს ფსიქიკურ მოღვინებას, დაძაბულობის მოხსნას (სიცილის უწრო გაფიქრებით, თამაშით თერაპია, მუსიკათერაპია, ცეცხლები და ა.შ.).

**16. ტრიბუნის მისიზმი** - **неп смешение** (ლათ. *ludus* - თამაშები და დაჯილდოება). სხეულობის ნეიროლექსი - ნერვიული ხისტების სიცილისური დაზიანება.

**17. ტრიბუნის მისიზმი** - **неп смешение** - **Лундберг** **Б.О.**, 1973) მუქიდერობით დაჯილდოება, ხასიათებსა მიოპათიით, გამომავალი ოლიგოფრენიით, მონიშნის პათოლოგიით და პიქტორნალოგორთული პათოლოგიის მიხედვით (ანტიგრაფი, ნადირეზი მენიპარება). ნეიროლოგიურად - პირამიდული ნიშნები, პიქტორიის პროგრესული დარღვევა, მუცხელებს დარღვევა. აღინიშნება მონიშნის ანომალია გადაცემის ავტოსომურ-რეცესიული გი.პი. სინონ. **სემსუალური ღვინოთა**.

**18. ტრიბუნის მისიზმი** - **неп смешение** (ლათ. *ludus* - თამაშები და დაჯილდოება). სხეულობის ნეიროლექსი - ნერვიული ხისტების სიცილისური დაზიანება.

**19. ტრიბუნის მისიზმი** - **неп смешение** (ლათ. *ludus* - თამაშები და დაჯილდოება). სხეულობის ნეიროლექსი - ნერვიული ხისტების სიცილისური დაზიანება.

**20. ტრიბუნის მისიზმი** - **неп смешение** (ლათ. *ludus* - თამაშები და დაჯილდოება). სხეულობის ნეიროლექსი - ნერვიული ხისტების სიცილისური დაზიანება.

**21. ტრიბუნის მისიზმი** - **неп смешение** (ლათ. *ludus* - თამაშები და დაჯილდოება). სხეულობის ნეიროლექსი - ნერვიული ხისტების სიცილისური დაზიანება.

3. ლურთან ზინაბანო სერაფიმ დავაგაძისა - Луртан А. Зинабана Серрафимовна (Луртан А.Р., 1935). об. **დავაგაძის ზინაბანო სერაფიმ**.

**ლურსმანი მტმარაღლი** - *mus musculus* (clavus hystericus, ლათ. clavus - ლურსმანი). ბღიერა ტკივილის შეგრძნება, რომელიც ერყვლება ერთი მიმართულებით, თითქოსდა მარტობადი ლურსმნის გასწვრივ. მაგ, თავის ტკივილი, რომელიც ერყვლება წინიდან უკან. აღინიშნება ისტერიის დროს.

**ლურსმანის ტმარაღ ზერის პარანეზისა** - *Носовая полость ушная* (Liseaber M., 1948). ეჭმპერამენტულ-ფსიქოლოგიური მეთოდიკა პარონული თვისებების გამოსაკვლევად. დამყარებულია ეარაულზე, რომ ამა თუ იმ ფერისთვის უპირატესობის მინიჭება ასახავს პარონების ცნობიერ და არაცნობიერ სტრუქტურას. გამოსაკვლევი ირრეეს ფერების ნიმუშებს და მათ აღაგებს სუბიექტური ფერარქიის მხედვით. შეუასება ხლება აქტიურობის - პასიურობის და პეგრირატივონოშიურობის პარამეტრების მიხედვით. შოლოდ გესტის მონაცემებით არ შეიძლება პიროვნების სრული აღასათება, თუმცა, მეთოდიკა იძლევა პარონების ემოციური მდგომარეობის ცვლილების აღინიკაში შეუასების საშუალებას. ამგვარი მონაცემები, რამულას (Рауляс К.А., 1966) ფერების სუბიექტური აღქმის მეთოდიკის საშუალებით, მიღებული იქნა დისფორიების დროს ენაღვსისთი დააეღებულებში (Носищев В.М., Носищова И.В., 1969). გესტი წარმატებით იქნა გამოყენებული ბოკოფის (Бокос С.Н., 1988) მიერ შიშოფრენის დროს, სადაც მან მიუთითა, რომ გამოყვლეულა მოქმედების გენდერცია დამოკიდებულია ფსიქიკური დევექტის გამობაღვლების მარისხზე, მოგვიაციის დონის დაქვეითებაზე.

**ლურსმანის სინდრომი** - *Лицевая дистония* (Ludman L., 1907). **სამპტომთა ტრიადა** ნათხვობ სხვადასხვადანანვობ დროს: 1) კუნთოენი ასთენია ან პიპოსტენია (მუსკულატურის შრომის უნარის დაქვეითება); 2) ატონია (კუნთოენი დაბაბულობის დაქვეითება მოსვენებულ მდგომარეობაში); 3) ასტანია (ნებითი მოძრაობების სიშყარის დაქვეითება). შესაბლოა აღინიშნებოდეს ატაქსიაც.

**ლუსტოლნიკი** - *Лустолник* (ლათ. Lusa - სხივი, სინათლე). **პათოლოგიური შანაარსთ დაუტვართაღ**. მაგ, ლ. ღრო, ლ. ინტერგადი (ნათელი პეროლი) მღუს დროს. ლ. კატატონია - კატატონია, მიმდინარე პალეუნიკურ-ბოლოდეთი განცდების გარეშე.



**მანქანების რეპარაციის უნივერსიტეტი** - МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ტვირთის ტრანსპორტის განვითარების განხორციელების მიზნით, დაზარალებული წყალბადის (პროტონის) ბირთვის სიმკვრივის განსაზღვრის შეუძლებლობა. გარკვეული თანმიმდევრობით გამოიყენება მუდმივი და ცვლადი მაგნიტური ველები. მრავალჯერადი დამუშავების შემდეგ ეკრანზე მიღებულ გამოსახულებას აქვს არა მარტო ანაგონური შიშვნილობა, არამედ იძლევა ფიზიკურ-ქიმიური ხასიათის ინფორმაციას სხვადასხვა საბრტყეებში ტრიალების გამოსახულებების მაღალი კონტრასტულობის მიღებასა და ადრეული და ზუსტი დადგენისთვის (სიმთვინე, გვირის ინჟერქტი, მადეზილენინების და ატროფიული ცვლილებები და სხვ.) საშუალებას გამოირჩევიდა არგუმენტები კრისტალოგრაფიის მეთოდების გამოყენებით ნათქვამში, ქვიშვურობებში და გვირის ღეროში ძვლოვანი ქსოვილის სანაღებზე. სპეციალურ ტრიალში შეიძლება გამოვიყენოთ კრანოლოგებისგან და დასავლეთის მიღებულ მრ-გომოგრაფიის საშუალებებით შესაძლებელია შევასწავოთ სისხლის ნაკადი და გვირის მსხვილი სისხლძარღვების კედლის მდგომარეობა. მრ-ხევეტროსკოპია იძლევა ერთდროულად გვირის სტრუქტურის და შევადგინების, ენდოგვირული და გვირული პროცესების შევასწავებს საშუალებას.

**მანქანების უნივერსიტეტი** - МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ლათ. machina - ღილი, მანქანა - მკვლევარი). მაღალი თანამდებობის პირის მკვლევარი. **მანქანების უნივერსიტეტი** - МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ იხ. მანქანების უნივერსიტეტი.

**მანქანების უნივერსიტეტი** - МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ფსიქოანალიზზე სპეციალური გავლენების მიზნით, რომლის დროსაც სუბიექტი დატოვებულია დევილბის პარტნიორისაგან წახებით და დამცირებით. ვროილი მანქანების საწყისებს ზედმეტ ბავშვთა სექსუალობაში, ხოლო მის ელემენტებს - სხვადასხვა სექსუალურ ქვებში. ამავდროს გამოყოფს **მანქანების უნივერსიტეტი**, რომლის დროსაც დანაშაული არანდებოვანი გრძობა აიძულებს სუბიექტს, დაიკავოს მსხვირბის პოზიცია. ასეთ შემთხვევებში მანქანების უნივერსიტეტი გამოიყენებენ შეიძლება არ იყოს დაკავშირებული სექსუალურ დატოვებებისთან.

**მანქანების უნივერსიტეტი** (მანქანების უნივერსიტეტი) - Малярская цеховая (Maлярский цех). ნეოლოგიზაციის ერთ-ერთი ფორმა. დსოლეუის შექმნის მიზნით, განხორციელება აღნიშნული გრძობა და დსოლეუ, რომლის მაგნიტული სუბსტრატია ელემენტური ნერული სისტემა. ინტენციები, დსოლეუა წარმოადგენს ფსიქიკური ცხოვრების დინამიკის წყაროს. აღნიშნის ფსიქიკური ფუნქციის განვითარების ეტაპები განხორციელება შრომით ევოლუციურ ასპექტში, ისინი აისახება მონდოლი აღნიშნის ფსიქიკური მოქმედების სტრუქტურაში. უკანასკნელი წარმოადგენს პირობით-მამორბაელები პრელოგური და დსოლეუი დინამიკების სინთეზს. მანქანების უნივერსიტეტი, ელემენტური ნერული სისტემა წარმოადგენს თავის გვირის ყველა საფეხურს მირთად გამართიანებულს, რომლის უორმირება შეუძლებელია ფსიქიკის ეტაპებს. მანქანის ფსიქიკური ფუნქციის განვითარების მიზნით მისი ავტორის მებელებს მიმოგრენიანს დროს ხდება ქვემარტივი, პროგრესული, უშუალო დსოლეუა, რომლის დროსაც, პირველ რიგში, მიანდება თავის გვირის ინჟერქტიული მანქანების მიზნით მალა მდგომ უნებში მანქანა, როცა ქვემდებარე სარტულის (ცნის დონე) ფუნქციონირება არ მიანდება და შეიძლება გამბეზრებული იყოს. მანქანების უნივერსიტეტი, ელემენტური პროლოგური ფსიქიკოლოგიური სიმპტომები (პალეონიკა, ბოლეა) რაც განპირობებულია პრელოგური სტრუქტურების გადმიანებით.

**მანქანების უნივერსიტეტი** - Малярская цеховая (Maлярский цех) (1909) იხ. მანქანების უნივერსიტეტი.

**მანქანების უნივერსიტეტი** - Малярская цеховая. სიმპტომი, რომელიც ხასიათდება მანქანების უნივერსიტეტი ტრენდენტოში მემთხვევებშიცაა კი, როცა მაგნიტული სარტული არ არის. აღნიშნება გამოხატული ფსიქიკოლოგიური ცვლილებების დროს ასეული უნივერსიტეტი და განსაკუთრებით მოგვიწოდებთი ასაკის ფსიქიკური დაავადების დროს.

**მანქანების უნივერსიტეტი** - Малярская цеховая (Maлярский цех) (1936). 1) ასოციაციების გავლენები; 2) ნების დარღვევა - ავტომატური რეაქციები, არადევიტური იმპულსურობა, ნეგატივიზმი, ამბივალენტობა; 3) ასოციაციური ავტომატური გამოვლინებები - ახლობლებისა და მეგობრების მიმართ გრძობების გაყვება, შინის გრძობა, გამდინარეობის ავტომატური; 4) ავტომატური

ელეზიები, რომლებიც უღიწველად მწვანე გაღმოსავლეთში შთაბეჭდილებებით და აღმოცენდება მისიკური განწყობის და სრუ ინტერპრეტაციების ზოგადების დროს; 5) კატატონური სიმპტომები, მეტყველებითი და მიძრავითი დაბოლოებების განსაკუთრებული დეკლარაცია; 6) პალეოცენტრიზმი, განსაკუთრებით სწვნილი. ამ სიმპტომთა დაბოლოებული მნიშვნელობა შევად იმრდება, როცა მათ თან ახლავს აუცილებელი რეალობიდან მოწყვეტილი და მშინ, როცა ავადმყოფი ვერ ამჩნევს ქვევს ზოგადი თაგისებურების აბსურდულობას, მათში ვერ ხედავს დაავადების ნიშნებს.

პაპირ-მრწამსის მნიშვნელოვანი მდგომარეობები - Mayer-Grossa onefromnne sostoyaniya (Mayer-Gross W., 1924). იხ. მნიშვნელოვანი მდგომარეობები.

პაპირ-მრწამსის ორბანული მსტრინი - Mayer-Grossa organoznaniya istoriya (Mayer-Gross W., 1930). იხ. მსტრინი ორბანული.

პაპირ-მრწამსის სიმპტომი - Mayer-Grossa simptom (Mayer-Gross W., 1928). სინსტემური პალეოცენტრიზმი, აღმოცენდება ერთდროულად რამდენიმე ანალიზატორში. მაგ, ავადმყოფი ხედავს მოძრაე ვიზუალებებს და ესმის მათი მეტყველება, ხედავს ყუვილებს და ცრინობს მათ სუნს. იხ. პალეოცენტრიზმი სიმპტომი.

პაპირ-მრწამსის სიმპტომი მრავალფეროვანი მსტრინისა - Mayer-Grossa simptom raznoobraznoy psixozny (Mayer-Gross W., 1931). იხ. სიმპტომი მრავალფეროვანი მსტრინისა.

პაპირ-მრწამსის სიმპტომი ჩარბინისა - Mayer-Grossa simptom kharbinskiy (Mayer-Gross W., 1936). იხ. სიმპტომი ჩარბინისა.

პაპირის ზრდის შარბინის სიმპტომი - Mayera simtomnye sredoprazhazhniye (Mayer H.W., 1913). ზოგჯერ წარმოქმნა, რომელიც შეესაბამება გუნება-განწყობას და მისგან გამოხდნარეობს, მაგ, მიმოთ განპირობებული დამოკიდებულებებს ზოგჯერ, რომლის სტრუქტურაშიც მნიშვნელოვანი ადგილი უკრავს შინს და გუნება-განწყობის დაქვეითებას.

პაპირის მრბანული მსტრინი - Mayera prazhazhniya (ბერბინ. ფრანკ. - შუმაბი, მოქმედება, სივს - სიყვავი, ცნება) (Meyer A., 1908). შარბინის მიერ 1915 წ. შექმნილი ფსიქოპათოლოგიის ძირითადი კონსტრუქცია, წარმოადგენს ევლუციურ, პრაგმატულ თეორიას. დაზიანებული განხილვებს როგორც ბიოლოგიური, სოციალური და ფსიქოლოგიური ფაქტორები ინტერაკციული ერთობადა. ფსიქოპათოლოგიის ფსიქოპათოლოგიის შესწავლაზე დამყარებული ნოზოლოგიური პრინციპი შეუდილა კონდრინის პოლიფილიან ზოგადიდან ჩატარებულ ე.წ. ურბანული რეაქციების აღმოცენების პირობების გამოკვლევისას. ეს ურბანული განხილვები როგორც პარტენების ადამიანების რეაქციის ფსიქოპათოლოგიური დახვედვა თითონ ცნება ფსიქიკური დაავადება, განხილვები როგორც უწყვეტად მიმდინარე ურბანის შედეგი, რთვ ფაქტორების სუბსტრუქტურის და ურბანული მსტრინის, რთვლიდან არც ერთი არ არის წაყვანილი. დაავადების შესწავლა დაეყვანილა ავადმყოფის ბიოგრაფიის ანალიზზე. პარტენ რეაქციების 6 ტიპს, რომლებიც თითქმის აერთიანებს მთელ ფსიქიკურ პათოლოგიას: 1) ორბანული; 2) დელირიული; 3) ფიქტიური; 4) პარანოიული; 5) რეაქციული, მაგდარე ზოგადი და პალეოცენტრიზმი; 6) დროებითი რეაქციები კონსტრუქციების გამოდგენის დროს. 1-2 ტიპი შეესაბამება სომატოგენურ ფსიქოპათოლოგიას, 3 - სერუკარული ფსიქოპათოლოგიას, 4-5 - მიმოფრენის, 6 - ნეგროზის.

პაპირის პატარბინული პარტენი - Mayera katatimnye psixozny (Mayer H.W., 1913). იხ. პატარბინული პარტენი.

პაპირის სიმპტომი - Mayera simptom (Meyer A., 1910) შეუდილა შარბინის წარტილებ შეწოდით გუგუბის გაფართოება. შეიძლება შეგვიდეს სხვადასხვა ფსიქიკური დაავადებების დროს.

პაპირის ფსიქოპათოლოგიური მსტრინი - Mayera psixopatologicheskaya teoriya (Meyer A.) დამყარებულია ურბანული როგორც კონსტრუქცია და ფსიქოპათოლოგიის ძირითადი მეთოდი ავადმყოფისთვის განმარტება, რომ სიმპტომი, რომელიც მას აღნიშნავს წარმოადგენს არაცნობიერის მიერ სექსუალური კომპლექსების დატრეფის შედეგს, მისთვის ცხოვრებისეულ სიტუაციებზე აღუკავრული რეაქციების სწავლება. ფსიქოპათოლოგიური ფსიქოპათოლოგია (პარტენის ანალიზის) პრევენციას აყვადებს ფსიქიკური დაავადების მუერნალობის ძირითადი და განსაკუთრებული მეთოდის როლზე.

პაპირის შარბინი - Mayera aktsiya (Melnart Th., 1881). იხ. შარბინი.

პარანოიის შარბინი - Melnartova psixozny წყის თანხმად, სულითავდაწყობები არ ატევენ პახებს თავის ქვედაზე, რომლებიც ჩაიღებენ ავადმყოფურ მდგომარეობაში, არ შეუდილიან განსამხვრეათ საკუთარი მოქმედებების არადადეგატორობა და მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი. წყის შარბინი 1883-დან, როცა იგი ბრიტანეთის სასამართლომ მიიღო დანიელ მაქნათანის (McNathson D.) მიერ ზოგადი მოცავების ჩაქვნილ მექველობასთან დაკავშირებით. 1922 წ. აღნიშნული წყის გაფართოება ცნებით სრეფინის სრესის (იხ).

პარანოიის შარბინი - Melnartova psixozny (ბერბინ. ფრანკ. - დილი, მსო - უესმე, შესმის). მდგომარეობა, რომლის დროსაც პარტენი აღუქმება გაძლიერებულად აღინიშნება ეპილეფსიის დროს.

პარანოიის მსტრინი - Melnartova psixopatologicheskaya teoriya (ლით. genitalis - მიეტივენება დაბადების, ლათ. zoma - სხეული). ნაადრევი სექსუალური და ფსიქიკური მსტრინი აღინიშნება ენლოკრინული სისტემის პათოლოგიის დროს (პარანოიის, სისქიკური ჯირკვლების, ეპილეფსიის, თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქის სიმბინეები), თავის ცინის ორგანული დაზიანების დროს, აგრეთვე თავის გრავების შედეგად.

პარანოიის შარბინი - Melnartova psixozny (ანაგ. გუთს ცხოვრ - დილი გენის სხეული). თავის ტყინის თანდაყოლილი ან შექმნილი (ნადასახებ ევმოგენური მექოქელებით გამოწვეული) ანომალია. ხასიათდება სხეულების მოშების გადაღებით და მათი რაოლეობის შემყრებით. ამ დროს ცინი ჩვეულებრივი მოშისა ან შექმნილია (მიკროსეფალია). აღინიშნება გუნებრივი ჩამორბინილობა ილიგიადზე.

პარანოიის მსტრინი - Melnartova psixopatologicheskaya teoriya (ბერბინ. ფრანკ. - ენს). ენს მოშების გადაღება. ენს მოგურ იმდენად დილია, რომ ვერ ეტევა პირის დრუმი და ჩანს ქუეჩის შორის. ამ დროს მნიშვნელოვან დაზიანება გამოთქმის ხარისხი. აღინიშნება აკრომეგალიის, მიქსედემის დროს.





**მარკო-ლევის ავტობიოგრაფიული სიტყვა** - Марк-Левы автобиографический очерк (Marie P., Levy G., 1920).

იხ. **სიტყვათა მემორიალური სიტყვა**.

**მარის დასავლელი** - Мари Бельен иб. ქაქაძე **მარია**.

**მარის ნათესავის ატაქა** - Мари атақия мақалқатая (Marie P., 1893). იხ. **ატაქა ნათესავის**.

**მარის სიმბოლო** - Мари символ (Marie P., 1906). თავის გინის კუთხის წილების დამაინების დროს აღწებს და ხედავს **ორიენტაციას** თავისებურ **მომღა**. ავადმყოფი ვერ ახერხებს გაერკეოს ადგილმდებარეობაში, ვერ გადაადგილდება განსაზღვრული ხელაკებით.

**მარინესკუ-გარლენდის სიმბოლო** - Маринеску-Гарленда символ (Marinescu G., Garland). **გონებრივი მახორჩნელობა**, კატარაქტა, ნათესავის ავადმყოფი.

**მარინესკუ-გარლენდის რაზმის** - Marinescu-Гарленда рефлекс (Marinescu G., Rodovici A., 1920). **ორიგული ავტობიოგრაფიული სიმბოლო**. ნიკა-ხელისეულის რეფლექსი. ხელის ველის თენარის და წინამხრის ქვედა მესამედის წინა შედაქირის მტრისული გაღიზიანება იწვევს ნიკაის კენთის შეკუმშვას იმავე მხარეს. მიუთითებს თავის გინის ქერკის შემაკუმშვად გაღვივებს მოხსნის ქერქვეშა კანბეჭებზე, ნორმაში ცხებდება ახადმოზილებში.

**მარინესკუ-გარლენდის სიტყვა** - Маринеску-Шарленда очерк (Marinescu G., 1931; Sjogren T., 1952). **შეკუმშვითი დაავადება** (გადაკუმშვის რეგული გიკი), ხსიათდება სინაღურ-ცენტრული ავტომატი, ოლიგოფრენიით, ორბარვი კატარაქტით. ნათესავის სიმპტომებს თან ახლავს პირამიდული ნიშნები ავრთვე გიკურია დაბალი განი, უკერის დახლა, ნიკაგბი, კონვერტილი სტრაბიზმი, თავის ქალას სიმბინჯე, ფსიქიკის შირე - გონებრივი განუთიარებლობა. მიზანდასრული პროგნოზი. გრძელდება ახორგული ვარიანტები ავტომატიკური უკუმშვის პროგრესის გარეშე.

**მარჩიავა-ბენიამის დასავლელი** - Марчиава-Беньями болелы (Marchiafa E., 1897; Bignami A., 1903). იხ. **ავტობიოგრაფიული მემორიალური**.

**მარკის კლასიციზმი** - Марк классицизма (Marc C.C.B., 1870). **მიზიდულობითი დარღვევის ხახე**. პერიოდულად აღმოცენებული დაუბეველი მისწრაფება ქერლობადაში. ხშირად ქერობა ავარებს ავადმყოფისათვის სრულიად უსარგებლო და მავრადიურად არასაბიოგი ხასითს. ზეგ შემთხვევაში ქერობა იწვევს პათოლოგიურ კოლექციონერობას. უპირატესად აღინიშნება ფსიქოპათიების და პროგნული ცვლილებებით და მიზიდულობითი გამწვრუებით მიზინარე თავის გინის ორიგნული დამაინებების დროს, აღწერილია ავრთვე ეპილეუსის და მიზიდულობის დროს.

**მარტი-ალბრახტის სიტყვა** - Марти-Албрахт очерк (Martia E., Albright F.). ქსოვილების მიერ ვარისებრასლო პირკელს პორპორის უკლიდაციის დარღვევის გამოვლინება. დამახასიათებელია პიკოკლიციზმი, პიკურულიუკუმშია, აინდროპლამია, გონებრივი განუთიარებლობა, გეგანური კუნძნებით შეგვეები, კატარაქტის განვითარება, ფრჩხილების დესტროფია სინონ: **შემაკუმშვითი პროგრესული სინდრომი**.

**მარტიანდის სიტყვა** - Мартиана очерк (Martian, 1928). **მოხტარტიკული ენციკლოპედიის მოკრევება** ხასიათდება თანდათანობით პროგრესირებელი დემენციით და ხასიათობრივი ცვლილებებით (ვიგორია, გამობაგული ეპილოური დახილობა). იხ. **დემენცია** **მოხტარტიკული**.

**მარშანის ენციკლოპედიის** - Маршан энциклопедия (Marchand L., 1937). იხ. **ავტობიოგრაფიული**.

**მასანაის გინიციზმი** - Массана синдром (Masserana I., 1955). შემეშეველებელ ფსიქიანაღალახ ფარგლებში, თან ერთვის ბიპეიორიზმის იდეები, მიზანია - აღმინის და ცხოველის ქვეყის დაბოლოებების აღწერა და ძირითადი ცნებების სისგამაგნისა. ეყარება 4 პრინციპს - **მოტოციკა**, **გარგბი**, **აღაქტიცა** და **კონფლიქტი**. 1. ყველა ორიგინის ამობრავებს ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებები; 2. ორიგინის გარეშის შემოქმედებამ რეაგირება ინტერგრაციით, საკუთარი მოთხოვნილებების იდეოლოგიური გერმინებით, საკუთარი უნარით და პიროვნული გამოცდილებით; 3. გარე წინააღმდეგობათან ორიგინის კონფლიქტის დროს ცდის მიზნის მიღწევის ხერხს, გეგნიკას ან თით მიზანს; 4. ერთდროულად არსებული ორი ურთიერთგამობრევაპო მოგაყენის დროს ღვება შუოთის ინფორმაცია, ირღვევა ორიგინის ადაგაგია, მისი ქვეყის ხლებამ ამბოვალეგური, გამოვლინდება ჩანაცვლების უნარის მოშლა (წყერბული) ან ფსიქიკური გამოვლინებების დემორგანიზაცია, რეგრესიულობა და უბეველობა (ფსიქოტურია). კლინიკურ პრაქტიკაში ბიოინამიკამ პიკოკლიციზმი გამოხატულებს ბიპეიორიკულ ფსიქოთერაპიით.

**მასკულინიციზმი** - маскулинизация იხ. **მარტიციზმი**.

**მასკულინიციზმი** - маскулинизм იხ. **მარტიციზმი**.

**მასტალიზმი** - мастализм (ბერძ. mastos - საძრევე ქერკალი, mēgos - გვიელი). იხ. **მასტორედი**.

**მასტორედი** - масторедия (ბერძ. mastos - გვიელი). სპორადულად აღმოცენებული ტკივლი სარქვევ ვერკვლად არეშე ხშირად აღინიშნება პრეკლიმაქტერიულ პერიოდში, განსაკუთრებით თვიურს წინ.

**მასტორედი** - масторедия (ლათ. mas - მამალი, mas - შუოთის მომეტეელი). სინონ: **ინანციზმი**.

**მასხარატი** - масхартия სიმპტომი, ხასიათდება მახარახ ქვეყით, გარემომყოფა მიზანის, მანჯე-გარეხისაღში მისწრაფებით. აღინიშნება ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თავის გინის უბენი ორიგნული პათოლოგიის და მოზარდთა მიზიდულობის დროს (Peters U.H., 1977). არსებობს გერმინის სხვა გაგებე (Puchan B.C., 1965), ისტერიული გულერების დაინიშნავად რომელიც მიზიდულობის გამოხატულია პიკურინეზით (მილიარი მიკიპი, ესტეკიულიცია, თვარგარდური კიბა, სხეულის გადაღუნვა რკალად).

**მასტორედი** - масторедия (ლათ. mastos - პავისიციე გამოთვლილი ქალი). **ნადრევი მომწევა**, დასიცივალეური სისტრობი ახადგარბდა გოკარბში. ხასიათდება მომწეველი ქალისთვის დამახასიათებელი სექსუალური და უნიკური ნიშნების არსებობით (შეკრდის მომა და ვირბა, მტრების, თვითების, შეხვის სიგანე). სახას გამოხატულება მოზარდისაა. შენსტრუქცია იწვევა ვიღამე არე. დამახასიათებელია მოზარდული ასაკის გემპრამპენცის დაუსებრეანება, აწეული გამიღიანებლობის მოვლენები. შ. განიხილება როგორც ენდოკრინული სისტების სექსუალადრული აპოთროფიის გამოხატულება საკერინეების ფოლიკულები პიკურინეციით და პიკურინეციით.





ერთობლივად აღიზიანების და მიუყვანის გრძობა. ხასიათდება შინაგან დაშლის, გაორების ვანდლით. შიშს გრძობით. სინონ: **მედიკალიზაცია** **მედიკალიზაცია** **მედიკალიზაცია**.

**შპს სახელმწიფო დაწესებულება** - **медицина** **медицина** **медицина**. ფსიქიკური ავადმყოფის მიერ საკეთილმოქმედების გარე სინამდვილისგან მკაცრი გამოყოფის გრძობის დაკარგვა. მიმდინარეობს ან პირივედის განხილვით, გარე მემორიზაციის ურთობით (იხ. **მედიკალიზაცია** და **მედიკალიზაცია** **მედიკალიზაცია**), ან განდევნილობით (ავტონომია). ამ დროს რაიმეხნობის ბოლოვით განმარტდება. წარმოადგენს ლაბორატორიული გამოვლენების, შულის ფსიქიკური ავადმყოფის სტრუქტურაში. სინონ: **მედიკალიზაცია** **მედიკალიზაცია** **მედიკალიზაცია**.

**შპს მედიკალიზაცია** - **медицина**. ფსიქოანალიზური ენკრეტული ტერმინი, გამოიყენება პიროვნების თვითმოქმედების ხარისხის, გარე საზღვრისა და ვადლების დახმარისპირების, შიშს სურვილების და მისწრაფებების მიმართულების და დაშლილობების აღსანიშნავად.

**შპს მედიკალიზაცია** - **медицина** **медицина** **медицина** (Möbius P.J., 1891). იხ. **მედიკალიზაცია** **მედიკალიზაცია**.

**შპს მედიკალიზაცია** - **медицина** **медицина** (Möbius P.J., 1890). კონვერტიციის შეზუტება. უმეტესად აღინიშნება **შპს მედიკალიზაცია** დაავადების დროს. დინამიკა თავის კაცების შიშობილ მდგომარეობაში შენარჩუნების შეუძლებლობით ახლოვდება სავიზუალურ შიშის ფიქსაციის დროს. ერთი თვალის (მოკავრ ორივე) მალევე განიხილება გარეშ.

**შპს მედიკალიზაცია** - **медицина** **медицина** (Möbius P.J., 1892). ხასის დასტავილი და დასტავა. სახე მოკლებულია ყოველგვარ გამოშვებულებას; თვალის კაცების შიშობის შეზღუდვა პირინობილი ურთობით; დაბალი სინამდვილისა; ვეჯიზილობა. ფსიქიკური შიშობა - გონებრივი ჩამორჩენილობა.

**შპს მედიკალიზაცია** - **медицина** (ბერძნ. **μεδία** - დია, გადამდებული, **ψαχ** - გამოხება). კალიგრაფიის შეცდომა, ასურების მოშების გადგება. აღინიშნება ნათხების დანიანების დროს (ნათხების პიკეტეგრა) და მანიკალური და მანიკალური მდგომარეობის დროს (მდგ. პროგრესული და მდგ.).

**შპს მედიკალიზაცია** - **медицина** (ბერძნ. **μεδία** - დია, გადამდებული, ურო მდგად გამოყენება გერმინისა **შპს მედიკალიზაცია** **შპს მედიკალიზაცია**).

**შპს მედიკალიზაცია** - **медицина** იხ. **მედიკალიზაცია**.

**შპს მედიკალიზაცია** - **медицина** იხ. **მედიკალიზაცია**.

**შპს მედიკალიზაცია** - **медицина** **медицина** **медицина** (Meyerson A.A., 1959). იხ. **მედიკალიზაცია** **მედიკალიზაცია**.

**შპს მედიკალიზაცია** - **медицина** **медицина** **медицина** (Meyerson A.A., 1972). იხ. **მედიკალიზაცია** **მედიკალიზაცია**.

**შპს მედიკალიზაცია** - **медицина** (ლათ. **mediatio** - ფიქსაცია). ინტენსიური, დრამატული მდგომარეობა პროცესისაგან, იდებუ, რომელიც მიღწევა სხეულების მიღწევა ურთიერთობის დაძახებით ერთ ობიექტზე და ყველა დანარჩენი (რაც ხელს უწყობს ურთიერთობის გადარბანს, როგორც გარეშე - სხეულის, სინამდვილე და ა.შ. ასევე შინაგანი - ემოციური, ფიზიკური და სხვ.) ფაქტორის გადღვეთბა. შ. საუბრედა ელვის ინტენსიური ობიექტის, **შპს მედიკალიზაცია** - დაბალი. უარყოფით გამოიყენება ანალიზურ ფსიქოლოგიაში და ავტობიოგრაფიულ ტერმინში.

**შპს მედიკალიზაცია** - **медицина** **медицина** (Medow W., 1922). იხ. **მედიკალიზაცია** **მედიკალიზაცია**.

**შპს მედიკალიზაცია I** - **медицина** **медицина** (Meduna L.J.). ფსიქიკური დაავადების მკურნალობაში ნახშირმჟავას აირის და ვანგნალის ნარევის ინჰალაციის გამოყენება.

**შპს მედიკალიზაცია II** - **медицина** **медицина** (Meduna L.J., 1934). იხ. **მედიკალიზაცია** **მედიკალიზაცია** **მედიკალიზაცია**.

**შპს მედიკალიზაცია** - **медицина** **медицина** (Meduna L.J., 1950). იხ. **მედიკალიზაცია** **მედიკალიზაცია**.

**შპს მედიკალიზაცია** - **медицина** **медицина** **медицина** (Meduna L.J., 1950). იხ. **მედიკალიზაცია** **მედიკალიზაცია** **მედიკალიზაცია**.

**შპს მედიკალიზაცია** - **медицина** (ლათ. **mediatio** - ფიქსაცია). ინტენსიური, დრამატული მდგომარეობა პროცესისაგან, იდებუ, რომელიც მიღწევა სხეულების მიღწევა ურთიერთობის დაძახებით ერთ ობიექტზე და ყველა დანარჩენი (რაც ხელს უწყობს ურთიერთობის გადარბანს, როგორც გარეშე - სხეულის, სინამდვილე და ა.შ. ასევე შინაგანი - ემოციური, ფიზიკური და სხვ.) ფაქტორის გადღვეთბა. შ. საუბრედა ელვის ინტენსიური ობიექტის, **შპს მედიკალიზაცია** - დაბალი. უარყოფით გამოიყენება ანალიზურ ფსიქოლოგიაში და ავტობიოგრაფიულ ტერმინში.

**შპს მედიკალიზაცია** - **медицина** **медицина** (ინგლ. **interview**). სოციალურ-ფსიქოლოგური გამოკვლევის მეთოდი; პირველადი ინფორმაციის შეკრება უშუალო მეტყველებით კონტაქტის საშუალებით. ინტერვიუ შეიძლება იყოს სტანდარტიზებული, გამოიყენება წინასწარ მომზადებული შეკითხვებით; არსტანდარტიზებული, ევლისხმობს საუბრის განსაკუთრებულ მეთოდებს, მის ცვალებადობას სიტუაციასთან დაკავშირებით; ნახვერდისაგანდარტიზებული, რომლის დროსაც დამკვეთი დაპროგრამებული საუბრებიდან გადახარა. შ.ა. ხელს უწყობს კონტაქტის დამყარებას გამოკვლევისა და დამკვეთის შორის. აგრეთვე გამოიყენება სამედიცინო ფსიქოლოგიაშიც. შ.ა.ს ელემენტები და მათი კონტაქტის ცოდნა საჭიროა ექიმ-ფსიქიატრისთვის ანამნეზის შეკრების დროს.

**შპს მედიკალიზაცია** - **медицина** **медицина** (ლათ. **medicatio** - დიაგნოზი). გამოიყენებოდა მოგვიანდელ ევროპაში (ძირითადად აშშ-ში); დიდი რაოდენობით ელემენტარული სიხშირით სიანების მიატარება (3-8 სიანის დღეში, საერთო უარსის მხედვით, 30-40 ექვრის განმავლობაში), რომლის შეზღუდვა უთარდება რეტრესიის მდგომარეობა ცნობიერების აღიზიანება, სპონტანური მეტყველების უკონტროლობა, აპათია და ა.შ. რეტრესიის მოვლების ნაშთარების მუდგე თითქოს უნდა დადგეს ფსიქომოდიან გამოყენებით. ამგვარ თითქოს არ გამოიყენება.

**შპს მედიკალიზაცია** - **медицина** **медицина** (Meyard). კატატონურ სტეპორში მყოფი ავადმყოფის მყესთა (მაგ. მუხლის) რთულქების გამოწყვეტის ავადმყოფებში, კლერი საწყის მდგომარეობის უზრუნველ ანა მამხივე, არამედ რამდენიმე წამის შემდეგ.

**შპს მედიკალიზაცია** - **медицина** (Mell R., 1928). ინტელექტის გამოხატულება ანალიზური ფსიქოლოგიაში მეთოდები. შედგება ექვსი დავალებას-სტატუსისგან; სიუჟეტის განვითარების თანმიმდევრული დადგენა ნახატების სერის მხედვით, რომელიც რაციის გაგრძელება დადგინდი კანონზომიერებათა წინადადების შედგენა ოთხი სიტყვისგან, რომლებშიც გამოტოვებული ადგილების შევსება და ა.შ. გამოკვლევის შედეგების მიხედვით იცნა ინტელექტის ასრთვით.

**შპს მედიკალიზაცია** - **медицина** **медицина** (Meyard). ნეგატივის ტერმინული გარეულება. დამახასიათებელია ფსიქიკური ანალიზის მიღწევისას, მანიკალურ-დემონსტრაციული მდგომარეობის სახით.

**მელონი სინდრომი** - *Melanoma Syndrom* (Melin T., 1957). აღვუცრებული ფეიქოზური მდგომარეობები, ავტორის მიერ აღწერილია ესოქიაგრიულ სტაციონარების მომხაზერე ქალთა პერსონალებში. ინფუქტორის როლში გამოდის ესოქიაგრიულ სტაციონარში მოთათებულ ავადმყოფებს, თით ესოქიაგრიულ სადავადმყოფოს გარემო ხელს უწყობს დაავადების აღმოცენებას. **იხ. პირველი მდგომარეობა**.

**მელონი სინდრომი** - *Melanoma Syndrom* (Meige H., 1909). **იხ. ტრანსფორმაცია**.

**მელონიზმი** - *Melanismus* (ბერძ. melon - ყავაძი). **იხ. მანკანა**.

**მელონიზმი** - *Melanismus*. 1. ვნდრეფენია ღებრების (ყრუკარული, ციკლოური, ინოლუციური) სინონიმი. ნეულებრიგო გერმინი გამოიყენება მიმწენლონად გამოხატული ღებრისებრი მდგომარეობის დროს. 2. ღებრებრივი გუბრეზი-განწყობილი ღებრებრივი ფსიქოპათოლოგიური მდგომარეობის განზოგადებული სახეღვროება.

2. **მელონიზმი** - *Melanismus*. ღებრებრივი მდგომარეობის გამოხატული მეტაბოლიკური სინონი. *Melanismus* (ლათ. *melanitis* - ღებრებრივი).

2. **მელონიზმი** - *Melanismus*. **იხ. მანკანა**.

2. **მელონიზმი** - *Melanismus*. **იხ. მანკანა**.

2. **მელონიზმი** - *Melanismus*. **იხ. მანკანა**.

2. **მელონიზმი** - *Melanismus*. **იხ. მანკანა**.

2. **მელონიზმი** - *Melanismus*. **იხ. მანკანა**.

2. **მელონიზმი** - *Melanismus*. **იხ. მანკანა**.

**მელონიზმი** - *Melanismus*. **იხ. მანკანა**.

**მელონიზმი** - *Melanismus*. **იხ. მანკანა**.

**მელონიზმი** - *Melanismus*. **იხ. მანკანა**.

**მელონიზმი** - *Melanismus*. **იხ. მანკანა**.

**მელონიზმი** - *Melanismus*. **იხ. მანკანა**.

**მელონიზმი** - *Melanismus*. **იხ. მანკანა**.

**მელონიზმი** - *Melanismus*. **იხ. მანკანა**.

**მელონიზმი** - *Melanismus*. **იხ. მანკანა**.

**მელონიზმი** - *Melanismus*. **იხ. მანკანა**.

**მელონიზმი** - *Melanismus*. **იხ. მანკანა**.

**მელონიზმი** - *Melanismus*. **იხ. მანკანა**.

**მელონიზმი** - *Melanismus*. **იხ. მანკანა**.

**მელონიზმი** - *Melanismus*. **იხ. მანკანა**.

**მელონიზმი** - *Melanismus*. **იხ. მანკანა**.

ფილოსოფიის ხარისხამდე, თან ახლავს უბილევსიფორმული გულურები. პათოპისტოლოგიურად - გენისის შემუშავება, ღრუბლოვანი გადაჯგუფება, ასტროლოგიური, მეტეორიზაციის დარღვევა. სინონ: ნიშნობის ხარისხის დაპყრობა, ღრუბლოვანი გადაჯგუფება.

**ენკეპტაზა** - **энкептаза** (ბერძ. *enkēptasis* - შეწყვეტა, შესვენება). კლიმატოლოგიური პერიოდის ფორმა, დგება უკანასკნელი მენსტრუაციის შემდეგ და ხასიათდება ენდომეტრიუმის ციკლური ცვლილებების (მენსტრუაციის) შეწყვეტით. გენერალური ფუნქციის დაკარგვის, ხასყის სისუსტის და მთელ ორგანიზმის ინფილტრაციის ნიშანი. 2. შეიძლება ფოს ხელოვნური, გამოწვეული რაიმე ჩარევით (სამედიცინოს, საკურსების ექსტრაქცია, ქირურგიული ან სხვაგვარი კანკრაცია) და გამოლოგოური, სამედიცინოს და საკურსების სიმბიოტიკური დაზიანების შედეგად.

**ენკისტაზა** - **энкстаза** (ბერძ. *enstasis* - შეჩერება). თვიურად შეწყვეტა. სინონ: **ქალმამამ**

**მენტრუაციის** - **менструация** (ლათ. *mensuratum* - გრძელდება თვე). ფიზიოლოგიური სისხლდენა საშვილოსნოდან ყოველ 28 დღეში ერთხელ, ხანგრძლივობით 4-5 დღე, სამედიცინოს განვითარებული ღირსეული გარსის ციკლური მოცულების შედეგად. შის დროს და მოგვიან მის წინ არამედიცინო ადინამიკა გენეზა-განწყობის დისთიმური ცვლილებები, განღმარებლობა, ასთურული სიმპტომები, გამოვლენილი ლიბიდო. ამავე პერიოდში არამედიცინო შეწყვეტა ან წყება ფსიქიკური დაავადება.

**მენტალური** - **ментальный** I. (ლათ. *mens* - გონება). შეეუფლება ფსიქიკას, ანტილექტს (მაგ. მენტალური ასია). 2. (ლათ. *mentium* - ნიკაბი). შეეუფლება ნიკაბს.

**მენტოზი** - **ментоз** (ლათ. *mens* - გონება) (Chassin P.H., 1914). ამრების, მოგონებების, წარმოდგენების მოზღვაების სიმპტომი. დამახასიათებელია უნებლო აღმოცენება და ნებასთან დაუმორჩილებლობა. ასოციაციური ავტომატიზმის გამოვლინება. სინონ: პარანოზი, პარანოზი, პარანოზი.

**მენტალის სინდრომი** - **Ментал синдром** (Menzel F., 1891). ატეპია და ნაოსნობის დარღვევა მეტეორიზაციით დაავადება, უღრუბლო ახალგაზრდა ასაკში. დეგენერაციული პროცესი ახანანებს ნაოსნობის გამარტებს (პარანოზი და ოლიგოფრენია). ზოგ შემთხვევაში აღინიშნება პარანოზი (Keddle M.E., 1969).

**მეორეული მემბრანული-მეტაფორა** - **вторичная мембранно-метафора**. ფსიქიკაში: სიმბოლის მემბრანის ერთ-ერთი მეტანომი, როცა ხდება ანკარა სიმბოლის ელემენტების გადაგვლება და შეკავშირება მეტაფორით უფრო პარანოზულ მთლიანობაში.

**მეტაფორა პარანოზული** - **метафора параноическая** (ბერძ. *metas* - ხარისხი, *algos* - ტკივილი). ტკივილი და ხარისხი უნებლო ბარბაროსი გარკვეული მეტაფორა, დევიანობა დროში და ხარისხის დროში; აღმოცენდება პარანოზის კანის ლატერალური ნერვის დაზიანების შედეგად და აღინიშნება ინფილტრაციის, ინტოქსიკაციის, ორსულობის დროს.

**მეტაფორა** - **метафора** (ლათ. *metas* - ნაწილი, *argans* - სამუშაო, მოწყობა) (Meyer A., 1908). აღინიშნება ტკივილს პარანოზულ დარღვევებში. 2. შეესაბამება ნერვოს. იხ. **მეტაფორა პარანოზული**. სინონ: **მეტაფორა**.

**მეტაფორის მემბრანული მემბრანული** - **Метаморфозного мембранного метаморфоза** (Мержевская И.П., 1884). იხ. **მეტაფორა პარანოზული**.

**მეტაფორის სინდრომი I** - **Метас синдром I** (Morsier G., 1938). პარანოზულად აღმოცენებული სიმპტომი კომპლექსი, შედგება რთული ნაძალადევი მოძრაობებისა (საკუთარი ღერძის არტული ბრუნვა, ოპსიკოგონუსი, თავის მამოძრავებელი კრანხები) და მრავალბოლოანი ქალკანისებრი (მეტაფორები, ფოტოფსიები, ლილიპეტ-პალეონტოლოგი, ვარე საგნების შეფერილობის შეცვლა). აღინიშნება თავის გენის მარცხენა თხემის მიღამის სხვადასხვა ინტოქსიკაციის დაზიანების დროს (გენის აბსესის და სიმონე, არქივარტოლოგი, ქალკანის გრავიზის შედეგები). ზოგჯერ გამოდის აურის რთული გულსის უბილევსი გულსის გულსის წყნ.

**მეტაფორის სინდრომი II** - **Метас синдром II** (Morsier G., 1944). აღინიშნება შუა გენის სხვადასხვა გენების დაზიანების დროს (სიმონე, გრავიზი, ინტოქსიკაცია). ვარდობა ფსიქიკური დარღვევით (მეტაფორები და შედეგები, აქტის დარღვევა, შედეგებითი და უნისეთი პალეონტოლოგიები), აგრეთვე მოგონის და მეტაფორების დარღვევებით.

**მეტაფორის სინდრომი III** - **Метас синдром III** (Morsier G., 1954). სიმპტომები, რომელიც დამახასიათებელია თავის გენის მუხლის კონვექსიური მიღამის დაზიანებისთვის: ფიქსაციური ამენია, აპათია, გაზიანებლობა.

**მეტაფორის** - **метаморфоз** (ბერძ. *metas* - შესაბამისი, მორიხებული). **საკუთარი გამოჩენილობა**, **განსაკუთრებული დამატებლობა** ადგება, გახლავს მსხვერპლი საკუთარი ხალხის, კაცობრიობის გადასარჩენად. სინონ: **მეტაფორის**.

**მეტაფორის** - **метаморфоз** იხ. **მეტაფორის**.

**მეტაფორის** - **метаморфоз** XVIII ს-ში გავრცელებული წყევლება **პანოზის**, როგორც ცხოველური მანეგეტიზმის, შესახებ. მის ავტორი, შეეყარული წარმოშობის ავსტრიელი ექიმი ფ. მენეგეტი (Meninge F.A., 1815) თვლიდა, რომ მანეგეტი წარმოადგენს ფსიქიკური მანეგეტიზმის განსაკუთრებული ფუნქციის გადახვევებს. მენეგეტიზმი მან უარყო მანეგეტიზმის გამოყენება და თვლიდა, რომ მანეგეტიზმი ახასიათებს ყველა ცოცხალ სხეულს. მიუხედავად იმისა, რომ მ. იყო ერთ-ერთი ეგაპი პანოზის მეტაფორული პერიოდის ისტორიისა, მან ღირს როლი მეტაფორულ პანოზულ და რეკურსი ფსიქოლოგიის განვითარებაში.

**მეტაფორის** - **метаморфоз** (ბერძ. *metas* - ცვლილება, გარდაქმნა). ნაყოფების, რომლებიც ორგანიზმში წარმოიშობება ნივთიერებათა ცვლის პროცესში ბიოქიმიური რეაქციების შედეგად ამა თუ იმ ნივთიერების გარდაქმნის გზით.

**მეტაფორის** - **метаморфоз** სტრუქტურა-პანოზული მემბრანული აქტორები არალატენტურად ნარკოზანების მოხმარებ ერთ ან ორ გაბლენს (300-600 მგ) ე.წ. **გულსის წერტილები** ("elings") მისაღწევად და სისუსტეული პოტენციის ასახვევად. თავისი მოქმედებით შეესაბამება **მეტაფორის** (იხ).

**მეტაფორის** - **метаморфоз** სიმბოლისური პარანოზული - **метаморфоз** **ფორმის** **მეტაფორის** (ბერძ. *metamorphosis* - გარდასახვა, ლათ. *metamorphosis* - სქესობრივი, ბერძ. *para* - გვერდით, *nous*, *noos* - გონება) (Krafft-Ebing R.). ადამიანების მთლიანი დარღვევების, თითქმის იგი გარდაქმნება სხვა სქესის პირად აღინიშნება მემორიზების დროს.

**მეტაფორის** - **метаморфоз** (ბერძ. *metas* - შორს, შეხვედრითი, ფორმა, სახე, *opsis* - შეხედვლობა) (Wechsler V.). ხაგნება **ზომის** და **ფორმის** ადამიანს დარღვევა. ხასიათდება საგნების, მათი ფორმის, უფროს, შიშის,

სიერეში განლაგების, მოსვენებულ მდგომარეობაში ან მოძრაობაში გაკუდმართებული მხედველობითი აღქმით. შილდერი (P.Schilder) შ-ის ჰაიოგენეზში აღნიშნავდა დაბირანთული ან ფსიქიკური დარღვევების როლს. პეტროლი (O.Pölzl) მნიშვნელობას ანიჭებდა მარჯვენა და მარცხენა თვალის მხედველობითი აღქმის პროცესების შერწყმის უპირის უპირებას, მათ დესინტრონიზაციას. ვებერსტაიხის თვის გვიან ეგზოგენურ-როგენული დაავადებების (ვებერსტაიხ გრაველი და ინტექტური გენების) დროს. შულის პიკის სინდრომის, გურვერის განსაკუთრებული მდგომარეობის სტრუქტურაში. ვურგელის (Vurghel M.O., 1949) მიხედვით, შ. მიეკუთვნება ფსიქოსენარულ დარღვევებს. რაბაღეკის (Pantulovich M.I.) მიხედვით, შ. წარმოადგენს სენსორულ სისტემის დარღვევით (ორგანული დაზიანება) გამოწვეულ ილუზიებს. არმევერ ავტორი და ვ. შტრომელი ამბობენ, შ. პირველის დროს ავადმყოფს აქვს საკუთარი სხეულის ნაწილების არანორმალური მოძიხა და ფორმის შეგრძნება. ხშირად აღინიშნება დაზიანების წინ. აღმოცენდება ხანმოკლე დროის განმავლობაში (ეპილეფსიის დროს) ან გრძელდება დიდხანს (თვის გვიანის სიფილისის, სიმპინის დროს). ეპილეფსიით დაავადებულებში შეიძლება აღინიშნებოდეს აურის დროს ან მუდმივად პაროქსიმულად, ეკვივალენტის სტრუქტურაში. მეორე შემთხვევაში აღინიშნება გარე რეალური ობიექტების მოძიხ, ფორმის, ნაწილების თანაფარდობის გაკუდმართებული აღქმა. მათ, ასევე როგორც ავტომეგამორფოფსიებს, თან ახლავს ორგანული ფსიქოსინდრომი.

**მეტანოზიზმი** - метанозмия (ბერძნ. meta - შორს, შემდეგ. ღაით. nozmos - თვალთმაქცობა). ხშირად სხვა-ახლო წარსულში გადატანილი და უკვე ჩამთავრებული ფსიქიკური დაავადების სიმპტომების მძიმანდასახული ბელახება. ანოზიზმი. უმეტესად აღინიშნება გადატანილი რეაქტიული ფსიქოზების შემდეგ.

**მეტატრანსპოზი** - метатранспозия (ბერძნ. meta - ჰრილობა, სხეულის დაზიანება ჰრილობის მუდგეგად). გრავიით გამოწვეული, მისტიკაგებულა, შაგ. პისტრავიული ენციფალიპათია.

**მეტაფსიქოლოგია** - метапсихология (გერმ. Metapsychologie). ფსიქოანალიზში: აღნიშნული გერმინით ფრთხიდი განსაზღვრავდა შის მიერ დაუქმებული ფსიქოლოგიის თეორიულ ასექტებს. შეგასიქოლოგია აშუშავებს კანტარელებს მოდულების ერთობლიობას, რომელთა ასე თუ ასე დამორეზულია გამოყოფილებისგან. შაგ, ფსიქიკური აპარატის ილა, რომელიც დაყოფილია რამდენიმე ინსტანციად, დლოვის თორია, გამოდრევის პროცესის კანციფიცია და ა.შ. შეგასიქოლოგია განიხილავს მოდუნათა სიშ ჰრილს: დანაბიკას, ტობიკას და ევთნოშავას.

**მეტაფსიქოზი** - метапсихоз (ბერძნ. metaпсихозის - სულების გადასახლება). ფსიქოატრიაში: ავადმყოფის ბოლვითი დარღვენებლობა, თითქმის იმა ადრე არსებობდა სხვა ადამიანს, სხოველს სახით. ახლოს არის რელიგიური მისტიკურ შეხედულებასთან, რომლის თანახმად, სიცილილი შემდეგ სულა გადასახლდება სხვა სხეულში (სადამიანში, სხოველში, მყენარეში). შდრ.: შიშება შარაშეშვი პრანაშეშვა.

**მეტანოზია** - метанозия (ბერძნ. metanosis - გადაქმევა). ზიტყუებს ან გაბოიქებს შეტყუარ შიშავის, შაგრაშ არა საგისხით ეკვივალენტური. აღნიშნული მდგეველების დარღვევის მოცულობა საბის დროს.

**მეტროპია** - метрoπия (ბერძნ. metros - საშუალონი). სინონ: ნიშეშეშეშე.

**მეტამეშეშეშე** - metaмешешешე - რთა ადამიანთა შროიერობის მტორიული დ შექმნილი ფორმა, რომელიც შორცულიდებია ენბ შაშეალებია. შ-სა და ენბ შორის არბიბობს როული დლაექციური ურთობა: შ. სრულიდებ ენის წესების მიხედვით, და აშავე დროს, რიგი ნაქტორების გავლენით (საშორადო შრატქიკის მოთხოვნები, მექნიურების განვითარება და ა.შ.), ცუდის და სრულიდების ენას. შ. წარმოადგენს ამროუნების ბირთიად შექნიშეშე. შ-ის გარეშე შეუძლებელია ენობირების ფორმირება. არმევერ შ-ს ზეპირბ და წყრბის. შ-ის ბირთიადი უნქეშეშე - კოშჩაქეალებია (შროიერობის პროცესების შესრულება). შ. როგორც გამოხატება და განათლებების, აბრის განვითარების საშეალებია: ხედნდიკატორი ანთოშჩაქეა (საგნების, მოვლენების, მოქმედების, ცოცხალი არსებების და ა.შ. აღნიშვნა). ზეშარ შ-ში არმევერ შოილოგურ და დლაექტურ შ-ს. შონოლოგურ შ. გაყოფილით გამოდლიდა და პასუბობს ამრობირი და გრამატიკული მნიშვნელობით უფრო რთულ მოთხოვნებს. შ-ის დაზილი, დარღვევით შიშინარე დაავადებების დროს ხდება შონოლოგური შ-ის ნაკლებების უფრო ადრეული გამოვლინება, უიდე დლაექტურისა.

**მეტროპიაშეშეშე** - p. метрoπияшешешешე ადრე დასწავლული და ცხოვრებისეული გამოცდილებით მიღებული სიგედადწყობილი სტროფების, სტრიტის (სადასპორტო მონაცემები, რიხები, უქარიხი, კურის დლებია, თუეუბი, დექსები და ა.შ.) გამოვრება. შედარებით დიდხანს შენარჩუნდება მეტყველების დალის პროცესში. შ-ის გამოკვლების დროს საჭიროა კითხვა ისე იყოს დასშეა, რომ შეიძლეეს დეზავტომაგიათიის ელემენტებს, შაგ, თვლა უკუშეშეშეალებით.

**მეტროპიაშეშეშე** - p. метрoπияшешешешე შეტყველებას დარღვევა, ამ დროს ჰარბობს სიგეას გარითმებისადმი გენდენცია. უმეტესად ეს არის აბნების დონის გარითმევა ელერადობის მიხედვით, აბრის საზიზიანო. აღნიშნება შინააქალური და კვტაგონიური აბნების მდგომარეობების დროს, არამიშეაითად - ეპილეფსიის დროს დათთუდობლობასთან ერთად.

**მეტაფსიქოლოგია** - p. метапсихология შეტყველებას დარღვევა, გემპრანბენის ეპილეფსიური პროპორციის დუენშეშეშეშე კომპონენტის გამოვლენება ავადმყოფება ხშირად იქნობით სუფესებს, შახლონურ გამოთქმებს. გიპურაა ეპილეფსიისიოფის. აგრეთვე მოგევერ აღნიშნება ფსიქიათურ პროცესებში, შირთიად დ ეპილეფსოიდებში.

**მეტატრანსპოზი** - p. метатранспозия (ბერძნ. metaпсихоз - თითი). მეტყველება, რომელიც წარმოქმნის სიგეებს დაქტელოფრის აბიბების ანუ თითების განსაზღვრული კონფიგურაციის ან მოძრაობის საშეალებით. გამოიყენება ყრუების პიროვნებათშორის კომუნიკაციაში.

**მეტაფსიქოლოგია** - p. метапсихология შეტყველებას დარღვევა, ენალება შისი გემპის მენელებით, შრადილოგიის მოვლენებით, შელმეცო საუქებელიანობით, დგადამაციისაღმი შილრეკაციებით, სიხლანგიით, ამრობრიად უნიშენელო გარემოებებზე დამუხრებლობა და შეპრებობა. გამოქმნის მიზანი, მეტყველებით ამოყუნა ამ დროს შენარჩუნებულია, შიარამ გია მიზნადე შნიშენელონად გაგრძელებულია. დამახასიათებელია ეპილეფსიისიოფის.

**მეტატრანსპოზი** - p. метатранспозия (ლათ. ego - მე, alterum - წრის ცენტრი). მეტყველება, რომელიც შინაბოულია საკუთარი თავისადმი, არეკლურებს და აკონტრულებს ბავშვის შრატეკულ მოქმედებას.

**მეტაფსიქოლოგია** - p. метапсихология (ლათ. exposito - ამონიშნება ხმაურით). ბრანთოული შეტყველება, რომლის დროსაც სიგეების და გარეების შეგრძნების და გავიშოს ფონზე ხდება ერთდვარი სიგეეური იყამოგორუნაა,







**პირენაზია** - *Micrococcium* (ბერძნ. *micro* - მიხლი, სიძულელი, *coxis*, *coctus* - ბავშვი) (Oppenheim H.) პათოლოგიური ხილი საკუთარი შეილებისადაც, საღისკური გენდენების გამოვლენება დედებში.

**პიროპანია** - *Micrococca* (ბერძნ. *myces* - მითი, გამოგონალი, *panis* - სწრაფა). (Dupre E., 1905). პათოლოგიური ცრულობა. აფგორის აბრით, გამოწვეული პიროვნული ფსიქოპათოლოგიური თავისებურებებით, მითომანური კონსტიტუციით. თანამორთვე შეხედულებით, უკანასკნელი შექსაბამება **ქტრიოფულ კონსტიტუციას**. ამ დროს უმთავრესად როდეს აგრძელებს ისტორიული მემკვიდრეობა - სხეულისაგან გამოწვეულობის სურვილი, საკუთარი მნიშვნელობის მეტება. ცნება ახლაა **მეპროპანია** (სხ.) ისტორიული განგაზიების სახე.

**პიროპანია** - *Micrococca* (ბერძნ. *myxa* - ხუმი, ლათ. *des* - დარღვევა, *opans* - შედეგობა). სინონ: „**პროპანია**“.  
**პიროპანია** - *Micrococca* (ბერძნ. *myxus* - ჯაგარა, *basis* - ნახიჯი, სიარული). სიარული **პიროპანია** ნაბეჭდობით ატაკობან ან მიწვან ტერფებ თითქმის პიროვნულად. აღინიშნება თავის გენის მთავარი (არგანული დაავადებისას. მაგ. ცერეზრული ათეროსკლეროზის დროს).

**პიროპანია** - *Micrococca* (ანბ. *myxus coctus* - თავის გენის პიროვნუროების ხეული). თავის ტენის განგაზობებს ანაბეჭდობა. ხსიათლება გენის ხეულებს მეორე მთავრით მათი რაოდენობის გაღივებისას (ჩანახისის მე-6, მე-7 თვეზე თავის გენის განგაზობის შეტერების გამო). უმეტესად გენდენება მკროსოცეფალის, პირენეცეფალის დროს. ჩვეულებრივ აღინიშნება ინტელექტუალური განგაზობებლობა.

**პიროპანია** - *Micrococca* (ლათ. *myxus* - ენა). ენის თანდაყოლილი განგაზობებლობა. ენა ვერ წელება კბილებს და რბილ სისას, რის გამოც უღინდება **მიპანია** (სხ.) **რეტანია** (სხ.). განხლებულია აგრეთვე ბავშვის - „**მ**“, „**ნ**“, „**ტ**“ - წარმოთქმა.

**პიროპანია** - *Micrococca* (ბერძნ. *myxus* - ქვედა ყბა). თავის ქალაბ ანაბეჭდობა, ქვედა ყბის განგაზობებლობა.

**პიროპანია** - *Micrococca* (ბერძნ. *myxus* - ვერ). წერბს დარღვევა, ძირობის მოშების შემცირება. აღინიშნება პარკინსონიზმის, ლეპრისის, მოგვრე კატანორიული მდგომარეობების, მკროსოცეფალის ხეულებების დროს.

**პიროპანია** - *Micrococca* (ბერძნ. *myxus* - თითი). განგაზობებს ანაბეჭდობა. ბავშვის (გეროის) ერთი ან რამდენიმე თითის თანდაყოლილი განგაზობებლობა სრულ ანარქიზმამდე.

**პიროპანია** - *Micrococca* (ბერძნ. *myxus* - გრძობა, შეგონება). ტაქტიკური შეგონებლობის დარღვევა - საგნების შეხებისას აღქმება უფრო შემცირებული, ვიდრე სინაბეჭდობა. ეღინდება თავის გენის მხედველობის ბოჭობის ან პოსტინტელუარული ხეულის დაზიანებისას. შ. შეიძლება იყოს ნორმალური - ილუმორული განგაზობის დროს.

**პიროპანია** - *Micrococca* (ბერძნ. *myxus* - გვაბა). გვაბების თანდაყოლილი განგაზობებლობა.

**პიროპანია** - *Micrococca*. თვალდაცნაობების მოგვანება იტება. უფრო მეტი შეიძლება გერმინი მკროსონური ბოჭობა.

**პიროპანია** - *Micrococca* (ბერძნ. *myxus* - სხეული). სინონ: **მიპანია** (სხ.).

**პიროპანია** - *Micrococca* (ბერძნ. *myxus* - მისი, მისი მანძილზე, *myxus* - ვესენი). მდგომარეობა, რომლის დროსაც ბავშვის აღქმება ხმადაბლა, თითქოს მორი მინძილიდან. გვხვდება ეპილეფსიის დროს.

**პიროპანია** - *Micrococca* (ბერძნ. *myxus* - მხედველობა) (van Bogert L.). პალეონთოლოგიური სახეები არა მარტო შემცირებულია მოშების (მეკროსოცეფალია), არამედ აღქმება შორიდან. აღინიშნება უპირატესად ეგზოგენური ორგანული დაავადებების დროს.

**პიროპანია** - *Micrococca* (ბერძნ. *myxus* - ურა). უფრბს ნივრბის თანდაყოლილი ხშირად გვხვდება ნივრბის რთვლივ ნაწილის შემცირებიდან (ნაწილობრივი) სრულ ანარქიზმამდე (სრული). ხშირად თან ახლავს გარეთა სსხეულის ხერეღის აგრეზია და სხვადასხვა ხარისხის სენების დაკვეთება. შეიძლება იყოს კალბრირი.

**პიროპანია** - *Micrococca* (ბერძნ. *myxus* - ხეხი - ხეხი, ხეხი). დაბალი ხმა ურბანიაში მონაწილე კეთების გონისის დარღვევის შედეგად. აღინიშნება თავის გენის ორგანული დაზიანების და სტეროის დროს.

**პიროპანია** - *Micrococca* (ბერძნ. *myxus* - მხედველობა). მხედველობის დარღვევა, რომლის დროსაც გარემუ საგნების აღქმება პროპორციულად შემცირებული მათ რეალურ მოშებთან შედარებით. აღინიშნება აკომოდაციის დამბდის, თვალის ბალრბის დაზიანების დროს ყეთილი ხალის მდგომარეობა და თავის გენის ეგზოგენური ორგანული დაავადებებისას.

**პიროპანია** - *Micrococca* (ბერძნ. *myxus* - ხეხი). განგაზობებს ანაბეჭდობა, ეღინდება თავის ქალას და თავის გენის პაგარა მოშებით. შ. შესაძლებელია თავის ქალას ნორმალური მოშების დროსაც. გენის წონა ამ დროს 250-იდან 900 გრამამდე. არჩევენ შს უმეტესად, რომლის დროსაც ლაბარაკა გენის განგაზობების მეტერებამდე და შორიდან, რომელიც წარმოადგენს გენის მხედვ დაავადების შედეგს. შესაძლებელია მაკროსოცეფალია. შ. შეიძლება იყოს შემცირებული (ეგგოსოცეფალია) ან რეცესიული X-ურბომობისთან დაკვეთებით (გოპი).

**პიროპანია** - *Micrococca* (ბერძნ. *myxus* - ხეხი) (Ludwig H., 1934) აღინიშნება ბრეცელადი შიროგენოვული ბოჭობის წარმოქმნის ფარგლებში ანაბეჭდობითილი მთავრების მისგან დამოუკიდებელი ობექტურ კემპრებს, რომლებსაც შეეძლება შეიქმნას გენის კერებში სინაბეჭდობის მისგან განსხვავებით, გაცხოვების ურბანის დროს მნიშვნელოვანი როლი ეთება უფრო ხეხილენის ანაბეჭდობის ფსიქიკური მოქმედების შესრულებით. მკროსოცეფალია და გაცხოვების რეგონები განხილდება მთლიანობაში მათი ერთგვარი ფსიქოპათოლოგიური პროპორციის გამო და შეესაბამება კლბინურ წარმოგენის დეპრესიონალურ-ანაბეჭდობის კომპლექსის შესახებ, რომელიც მნიშვნელობის მთავრული ბოჭობის ცენტრი ხანძამული დარღვევების (Ludwig G., 1934) ბლოკების (Bender M., 1972) და შერბანის (Korovin A.A., 1975) შივ.

**პიროპანია** - *Micrococca* (ბერძნ. *myxus* - ხეხი) (Ludwig H., 1934) აღინიშნება ბრეცელადი შიროგენოვული ბოჭობის წარმოქმნის ფარგლებში ანაბეჭდობითილი მთავრების მისგან დამოუკიდებელი ობექტურ კემპრებს, რომლებსაც შეეძლება შეიქმნას გენის კერებში სინაბეჭდობის მისგან განსხვავებით, გაცხოვების ურბანის დროს მნიშვნელოვანი როლი ეთება უფრო ხეხილენის ანაბეჭდობის ფსიქიკური მოქმედების შესრულებით. მკროსოცეფალია და გაცხოვების რეგონები განხილდება მთლიანობაში მათი ერთგვარი ფსიქოპათოლოგიური პროპორციის გამო და შეესაბამება კლბინურ წარმოგენის დეპრესიონალურ-ანაბეჭდობის კომპლექსის შესახებ, რომელიც მნიშვნელობის მთავრული ბოჭობის ცენტრი ხანძამული დარღვევების (Ludwig G., 1934) ბლოკების (Bender M., 1972) და შერბანის (Korovin A.A., 1975) შივ.

**პიროპანია** - *Micrococca* (ბერძნ. *myxus* - ხეხი) (Ludwig H., 1934) აღინიშნება ბრეცელადი შიროგენოვული ბოჭობის წარმოქმნის ფარგლებში ანაბეჭდობითილი მთავრების მისგან დამოუკიდებელი ობექტურ კემპრებს, რომლებსაც შეეძლება შეიქმნას გენის კერებში სინაბეჭდობის მისგან განსხვავებით, გაცხოვების ურბანის დროს მნიშვნელოვანი როლი ეთება უფრო ხეხილენის ანაბეჭდობის ფსიქიკური მოქმედების შესრულებით. მკროსოცეფალია და გაცხოვების რეგონები განხილდება მთლიანობაში მათი ერთგვარი ფსიქოპათოლოგიური პროპორციის გამო და შეესაბამება კლბინურ წარმოგენის დეპრესიონალურ-ანაბეჭდობის კომპლექსის შესახებ, რომელიც მნიშვნელობის მთავრული ბოჭობის ცენტრი ხანძამული დარღვევების (Ludwig G., 1934) ბლოკების (Bender M., 1972) და შერბანის (Korovin A.A., 1975) შივ.

**პიროპანია** - *Micrococca* (ბერძნ. *myxus* - ხეხი) (Ludwig H., 1934) აღინიშნება ბრეცელადი შიროგენოვული ბოჭობის წარმოქმნის ფარგლებში ანაბეჭდობითილი მთავრების მისგან დამოუკიდებელი ობექტურ კემპრებს, რომლებსაც შეეძლება შეიქმნას გენის კერებში სინაბეჭდობის მისგან განსხვავებით, გაცხოვების ურბანის დროს მნიშვნელოვანი როლი ეთება უფრო ხეხილენის ანაბეჭდობის ფსიქიკური მოქმედების შესრულებით. მკროსოცეფალია და გაცხოვების რეგონები განხილდება მთლიანობაში მათი ერთგვარი ფსიქოპათოლოგიური პროპორციის გამო და შეესაბამება კლბინურ წარმოგენის დეპრესიონალურ-ანაბეჭდობის კომპლექსის შესახებ, რომელიც მნიშვნელობის მთავრული ბოჭობის ცენტრი ხანძამული დარღვევების (Ludwig G., 1934) ბლოკების (Bender M., 1972) და შერბანის (Korovin A.A., 1975) შივ.

**პიროპანია** - *Micrococca* (ბერძნ. *myxus* - ხეხი) (Ludwig H., 1934) აღინიშნება ბრეცელადი შიროგენოვული ბოჭობის წარმოქმნის ფარგლებში ანაბეჭდობითილი მთავრების მისგან დამოუკიდებელი ობექტურ კემპრებს, რომლებსაც შეეძლება შეიქმნას გენის კერებში სინაბეჭდობის მისგან განსხვავებით, გაცხოვების ურბანის დროს მნიშვნელოვანი როლი ეთება უფრო ხეხილენის ანაბეჭდობის ფსიქიკური მოქმედების შესრულებით. მკროსოცეფალია და გაცხოვების რეგონები განხილდება მთლიანობაში მათი ერთგვარი ფსიქოპათოლოგიური პროპორციის გამო და შეესაბამება კლბინურ წარმოგენის დეპრესიონალურ-ანაბეჭდობის კომპლექსის შესახებ, რომელიც მნიშვნელობის მთავრული ბოჭობის ცენტრი ხანძამული დარღვევების (Ludwig G., 1934) ბლოკების (Bender M., 1972) და შერბანის (Korovin A.A., 1975) შივ.

**პიროპანია** - *Micrococca* (ბერძნ. *myxus* - ხეხი) (Ludwig H., 1934) აღინიშნება ბრეცელადი შიროგენოვული ბოჭობის წარმოქმნის ფარგლებში ანაბეჭდობითილი მთავრების მისგან დამოუკიდებელი ობექტურ კემპრებს, რომლებსაც შეეძლება შეიქმნას გენის კერებში სინაბეჭდობის მისგან განსხვავებით, გაცხოვების ურბანის დროს მნიშვნელოვანი როლი ეთება უფრო ხეხილენის ანაბეჭდობის ფსიქიკური მოქმედების შესრულებით. მკროსოცეფალია და გაცხოვების რეგონები განხილდება მთლიანობაში მათი ერთგვარი ფსიქოპათოლოგიური პროპორციის გამო და შეესაბამება კლბინურ წარმოგენის დეპრესიონალურ-ანაბეჭდობის კომპლექსის შესახებ, რომელიც მნიშვნელობის მთავრული ბოჭობის ცენტრი ხანძამული დარღვევების (Ludwig G., 1934) ბლოკების (Bender M., 1972) და შერბანის (Korovin A.A., 1975) შივ.





**20. ა-ო-ლოპეზის ბოლომდებრივი ვარიანტი** - Мора-Лопеза окончательная методика (Myra-y-Lopez E. 1939).

ექსპერიმენტულ-ფსიქოლოგიური მეთოდიკა პიროვნების გამოსაკვლევად მიუყვება ექსპრესიის შესწავლის პროექტულ მეთოდებს (Luchins E.T. 1940). ემბარსი ვ.წ. მოკონტური დაგნოსტიკის პრინციპებს. შედარებით დადრწინებულს ანდებს მძიკური და საკლენ-მამობრატებელ მუსკლატურის გრუნუს ამა თუ იმ მოქმედების შესრულებაში და ამ გრუნუს შესაბამისად, გამოსაკვლევის ემოციურ-ნებით და ინტელექტუალური მდგომარეობის თავისებურებებს. პირიქედ და თვითურებების დაგნოსტიკა დამოკიდებულა ფსიქობიოლოგიის ხასიათზე გამოყოფილ ფსიქობიოლოგიურ კორლაციებში პიროვნის და სხვა ემოციური მდგომარეობის სხვადასხვა დონის და პიროვნული მახასიათებლებისათვის.

**20. შრამ-შემა** - Шрамские шаржовые тестовые, გამოსატვლია მოთხოვნისგან გრუნობადი განყოფილ ობიექტის შიშარი. ასევე დლოვლი და სერიოლი.

**20. შტაინერ-ტომასის პიროვნების ტესტი** - Методика Томаса Штайнера тест (Mittenocker E., Tommas V. 1951). ახლოა MMPI-თან. შედეგება 120 კითხვისგან, მიუყვება პიროვნული მახასიათებლების სარეცესტაციო მეთოდს, მათგან 94 ეხება ინტერესებს. ძირითადი თემებია: თვითკრიტიკა, სოციალური ურთიერთდაპოკიდებულება, ექსტრავერსია და ინტროვერსია, ნეგროციზმი, მანიაკალურება, დეპრესიულობა, მიმოღრუნება, პარანოალიზება, ევგებეტორუ დაბილობა, ხუნების სიყვარული, ინტერესი ხელაქმისადა, სახეინფორ ინტერესება, აღმანი საზოგადოებასა და ეკონომიკაში, აღმინსტრირება, გამოყოფებითი ხელმოებება, ინტერესი მუსიკასა და დღეინფორმისადა, სოცალური მოწოდება.

**20. შლინის მუნიციპალიტეტის ტესტი** - Мюллеры муниципальный тест (Müller M., 1930). იხ. მუნიციპალიტეტის ტესტი

**20. შინაპირების ხინტრეტი** - Шиняевы тестовые задания აღწერილია ინგლისელი ჭირურგის აშერის (M. Asher, 1951) მიერ. დახასიათებულია შედეგებზე დრამატული და დოკუმენტული მეთოდების თითქმის მუდის რეცესტაციის სომატურ და დაავადებების, ემბრიოგენების, ევლუციის, დამბლების, კანის დაავადებების შესახებ, მინაგანი რწმენა საკუთარი გამონაგონის სისწორება, ყურადღების მიპყრობის სურვილი, ფსეოდოლოგიისა და უანგამიებისადა ნაბილადევი მიდრეკილების გარანტი (Lewin E.F. 1948). დახასიათებულია რამდენიმე პრაქტიკული სარგებლობის არსებობა ავადმყოფის მიერ დემონსტრირებულ დაავადებისთან დაკავშირებით. ამ დროს არამიშთად აღინიშნება თავდადამანების ტენდენციები ავადმყოფის მდგომარეობის ინტერესების შინთან. ასეთ ავადმყოფებს ხშირად ეგარდებათ ოპერაციები. მათი პიროვნული თავისებურებანაა - მოგზაურობისადაში მოსწრაფება, ნარკოტიკული საშუალებების და შედეგამიშენების გამოყენებისადაში მიდრეკილება. ასინი ხშირად ხდებათ ფსიქოგორული საავადმყოფოების და ეხებება. შრიაელი მკვლეარის აბრით, ეს სინდრომი დახასიათებულია ასტროლოგიული ფსიქოპათიისათვის. ფსიქოპათოლოგიურად შეუძლება შევასდეს როგორც ნომოფილიის გამოკლებება. სახელოდება დაკავშირებულია ე. რასპერის წიგნის ჰმარონ მუშაუბრების თავდადასავალი გზისის სახელთან. მღრ: შინაპირების ხინტრეტი, ხეშტატების ხინტრეტი.

**20. შირ-შორანის ობიექტური პარატაქსიკული ტესტი** - Шир-Шоран объективный таксический тест (Murray H.A., Morgan C.D., 1935). დრეკტიკული მეთოდი პიროვნული თავისებურებების შესასწავლად. გამოსაკვლევად აბიექტურ მეთოდურ ნახატებს და მეთოდურ სურათებს და ემოციური ექსტრავერსია და ავადებენ არბორაციონებელ მუფასონ მათზე გამოსატვლი სიტუაციები. ანალიზებზე ავადმყოფის მიერ შედგენილი მოთხრობა, ყურადღება ექსტრავერსიური ექსტრავერსიის არასაკმარის გამოყოფას, მოთხრობის სურვედში საკუთარი განყოფილება გადგანას, გამოსაკვლევის პიროვნის და ა.შ. გუნების თორიული საეუბელი (შურებს პერსონალიზაციის) ექსტრავერსია, თუმა, თეთორი მეთოდი ფსიქოლოგს აძლევს მასალა, რომელიც საინტერესობა მისი ადექვატური კვალიფიკაციისათვის.

**20. შიშინი** - Шешинская ავადმყოფის კონტაქტის გამოსატვლი ვანტრება, შეუძლებლობა, რაც გამოწვეულია ფსიქიკური ანალიზებით - ზოგადი კლავიკულიური აბნევა, ცნობიერების აბნევა, სტაქორი, ნეგატივიზმი.

**20. შიშინი** - Шешинская (ბერძენი. шешин - ლორწო, шешин - შეუძლება). შამოთიფიკის მკვლევარი გამოსატვლი ფორმა. ფსიქიკური ანალიზობება შ-ის დრის იხ. შარ-შორანის პარატაქსიკული.

**20. შიშინი** - Шешинская (ბერძენი. шешин - სექსობრივი აბტი, шешин - ევლუცი, ეთადათავება) (Moll A.). შეუძლებლობა მუშაგრობა - დაკმაყოფილება მიიღევა სექსობრივი აბტის თავდათავება. სქოპოფილის სახე. სინონ: შიშინი-შეშინი.

**20. შიშინი** - Шешинская ჭირინული ინტროექტიული მდგომარეობის თავისებურება, როცა ნარკოტიკული ან გოქსიკური ნოტიობების განსაზღვრული დოზა აღარ იწვევს სასურველ ეფექტს და ამისათვის საჭიროა დონის გაზრდა. ნარკოპიანის და გოქსიკომანიის ფორმირების ერთ-ერთი მყენიზმი.

**20. შიშინი** - Шешинская (Mischel H., 1969). აღინიშნება შეამდებარე გუნის პათოლოგიის დროს და შეეყავს დეპრესიის, ანჭული ბილიანობის და გუშადღობის ან მანის მოკლებებს, გართულებულ დსფორიებით და პარანოიული ეპიზოდებით.

**20. შიშინი** - Шешинская. აღმანიხის სეკოცლები კანონსაწინააღმდეგო განმარბ ან გაურთობილებლობით ხელყოფა. ფსიქოპათიაში: ავადმყოფის მიერ ჩადენილი შ. განიხილება როგორც არამუსიკი დაგნოსტიკის, არაეფექტური გონივრობის ან ფსიქოლოგიური სეკიომარობად ავადმყოფის ნაადრევი გაწარის შედეგი.

**2. შიშინი** - y. Шешинская. შ-ის ჩაღის კოგნიტიური მდგომარეობით ან სხვა მძიშე ფსიქიკურად დაავადებული და წარმოადგენს იმპულსურ-აგრესიული მოქმედების შედეგს. მოგვიერ მისი ჩაღების სტაბილ წარმოადგენს ბოღითი განცდება, განსაკუთრებით პერსუკუტორული ბილი, რომლის დროსაც ადგენილი ხდება აბნევაობით. როგორც წესი, ეს აღინიშნება პარანოიული მდგომარეობის შემთხვევებში და ასეთი ქვეყნი შეიძლება იყოს ფსიქიკური პათოლოგიის გამოკლებების პირველი სიმპტომი (იხ. მანიაკალური სინდრომი პარანოიული მდგომარეობაში, დეპრესიული სინდრომი).

**2. შიშინი** - y. Шешинская (Mischel H., 1957). შეიძლება აგრესიულს არამორალურ ხასიათს (ავადმყოფი სიანის დახამაღს, რათა შეეყავს სეკიული), გუნებება გაგართობილი თვითმკვლევარის ვარტლებში, ხელის დახამოგობილი (სეკიული მძიშე სინდრომი), გამოსილებს (საკუთარი ნაიფიკების ან აბლობის შეწირვა იუჯას დახამაღს) გამოსასყიდად მიზნით, შედარებითი რაბკუსის მდგომარეობაში. შ-ის სიადან ეპილექსიით დაავადებული ავადმყოფები ცნობიერების აბნევისგან დარღვევის, მძიშე დასფორიების დროს.

**20. შინაპირების ტესტი** - Шешинская (ბერძენი. шешин - ლორწო, шешин - შეუძლება). ფსიქიკური ავადმყოფის რწმენადიზაციის მეთოდი, მოიცავს გუგურ საშუაოს საშუკრნადო სახელოსიებში, ავადმყოფთა ფიზიკური და ფსიქიკური მუშაობის სწორ ორგანიზაციის შრომისა და დასვენების პროექტში.

**ბიზნეს-საბანკო ბიზნესი** - *business banking*. უგარდებთ იმ ფსიქიკურ ავადმყოფებს, რომლებზეც ჩაიღრეს სოციალურად სამიმი ქვლბა და სასამართლო-საქონლო ექსპერტის მიერ მათილილი არაან სურდასადა.  
**ა. მ. ინინება** სასამართლო მიერ და გარდება ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. ავადმყოფს უნიშავენ მუდამეგრე მკურნალობას, აუცილებლობის შემთხვევაში დატოვება შრომისუნარიანობის ხარისხი, ორგანიზლება სოციალურ-რეაბილიტაციური ღონისძიებები. ავადმყოფი ექვს თვეში ერთხელ ვადის სასამართლო-ფსიქიატრიულ კომისაზე და თუ ჩათლიან, რომ იგი აღარ არის სოციალურად სამიმი, დება აქტი ა. მ. -ის გაუქმების შესახებ. ამის შემდეგ სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ავადმყოფი ვადის მკურნალობას საერთო რევიმის პირობებში და უკუწუნებების არარსებობის შემთხვევაში შიძლება გაეწეროს არსებული წესით.

**ბიზნეს-ლბა** *ლიზენცია* - *license*. მუდმიანში გამოყენება 1817-ლან ადკოლოგის დროს. რეკომენდებულია იმ შემთხვევებში, როცა სხვა მეთოდის გამოყენება შეუძლებელია ელსი, ფიცილების და სხვა დაავადებების გამო. ღიზონის წვენი მისი ორგანიზმში მუდმივი მუღწევისას ხელს უწყობს ორგანიზმის, ქსოვილების სენსიბილიზაციას, რაც განსაზრობებს ადკოპოლის მიხართ მიზს. ინიშება 20-30 ღიზონი დღეში (დასაწყისში 1 ღიზონი დღეში, თანდათანობით თითონ მომატებები, ასევე მისი თანდათანობით შემეიერებით).

**ბენეფიცი** - *benefit* (ბერბ. *beneficio* - დამახსოვრების ხელაუნება). ხერხების ხსებუა დამახსოვრების გასაღვილებლად სპეციალურად შექმნილ ასოციაციების საშუალებით (შეგახსენს, ანროზირვის და ა.მ. მიხედვით). მის ხერხები მსაღებია ფსიქოთერაპიულ შემოხაში მესხიერების მექანიზმად გამოხატული დაქვეითების დროს (დაქვეითებული ცერებრული ათროსილეროზი, ნეეროზული მდგომარეობები, მიმდინარე დამახსოვრების გაუარესებით ურადლების შესუსტების ხარჯზე და ა.მ.).

**ბიზნეს-ლბა** - *business license* (ბერბ. *licenz* - გამწებებით, *licia* - შეტყუება). ენაბროტკობის ხახე, რომლის დროსაც განდრელება სიყველე ცალკეულ კომპილებს წარმოთქმა.

**ბიზნეს-ლბა** - *business license*. მესხირებაში ადრე მიღებულ, მაგრამ ამემაღ არ არსებულ ობიექტთა (მოვლენა, საგანი, ანბი, გრძნობა) განმეორების ფსიქიკური პროცესი, რომელიც მიუკუთვნება ნანახი ობიექტის, როგორც წინასაუცილებელი ნაყნობის ადღენას. სინონ: *ბიზნეს-ლბა*, *რეპრეზენტაცია* (ლბი. *representantia* - მოცინება).

**ბ. სიმბოლბა** - *business symbol* - ადამიანისთვის უსამიერო მ., რომელიც აღმოყენება მისინებისგან დამოუკლებლად. მოგერი მისი საფუტელა სუბიექტის საქუელად, რომელსაც ავადმყოფი ავასებს უარყოფითად. მათი თაღიან მოცილების, ნეეცილების ცდები უსადრელებლად განდრელებულია და მოითხოვს ფსიქოთერაპიულ ჩარევას. დამახსოვრებელია ფსიქოსტენური პარებისთვის, განსაკუთრებით აგეიატულად მდგომარეობათა ნეეროზულ აღმოყენების დროს.

**ბ. სიმბოლბა** - *business symbol* - კრემბოტრეხის ხახე, რომლის დროსაც წაკითხული, ძილბი ან კინოფილმში ნანახი, მოსაუბრისგან მოსმენილი ავადმყოფის მიერ მიადება როგორც რეალური მოვლენა, რომლის მონაწილე და თვითმიღელი თაღადუ არს.

**ბ. სიმბოლბა** - *business symbol* - რეალური მოვლენები აღიქმება როგორც ვაკინილი, ძილბი ან კინოფილმში ნანახი, წაკითხულია.

**ბ. სიმბოლბა** - *business symbol* - სინანდელილბი ამემაღ ან მანამდე არსებული მოვლენები დამახსოვრებელია აუქტური აბილიტების, ბილეთით განყლების, პიროვნული კომიციის ცუდილებს, მესხიერების ფუნქციის შესუსტების ხარჯზე.

**ბ. სიმბოლბა** - *business symbol* - აღმოყენება ატკოტორულად, მოგერი ხატოვანი წარმოდგენების სახით, რომელიც ავადმყოფის მიერ მიდება როგორც მისთვის უბო ფსიქიკური აქტები, წარმოადგენს გარედან შემოქმელების, იმექნელობს, ძალადობის მუღეს. ფსიქიკური (იდეატორული) ატკომაცემის სიმბოლბი.

**ბ. სიმბოლბა** - *business symbol* - ადამიანისთვის უსამიერო მ. რომელიც აღმოყენება მისინებისგან დამოუკლებლად. მოგერი მისი საფუტელა სუბიექტის საქუელად, რომელსაც ავადმყოფი ავასებს უარყოფითად. მათი თაღიან მოცილების, ნეეცილების ცდები უსადრელებლად განდრელებულია და მოითხოვს ფსიქოთერაპიულ ჩარევას. დამახსოვრებელია ფსიქოსტენური პარებისთვის, განსაკუთრებით აგეიატულად მდგომარეობათა ნეეროზულ აღმოყენების დროს.

**ბ. სიმბოლბა** - *business symbol* - კრემბოტრეხის ხახე, რომლის დროსაც წაკითხული, ძილბი ან კინოფილმში ნანახი, მოსაუბრისგან მოსმენილი ავადმყოფის მიერ მიადება როგორც რეალური მოვლენა, რომლის მონაწილე და თვითმიღელი თაღადუ არს.

**ბ. სიმბოლბა** - *business symbol* - რეალური მოვლენები აღიქმება როგორც ვაკინილი, ძილბი ან კინოფილმში ნანახი, წაკითხულია.

**ბ. სიმბოლბა** - *business symbol* - სინანდელილბი ამემაღ ან მანამდე არსებული მოვლენები დამახსოვრებელია აუქტური აბილიტების, ბილეთით განყლების, პიროვნული კომიციის ცუდილებს, მესხიერების ფუნქციის შესუსტების ხარჯზე.

**ბ. სიმბოლბა** - *business symbol* - აღმოყენება ატკოტორულად, მოგერი ხატოვანი წარმოდგენების სახით, რომელიც ავადმყოფის მიერ მიდება როგორც მისთვის უბო ფსიქიკური აქტები, წარმოადგენს გარედან შემოქმელების, იმექნელობს, ძალადობის მუღეს. ფსიქიკური (იდეატორული) ატკომაცემის სიმბოლბი.

**ბ. სიმბოლბა** - *business symbol* - ადამიანისთვის უსამიერო მ. რომელიც აღმოყენება მისინებისგან დამოუკლებლად. მოგერი მისი საფუტელა სუბიექტის საქუელად, რომელსაც ავადმყოფი ავასებს უარყოფითად. მათი თაღიან მოცილების, ნეეცილების ცდები უსადრელებლად განდრელებულია და მოითხოვს ფსიქოთერაპიულ ჩარევას. დამახსოვრებელია ფსიქოსტენური პარებისთვის, განსაკუთრებით აგეიატულად მდგომარეობათა ნეეროზულ აღმოყენების დროს.

**ბ. სიმბოლბა** - *business symbol* - კრემბოტრეხის ხახე, რომლის დროსაც წაკითხული, ძილბი ან კინოფილმში ნანახი, მოსაუბრისგან მოსმენილი ავადმყოფის მიერ მიადება როგორც რეალური მოვლენა, რომლის მონაწილე და თვითმიღელი თაღადუ არს.

**ბ. სიმბოლბა** - *business symbol* - რეალური მოვლენები აღიქმება როგორც ვაკინილი, ძილბი ან კინოფილმში ნანახი, წაკითხულია.

**ბ. სიმბოლბა** - *business symbol* - სინანდელილბი ამემაღ ან მანამდე არსებული მოვლენები დამახსოვრებელია აუქტური აბილიტების, ბილეთით განყლების, პიროვნული კომიციის ცუდილებს, მესხიერების ფუნქციის შესუსტების ხარჯზე.

**ბ. სიმბოლბა** - *business symbol* - აღმოყენება ატკოტორულად, მოგერი ხატოვანი წარმოდგენების სახით, რომელიც ავადმყოფის მიერ მიდება როგორც მისთვის უბო ფსიქიკური აქტები, წარმოადგენს გარედან შემოქმელების, იმექნელობს, ძალადობის მუღეს. ფსიქიკური (იდეატორული) ატკომაცემის სიმბოლბი.

**გოლფოდონი** - оживление როული აუტორი რეაქცია. შეიყვან როგორც დაღებით, ასევე უარყოფით განწყობას. ახასიათებს ემოციური კონფლიქტების და შინაგანი ან გარეშე სტრეს-უაქტივობის დაძლევის, თავის გარემოების უნარი, რომელიც ხორციელდება ემოციური რეაქციების ან მომავალი მოვლენების შესაძლო შედეგების განხრევათ და რეალისტური აღტყინაიული გადაწყვეტილების გააზრების გზით.  
**გოლფოდონის პარანოიული რეაქცია** - Милохова параноические реакции (Милохова А.Н., 1940). იხ. *რეაქციები პარანოიული*.

**გონაკოვის ღია შიშო** - Монахова открытая об. *ღია შიშო*,  
**გონაკოვი-მურავის მემორიზირება** - Монахова-Мурга эмоциональные кризы (Монахов С., Мургуев Р., 1930). იხ. *პრობლემატიკური მონიშნის მეთოდით უმჯობესება*.

**გონაცემები (ნოტი)** - знания ნერული სისტემის, გენის თანდაყოლილი ანგაგონურ-ფიზიოლოგიური თავისებურება, წარმოადგენს ნიუის განვითარების ბუნებრივ საფუძველს. მ. არ არის სპეციფიკური მოქმედების კონკრეტული მინარსის და კონკრეტული ფორმების მიხედვით, ის მრავალმნიშვნელოვანია.

**გონიშის მემორიზირება** - Монахов метод анкиротации (Монах А.С., 1933). იხ. *გონიშის მემორიზირება*.  
**გონიშის მემორიზირება პრეფრონტალური ლეიკოტომის მეთოდით** - Монахов метод префронтальной лейкотомии (Монах А.С., 1935). იხ. *ღია შიშო*.

**გონიშის მემორიზირება** (ბერძნ. monos-ერთი, idea - აზრი, სახე, წარმოდგენა) ავადმყოფის ცნობიერებაში ერთი რომელიმე წარმოდგენის, იდეის დომინირება. იხ. *მონიშნის მეთოდით უმჯობესება*.

**გონიშის მემორიზირება** - моношания (ბერძნ. mania - ღაგოლეა) (Захаров J.E.D., 1838) ფიქტიუზება, რომლის შინაარსი შემოფარგლება ძირითადად ერთი რომელიმე ფსიქოპათოლოგიური კატეგორიით. გამოირჩევა მ. ინტელექტუალური, პოლიეთი, აფექტური, ინსტინქტური (ზოგად არ არის, მაგრამ ღაგოლეა აგარებს დაუძლეველ ხასიათს), შეკვლეობის.

**გონიშის მემორიზირება** - моношания (ბერძნ. plegos - დაზარება, უხედეება) ერთი კვლევის დაშლად, აღინიშნება დამიანების ტერქული ლოკალიზაციის დროს.

**გონიშის მემორიზირება** - моношания (ლათ. polus - პოლუსი) ფიქტიუზების პროცესების მიმდინარეობის დაშლისათვის, რომელიც აქვთ პოლარული, ურთიერთსაწინააღმდეგო სამეგობროება, მაგრამ შემოფარგვლით მხოლოდ ერთ-ერთი სიმეტრიითა კომპლექსით. მან, აფექტური ფსიქოზების მონოპოლარული მიმდინარეობა აღინიშნავს მათ დაშლენებას მხოლოდ დაქვემდებარება ან მხოლოდ მანიაკალური ფაზებით, ხიპოლარულიდან განსხვავებით, რომლის დროსაც ეს ფაზები მონაცვლეობს.

**გონიშის მემორიზირება** - моношания (ლათ. sexus - სქესი) სინონ: *გონიშის მემორიზირება*.

**გონიშის მემორიზირება** - моношания (ბერძნ. phasis - გამოვლენება) სინონ: *გონიშის მემორიზირება*.

**გონიშის მემორიზირება** - моношания (ბერძნ. phasis - გამოვლენება) სინონ: *გონიშის მემორიზირება*.

**გონიშის მემორიზირება** - моношания (ბერძნ. phasis - გამოვლენება) სინონ: *გონიშის მემორიზირება*.

**გონიშის მემორიზირება** - моношания (ბერძნ. phasis - გამოვლენება) სინონ: *გონიშის მემორიზირება*.

**გონიშის მემორიზირება** - моношания (ბერძნ. phasis - გამოვლენება) სინონ: *გონიშის მემორიზირება*.

**გონიშის მემორიზირება** - моношания (ბერძნ. phasis - გამოვლენება) სინონ: *გონიშის მემორიზირება*.

**გონიშის მემორიზირება** - моношания (ბერძნ. phasis - გამოვლენება) სინონ: *გონიშის მემორიზირება*.

**გონიშის მემორიზირება** - моношания (ბერძნ. phasis - გამოვლენება) სინონ: *გონიშის მემორიზირება*.

**გონიშის მემორიზირება** - моношания (ბერძნ. phasis - გამოვლენება) სინონ: *გონიშის მემორიზირება*.

**გონიშის მემორიზირება** - моношания (ბერძნ. phasis - გამოვლენება) სინონ: *გონიშის მემორიზირება*.

**მორვანის სინდრომი** - Morvan's синдром (Morvan A.M., 1890) შთოქრონის განაკუთრებული ფორმა, ხასიათდება ფორალარული კნოთიანი გავრცელებით კრანხვებით (ძირითადად წვივის კნოთებში), ფსიქიკის მხრივ - დეპრესიის მოკლებებით (მოკლე რაინიშები სუბილური ანრები, მიშის კრინება, უბილბა, ბაქონდრირული სიმპტომბაჟი). ეპილეფიური დარღვება - ოფალიზბა, კანის ერთბა, პულის არქარბა. უმეტესად აღმოცენდება ნეორობფექუალთან დაკავშირებით. სინონ: **მორვანის შინბა**, **მორვან შინბილარული**.

**მორისი** - Морис (ბერძნ. moria - სიხულება) (Brus L., Jastrowitz P., 1888) პათოლოგიურად აწველი გუნება - განწყობა შობარბობა გუნებათ, უპარვლებობით, მოსუღელი საყვილთ, უბში ხუნობებისაში შირველებით. დაშხასიათებელია აგრეთვე მიხიღლებობა განმხურუება, ვიფორია, ამორალური ქვეებისაღში შიდრეკილება. **ასტროფიკტის** ინფარგებით, **ჰუქვახვტობა** თავებური შხარული აუზნებათ. ოპენჰაიმის (H. Oppenheim, 1898) მიხედვით, **გადაცემა** შადვირ განვლებია. აღინიშნება თავის გუნის შუბლ-ბაშალური სიღბის დამიანების დროს. შორისმცავარი სიმპტომბაჟი აღწერილია დიდი გუნის სუბლომინანტური ჰემისფერო პათოლოგიის დროს. შით შეიძლება შეიკვალოს თავის გუნის შუბლბს წილბს კონფექსტური მედაპირის დამიანებით გამოწვეული აპათიური ახუღიერი სინდრომი ან ვრ ესწრებებს მას. ცნება ანალოგიურია განმხურუებებს **სინდრომბა** (Welt L., 1887). სინონ: **ბრუნ-ბასტრომბიტის სინდრომი**.

**მორიტის სინდრომი** - Мориса синдром (ლათ. Moritz S., 1919) სპეციფიური აპონური ფსიქოტორბაშული შუიფი. დაშხარებულია ბენუბლიშბი პრინციპებში. მოწოდებულია ნეურასთენიის სამკურნალო საკურსო ავადმყოფის ხანგრძლივად მოთავსება საავადმყოფოში. პირველი ეტრის განმავლობაში - დახვლებული თობში, ობოლბობა პარობებში. ავადმყოფბა თვითონ უნდა დაძლიოს საკუთარი ავადმყოფური განვლები, შეგვრბნებები, პრობლებები. შემდგომ 40-60 დღის განმავლობაში მეურნალობის რეჟიმში შუბს დასაქმბბს ეღებებები, შრომითი თერაპია. ამ შემთხვევაში აუკლებელია ავადმყოფის ამბადვია ახლობებისა და მეგობრებისაგან. დაუშვებელია საკუთარ სიმპტომებზე შხუღება გარშემოშოფუფთან. შინაში - პაროგუნბის გარდაქმნა თვითდაკვირების, თვითმარბეების გვით. შემდგომში ერთბაჟი გუჯვური ფსიქოთერაპია.

**მოროზის სინდრომი** ბლანტ-პაპიშვილი **შქანსუსტიმბსა** - Морозова синдромом блякнотимбулехоту снубоимбу (Морозова В.М., 1967) ებლევსური ჰუქვახვტობბს ერთ-ერთი გარანტი. დამახასიათებელია გამობბაგული აპათია, ინტელექტუალური მოქმელების და ემოციური გამოვლინბის უკუტრის შენელება, ბბულადმორბობა, აუტეტური მიმართულების და ექსპლემბორობის არარბობა. აღინიშნება ბბლევსური პროუყის ხანგრძლივი და ინტენსიური შიშინარეობბს დროს ხშირი კრანხვებით გუჯრებით, ებლევსური სგბგუსთ და ენობიერების ენობილური აშლით. მსგავსი დევნებური სინდრომბა და საწინააღმდეგობა ექსპლემბორობბსა. ახლოა ინტრეტოლოგიურად ჰუქვახვტობბსთან ებლევსურის დროს (Урылова Я.И., Жамухаева И.Я., 1964).

**მოროზ-ბარბულ-შქანსვის პარანტიში პარტიში პლემბრში ტრბმბსა** - Морозова-Каваса-Тикава синдромом прооту ахотитомбу თობით (Morozov F. B., Kavasa A.I., Tikaeva G.L., 1973) იბ **პლემბრში ტრბმბსა** **მოროზ-ბარბულ-შქანსვის ტაშარეობა** ხმორბნარი რეპრობმბსა **შქარბნარეობბსა** - Морозова-Тараева синдромом титанатах риботити при шотититити (Morozova B.M., Tarajeva Ю.К., 1951) გამოყოფენ რეისიების ობს ტბს: პაქრბიფიურბ, ახუნებრბ, ბარბობებლებ, აბოქონდრბლებ.

**მორისი** (ბერძნ. moros - სუღელი, გუნბბამბლული) გამოწვეულია ღებლი. **მორისბის დობორშოფობბა** - Морозова шотититити (Morsell E., 1886) იბ. **დობორშოფობბა**. **მორისბის ტაშარეობბა** - Морозова шотитити (Morsell E., 1886) იბ. **ტაშარეობბა**. **მორიფობბი** - морфиязм იბ. **რეპრბმბსა**.

**მორფოლბსა ზობბი** - морфоморфия (ბერძნ. morphe - სახე, ფორმა, dys - უწესიის დარღვევა, plasis - ფორმირება, წარმოქმნა) (Robert J., 1974; Laurent J.L., 1974) ეშხარბობბის გარანტი. დამახასიათებელია ორგანობის გენეოთარების შანკები შამბ, როცა პისკოლიქლამბიბისთვის დაშხასიათებელია ქსოვილების განვითარების შანკბი. შ. აღმოცენდება ეფმოგენური პათოლოგიური შემოქმედების შედეგად და ნაყოფის გუნტკვიურ ცვლბებთან დაკავშირებით. შმშენვლური როლს თამბობს ოლიგოფერინის ფორმირებბში. ეშხარბონული ცენების ოლიგოფერინის სობბური გამოვლინებბს ასახავს განვითარების სგაღბს, რომელშიც რეალბებულია გარემოს ან გენეტიკური შანკი უბბორბი (ნობითბ M.T., 1978).

**მოსალბარი მრბმბარობბა** - морсалары мрбмбары ფსიქობათოლოგიური მეფობარობბა, წარმოადგენს ფსიქიატრის, ნეუროპათოლოგიის, სობბური მედიცინის, სოციალური მეცნიერების გამოყვევის და მეურნეობბის ობბექტს. შბს შიქოთარბა ნეურბბბა, ფსიქობათობბა, რეპტული მეფობარობბის შოგირბი ფორმბბა, ნეურბბბა - და ფსიქობათობბეგარი მეფობარობბბს სობბტური და ფსიქიკური დაბადებებბს დროს.

**მოსალბარი სიმბბობბა** - морсалары არბობტიფიკებული შხარულება, აგბებული, აწველი გუნება-განწყობა, ბავშვური ქვეები, ავადმყოფის განვლებბა და გუყბს შორის შეუსაბამობა. ჰებფერბული მიზოფერინის ხშირი სიმპტომბა, შუბს შორის სინდრომის სტრუქტურბაში.

**მოტმბბობბა** - мортиция (ინგლ. mortis - შიშბე, შოგიე, სურვილი). შოგიეები, რომლებიც განაპირობებს მოქმედბბს. გრბანშიბის აქტიობბს, განსაზღვრავს მს მიმართულებბს. ფსიქობიოლოგური კრიტიკობების მიხედვით არჩევენ შოგიეოლოგი ფაქტობების სამ კლასს: 1. შობობნვლებბში და ანტიტეტბში როლოფ ფსიქიკური აქტიობბის წყარო; 2. შობტიფბბ, რომლებიც განსაზღვრავს ქვეების, მოქმედბბის მიმართულებბს; 3. უმთვებობა სუბბექტრი განვლებბ (მისწრაფბა, სურვილი და ა.შ.) და განწყობბა, რომელიც არეგულირებს ქვეებს. დაბიანის მოქმედბბს ფორმარბბში შონაწვლები ერთდროულად რამბენბე შოგიე მაგანბ ერთი წმამყანბა, ხოლო დანარბნი - დაქვემდებარებულია შეორბნარბობბიან, რომებბაჟი შეიძლება შეასრულოს დაბბეობით სტამბლბის როლო. წამყენი შოგიეები განსაზღვრავს დაბბანბს მოქმედბბს სუბბექტერ პიროვნულ არსს. მოქმედბბში რამბენბე შოგიეის ერთდროული არბსობბა ხასიათდება შით შორის როული - ანტიგონისტული და ბიბეგული ერთდროულბ კლებულებით. შოგიეებისგან არბბბობად განსხვავდება შოგიეობბა - საკუთარი მოქმედბბის, ქვეების ახბბა. შოგიეირბბა შეიძლება არ დაბბთბბს შოგიეებს და შეიძლება მიმანბსახუღად დაბბიანბნოს სვი. არჩევენ უშბბბებ (უპარობო, ბიოლოგიური, პარველები) და უშბბბებს (სოციალური, იდეალური, რთული) ც. ს. პირველი

განპირობებულის ნიუთიერი საგნებით, რომელიც შეესაბამება ადამიანის ელემენტარულ მოთხოვნებს, მცირე - სოციალურ ფაქტორებს.

**მონეტარა** - moneta (ლათ. moneta - მონეტარაში მოყვანა). სუბიექტის მოთხოვნებებთან დაკავშირებული მოქმედებას ზურგული, დამოკიდებულია სუბიექტის შინაგანი და გარეგანი პირობებით განპირობებულ აქტიურობაზე და განსაზღვრავს მის მიმართულებას.

**გოთაშენიანი ფაქტორები** - სინდრომი - сепарат "ნეოკონიხი იარ." იხ. პატარაშენი.

**მონეტარა** - монетар. მოქმედების ერთეული, ნებისყოფით, განმარტული აქტიურობა, მიმართული გაყნობიერებული მიზნის მისაღწევად.

**1. სპეციალური** - А. И. ИВАНОВИЧ. მონეტარაში აქტების შესრულების დაუქვეყნელი ზურგული მეტაქვებზე მოხანმეწონილი შესაბამის ვითარებაში (მაგ, ხელის აკეიბებული ხანა, საგნების სიმეტრულად განლაგება), სხვა შემთხვევებში სრულიად არამოხანმეწონილი (მაგ, აგობის შემდეგ ნომრების გამოება, სისტემატური შეხება ყურზე). ავადმყოფო გრძობის მათ უამრობას და უამრავებობას - კრიტიკა ყველა შემთხვევაში შენახულია, რაც განსაპირობებს იმას, რომ სრულად მხოლოდ ის აკეიბებული მოქმედებები, რაც ავადმყოფობა სისუყვას არ ეპყრება და არ ეწინააღმდეგება მის მორალურ და ეთიკურ შესვლებებს. შ.ა. შიშილება დაკეიმირებული იყოს აკეიბებულ შიშებთან, აკეიბებულ ამრებთან, რაც განსაპირობებს რიგვალების გაქენას. იხ. პატარაშენი.

**2. მონეტარა** - А. ИВАНОВИЧ. უეჭარი, მოტეგაციის გარეშე, ხშირად უამრო, მოგურ ავადმყოფობა და გარემოყოფთა სისუყვასათვის საშიში მოქმედება. შ.ა. ხანმოკლეა, კრიტიკის არ ექვემდებარება («ყრუნხვა ესოქომოტორულ სეკრშიას).

**3. მონეტარა** - А. ИВАНОВИЧ. გამხანული მოქმედება წანაწარი ნებთი განწყობის გარეშე, არ მოთხოვს ექვრალის დაძებნას. ამის საფუძვლად უღვს უამრობ რეველებები (მაგ, ხელის სწრაფი უკან გარეშე ელემენტარულნიან შეხებისას).

**მონეტარა** - მონეტარაში - монета восточная იხ. პატარაშენი.

**მონეტარა** - монетар. ცემლისმეწონილი - монета восточная იხ. პატარაშენი.

**მონეტარა** - монетар. სუბიექტის სამყაროთან ურთიერთაქვებულებებს დანაქვეყნი ხსტტება, რომლის პროცესში ხლებს ესოქომოტორი სხის აბოქვება, განსახიერება და სუბიექტის მიერ არსებულ დანაქვეყნებში მოქმედებებით რეაქციას. აღმართის მოღაქვება არის სოციალურად განპირობებული მოღაქვობა და უამრობდება ფიქსირებული და გამოხევაებული მოქმედებების სქემის, ამრობრივი და ენობრივი მოღაქვობის, სოციალური რილის, სოციალური ღირებულებების ნორმების სახით, ხოლო ინდივიდის სუბიექტური მოღაქვობის აქტიურობა განპირობებულია წარუღის გამოყვლებით, მოთხოვნებულებით, განწყობით, ცმოციებით, მიზნებით და მოციებით, რიწლებზე განსაზღვრავს პიროვნული მოღაქვობის მიმართულებას და არჩევითობას.

**მონეტარა** - монетар. ცემლისმეწონილი - монета восточная ცერადლებს ერთ-ერთი თებება. ხასიათდება ელემენტარული რიწლებით, რომელიც ადამიანს შეუბებს უამრობულად აღიქვება დაუქვეყნებულ უქმებებზე ყ.ს. ვარჯისით უამრობებლობა მაშინ, როცა ამრობრივიდ ასოქვებულმა შეობება იყოს საკმაოდ მაღალი. ეს გარემოება შიშიშელოვან როდს ასრულებს იმ პირობის ვარჯიშის დროს, რომლებსაც აქვთ უამრობულიდ შეხსიერება და ესტრადებულ ახლენენ «ადამიანსოქვების სასწავლებლის დემონსტრირებას.

**მონეტარა** - монетар. მილიანად ორგანიზმის ან მისი ცალკეული ნაწილების გაქვადებულება.

**მონეტარაში** - монетар. ცემლისმეწონილი - монетар. ცემლისმეწონილი შინაწამართული მოქმედება სრულდება გაყნობიერებლად აღრული ცხოვრებისეული გამოყვლებების შესაბამისი გემპით, გამოხევალების ხარისხით, ამლიცვლით.

**მონეტარაში** - монетар. ცემლისმეწონილი - монетар. ცემლისმეწონილი ნებთი გაყნობიერებულად ან გაყნობიერებლად შესრულებული მოქმედება.

**მონეტარაში** - монетар. ცემლისმეწონილი - монетар. ცემლისმეწონილი მიმანდისხული მოქმედება, რომლებსაც კონტროლდება ცნობიერებით. სინონ. - 2. ნებთი (მონეტარაში).

**მონეტარაში** - монетар. ცემლისმეწონილი - монетар. ცემლისმეწონილი «მონეტარაში» - монетар. ცემლისმეწონილი «монетар. ცემლისმეწონილი». თვალის კქვლებს ნელი მოქმედება სხედასხვა მიმართულებით, უამრობულად პირობინგაღვრება (ღრმა კომის - ეპილეფსიური, პიკერულიეპიური, გრავიტი. სისხლძარღვოვანი და სხვ. დროს).

**მონეტარაში** - монетар. ცემლისმეწონილი - монетар. ცემლისმეწონილი გარედან ძალდატანებით შესრულებული მოქმედება.

**მონეტარაში** - монетар. ცემლისმეწონილი - монетар. ცემლისმეწონილი (გრანტ. moneta, გერმ. plnmetale - არრალი). მომიწებითი მოქმედება, რომელსაც ავადმყოფი შეიგრძობს ამუქვებულ კიღრთ. იხ. მონეტარაში ან მონეტარაში.

**მონეტარაში** - монетар. ცემლისმეწონილი - монетар. ცემლისმეწონილი (ლათ. meta - გამოქვება). იხ. პატარაშენი.

**მონეტარაში** - монетар. ცემლისმეწონილი - монетар. ცემლისმეწონილი მეტეორად გამოხატული ამუქვებულობა ავანება, ავარებს უამრო, არაკოორდინირებულ ხასიათს. მიმანდისხული არამოციფორებულ აგრესიით, პანიკური გაქვებით, ქაოსური მოქმედებებით. უქვებად აღინიშნება ცნობიერების შეყვლის მდომარობების დროს, იმეათად - კვატალოური ავანების სტრუქტურაში.

**მონეტარაში** - монетар. ცემლისმეწონილი - монетар. ცემლისმეწონილი იხ. პატარაშენი.

**მონეტარაში** - монетар. ცემლისმეწონილი - монетар. ცემლისმეწონილი (ლათ. meta - ცემლისმეწონილი).

**მონეტარაში** - монетар. ცემლისმეწონილი - монетар. ცემლისმეწონილი მეტეორად აღმოყვლება და სწრაფად ეპოვლის. ხმარად მიმანდისხობის მოქმედება ავანებით და აგრესიადამანტრეული ტენდენციებით. დამახასიათებელია ევტიკატორი რეაქციები: სხის გაწითლება და გაუთიერება, გაქვყარდა, თავის ცყოლი (ხშირად შრისხანების შეტევის შედეგ). შის რეაქციები აღინიშნებით როგორც ესოქომოტორი განმარტული პირებს (მეუღლენი იგი მიმდინარეობს გამომწველ მიზეზთან დერარებით აღუქვებულ და ძირითადად კონტროლდებდა), ასევე ესოქომოტორი დაავადების დროს - ნეკროზის დროს, ესოქომოტორი პირებში, თავის ცენის ორგანული დამანებისას (ყრენრული ათიურიკლოროზი, პოსტგრაემული ავანების სტრუქტურაში).



**მცლარი მოქმედება** - **ОПЫТНОЕ ДЕЛАНЕ** (გერმ. **Fehlleistung**) ფსიქოანალიზში იმ მოქმედებათა საერთო სახელწოდება, რომელთა შესრულებისას თავს იჩენს სხვადასხვა ხასიათის შეცდომები (მაგ, სიგვეის წამოყვება, კალმის შეცდომა, რაიმე ნივთის შენახვა და შემდეგ დაიწყო, შეცდომები მესხიერებაში და ა. შ.). აიხსნება ურთიერთსაწინააღმდეგო მოთხოვნების თანაარსებობით ან შეჯახებით, რაც შემდგომ ამტარი მოქმედებებით გამოიხატება. შ. შ. სუხიექტის ნების საწინააღმდეგო მოქმედება და, ამდგომეუ იგი ცდილობს მის დაფიქრებას

**მძიმე ბრატრამეული უნტრალობა** - **тяжелая отрицательная интеллигентия** იხ. **ბრატრამის აკალეზიზი სინტრამე**

**„მწიგნობრის მუშაობა“** - **работа сном** (გერმ. **Traumarbeit**). ფსიქოანალიზში: ინტრაფსიქიური პროცესი, აღმოყვდება ახლოზელი ობიექტის დაკარგვის დროს. ამ პროცესის წყალობით სუბიექტი აბერებს საკუთარ ობიექტთან განმორებას.



**ნაპლერეზი სინეზიმი** - прежлеверенный сычуа იხ. **სახვამთა კამერეზიზმი**

**ნაპლერეზი ტაქსისმეტრიზი** - прежлеверенное чтение იხ. **მეზერეზი**

**ნატიული გერმედი** - оветная промашуток ანტიკვადი ფსიქოპათოლოგიურ მდგომარეობებს შორის დაავადების უაზური ან შედეგისმავალი მიმდინარეობის დროს. დაავადების სიმტომები არ არის გამოხატული. რემილუალური ფსიქოპათოლოგიური სიმტომების დასახელების ნაშენებს არსებობს გერმინის წაღის გამოყენება უმართებულა, შავ, მიმოყრენის რემისიული მიმდინარეობის დროს. იხ. აგრეთვე **მტკარეზი**.

**ნატირამის პათოლოგიური პიტომეტრიზი** - Натира патологическая астропатия (Nayrak), იხ. **სანტონის-პლერეზი**

**ნაისპირის პერსპერეზი** - Найсра персперия (Neisser C., 1894), იხ. **პერსპერეზი**

**ნაისპირის რეპროდუქციული გერეზი** - Найсра репродуктивный грез (Neisser C., 1893), იხ. **პერეზი რეპროდუქციული**

**ნაისპირის სიმეტრიზი პლერეზი** - Найсра симметрический птерез (Neisser C.), იხ. **სიმეტრიზი პლერეზი**

**ნაიტის კლასიფიკაციის კლინიკური პრინციპი** - Найта классификация клинических (Kniele P.P., 1937). არრევენ შემდეგ ფორმებს: **ფანტაზიური, რეაქტიული და სიმეტრიური ალკოჰოლიზმი**.

**ნანეზიმი** - нанази иხ. **მერეზი**

**ნანერეზი** - нанази იხ. **მერეზი**

**ნარეზი სანეზიმი** - нанази нанази საკვები ნარევი ხელოვნური კვებისთვის. შედგება რძე, ბულიონი, ზეთი, უმი კვერცხი, მარილი, ხილის წვენი ან ფრუიტული პრეპარატები; აუცილებლობის შემთხვევაში შეიძლება დაემატოს სამკურნალო საშუალებები.

**ნარეპროდუქციული** - наррепродуктивный (ბერძნ. narxis - გამეშება, analysis - დაყოფა, დამლა). კატეგორიურ რეაქტიულ სკაპორში მყოფი ავადმყოფების გამოკვლევის შედეგად ხანმოკლე (რავში) ნარკოზული მდგომარეობის გამოწვევის საშუალებით.

**ნარეპროდუქტიული** - наррепродуктивный გ. გ. იხ. **გარანტი**, რომლის დროსაც კრუნჩხვითი გულყრები გამოიწვევა ნარკოტიკული ნივთიერების (მეფენალი, პენგოალი) წინასწარი შეყვანის შემდეგ. გულყრა მიმდინარეობს მუდარებით რბილად, ნაკლებად გართულებებს (მოგებობა, ამოფარდნილობა, მუცუების დაქმულობა). სივანის შემდეგ - ღრმა ძილი შემდგომი სრული ანეზიით. ამეზიდ არ გამოიყენება, რადგან ხარბიგურაგები მაღლა სწვეს კრუნჩხვითი მღერაღს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს სუნთქვის გაზრება.

**ნარეპროდუქტიული** - наррепродуктивный (ბერძნ. narxis - განწმენდა, განთავისუფლება). ფსიქოთერაპიული შეთოდევა, რომლის დროსაც კათარზისული მთავნება (იხ. **სანეზიმი**) მიმდინარეობს ნარკოზული ძილის მდგომარეობაში. ავადმყოფს შეასწებენ ფსიქიკურ-მარეპროდუქტიული მოვლენის შესახებ და აძლევენ ემოციური რეაქციის გამოვლინების საშუალებას ან შეაფიქრებენ იმაღ, რომ მიეცემა შეხამდობა ადიკციონის დაავადების გამოწვევით ვითარება.

**ნარეპროდუქტიული** - наррепродуктивный (ბერძნ. narx - გამეშება, lexis - შეგება) (Gelineau J.B., 1880). სიმტომთა კომპლექსი, ხასიათდება ძლიანობის შეტევებით და კატალექსიური გულყრებით. ნარკოტიკული გულყრა აღმოცენდება ნებისმიერ სივანეაში. არარეპროდუქტიული გონის დაქვეითება და კავშირებულია რეულექსურად - სიცილიან, ნიშთან, შეკეთარ ბგერით გამოიხატება. დამახასიათებელია ძილისა და ლეიძის ხუნერსივი მონაცუეობის დარღვევა. მოგერ - პიანგოგოური და პიანგოპიური ქალეყანაიციები. თან აძლავს ენდოკრინული დარღვევები. შეიძლება იყოს დამოკლებული დაავადება (ესენციური ნარკოტიკი) ან აღნიშნულად სხვადასხვა ეგოლოგიის თავის გეინის ორგანულ დაავადებებს (მენინგოენცეფალიტი, თავის გეინის სიმტინეები, სიცილიან და ა.შ.) დროს დამიანების დოკლამაიციით დინეყუადურ მილაბოში. სინონ: **პარეპროდუქტიული, ნარეპროდუქტიული რეპროდუქტიული, ნარეპროდუქტიული, ნარეპროდუქტიული**.

**ნარეპროდუქტიული** - наррепродуктивный (ბერძნ. narx - გამეშება, ქრონიკის დაბინდა სხვა - შეყრება, სწავლება). საშუალო შეყნარება ფსიქატრონის დისკო პიან, რომელი შესწავლის ალკოჰოლიზმის, ნარკოზიანის, გოქსიკოზიანის ეგოპათოლოგიებს, კლანიკოს, მკურნალიანს, პროფესორს, ექსპერტის და სოყალურ-ფსიქოლოგიური რეპროდუქციის სათვისს.

**ნარკოლოგიური სამსახური** - наркотическая служба საქალაქური დაწესებულების ქსელი, რომელიც ეწევა ალკოჰოლიზმით, ნარკომანიით და გოქსიკომანიით დაავადებულთა სამკურნალო-პროფილაქტიკურ, სამედიცინო-სოციალურ და სამედიცინო-ფორმულ დახმარებას. მოიცავს ნარკოლოგიურ კაბინეტებს, ნარკოლოგიურ დასასვენებელ და განყოფილებებს ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებთან, ნარკოლოგიურ საავადმყოფოებს, დღის სტაციონარებს და ა. შ.

**ნარკოზიზმი** - наркотизм ანდვლი, რომელიც არასაკმარისი მიზნით სისტემატურად მოხმარას ნარკოტიკულ საშუალებებს, გასობავლი აქვს მათთან ფსიქიკური და ფიზიკური დამოკიდებულება და შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ დადგენილი აქვს ლიენზიზმი ინარკოზიზმა.

**ნარკოზიზმი** - наркотизм (ბერძ. νάρκη - გაუმეხვა, ცნობიერების დახინდვა, mania - ღელვა, სწრაფვა). კრძალია ხსენება რთვი დაავადებებში, რომლებიც ხასიათდება ნარკოტიკული საშუალებების მზარდი მიღების დაუძღველი სურვილით მათ მიმართ განვითარებული ფსიქოპათია და ფიზიკური დამოკიდებულების გამო. ნ. ს, როგორც დაავადების კრიტერიუმად ითვლება ქვემოთ ჩამოთვლილი ცხრა კრიტერიუმებიდან სამეფ არსებული თუნდაც სამი. გამოეყენილი კიანასენილი ერთი თვის განმავლობაში. 1. სუბიექტი მზინად მოიხმარს ნარკოტიკული საშუალებების მძალად დაწვას და უფრო ხანგრძლივი დროით, ვიდრე მას პქინად ვანახდებოდა. 2. აქვს სურვილი ან ცდილობს, შეაგროვდეს უშეცდომოდ, შეამცროს ან შეწყვიტოს ნარკოტიკული საშუალებების მიხმარება. 3. სუბიექტი დიდ დროს უთმობს ნარკოტიკული საშუალებების მოძიებას, მის გამოყენებას და მისი მიხმარებას შემდეგ ორგანიზმში სინდრომული ფუნქციონირებას მდგომარეობაში მოყვანას. 4. თუ თქოფება ნარკოტიკული საშუალებების ზემოქმედების ქვეშ ან აბსტინენსური მდგომარეობაში მაშინ, რამდენადაც მისი მოკლევადიანი ოჯახული, სამსახურადიანი ან საზოგადოებრივი ზოგადებითა შესწრდება ან მისი ახელი მდგომარეობა ხდრობს უქმანს საკუთარ ან გარემოშეყოფა სეციტინებს (მაგ. ავტოზოილას ან სხვა სარტანსოტო საშუალებების მიართ). 5. ნარკოტიკული საშუალებების მიხმარებას მისთან ოგნოტიკულია პროტოტიკული ან საზოგადოებრივი ცვლდებულებები. 6. ნარკოტიკული საშუალებების მიღება გრძელდება შუახდობად ოქსია, რომ ავადმყოფს ცენტრობერული აქვს, რომ ამან შეიძლება გამოიწვიოს მისი საზოგადოებრივი მდგომარეობის გაუარესება და სომატურ-ფუნქციონირების დარღვევა. 7. ტოლერანტობის მნიშვნელოვანი ზრდა. წყურთი უწყობს მძალეწვიად საქართა, ხელ ცრტა მწრ - ამ ვანზარდის მიხმარებული ნარკოტიკული საშუალებების რაოდენობა. 8. ავტოტიკული ხანგრძლივობა. 9. ნარკოტიკული საშუალებების მიხმარება ავტოტიკული ხანგრძლივობის უკარებასთან. ბოლო ორი პუნქტი არ-ებება კანბინიოლთ, პალეინოგენიით და ფუნქციონირებით გამოწვეულ ნარკოზიზმს. იხ. Criteria for Substance abuse, Criteria for substance dependence.

**6. ბარბიტურული პრეპარატები** - барбитуровые препараты ანტიეპილეპტიკური ორგანიზმში შეყვანების ანთიპიკულუს პრეინანდუსური დაბოლოებებიდან სეროტონინს და იმუნოპრეპარატებს მის უკუმიტაცებას. დაახლოებით 5 მგ პრეპარატის მიღება იწვევს ეთოროიდ განსრომას, ახდენს ვერბალური, წერთი მეგეყვებისა და მოძრაობების გატეკურებას, ამცირებს დაღლილობას, ანორექსიას და მრდის გყოილის ზურჩის, აძლიერებს გროიკულ ერთი ანტიეპილეპტიკური პრეპარატების მოქმედებას. ანტიეპილეპტიკური მოქმედება იწვება დაახლოებით 2-3 საათის შემდეგ და გრძელდება 2-3 საათით. აღმანი ხდება მელმეგად კონტაქტური, მოუსვენარი, ბერის დაპარაკობის ირდევია დროით ადრეში. გამოსარეობს გეოქარლია, არტერიული წნევის მომაგება, სახის ვაჭილება ან ვანეროტიკობა. შეიძლება ადვილად ქირდეს იანობს ან წამოხურებას და სხვა სისხლძარღვოვანი დარღვევებს, გულსრებას, ლებინებას, ბრუქსიზმს (იხ.), სუნძების ვაჭილებას, უკვების გაფართოებას, ოფლიანობას, გრემორს, ატაქსიას, სენსორული სერვის აზრდევებას, კრანხიოთი ბეროტიკებს, გვანობას, კრუნხებს, ინტრაინური შეყვანის დროს გართლებების სახით იძლევა სეროზულ სეპტიკის, ვიდატის ახუცის, ენოკარდების, ნეკროზული ანგიოს. ქრონიკული მიღებისას თავის გუნში ვითარდება ნეიროპათიური ცვლილებები. მიიწევა და დამოკიდებულება ეთიარდება სწრაფად. ქრონიკული მიღებისას გოლერანტობა მავლობს სუ-ზე ლემა. მნიშვნელოვანი ფსიქიკური ცვლილებები - დისფორიები, დოგორება, უძილობა, აწვეული გამომიანებლობა გარემოშეყოფა მიმართ მგრულ დამოკიდებულებამდე უკიდურესი დაბახულობა, ახნევა, მწფოთიერ-მანკურა რვაქეყება; არამეფათილ ეთიარდება მდგომარეობა ფსიქოზი, რომლის კლინიკურ სურათში დომინირებს ლენის ბოლა. ფსიქოზურ მდგომარეობაში ადვილად აქვს სენიოთ და გატეკურ პალეუანტიკებს შესაძლებელია ვანზოთარდეს გლართობი ეპილეპტიკული ეპილეპტიკული, რომლის დროსაც აუადმყოფი სინდრომით ნარკოტიკული ქვეყნის. ანტიეპილეპტიკული გამოწვეული ბოლითი ფსიქოზი მოგადონებს პარანოიულ მინოტიკინას დიფერენციაციის საშუალებების იძლევა შედეგობითი პალეინანტიკების არსებობა, რაც შესაბამემა აუტეკურ მდგომარეობას, პერიოდული ახნევის და კოქერენცილობის დარღვევის მდგომარეობით, აუადმყოფის მიუპრეტიკობა და აზროვნების დარღვევები. ანტიეპილეპტიკული გამოწვეული ფსიქოზის დროს მფიათად გვხვდება სხეულის სქემის და სახეების ამოცნობის აშლა. ფსიქოზური მოღენძენი გრძელდება რამდენიმე დღიდან 1 კვირამდე. გრძელვადურ სიმამომების აღსანიშნავია ბოლა, ვევიანობა, ცრუ ინტერპრეტიციისაშვი მიდრეკილება, რაც უკონილება გარემოდებს თვეების განმავლობაში. აბსტინენსურია ხანგრძლივ, რომელიც ნარკოტიკული ოფლიანობა „კრახხი“ ვითარდება როგორც პრეპარატის მოხმანის შემდეგ ასევე დობის გამრდის მითხოვნებისას ან მრავალდღიანი მძალადი დობის მიღების შემდგომ პერიოდში. მისთვის დამახასიათებელია მფოთია, გრემორი, დისფორია, ლეტირგია, დაღლილობის მგრძობა, კომპარენული სიმშრები, ძლიერი თავის ცუდილი, პროფული ოფლიანობა, უკონიკანი მეროტიკობა, სახმები კვში, დაუკებელი მიმძლი, ფსიქოპოგორული აეიგაყია, რომელიც გადღის აგნებაში და აგრესიულ იმპულსურ მოქმედებებში. აბსტინენსურია სინდრომი თავის მაქსიმუმს აღწევს 2-4 დღის შემდეგ. ამ დროს ხშირად ღრმა დეპრესიული მდგომარეობები სუციდური გენდენსეპიბი. იხ. Diagnostic criteria for Amphetamine intoxication, Diagnostic criteria for Amphetamine withdrawal.

- 6. ბ. ბარბიტურული პრეპარატები - ი. ხ. ნარბიტურათაი იხ. ბარბიტურული პრეპარატები.
- 6. ბ. უპრეპარატი - ი. ა. აქედინიკი იხ. უპრეპარატი.
- 6. ბ. ქატილი - ი. ხ. каатилю. კატი - მუტარეული ნარკოტიკული საშუალება კატიის ბუქები იხრდება ახლო აღმოსავლეთში და აფრიკაში. აქ მოსახლეობის 80% დაავადებულია კატიზმით. მისი კულტივირება არეზია.

მსოფლიოში თანდათან იზრდება, რადგან სტიმულატორულ თვისებას აცარებს მხოლოდ ახალი მოწყვეტილი ფოთლები. კაცის ნარკოტიკული ვუქტი გამოწვეულია ალკოლით კაცის და კაცისთვის არსებობით, რომელიც 1972 წ. გერმანიაში პირველად იქნა გამოყოფილი. 200 გრ კაცის ფოთოლი თავის მოქმედებით უგლოდება ზერ აბუფადის. კაცის მიზნით ტოლერანტობა იმდენად იზრდება, რომ შეიძლება მიადრის 2,5 კგ ფოთლის მოხმარებას. კაცით გამოწვეულ სიმთრავლეს ყოფნ 5 სკალიად (Gawin F. და თანაავტ., 1986; სტიონი P.B. და თანაავტ., 1987): უფორმა, გადაღებულად ასოციურად მოაქვნიან, უმეორად აქვნიან, ასთენიკა, მოვლენებით სიმბატრ-ნიტბატორი დასუბტები. კლინიკურად იგი გამოვლინდება გუნება-განწყობის აწვეით, მავლობის თვითშეგრძნება და თვითშეფასება, ღრმადება ყურადღების კონცენტრაცია, ჩქარდება ასოციაციები, ხდება წარმოსახვების და უაღრმადობის აღმოცენება სახეების სრული ცვლით, თვლება დროის შეგრძნება, იკარება ურთიერთობების და კომუნიკაციების სურვილი; ვარჯიშ გახდომიანებისადმი ჩნდება პატივთმეობა და მოკიდებულება. ჩქარდება და ხშირდება სურვილები. ირღვევა კორდინაციული მოძრაობები. სუთა ალკოლიდების და სინთეზური სტიმულატორების მოხმარებისაგან განსხვავებით, გამზავდება სახის პიკურება, სკვრების ინსიციება, ხშირდება პულსი, სუნთქვა, მავლობის არტერიული წნევა, ფართობები გუგები, გამზავდება გახმობები ილირები, მალის დაქუთობა, მეტორიზმი, ყხმობა თრობა კრძალდება დაახლოებით 2 საათი. ინკოფიციკლიან გამოხდის შედეგ უფორმება თვის კტილით, უსამიერად შეგრძნებები სხეულში, ღვრებისა, ამათი ან დასუფორმა. აბსტინენციური სინდრომი ეთარდება 12-20 საათის შემდეგ. იგი არ განსხვავდება სტიმულატორების მიღების დროს გამზავული აბსტინენციური სინდრომისაგან (იხ. მუშაურობისაგან).

**6. ბ. ძმობისაგან** - **ბ. კოკაიანი**. ნარკოტიკის სახე. უანბო-ის მოხმარებით, მსოფლიოში თვლიან 20 მლნ-მდე უკაინომანს. კოკაინს იყენებენ როგორც სუთა სახით, ასევე სხვადასხვა მიზნარეობით, მაქრონი, ნოკოკაინით, ანუგამინებით და სხვა. მღების ფორმა ძირითადად სამი სახისაა: ცხარეი შესუნთქვა, პიკტეუ ან გენაში შეყვანა და სუთა ალკოლიდის მოხმარება მოწყვის გზით. ორგანიზმში მოხვედრისას კოკაინი ასტიმულირებს ბოლოინტეგრულ სისტემას, გამოიყოფა დიდი რაოდენობით დოჟამინი და ხდება სტიმულირების უკუშედეგობის პრეციის დეპოკარება. ამის გამო იწვევს ძლიერ ეუფორიას. მისთვის დამახასიათებელია მოხმარების პირველ დღეებში გახვთარებული ფსიქიკური დამოკიდებულება. კოკაინის ერთი დოზის მოქმედება გრძელდება 30 წუთიდან 1 სთ-მდე (უკანაში შეყვანის და შესუნთქვის დროს). ცხარე მოქმედება გამოხატება ვეზმალდასით, ეუფორიით, თვითშეფასების აწვეით, უმეორად და გონებრივ მოხმარების დროებითი გაუმჯობესება. იგი ამბავრებს აღქმას, ამყირებს დაღლილობის გრძნობას, ამჩარებს ასოციაციებს. ავადმყოფთა ნაწილ იმყოფება მზანებაში. სხვა შემთხვევაში ადგილი აქვს აღსაზრებას და პალტუტაქციებს, რომლებიც აღმოცენდება თვით მეღაბორზე მეტი დროის მატრო-ან მატროსული მოლოგორი ილუზიების და პალტუტაქციების სახით. თრობის დროს სახე პიკურდება, სკვრები ინსიციებული, გუგები გაფართობებული, ვალისიება და სუნთქვა გახმობებული, არტეზიული წნევა მოზავებული, დიორები გახმობებული, გამზავდება ამორტუტა. თრობის გამზავალი მდგომარეობა დათრგუნვის ფაზა ეს უკანასკნელი ხასიათდება გუნება-განწყობის დაქუთობით, ამათით, ადვილი გამომიანებლობით, ამორტუტით, უსამიერად შეგრძნებებით სხეულში, თვის კტილით, სუყოფილ აზრებით და გუნებრივებით. კოკაინის ქრონიკული მოხმარება სრულად იწვევს ე.წ. ტობის მდგომარეობის მესხვებას. ეუფორიის და აგმენის მდგომარეობის ვამეორების მიზნით ინდივიდს უეთარდება დაუძლეველი მოთხოვნილება, მიიღოს კოკაინის ახალი დოზები. ავადმყოფი არის აუფორებული, აღიკლავ აგმენიად, ურტორი, აგრესიული. გამზავდება იმპულსური სექსუალური ქმეობები, აწული ფსიქომორტორული აგმენებალია მანააკალურ აგმენებად. თვითგრანდიოზობის შეგრძნება; გამოირჩევა ღარაკუთრებული სოხმობით, აღნიშნება უბილობა, საგრმზობლად ირდება წონაში, აქვს გამოხატული რინორა კონსიციების ანთებით, ცხეობის შეუძლებელი, დეფორმაციით, მზინად ეთარდება ძვიდის პურფორიკა. აბსტინენციური მოვლებში გრძელდება 2-4 დღე, თუ არ ჩაეთვლით ღვრისისა და გამომიანებლობას, რომელიც გრძელდება კვირების განმავლობაში. აბსტინენციამ ადგილი აქვს დესფორიას, ადვილად დაღობა, უბილობას (ან მილანანობას), ფსიქომორტორულ აუტაგონს, საჭმლის მოზრდებულ სისკების მზრად მზამუნებლად აღარღვევს, გელისრებას და დეპინებას. შეიძლება განთვარდეს ეპიდემიოფორმული კრუნხვითი განკვირებები ან ფსიქომორი მდგომარეობა. ეს უკანასკნელი ეთარდება უმეტესად კოკაინის თგრანენური მოხმარებისას როგორც აბსტინენციამთ, ასევე წყავთ ინკოპიაციური მდგომარეობაში. ეთარდება დამოკიდებულების პარანოიული იდეები, მხედველობითი, სმენითი და გაქვიდური პალტუტაქციები. შეიძლება გამზავული იყოს დელანაული ან ზოგჯერ ფსიქოზება, უპირატესად დაზიანობის ან დეგნის ბოლით. ფსიქომორი არამუთაბით როგორც სექსუალური იმპულსური მოქმედებით, ასევე იმპულსურად აღმოცენებული შედეგობის დაუძლეველ სურვილს. გამოიყოფა კოკაინის მღები, რომლებსაც უკვე გამზავული აქვთ ფსიქორტავული სინდრომი, ხშირად ელოდება ფსიქომორი სურათის განვითარებას, არ კარგავნ რინორაქციას, იყნას სად იმყოფიან და აგრძელებენ მიზანდასახულ მოქმედებას. ასეთ მოვლებში ისინი ურდებიან *პატანზმდ მღ მღრეობის* (იხ.) იხ. *Diagnostic criteria for Cocaine Intoxication, Diagnostic criteria for Cocaine withdrawal*.

**6. ბ. წიპიშეობი** - **ბ. ოთხიანი** იხ. *წიპიშეობა*.

**6. ბ. სპატივს სპატივსაგან** - **ბ. თვითმართი**. ნარკოტიკის მისაღწევა გამოიყენება სხვადასხვა ჯგუფის პრეპარატები: ზანბტურატები, ურდები (ბროიურად), ზანბტინება და ზანბტინება (როქსინობი). ნარკოტიკული თრობა ეთარდება ორზაგი, სამზაგი თერაპიული დოზების მიღების შემდეგ. საძილეების მოხმარებისას შემოვლარება ავადმყოფის განწყობა, მიიღოს ეუფორიული შედეგი. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი მოქმედება მნიშორარდება საძილე ურდები. თრობის პირველი ფაზა (იხ. *ნარკოტიკული მღები*) ეთარდება მომენტურად, რგმსნე, ნარკოტიკული საშუალების შეყვანისთანავე და გამოვლინდება ე.წ. *ანბილი* დარტყმით, გაბრუნებით, თვლებში დაბნელებით, მხედველობის ხდება უნებურად, ავადმყოფი ხდება სუსტიმეო წერტილები და რტოვებს. ესითი აკაბმები. ყოველივე ეს სასაზოვნაა. ეთარდება გუგების გაფართობება, მოცილების მღა ნაწილის კანისა და ღორწორანის .იპურება; რტადური ვარჯ საბყარი არ აღქმება. თვით ავადმყოფობი ამ მდგომარეობას ურდებენ ფეხითმეფას, იმყოფიან წყოლებზე ან ხალხებზე წყოლიარ შეტეობრობაში. ფაზა გრძელდება რამდენიმე წამი. თრობის მეორე ფაზის დროს ავადმყოფი ხდება ხასიათი, მძარბული ხეობის, აქვთ მოძრაობის, მოქმედების სურვილი. მოგორულ აქციოება და მოძრაობა დაუძლეობს ქაისურ ხასიათს, გაბრუნების და ამროვნების ხარისხი დაქუთებულია. პასური უკრადდება აწული, მოქმედებების და ამროვნების თემა ცვალებადი, ემოციური ფონი მრეყვი;



და ხსენს შესაძლებელია ერთი კვირის განმავლობაში. ქრონიკული შობზარებისა ინტოქსიკაციური ცვლილებები დამოკიდებულია პრეპარატის დოზაზე. სუსტ დოზის მიღების დროს ადვილ აქვს დიამორიას, ატაქსისა, კუნთების, განსაკუთრებით სახის და კისრის რიგიეობას, ზოგჯერ ოპისტიკონუსს, მუცელ-ბალონ რეფლექსების გახიზულებას, ცივილიზის მცერბნების დაქვეითებას. მაღალი დოზები იწვევს პიკეტორიზმის, ატაქსიის, სტერეოტიკულ და ათეოტიკურ მოძრაობებს, პიკეტორიზმის, გატიკარდას, ნისტაგმს. აღინიშნება ღებინება, პიკეტორიზმი, ატაქსია, ხშირად ბილატერალური ფემო. უფრო მაღალ დოზებზე გამოიწვიოს ძილიანობა, სტაპორული მდგომარეობები, რომლის დროსაც თვალები ცახვლილია და რეაგირება ხდება მხოლოდ უბუნ გამზინებელ გამღიანებელზე. შემდგომში სურათი რთულდება კონამორური მდგომარეობით. არამიშვითია გინკრლიმებელი კრუნხები და ეპილესიური სტაგუსი. ხშირად გვხვდება ჩინბ-სტოქსის სუნთქვა, სუნთქვის დაქვეითება. როგორც წესს, ავადმყოფებს უკითხვობა უსიქომური მოუღებია, რომელიც გამოიხატება ტექვისით, ემოციური და აღქმის დარღვევებით. ავადმყოფი მის გამსაკურთხებელ პოზიში, უმზერს სივრცეს; აღნიშნება ევრალადა, ღებინება, პარანოიული იდეები, უძილობა, აგნეზია; დაუფარაბელ უწყვიან მხებერბაციას, იგლეჯენ განსაკუთრებით, არ იკაუებენ მარსს. გუთავებლად გირანბ ან იყინებან, აქუთ გინღენუთა ძალაღობისაკენ. ზოგ შემთხვევაში გამოხატულია ფელარული სინდრომი. ფსიქომური პერიოდები უმეტესად აბნებრებულია. ფსიქომური მოუღებების ხანგრძლივობამ შეიძლება მიაღწიოს რამდენიმე დღიდან 2 კვირამდე. რაც შეეხება ნევიროლოგიურ ცვლილებებს და ორგანულ ფსიქოსანდრომს, იგი გამოხატულია ფუნციონირების მოხზარების შეწყვეტილად 1-2 თვის განმავლობაშიყ. **Diagnostic criteria for Phencyclidine intoxication.**

**6. ბ. პ. ჰალუცინოზენაში** - **ნ. ა. რალითაიონიასა. პ. კ. უმერბანასი** (ბ.) მიიღებს შემდეგ გამოწვეული მცერბნები განსხვავდება როგორც ხარისხით და გამოხატვებით, ასევე ხანგრძლივებით. შედარებით უარყო დაპაზონით გამოითრება LSD, რომლის მოქმედება იწყება მიღებიდან დაახლოებით 1 სთის შემდეგ და გრძელდება 8-12 სთ. სხვა პალეუროგენების მოქმედება მერყეობს 1 სთ-იდან რამდენიმე დღემდე. პირველ რიგში გამოუღინდება ფიზიკური სიმპტომები, როგორც არის მიღრიანი, გატიკარდა, ოფლიანობა, მუდგელობის სიმბვილის დაქვეითება და გუქომორი. პათოფიზიოლოგიური რეაქციების წარმოშობა დამოკიდებულია პარონების რეაქციებზე, სასურველ მოლოდინზე და გამოვლენება აღქმის, გუნება-განწყობის და აზროვნების ცვლილებებით. ნარკოზენები უმეტესად თვლიან, რომ აღქმის პათოლოგია პრეპარატითა გამოწვეულია, თუქუ, არამიშვითად აქუთ მცერბნები და შიში, რომ შეიძლება და არასივლი და დაუზრდება სორმას. როცა ნარკოზენს აქვს პათოლოგიის მიმართ უკითხვობა ხილვითი ინტერპრეტაცია, პალეუინაიციები გუბელობს რეალურ ხასიათს, განსაკუთრებულ ინტენსიურობას და სიუკამპებს. განსაკუთრებული ხდება ფრია, სუნ, გემოვნებითი აღქმა. ზუსტად იტყვიან განსაკუთრებულ დრმა, ემოციურ ხასიათს. აბგლედი აქვს სინესთეზებს - ფრები ესმით, ზღერებს ხედავენ. წარმოიშობა დროის, სივრცის მცერბნების და სხეულის სქემის აშლა. პალეუინაიციები უმეტესად მუდგელობითია. გუნება-განწყობის და გუქომორი, ემოციები იღებს განსაკუთრებულ ინტენსიურობას, ხშირად იტყვიან და შესაძლებელია ერთი და იმავე დროს ადგილი უქონდეს საპირისპირო გრძობებს. მთავარბებლობა და არავერბალური სინგლისადმი მცერბობელობა აქვლია. შეიძლება გამოხატული იყოს იზიდაობის სურვილი, ან პირიქით. დამახასიათებელია იდეილებითი მესტირებაში, აღმოცენდება არრველი ბავშვური განსუბები, რომლებიც დიდი ხანაა დიუწყებელია. ადვილი აქვს არაქონიოების სიმბოლური ფორმით გამოხატუბელებას. გამოხატულია რეგრესია, მესსარებაში ცოცხლება ძალზე მორვეული მოგონებები დაბადების ბავილით. გაქურდა ინტროსპექციური რეფლექსია და რეალიზურ და ფილოსოფიურ იდეებში დრმა წელობა. ინდივიდი შეიგრძობს საკუთარ ორგანოების უზამობას. დრმა იტყვიან თვითმცერბნება, რომელიც ხშირად აღწევს დეტერმინაბილიაციურ ხასიათს. შეიგრძობს საკუთარ იმპუს სხეულისგან განმორება და მისი მორწყება მსგეისურ ექსტეზითა. აღნიშნული პრეპარატების მიღება არ ხდება დიდი ხნის განმავლობაში. მათ შიშიარო უსიქოური დამოკიდებულების განვითარება იშვიათია, ვინაიდან სრულად ახალი მიღების დროს მათი მოქმედება სხვადასხვავებარა და ამავე დროს, იშვიათად აბსაბითებს ეფორია. გოლერანგობა ვითარდება სწრაფად, მავრამ სწრაფადვე გრება. პირებს, რომლებიც ბორგულ მთისმარენ აღნიშნულ პრეპარატებს, აღნიშნებით ქრონიკული მეთოთა, დეპრესია, არასრულფასოვნების გრძობა. აღნიშნული სახის ნარკოზინის დროს გამოხატულია რიგი ფსიქომური ანლიობები (ბ. **6.ბ. მხარდობი პრეზენაში, 6.ბ. მხარდობი პაროლენაში, 6.ბ. მხარდობი პაროლენაში, 6.ბ. მხარდობი პაროლენაში**).

**6.ბ. მხარდობი პრეზენაში** - **ნ. ა. რ. იონიასა. მ. ა. პალეუინოგენების მოხზარებისას** ყველაზე უფრო ხშირად გვხვდება ე.წ. **ყუდე ექუქურბა** (xmas tree), რომელიც ვითარდება როგორც მწვავე პანსკური რეაქცია შესაბამისი უსიქოპათოლოგიური სიმპტომებით. გრძელდება 8-12 სთ და მთავრდება პრეპარატის მოქმედებისათი ეთიად. მთავარბობს ძირითადად უსამაგორი აუტექტირეაქციებით. გარდა აღნიშნულისა, ადვილი აქვს ფსიქომურ გამოვლენებს. მთავარბობს ძირითადად ოთხი სახით: პალეუინოგენური პალეუინოზი, ბოღვითი აბლიობა, გუნება-განწყობის აშლა და პალეუინაციების მუდგელობა აღქმის აშლა. პალეუინოგენური პალეუინოზი იტყვიან როგორც გუნების გავართიებას, გატიკარდას, ოფლიანობას, მუდგელობის დაქვეითებას, გრემორს, დესკორინდანიაციას, მფოთვიანობას ან დეპრესიას, დამოკიდებულების იდეების და პარანოიული იდეების წარმოშობას, შიში, რომ შეიძლება, კრიტიკის დაქვეითებას. აღქმის პათოლოგია ოლბიების, პალეუინაციების, სინესტოპათიების და სინესთეზების სახით ვითარდება უხელო მდგომარეობაში. გამოხატულია აღქმის განსაკუთრებულ გამოვლენება და დეპრესიანდამიაციური სინდრომი. ბოღვითი მდგომარეობის განვითარების შემთხვევაში ხეშით მოყვანბლ სომბატურ-რევიროლოგიურ ცვლილებებს თან ერთვის დეენისა და ნემოტივების ბოღვითი იდეები. გუნება-განწყობის ცვლილებები იტყვიან პალეუინოგენების მოხზარების დაწყებიდან 1-2 კვირის შემდეგ. გამოხატულია დესკორინიზისა და დეპრესიების სახით და წელება ნარკოტიკული საშუალებების მოხზარებიდან 24 სთ-ის შემდეგ, რაც შეეხება პალეუინაციების მუდგელობა აღქმის აშლას, იგი ვითარდება პალეუინოგენის მოხზარების შეწყვეტის შემდგომ პერიოდში და ვლრდება გუნებრული ფუნქციის პალეუინაციების მუდგელობის პირველი ეტაპი წარმოშობის უმრავლეს შემთხვევაში. გუნების ცნასაკურთხებელ აღქმის მოძრაობი იბეჭეტებს ცვალს, პარაუნდლს, მკერო და მკეროქსების სახით.

**6.ბ. მხარდობი პაროლენაში პრეზენაში** - **ნ. ა. რ. იონიასა. იპოთიპროფინისა მ. ა. პალეუინოგენების** მოქმედებით მოუღებელი მოუღებების ცვლილებების როგორც გუნება-განწყობის და ბოღვითი დარღვევის. ოთხინ ეტაპებშია ე.წ. **ყუდე ექუქურბა** და **არტროზოპექტულ სენდებს** და აქუთ გაბანგრძობებული ხასიათი. მათი ხანგრძლივობა აღწევს 24-48 სთ-იდან რამდენიმე კვირის ან რამდენიმე თვის. ბექე გუნება-განწყობის სხვადასხვა რეგისტრის

ეკოლოგები. აღნიშნული მოვლენები (უბეჭდად) უკითარდებთ პრობლემებს, შიშილიური ხაზებით ხსიათირი და მიღრეკილებს შოთოთისაღმი, რომლესაც უკირთ განსილი პერსუაუილი და სხვა დარღვევების გვადანია.

**ნ.ბ.ა. "რეტროსპექტიული სინთეზი" -** ხ. ა. გ. "регрессивная химия". აღნიშნული მოვლენებს ეწოდება "უკუაფთქება" - "flashback" და წარმოადგენს პირებარების მიღების დროს არსებული ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომების რეგრესიუტულ სინტანსურ, ტრანსიორულ გამოვრებას შამინ, როცა ავადმყოფი აღარ იმყოფება ნიუთოიტების ხელშეშელების ქვეშ. გამოვლინდება პალეუსიაციებით გოთმერეული ფიგურების სახით, სეზიზით, ევრასაღერი სეკუნდონის, მხედველობის პერსფორირ ველში წარმოშობილი ფურადი ავეტებების, ურების განსაკუთრებული აღქმის, შოდრავი იხივეტების ევალის, შარავანდელის, შაკრო- და მიკროსუბების სახით, დროს აღქმის დარღვევით, მესხობაში ძლიერი ემოციების განსხვებით. შედგომარეობა გრძელდება რამდენიმე წაშინან რამდენიმე წუთამდე. ენდორფინად ავიღიი აქვს პარესთეზიებს და ბერეს კერის. რეგრესიუტული სეციების წარმოშობა არიშიშოთია. შინა ვამოწვევა შეუძლია იქვითქვს სურვილს მიხეღით ან წარმოიშობა ზნელი ადგილიდან ნათულმა გვადსეულსას, შოგეერ კანახიოლის შიხმარებისას. არსებული სიმპტომების გაცილის შეშეგვ რება ღრმა დეპრესია სუციდული გენდერეულით და პანიკური რეაქციებით, რომლებიც შეიძლება გავრტელებს თუვეის განშელოზობაში.

**ნ. ბაქოშვილი ბავშვთში -** наркотическая зависимость у детей. нб. **პაშვილი**.

**ნარკოპიანისა ბაროშული -** наркотическая зависимость. დამოკიდებულების განვითარება ერთდროულად ნარკოტიკული საშუალებების და არანარკოტიკული ზუნების ფსიქოტროპული ნივთიერების შიმარით. **ნარკოპიანისა -** зависимость (რატომაცა) **ბავშვებში -** зависимость у детей при наркотизации. ნარკოტიკული საშუალებებით ინკოქსაციის საწყის ეტაშე შეხეღებით ისეთ სიმპტომებს, როგორცაა: ღებინება, ქავილი, პროუშული ოფლიანობა, სიპერსალივაციო, სლოკობა, თუღების წვა, გულს წასულია შეგრძნება, გულისრევა, თებერუსხვევა, რაც სისეტმტური ნარკოტიკის მიღვე თანდათან ქრება და გარკვეულად შიუთითებს დააგადვებს შიმდვეწო სტადიის განვითარებაშე.

**ნარკოპიანისა - ტოლერანტობის შეცვლა -** изменение толерантности при наркотизации. ნარკოტიკული საშუალების შიმართ რეაქტიულობის შეცვლა შიპყების გოლერანტობის განრდა. გოლერანტობის სწრაფი ეკლილება გამოვლინდება ოპოლორი პრეპარატების შიხმარებისას 2-4 კერის განშელოზობაში, სემოვადორების შიხმარებისას - 1-2 კერის განშელოზობაში. დადავების შიმდინარეობის პროცესში გამოხატება გოლერანტობის გარკვეული სტაბილიზაცია, რომელსაც შეიძლება შიპყეს ინივიდუალურად ან გოლერანტობის ეკვად გამრდა (შორეინიშის დროს 2-3 გ-მდე, სედატიური პრეპარატების შიხმარებისას 2-2,5 გ-მდე), ან დავეითება. დადავების გამოილი ეტაშე საწყისი დოზა შეიძლება გაიზარდოს ბარბატურადგებისათვის 10-ჯერ, სედაციურებისათვის - 12-ჯერ, ოპოიდებისათვის - 200-ჯერ. არჩვენ "ფეციტია" და "ქოიფილტობა" გოლერანტობას. «ქეციტია» გოლერანტობაშე დაპარაკია შამინ, როცა ავადმყოფს შეუძლია ვაკოტგროლის საკუთარი მოქმედების ნარკოტიკული სიმთრალის შელომარობაში. «ქოიფილოვანი გოლერანტობა» (Лихущак Н.И., 1994) არახესგად გაღოსეებს პროცესს, ეინაინდან ეგე შიმდინარეობის ტოლერებუით უწესეურ სისეტეებში და არა სასეციური ქოიფილებში; ამგომ ურო შისაღებია გერმინი "ფუნქციური გოლერანტობა".

**ნარკოპიანისი რეშისიზიზი -** рехиссия наркотизации. არჩვენ ნაწილობრივ და სრულ რეშისაბ. ნაწილობრივი რეშისიშე საურობენ შამინ, როცა უკანსეტლი 6 თვის განშელოზობაში ადგილი აქვს ნარკოტიკული საშუალების მხოლოდ ენიორდურ შიხმარებას. სრული რეშისა გამოხატულია შამინ, როცა უკანსეტლი 6 თვის განშელოზობაში არ აღნიშნება ნარკოტიკული საშუალების შიხმარების ეფეცი ან თუ აყუთ არსებობდა, არ არის გამოხატული ნარკოპიანისის დაშახასათიფელი სიმპტომება.

**ნარკოპიანისი სტრისინიზი -** стрессовая наркотизация. არჩვენ შიუბუქ, საშუალო და შიმდე შარსისებ. შიუბუქი ხარისხის ნარკოპიანის დროს აღინდებ სუდად არის გამოვლინებული და შერვა სობატურ-ნეეოლოგიური სიმპტომები, რომ ცარულებულია დიდგროსი ღებმა, თუშეა სახეტეა პროცესული და სოციადური დავეცილება და გარეშისთან კავშირების ნაწილობრივი გავყევა. საშუალო ხარისხის დროს სიმპტომები ნაწილად შიუბუქ და შიმდე ხარისხებს შორის. შიმდე ხარისხის ნარკოპიანის დროს სახეტეა სიმპტურ-ნეეოლოგიური და ფსიქიური დარღვევები, გამოხატულია პროუესიული და სოციადური დავეცილება, გარშემოყოთინ კავშირები შიღინანდ განპირობებულია ნარკოპიანური ქეციით.

**ნარკოპიანისიშეზი -** наркотическая (бегрды. ეინახას - მეერთება). კათარზული ფსიქოტრამა, რომელიც გარღებია შიხმარობის ან ნარკოტიკული ძილის შეგომარობაში.

**ნარკოტიკული ორგოზა -** наркотическое опьянение. წა-ის დროს დარღვევები გამოვლინდება შემდეგი სინდრომების სახით: 1) ისტიკური პროცესების უმარადილება; ემოციური სფეროში - შიშის ავეტების დაქვედველება, დისთეციაციის შეშეღებლობა. აღქმის სფეროში - აღეყობა, პალეუსიაციები. ანთონებთი სფეროში - ამოთა თავისუფალი, სინტანსური ნივთიერების, ასოციაციების პერსფორირული შეკვლა (ოპოიდები, ალიპოლო, სედაციური საშუალებები), ამოთა სინტანსური აღეყობება, რომლისგანაც ვიღოსეყო უერ აღქვის თავს (ქოლნალიზირი, ფსიქოლოგიური პრეპარატები). 2) ფსიქიური პროცესების მოქმედების დაბლაყობა; ამ დროს სხვადასხვა ფსიქიური პროცესების აღმოცენება არ ენიშნება ურთინანის ეტაშა და დროში. შიგ, ფსიქოსენორული აღქმის შიბაქვილებები ხმარად არ ენიხევაა ანთონებების გეტმა, რომელიც ამ დროს შენდებულა, რაც ქმის ქ. წ. მობლადეეების შიბაქვილებებს; ან მეჭა-სოციოტიპურების დისოციაცია, როცა ასულად თოთისა ეტირდება სხეულს. ეს უკანსეტლი არა შარც ინგედეტეაღერი არამედ ფსიქოსენსორული აშდლობაა. ინგედეტეაღერი უწესეების დისოციაცია გამოხატულია აღქმასა და დაშახსორებაში, გაეტხსა და ევიზილანსაციში, აყვადეფერი ზღვა ნათილად, აყველადერი იღებს სხვა შიმინველოზას), თუშეა ახეტა და ყველადერი რება აუხვლად. ასთიფე დისოციაცია გამოხატულია სიმთრალის დროს, როცა დაპარაკია ამრებისა და შეგრძნების (გარეზების). 3) ერნობიათი პროპოპოთიურება, შიით სიდრში, დფეურეობა, აუნსეტლობა, ანეარიშოქვილობა, რაც შიუთითებს თალაშური სტრუქტურების დინტეგრეციაში.

**ნარკოტიკული ორგოზის ბავშვებში -** опьянение у детей наркотическими средствами. შამინ-ქოლითა ქოლით და სემოვადორების შადლი დღებმა ძილი შიმბე; და გულტების თან ახლავს დამტეეელობის და სხვა უსამირი შეგრძნების ოპოლორი პრეპარატები ექვეს სანახაშეში ძილს ფსიქოტრეეციის ადღენით. სემოვადორების და შიეურიტი ფსიქოლოგიური პრეპარატების მიღების შემდეგ ხმარად ადელი აქვს დანორმული მდგომარეობის სეღლიანი უნიულობით, შიეჯერ სოციადური აბრებით. პამიში გამოწეულ ინფექსიკია ხმარად შიავრება გარკვეული შიმით, შიეითი.

**ნარკოტიკული ტირობის უწყობა** - ანტიბიოპროტინოზი თანადასწრებულ ნარკოტიკული ტირობის დროს იცვლება ექსოტრი მდგომარეობა. რაც უკლებს ეფორიას. მატელობს როგორც ექსოტრი ფუნა, ასევე იცვლება ესოტიკური და სომატური შეგრძნებები. სხვადასხვა ნარკოტიკული საშუალება იწვევს სხვადასხვა სახის ეფორიულ მდგომარეობას, რომელთა სტრუქტურაში არსებენ ალკისი, ამრონიტის და ცნობიერების დარღვევებსა და ცვლილებებს. მაგ, მორფინის (ნიკოტინის) ეფორია შედგება სომატური სიგებობის, ემოციური სიმშვილის და განცხრომისგან. სიგებოდასურია ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების თურობას გამოიხატება ინტელექტუალური დაწყობა და შესაბამისობა. სინარჯის და განცხრომის ვრძობა შეორველია და განპირობებულია ამრონიტის ეფორიის ცვლილებებით. გამოხატულია ავადობა, პიკერატივობა. ესოტიკულიური პრეპარატებით, დამრგინის შევათა ან პამინოთ გამოწვეული თურობა უფრო ინტელექტუალურია, ეფორი სომატური. შეველი ცნობიერების ურბე ალკისი დარღვევება უკინდება რეალობის მისიკურ-ფანტასტიკური აქვებით. განსაკუთრებით ხაგოვანა ალკის და ინტელექტუალურია სათანებება უფროან ცნობიერებულ ნარკოტიკული საშუალებებით გამოწვეული ეფორიული მდგომარეობის დროს. შევარებულა ჯირო მარტივია თურობის სტრუქტურა ხარბიგურატების გამოყენებისას. აქ ადგილი აქვს უფრო პირველად ექსოტრი ცვლილებებს.

**ნარკოტიკული ტირობის სომატურ-ნარკოტიკული ბაზისი ინტენსივობა** - თანთ-ნარკოტიკული პროპაგანდა ნარკოტიკული ტირობის დროს ადგილი აქვს გავრცობის გაფართობებს, პიკერატივობას, პიკერატივობას, პიკერატივობას. გამოხატულის წარმოადგენს თანთ-ნარკოტიკული და მრგინის ესოტიკულიური პრეპარატი, რომელთა მოხმარება იწვევს მოძრა, პიკერატივობას და ანის სიფრქობას. თანთ-ნარკოტიკული და სიგებოდასურების მიღების დროს ადგილი აქვს ურბე მოძრაობას. თითქმის ყველა ნარკოტიკული საშუალება იწვევს გაქიკარობას, გაქიკარობას, არტერიული წნევის მომაგებებას, რომელიც სემბლადორების და ზოგადი ესოტიკულიური პრეპარატების მიღებისას რბება, ხოლო სხვა შემთხვევებში იცვლება ბრადიკარდია, ბრადიპნოთა და პიკერატივობა. თითქმის ყველა ნარკოტიკული საშუალება იწვევს თანთის დროს შალის დაქიკითებას და სექსუალური ფუნქციის მომაგებებას, ხოლო ინტოქსიკაციის დროს გამოხატულის შემდეგ - პოლიადისიას, ხულისმას. თანთის დროს არღვევა ექვ-ნაწილის მოგორება, იცვლება კინთა ტანსუ, მათი ადგილობრობის უნარი, ირღვევა ნების მოძრაობების სისწრაფე და კორდინაცია (ეს უკანასკნელი არ აღინიშნება სექსუალურების, ზოგადი ესოტიკულიური პრეპარატის და კოლდისის მოხმარების დროს).

**ნარკოტიკული ტირობის სერატის უწყობა** - ნარკოტიკული ტირობის დროს იცვლება ნარკოტიკული საშუალების სიგებოდასურების მოხმარების, შალად კორდინაციის და დაციით რეაქციების გაქიკობის შედეგ. იგი უმეტესად გამოხატულება ნარკოტიკული საშუალების ეფორიული თვისების შეცვლაში. მისი ბუნების პარადოქსული და სომატურ-ეფორიული ეფორების ცვლილებებით. მაგ, მორფინი დამოტრანვეული მოქმედების ნაცვალ იძლევა ზოგადი ესოტიკულიური და სულერი ადგილობრობის შეგრძნების (დრეზინი BL 192). სიგებოდასურია ნარკოტიკული საშუალების უწყობა კლებს და იცვლება სემბლადური ეფორი. ხარბიგურატების და თანთ-ნარკოტიკული ტირობის დროს საწყის ეფორებში თუ გამოხატულია მოგორება მოღვება, შეკავება, შემდგომში ადგილი აქვს გაქიკობებს, მოძრაობის გახმარებას, ადგილობრობის იცვლება მრგინის უწყობის სიგებობა და ესოტიკულიური პრეპარატების გამოტრებისას. დაავადების გაქიკობებისას ერთად თანს იწვევს პალდისესტეტი, ხოლო ხარბიგურატების დროს - გამოხატული ამრეტივიზი მდგომარეობები, სემბლადორები ადარ იწვევს გაქიკარობას, კოლდინი ადარ მოქმედებს ხელების ცენტრზე, თანთის პრეპარატები ადარ იწვევს ექვ-ნაწილის და მარდ-სამსუსო სიგებებში საექსოტიკური ცვლილებებს.

**ნარკოტიკული ნიშნების ნიშნობა** - ნარკოტიკული ტირობის დროს იცვლება ნარკოტიკული მოქმედებას, მაგრამ არა აქვს მინიმალური ნიშნობებითა ნარევი, რომელიც თანთისში ადგილი ნარკოტიკული მოქმედებას, მაგრამ არა აქვს მინიმალური ნარკოტიკული ან ესოტიკულიური საშუალების სიგებობა.

**ნარკოტიკული რეაქციის უწყობა** - ნარკოტიკული ტირობის დროს იცვლება ნარკოტიკული საშუალების მისაღებად და იგი პირველად სხვათ არ შედის საბოლოო პროდუქტში. მაგ, აცეტინი, ბენზინი, ეთანოლი, მეთანოლი, ქლოროფორმი, გოლდოლი, იმორქინი და სხვ. კატალიზატორი - ნიშნობები, რომლებს გარემო შეუძლებელია სასურველი ქიმიური რეაქცია, შედის მოქმედება ნარკოტიკული საშუალების შემადგენლობაში. პრეპარატის - ნიშნობები, რომელიც ნარკოტიკული საშუალების დაშლისას პროდუქტს მთლიანად ან ნაწილობრივ შედის მისი მოქმედებას შემადგენლობაში. მაგ, აგრანიდობა, ალდებიზილი, ბენზალდეჰიდი, პიკერინი, მარმევა ანპილიდი, ეფორინი და ა.შ. რეაქტი - ნიშნობები, მონადირეობის, აქტივობის ან მარტაის ქიმიურ რეაქციას, მაგრამ არ შეადგენს საბოლოო პროდუქტის ნაწილს. მაგ, ამონივი, ამონივის პიკერატივობა, ხორის, შრის და მარინგებები, თალი, პოტაში, სოლი (სამხედი), წითელი ფოსფორი და სხვა. მარტაის ნიშნობები - ნიშნობები, რომელიც თანთთანად ნარკოტიკული და მისი ქიმიური გაქიკობების შედეგება მთლიანად სხვა უფრო მდვილი ან განსხვავებული მოქმედების ნარკოტიკული საშუალება.

**ნარკოტიკული საშუალება** - ნარკოტიკული ტირობები, განდამავალი ნიშნობები ან ნიშნობებითა ნარევი, საექსოტიკული ან ქიმიური დამრგინების, ბუნებრივი ან ხანოტიკური წარმოშობის, რომელსაც კვების კომპეტენტური თანთთანად აქვს მინიმალური ექვ-ნაწილის სიგებობა. ნ.ს. სიგებობის მისანიჭებლად ნიშნობების უნდა აქვს ეფორიული 2 კრატერები: პირველი - საექსოტიკული, უნდა ახდენდეს მოქმედებას ცნ-შე, რის გამოც მოხმარება არასამედიცინო მიზნითაც შეორე - სიგებობა, ამ ნიშნობების არასამედიცინო მიზნით მოხმარების მასსინარობა. ამ კრატერების არსებობისას ნარკოტიკული ნიშნობების მიწებება შესაბე - ჯიგდებული კრატერებში ანუ შეიკინება ნარკოტიკული ნიშნობების საბე რიგობა.

**ნარკოტიკული საშუალება ხანოტიკული** - ნარკოტიკული ტირობის დროს იცვლება ნარკოტიკული საშუალება, რომელიც იწვევს ხანოტიკული ან იწვევს ფუნქციურ დამრგინებას.

**ნარკოტიკული საშუალება კლინიკური** - ნარკოტიკული ტირობის დროს იცვლება ნარკოტიკული საშუალება, რომლის ეფორიული დიშევა ხანოტიკული, რომ გამოიყენება. ესეიკური ფუნქციების მნიშვნელოვანი იცვლება და (ან) მისი განმარტებით შალის დროს იწვევს მინიმალური ექვ-ნაწილის. მისი სიგებობა უნდა იყოს უფროან ცნობიერების დროს იწვევს მინიმალური ექვ-ნაწილის.

**ნარკოტიკული საშუალების არასწორი უწყობა** - ნარკოტიკული ტირობის დროს იცვლება ნარკოტიკული საშუალებების არასწორი გამოყენება. უმეტესად გამოხატულება ღობის გაქიკობებით, რამაც შეიძლება გამოიყენება: გრატინარტობა (სხ).

**ნარკოტიკული საშუალებების ბერძნულ ტერმინებს -** наркотические препараты ნარკოტიკული საშუალებების

სისტემური გამოყენება ინდივიდის მიერ ხაკოარი ინფორმაციის მიწოდების გარეშე ნარკოტიკული საშუალებების მიზნობრივად - наркотический эффект ინდივიდი, რომელიც საკუთარი ღრუბლის დასაკმაყოფილებლად ან სხვა მიზნით მოხმარებს ნარკოტიკულ საშუალებებს ემთხვევა. მათგან უსიქიური და ფიზიკური დამოკიდებულების განვითარების გარეშე.

**ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების ფორმის უზრუნველყოფა** - наркотический прием ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების ფორმა. პირველი ღონის მიღების შემდეგ სიკვდილიერი ბარიერები, ამომი, სტიმულირება, აქროლადი ნოტიორება იწვევს გარკვეული დოსიფორმის მდგომარეობის, რის გამოც შიღება ენიშნულია და ეს შეიძლება გავრცელდეს 1-2 კვირა. გამოწვევის წარმოადგენს თიხილიერი პრესტიჟები, რომელთა დროსაც იმდენად სწრაფად მიმდინარეობს მიზევი, რომ ძნელად აღნიშნული დოსიფორმის შეგრძობის დაკვირა. ნარკოტიკული საშუალების მოხმარება, როგორც წესი, ხსტოტიკულირდება, თუ არ მოხდა რაიმე გარეშე მიზნით მისი მიღების შეწყვეტა იწვევს შეიძლება მიიღოს ციკლური ხახათი (სტიმულირები). განიხილეთ ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების შემდეგი ფორმები: ა. ხსტოტიკულირება; ბ. პერიოდული;

გ. შეტყუებისგან: დ. ენაშიღრად ხსტოტიკულირება; ე. ენაშიღრად (ა. გამოყენება).

**ნარკოტიკული საშუალებებისა და ნარკოტიკული საშუალებების სინდრომი** - синдром пристрастия к наркотикам (ინგლ. addiction). აღნიშნული სინდრომის ქვეშ იგულისხმება ნარკოტიკული საშუალებებით მუდმივად და ქრონიკული ინტოქსიკაცია და ხახათიდან შემდეგი ხსტოტიკული: ა) დაუძლიებელი (კომპულსიური) ხუნგილი, გაგრძელები ნარკოტიკული საშუალების მოხმარება და მოპოების ოცნებების ხერხებით; ბ) დოზის შიშობის ტენდენცია; გ) ფსიქური და ფიზიკური დამოკიდებულება ნარკოტიკული საშუალების შეტყუებისადმი; დ) შიშის შეტყუების არსებობა როგორც ინდივიდისთვის, ასევე ხახათისთვის.

**ნარკოტიკული საშუალებებისა და ნარკოტიკული საშუალებების სინდრომი** - синдром пристрастия к наркотикам (ინგლ. addiction).

მიზევის ქვეშ იგულისხმება მდგომარეობა, რომელიც წარმოადგენს ნარკოტიკული საშუალებების განმეორებითი მოხმარების დროს და ხახათიდან შემდეგი ხსტოტიკული: ა) ნარკოტიკული საშუალებებით მუდმივად ეუქმის გამოყენების ხუნგილი (არადაკმაყოფილებელი); ბ) შესატყუებლობა (არადაკმაყოფილებელი); მოხმარების ნარკოტიკული საშუალების გარდაღი დოზა; გ) ინდივიდის ფსიქური მდგომარეობის დამოკიდებულება ნარკოტიკული საშუალების არსებობაზე ან არარსებობაზე (ფსიქური დამოკიდებულება); ფიზიკური მდგომარეობის დამოკიდებულება (ფიზიკური დამოკიდებულება) ნარკოტიკული საშუალების არსებობაზე ან არარსებობაზე; დ) შიშის შეტყუების არსებობა, თუნდაც კონსტრუქციულად ინდივიდისთვის.

**ნარკოტიკული საშუალებისა და ნარკოტიკული საშუალების სინდრომი** - синдром пристрастия к наркотикам

**ნარკოტიკული საშუალებისა და ნარკოტიკული საშუალების სინდრომი** - синдром пристрастия к наркотикам (ინგლ. addiction). აღნიშნული სინდრომის ქვეშ იგულისხმება ნარკოტიკული საშუალებების განმეორებითი მოხმარების დროს და ხახათიდან შემდეგი ხსტოტიკული: ა) ნარკოტიკული საშუალებებით მუდმივად ეუქმის გამოყენების ხუნგილი (არადაკმაყოფილებელი); ბ) შესატყუებლობა (არადაკმაყოფილებელი); მოხმარების ნარკოტიკული საშუალების გარდაღი დოზა; გ) ინდივიდის ფსიქური მდგომარეობის დამოკიდებულება ნარკოტიკული საშუალების არსებობაზე ან არარსებობაზე (ფსიქური დამოკიდებულება); ფიზიკური მდგომარეობის დამოკიდებულება (ფიზიკური დამოკიდებულება) ნარკოტიკული საშუალების არსებობაზე ან არარსებობაზე; დ) შიშის შეტყუების არსებობა, თუნდაც კონსტრუქციულად ინდივიდისთვის.

**ნარკოტიკული საშუალებისა და ნარკოტიკული საშუალების სინდრომი** - синдром пристрастия к наркотикам

აღნიშნული სინდრომის ქვეშ იგულისხმება ნარკოტიკული საშუალებების განმეორებითი მოხმარების დროს და ხახათიდან შემდეგი ხსტოტიკული: ა) ნარკოტიკული საშუალებებით მუდმივად ეუქმის გამოყენების ხუნგილი (არადაკმაყოფილებელი); ბ) შესატყუებლობა (არადაკმაყოფილებელი); მოხმარების ნარკოტიკული საშუალების გარდაღი დოზა; გ) ინდივიდის ფსიქური მდგომარეობის დამოკიდებულება ნარკოტიკული საშუალების არსებობაზე ან არარსებობაზე (ფსიქური დამოკიდებულება); ფიზიკური მდგომარეობის დამოკიდებულება (ფიზიკური დამოკიდებულება) ნარკოტიკული საშუალების არსებობაზე ან არარსებობაზე; დ) შიშის შეტყუების არსებობა, თუნდაც კონსტრუქციულად ინდივიდისთვის.

















სტერეოგრაფიული ნ-ს, რომელიც შეიშაბა თვის გეინის ღრმა სტრუქტურებზე ლოკალური შემოქმედების შეთოდებს, კერძოდ, პარკინსონის დაავადებების სტერეოგრაფიული მკურნალობას. აგრეთვე შემოქმედებულია ეპილეფსიის თერაპიული მკურნალობის მეთოდები მდიდარნივრთი თერაპიისაში რემისინგაციის და პიროვნების გასობადი ანტისოციალური ტენდენციების არსებობის შემთხვევებში.

**ნეიროფიზიოლოგიის ინსტიტუტი** - *Нейрофизиологический институт* (ბერძნ. *neuron* - ნერვი, *cybus* - უკრული, *architektონიკა* - აგება, სტრუქტურა). თავის ტრანსარქიტოლოგიის ნაწილი, შეისწავლის ნერვული ულემენტების, უკრულების განლაგებას, აგებულებას და სივრთი თანაფარდობას თავის გვირის სპინალური კერძის ქვეშე. ნ-ის შესწავლას აქვს დიდი მნიშვნელობა ნეიროფიზიოლოგიის, ცნს-ის პათოლოგიისა და ნეიროქირურგიისათვის.

**ნეპრინალიზის სინდრომი** **ლაპანკა** - *ნეპრინალიზის სინდრომი* - *ნეპრინალიზის სინდრომი* - *ნეპრინალიზის სინდრომი*.

**ნეპროზი** - *нефрози* (ბერძნ. *nephros* - შვიდარი, *გამი*, *mania* - ღრღღა, შემოღობა). გვაგებებს წაბლწვისადმი ატაფიოფორი ღრღღა, ხშირად თან ახლავს ნეფროსადიში.

**ნეპროსადი** - *нефроз* სექუალური პრეგრისის ხახვ, რომლის დროსაც სექუალური დაქმყოფილება მოღწევა გვირის დამახინჯებას. მოგვირ თან ახლავს ნეფროზილი. სინონ: **პაპაპროზი**, **პატრანტი**.

**ნეპროზი** - *нефроз* (ბერძნ. *nephros* - შვიდარი, *გამი*, *mania* - ღრღღა, შემოღობა). გვაგებებს წაბლწვისადმი ატაფიოფორი ღრღღა, ხშირად თან ახლავს ნეფროსადიში.

**ნეპროზი** - *нефроз* (ბერძნ. *nephros* - შვიდარი, *გამი*, *mania* - ღრღღა, შემოღობა). გვაგებებს წაბლწვისადმი ატაფიოფორი ღრღღა, ხშირად თან ახლავს ნეფროსადიში.

**ნეპროზი** - *нефроз* (ბერძნ. *nephros* - შვიდარი, *გამი*, *mania* - ღრღღა, შემოღობა). გვაგებებს წაბლწვისადმი ატაფიოფორი ღრღღა, ხშირად თან ახლავს ნეფროსადიში.

**ნელსონ-მაიერის რეპროდი** - *Нелсона-Мейера репродукция* (Nelson R., Mayer M., 1949). შემგრანობიარ და სპეციფიური სტრუქტურული რეპროდი სივლილის სალიანსისეკოლ, სივლილის დაავადებულის სისხლის შრავი იწვევს მერთილი სპორიკების იმობილმეობას.

**ნეპროზი** - *нефроз* (ბერძნ. *nephros* - შვიდარი, *გამი*, *mania* - ღრღღა, შემოღობა). გვაგებებს წაბლწვისადმი ატაფიოფორი ღრღღა, ხშირად თან ახლავს ნეფროსადიში.

**ნეპროზი** - *нефроз* (ბერძნ. *nephros* - შვიდარი, *გამი*, *mania* - ღრღღა, შემოღობა). გვაგებებს წაბლწვისადმი ატაფიოფორი ღრღღა, ხშირად თან ახლავს ნეფროსადიში.

**ნეპროზი** - *нефроз* (ბერძნ. *nephros* - შვიდარი, *გამი*, *mania* - ღრღღა, შემოღობა). გვაგებებს წაბლწვისადმი ატაფიოფორი ღრღღა, ხშირად თან ახლავს ნეფროსადიში.

**ნეპროზი** - *нефроз* (ბერძნ. *nephros* - შვიდარი, *გამი*, *mania* - ღრღღა, შემოღობა). გვაგებებს წაბლწვისადმი ატაფიოფორი ღრღღა, ხშირად თან ახლავს ნეფროსადიში.

**ნეპროზი** - *нефроз* (ბერძნ. *nephros* - შვიდარი, *გამი*, *mania* - ღრღღა, შემოღობა). გვაგებებს წაბლწვისადმი ატაფიოფორი ღრღღა, ხშირად თან ახლავს ნეფროსადიში.

**ნეპროზი** - *нефроз* (ბერძნ. *nephros* - შვიდარი, *გამი*, *mania* - ღრღღა, შემოღობა). გვაგებებს წაბლწვისადმი ატაფიოფორი ღრღღა, ხშირად თან ახლავს ნეფროსადიში.

**ნეპროზი** - *нефроз* (ბერძნ. *nephros* - შვიდარი, *გამი*, *mania* - ღრღღა, შემოღობა). გვაგებებს წაბლწვისადმი ატაფიოფორი ღრღღა, ხშირად თან ახლავს ნეფროსადიში.

**ნეპროზი** - *нефроз* (ბერძნ. *nephros* - შვიდარი, *გამი*, *mania* - ღრღღა, შემოღობა). გვაგებებს წაბლწვისადმი ატაფიოფორი ღრღღა, ხშირად თან ახლავს ნეფროსადიში.

**ნეპროზი** - *нефроз* (ბერძნ. *nephros* - შვიდარი, *გამი*, *mania* - ღრღღა, შემოღობა). გვაგებებს წაბლწვისადმი ატაფიოფორი ღრღღა, ხშირად თან ახლავს ნეფროსადიში.

**ნეპროზი** - *нефроз* (ბერძნ. *nephros* - შვიდარი, *გამი*, *mania* - ღრღღა, შემოღობა). გვაგებებს წაბლწვისადმი ატაფიოფორი ღრღღა, ხშირად თან ახლავს ნეფროსადიში.

**ნეპროზი** - *нефроз* (ბერძნ. *nephros* - შვიდარი, *გამი*, *mania* - ღრღღა, შემოღობა). გვაგებებს წაბლწვისადმი ატაფიოფორი ღრღღა, ხშირად თან ახლავს ნეფროსადიში.

**ნეპროზი** - *нефроз* (ბერძნ. *nephros* - შვიდარი, *გამი*, *mania* - ღრღღა, შემოღობა). გვაგებებს წაბლწვისადმი ატაფიოფორი ღრღღა, ხშირად თან ახლავს ნეფროსადიში.

**ნეპროზი** - *нефроз* (ბერძნ. *nephros* - შვიდარი, *გამი*, *mania* - ღრღღა, შემოღობა). გვაგებებს წაბლწვისადმი ატაფიოფორი ღრღღა, ხშირად თან ახლავს ნეფროსადიში.

**ნეპროზი** - *нефроз* (ბერძნ. *nephros* - შვიდარი, *გამი*, *mania* - ღრღღა, შემოღობა). გვაგებებს წაბლწვისადმი ატაფიოფორი ღრღღა, ხშირად თან ახლავს ნეფროსადიში.

**ნეპროზი** - *нефроз* (ბერძნ. *nephros* - შვიდარი, *გამი*, *mania* - ღრღღა, შემოღობა). გვაგებებს წაბლწვისადმი ატაფიოფორი ღრღღა, ხშირად თან ახლავს ნეფროსადიში.



ერთობლიობას, რაც ყალიბდება პიროვნებათშორის სიკუდილისა და ურთიერთობაში (H. Sullivan), არაეცხობიერ ღვრელებს და სურვილებს ანიჭებენ დეგრადირებულ როლს ადამიანის ფსიქიკაში (E. Fromm).

**ნეკროპატიზმი** - некропатизм (Клинов М.М., 1973) ვარე სამყაროდან ფიზიოლოგიური გამაჯინებს მდგომარეობა, რაც დაკუმირებული ავადმყოფის საავადმყოფოდან გაქრის შემდეგ არასასურველ პირობებში (ოჯახური, მაგერაღვრი და სხვ.) მოხვედრისთან და ღრმადება სტაციონარში ყოფნის დროს ხელშეწყობდა (იორავერის, ასობობი) შექმნილ პირობებში.

**ნეკროლი სისტემის დიფერენციალური სისტემა** - дифференциальная система. იხ. **ნეკროლი სისტემა**.

**ნეკროლი სისტემის გრძელი პარამეტრიზაციის უბანში** - Николаев Бред физическое неустатка. некролика для окружающей (Николаев Ю.С., 1949) იხ. **გრძელი პარამეტრიზაციის უბანში**.

**ნეკროლი სისტემის გრძელი პარამეტრიზაციის უბანში** - Николаев метод разгрузочно-диетической терапии (Николаев Ю.С., 1949) იხ. **გრძელი პარამეტრიზაციის უბანში**.

**ნეკროლი სისტემის უბანში** - некропация, აღკვეთილია წარმოადგენს ცნს-ის სტრუქტურის. იგი ღიდი რაოდენობით შედის თამბაქოში. სიგარეტის ერთ ღერი შეიცავს დაახლოებით 84 მგ ნიკოტინს და 15 მგ ფისს. ნ-ის დროს ინტექსიუალური შედეგები უწყვეტად მნიშვნელობა მიენიჭება ნიკოტინს, სოლო ქრონიკული - ფისს. ნიკოტინი მაღალკონცენტრირებული შხაშია. მისი 60 მგ სასიკვდილო დოზაა. გამოყენებისას ნიკოტინი ცელის ფიზიოლოგიურ ფუნქციებს, იწვევს პერიფერიული სისხლძარღვების შევიწროებას, პერისპალტიკის გაძლიერებას, ასევე გულსისხლძარღვების წარმოქმნას, აღრნაღრნის და ნორადრენალინის გამონათავისუფლებას, ასევე გულსისხლძარღვების სიძირეების პირობად აქვს ცენტრებს, ახლებს ნეიტროფილთა ცელის პროტეინებს, სისხლში იწვევს ციბოზიანი მიაგრების ღრის ამაღლებას, იწვევს გრძელვადიან, შედეგ მიწაწადს დროს ადგილი აქვს თავის ცივილს, თავბრუსხვევას, გულსისხლძარღვების, ღებინებას, დიარეას, პირწყალს, ცივი ღრის. დასაწყისში აღინიშნება პულსის შენელება, შემდგომში აქვარება, არითმია. გუჯები ექვრულდება. გამოსავალია გრძელვადიანი, ცნობიერების ამაღლება, კრუნხები, კოლაუსი. დამოკიდებულება ვითარდება სწრაფად, რამდენიმე სიგარეტის მოწევის შემდეგ. ნიკოტინური აბსინენცია ვითარდება 90-120 წუთის შემდეგ. თავის მაქსიმუმს აღწევს 24 სასიგარეტო რაოდენობა კერძო და თვეში ყო. მისთვის დაზიანებათგანდა მოწევის დაუძლეველი სურვილია დაბალია, გამომიანებალობა და აგზნებალობა, ფრუსტრაციის გრძელვადიანი, პრაქტიკა, მოუსვენარი, მშობოთავებ მდგომარეობა, ყურადღების კონცენტრაციის შეუძლებლობა, ძილის სურვილი, მაგარი უძილობა, გულის კენობის მოქმედების შესუსტება, რთობის შენელება, მაღის შიშობება. აბსინენცია სიძირის სიძირის გავლის შემდეგ ხანგრძლივად, წლებს მანძილზე რჩება სიგარეტის მოწევის სურვილი. იხ. **Diagnostic criteria for Nicotine withdrawal**.

**ნეკროლი სისტემის უბანში** - Николаев Николай путешественник (Nikolaev L., 1966) იხ. **ნეკროლი სისტემის უბანში**.

**ნეკროლი სისტემის უბანში** - Николаев Николай путешественник (Nikolaev L., 1966) იხ. **ნეკროლი სისტემის უბანში**.

**ნეკროლი სისტემის უბანში** - Николаев Николай путешественник (Nikolaev L., 1966) იხ. **ნეკროლი სისტემის უბანში**.

**ნეკროლი სისტემის უბანში** - Николаев Николай путешественник (Nikolaev L., 1966) იხ. **ნეკროლი სისტემის უბანში**.

**ნეკროლი სისტემის უბანში** - Николаев Николай путешественник (Nikolaev L., 1966) იხ. **ნეკროლი სისტემის უბანში**.

**ნეკროლი სისტემის უბანში** - Николаев Николай путешественник (Nikolaev L., 1966) იხ. **ნეკროლი სისტემის უბანში**.

**ნეკროლი სისტემის უბანში** - Николаев Николай путешественник (Nikolaev L., 1966) იხ. **ნეკროლი სისტემის უბანში**.

**ნეკროლი სისტემის უბანში** - Николаев Николай путешественник (Nikolaev L., 1966) იხ. **ნეკროლი სისტემის უბანში**.



**ნორაპინეფრინი (ნორადრენალინი)** - ნორაპინეფრინი (ნორადრენალინი). სინთეზირდება ლოუპინისიდან ლოუპინილირაციის საშუალებით, ხოლო მისი მეთილირების შედეგად (ფერმენტ ფენილეთანოლამინ - N - მეთილტრანსფერაზის საშუალებით) სინთეზირდება ეპინეფრინი (ადრენალინი). ნ-ადმი სპეციფიკურად მტრისობიარე რეცეპტორებია: α- არასპეციფიკური. α<sub>1</sub>, α<sub>2</sub>, β - არასპეციფიკური, β<sub>1</sub> β<sub>2</sub> არასპეციფიკური რეცეპტორების აგონისტებია: norepinephrin. spiedrin. amphetamin; ანტაგონისტია lebasolol. α-ს აგონისტია phenylephrin, ანტაგონისტია phenoxylbenzamin. α<sub>2</sub>-ის აგონისტია klonidin, ანტაგონისტებია: piperoxan და yohimbini hydrochloridi. β<sub>1</sub>-ის აგონისტია dibutalamin, ანტაგონისტია metoprolol. β<sub>2</sub>-ის აგონისტია terbutalin და xaxaproteteroni, ანტაგონისტია butoxamin. აგრეთვე ცნობილია β არასელექტური აგონისტები: propranolol, alprenolol, nadolol და timolol.

**ნორაპინეფრინის სინტეზი** - Norra-Varneria თაჟი (Norrle G., 1927; Warberg M., 1961). სქესთან შეკავშირებული ოჯახური დაკავება. გადაყენის ავტოსომური გემა. ავადღებობა ძირითადად მამაკაცები. გამოხატულია ბალურას ვარსის ორმხრივი ფსევდოკლიობა, სიყრუე და გონებრივი ჩამორჩენილობა.

**ნორპინეფრინი პრაპარატში** - ნორაპინეფრინი (ლათ. norra - ნორა, წესი, ბერძნ. ksynon - გუნება-განწყობა). ფიზიოლოგიური პრაპარატები. არეგულირებს აფექტურ გამოვლინებებს და აქვს პროფილაქტიკური მოქმედება ნაზალური მიმდინარე აფექტური ფსიქოზების დროს. ნ-ს შეეკუთვნება ლითონის პრაპარატები (ლითონის კარბონატი და ოქსიდები). ცნობილია აგრეთვე ფინლენდის, ვალაროას შეიქმნა პრაპარატების ნორმოთიმიური ეფექტი.

**ნორტალინი** - ნორტალინი (ბერძნ. norra - დაბრუნება სახლში, alinos - ტყვილი). სამშობლოს შიშით სუფობა ავადმყოფური გრძობა. მოკვლე იღებს მძიმე ნევროზული ან ფსიქოზური მდგომარეობის ფორმას. მიმდინარეობს პიკოტიზმით, უძილობით.

**ნორტალინი** - ნორტალინი (ლათ. nor - დამე, alinos - სიარული, სეირნობა). სინონ.: ნორტალინი.

**ნორტალინი მიკრონი** - ნორტალინი მიკრონი. აღნიშნული პათოლოგიის დროს გამოხატულია ძილში ქვედა კიდურების კუნთების სტერეოტიპული შეკუმშვები. თან ახლავს მწერების ცოცხის შეგრძნება, რის გამოც წარმოიშობა ფეხების მოძრაობის მოთხოვნა და დაძინების გაძნელება.

**ნორმალური სინტეზი** - ნორმალური სინტეზი (Norrna J.A.). შეგვიძლია ანთიპოლიზის კომპლექსი (გადაყენის ავტოსომურ-დომინანტური გემა). დაბახსიათებელია: ფილტვის არტერიის სარქველის სტენოზი, დაბალი ტანი, პიკოტიზმი; ქუთუთების უტომი; დაყვეტილი ყურის ნივარები, ეპიკანთი; კრიპტორქიზმი; ჩონჩხის დეფორმაცია (spina bifida, pectus excavatum); გონებრივი ჩამორჩენილობა.

წ

**ობიექტივისმიერი უსივრცისობა** - *объективный идеализм* (გერმ. *Oberwese* - დამატებითი გონები, აღმოცენებული ძირითადი გონის კლერადობის დროს). ფსიქონალიზმზე შეადგენი ფსიქიკური პროცესები, გარდამავალი ცნობიერება და არატოტოზიკური ფსიქიკური მოქმედებას შორის.

**ობიექტიური ტიპობა** - *объективизм* (ინგლ. *Object Relations*) ფსიქონალიზმზე: ურთიერთგაგებობა, რომლებშიც შეიცავს როგორც პირდაპირ ინსტინქტურ დაქმყოფილებას (ლიბიდოური, აგრესიული), ასევე სუბლიმირებულ (მეგობრობა, მშობელსა და შვილს შორის სიყვარული) კავშირებს.

**ობიექტი - ობიექტი** (გერმ. *Objekt*). ფსიქონალიზმზე: ობიექტი განიხილება ძირითადად სამყაროში მდებარეობით: 1) დეტალურად დაქმნა: ობიექტში ან ობიექტის საშუალებით ღვთისმად შეუძლია მიადწიოს თავის მიზანს ან დაქმყოფილებას. ეს შეიძლება იყოს მიღწეა ან ადამიანი ან ნაწილობრივი ობიექტი, რეალური ან ფანტასტიკური ობიექტი. 2) ხედავლობით ან ხელშეწყობით დაქმნა: ლაპარაკი პიროვნების დამოკიდებულებასზე "შე"-ს რომელიმე ინსტანციასთან ან მიღწეა ობიექტთან. 3) შეწყობის ფსიქოლოგიის და ფილოსოფიის ტრადიციული გაგებით: ობიექტი არის ის, რომელსაც აქვს მყარი და მუდმივი თვისებები და აღიქმება სუბიექტის ერთობლიობით, მიუხედავად მათი სურვილებისა და აზრებისა.

**ობიექტის არჩევა** - *объект выбора* (გერმ. *Objektwahl*). ფსიქონალიზმზე: სიყვარულისათვის განკუთვნილი პირის ან ობიექტის არჩევა გამოყოფილ ინტენციურ და პუბერტატულ პერიოდში წარმოადგენს შვილსა და მშობელს შორის საფუძვლად. ფროიდის მიხედვით, არსებობს არჩევა მკაცრად (ანალიტიკური) და არჩევა ნარცისული.

**ობიექტის არჩევა** - *объект выбора* (გერმ. *Objektwahl*). ფსიქონალიზმზე: ობიექტის არჩევის არჩევა, ამ დროს სიყვარულის ობიექტი მარტოა და მარტოა, რომელიც უზრუნველყოფს მის კვებით, ღვთის და მრწებით.

**ობიექტის არჩევა** - *объект выбора* (გერმ. *objektive Objektwahl*). ფსიქონალიზმზე: ობიექტის არჩევის არჩევა, რომლის დროსაც ობიექტი არჩევა იმის მიხედვით, თუ როგორია თვით ამომრჩეველი რაგონი ან რაგონი უნდა იყოს ყოფილიყო.

**ობიექტის არჩევა** - *объект выбора* (ინგლ. *Object Representation*). ფსიქონალიზმზე: "შე"-დან განსხვავებული პიროვნების სქემა, რომელიც შექმნილია "გო"-ს მიერ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებული მთავარი დეტალებით. ხატებისა და გამოხატობის საფუძვლად პიროვნებას, რომელსაც შეუძლია დაქმყოფილოს ინსტინქტური საჭიროებები, ეწოდება საჭიროებათა დაქმყოფილებელი ობიექტი. ობიექტის ასახვა არსებობს საჭიროების ასეთი დაქმყოფილებისაგან დამოკიდებულებად, მაგ. ღვთის ხატის შექმნის შემდეგ ბავშვი მას აღიქვამს იგივე ადამიანად მაშინაც კი, როცა არ საჭიროებს ღვთის მომსახურებას (ე.ი., როცა ღვთის სინანულს და ა.შ.). "შე"-ს ხატთან ერთად აქვს უზრუნველყოფის მასალა და ჩარჩოს ამოცანების ყველა პროცესისთვის, "გო"-ს დაქმყოფილი და ღვთის ენების ჩათვლით.

**ობიექტის არჩევა** - *объект выбора* (ინგლ. *Object Loss*). ფსიქონალიზმზე: 1. სიყვარული ადამიანის ნაშთი დაქმნა განმარტობის, ავადმყოფობის ან სიკვდილის შედეგად; 2. სიყვარული დაქმნის განცდა სუბიექტის მიზანს საჭიროებთა საყვარელი ადამიანის ნაშთი დაქმნის ან დაქმნის რეალური სამომავლის გარეშე.

**ობიექტის არჩევა** - *объект выбора* (ინგლ. *Object World*). ფსიქონალიზმზე: ვარა ობიექტების ასახვა სუბიექტის განცდას შიგნით. იგი შეიძლება პეტახანობის რეალურ გამოცდილებებს, მგრამ მშობელს დაღვთებულად განაჩივებთ.

**ობიექტის არჩევა** - *объект выбора* (ინგლ. *Object Love*). ფსიქონალიზმზე: სხვა პიროვნებასთან სიყვარული ურთიერთგაგებობის ტიპი, როცა ინდივიდი კავშირდება (ინსტინქტურად) ღვთისმად. თანდასრულად ღვთისმად ნაწილი შეიძლება გამოყოფილ იქნას და გარდაიქმნოს ობიექტის საყვარულად; თუ ობიექტის ასეთი სიყვარული დაქმნის სხვა საყვარელი ობიექტის გარკვეული დამახასიათებელი ნიშნების მსგავსებზე "შე"-ს რეალურ ან სხვარეულ ასიქტთან.



















**პავლოვის თეორია** - Павлова теория Павлова И.П. უბაღებს ნერვული მიჭედებს თეორია ფსიქიკური პროცესები შესწავლება დეკორმინისტული მდგომარეობისგან პირობითი რეაქციების კონცეფციისათან დაკავშირებით. ფსიქიკურიისთვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ჰედლოგის სკოლის მიერ დამუშავებული მოსაზრება ორი სასიგნალო სისტემის, ფუნქციითა დინამიკური ლოკალიზაციის შესახებ, დიდი გენის ტრეში პირობადურ-ფაზური მდგომარეობის შესწავლის შესახებ, ურთიერთდასკიდებულება ძირითად ნერვულ პროცესების შორის, ექსპერიმენტული ნერვოზების გამოკვლევა. ფუნქციითა დინამიკური ლოკალიზაციის პრინციპი საფუძველად დაედო ფსიქოლოგიის და ნეიროფიზიოლოგიის მიერ შემუშავებულ კონცეფციას თავის გინიში ფუნქციური ხსკედების შესახებ (Несомнен А.Н., Нурин А.Р., Ароухи П.К.). 3-8 შესარული მნიშვნელოვანი როლი რაფი ფსიქოპათოლოგიური პროცესების - კავთონური სიმტომების, ბოლვის, მინაკალური და დეპრესიული მდგომარეობების პათოფიზიოლოგიური მექანიზმების შესწავლაში (Иванова-Сидорова А.Г., Протоухов В.П., Чистова А.С.). პავლოვის შრომებში იქნა გახსნილი ისტერიული, აკეიაგებულ და პარანოიულ სიმტომთა წარმოქმნის მექანიზმები. ზოტკინთან (Ботани С.Н.) ერთად პავლოვის მიერ შემუშავებულმა ნერვიზმის პრინციპმა შესარული რიგი მელიციების თეორიის და პრაქციის განვითარებაში. პავლოვის კონცეფცია ძილის, როგორც თავის გინის გაერკობილს შეკავების შესახებ, რომელსაც აქვს დამცავი მნიშვნელობა ცნსის მოქმედებისათვის, საფუძველად დაედო ნერვულ-ფსიქიკური და სომატური დაავადებების მექანიზმების მეორედების შესწავლებას - მკერნალომა ძილთ (მედიკამენტური და ულექტრობილი), ფსიქოთერაპია, პარეულ რაგმა, პიანოთერაპია.

**პავლოვის სიმტომები** - Павлова теория კატატონური ტუეზიონის მდგომარეობაში მყოფი ავადმყოფი არ ასრულებს ინსტრუქციებს და რჩება მეტმის მდგომარეობაში მვეულებრი მადლ ხმაზე მიმართვისას, ხოლო ნერულით ან დაბად ხმაზე შეკითხვისას ასრულებს უქმის დაავადების და ასსუბის. პავლოვის ეკუთნის ამ სიმტომის პათოფიზიოლოგიური განმარტება როგორც მხოტრუთად დაავადებულს თავს გენის ტრეში უდგამარულიკულ უამს გამოერება.

**პათოქსიზმი** - ПАТОКСИЗМ (ბერძნ. παθος - ავადმყოფური თვისებების გამოხატუვლი). ჰბბორი პარტნარიო მაშაკაცოა პოზიციუშუადიზმის დროს.

**პათოქსიზმი** - ПАТОКСИЗМ (ბერძნ. παθος - დაავადება, ειძიხ - სასქესო ორგანოები) (Danzonov Th., 1945). ავადმყოფური ზორცუგობის ხმბტომთა ავადმყოფს რუბენია თოტქოსდა არსებული საკუთარი სომახინჯისა და ცლილობს დაეაროს იფი შერუბუნენის მიშით გერუნის ხნვა დამხანახების სასოგადოებას (ანთროპოფიხია). სიმტომთა შუდს რისორიფოლოიბის ნინდრომის მეშადღენლოხაში.

**პათოქსიზმი** - ПАТОКСИЗМ (ბერძნ. πάθος - წარმოშობა, განვითარება). 1. ხწაველება დაავადების ზოგად პრინციპებზე, განვითარების კანონზომიერებებზე, მიმდინარეობასს და გამოსაუდზე (დაავადების პათოგენური მექანიზმების შესწავლა). 2. რაიმე კონკრეტული დაავადების, ავადმყოფური პროცესის, მდგომარეობის განვითარების შექანისში, კანონზომიერების ძიება.

**პათოქსიზმი** - ПАТОКСИЗМ (ბერძნ. genes - შემქმნელი). ორგანიზმში ავადმყოფური ცვლილებების გამოწვევის უნარი.

**პათოქსიზმი** - ПАТОКСИЗМ. ავადმყოფურა, ავადმყოფური ცვლილებების გამოწვევა.

**პათოქსიზმი** - ПАТОКСИЗМ (ბერძნ. παθος - დაავადება, გენეხ - წერა). შწრლებს, პოვეტების, მადგერების, მოამროვეტების შემოქმედების შესწავლა ავტორის პიროვნების, როგორც ფსიქიკური ავადმყოფის, შევასების მიშით.

**პათოქსიზმი** - ПАТОКСИЗМ (ბერძნ. genesis - მოძრაობა). არსებული დაავადებების სტადიის, კლინიკური სინდრომების, ანატომიური განიანტების ცვლა. გუზინი მოწოდებულა დაეფლოტკეს (Лавинская И.В.) მიერ.

**პათოქსიზმი** - ПАТОКСИЗМ (ბერძნ. genesis - მოძრაობა). არსებული დაავადებების სტადიის, კლინიკური სინდრომების, ანატომიური განიანტების ცვლა. გუზინი მოწოდებულა დაეფლოტკეს (Лавинская И.В.) მიერ.

**პათოქსიზმი** - ПАТОКСИЗМ (ბერძნ. genesis - მოძრაობა). არსებული დაავადებების სტადიის, კლინიკური სინდრომების, ანატომიური განიანტების ცვლა. გუზინი მოწოდებულა დაეფლოტკეს (Лавинская И.В.) მიერ.

**პათოქსიზმი** - ПАТОКСИЗМ (ბერძნ. genesis - მოძრაობა). არსებული დაავადებების სტადიის, კლინიკური სინდრომების, ანატომიური განიანტების ცვლა. გუზინი მოწოდებულა დაეფლოტკეს (Лавинская И.В.) მიერ.

საერთოდ არ ექვემდებარება კორექციას არსებითად ეს არის **ზედარებული ოდებები**, აღმოცენებული ფიქტივებურად. უბედურად კონსტიტუციური ან პათოლოგიური (მაგ. ალკოჰოლიზმი) წინაგანწყობის დროს, რომლებიც მალე გადაიზრდება ზოგჯერ **პარანოიკული** ხდება **გვეგანობის პარანოიკული** ზოგჯერ ფორმად **პარანოიკული რეაქციები** განვითარებს ტიპით. მკ. გუბელია აგრეთვე მიმოიხილავს პარანოიკული ხოლვის ფარგლებში, ცერებრული პათოლოგიის დროს იგი არაზანგრძლივია და სუსტდება დემენციის გარდაშეგებისას ერთად.

**პათოლოგიური პროცესების წარმოშობა** - патологическое происхождение ფიქტიური ავადმყოფის მიერ სხვადასხვა ხშირად უზველად კლავიქივებს **სეგრაფებს**, რომელიც არაიმეათად ასახავს ავადმყოფური განცდების და ინტერესების მიზანრეულებას. მაგ. ინფორმაციები შედარებით დაავადებული პირი, რომელსაც ადრინდებს იმპოზანტურილი ბოღვა ყოველდღე ატროფებს ასანთის კოლოფებში საკუთარი გინაულის პორციებს და ახდენს შთი ინტენგარბიყაის.

**პათოლოგიური პროცესების წარმოშობა** - патологическое состояние ნორმადან შეყრა გაჯახრა, ორგანიზმისთვის აქვს უარყოფითი ბიოლოგიური მნიშვნელობა (პიშვისგამის დარღვევა), გამოვლინდება კლინიკურ-ფსიქოპათოლოგიურ სიმპტომთაგან და სოციალური დემადგაყით.

**პათოლოგიური პარანოიკული** - патологическая паранойя (ფრანგ. paranoïa). ფიქტიური ავადმყოფის მიერ შეტვისშეგრა წესრთებს, ზედმეფენითი სიზუსტის, უნიშვნელი ფორმალბობის დაყვის, მოთხოვნებისა და წესების განუხრელი შესრულებისადმი **სწრაფვა**. დამახასიათებელია ეპიდესიოდური წრის პარონენებებისათვის, ეპიდესიოდ დადავდულთათვის. აღინიშნება ფსიქსანტური პარონენებში. თუმეა, ამ შემთხვევაში შეგისამეტი უქდანტრობობს ობიექტის თვით ავადმყოფი და მისი მოქმედება.

**პათოლოგიური პროცესების წარმოშობა** - патологический процесс (ბერძნ. poly - ბერი, soma - ნიშანი) [ქანტაყიძის M.C., 1938]. **არსტენბობა და შეტყუებულობა დარღვევებს გამოვლენება** მიმოფრენის დროს. დამახასიათებელია ერთი და იგივე სიტყვის განსხვავებული მნიშვნელობით სმარება.

**პათოლოგიური** - патологич (ბერძნ. pathos - დაავადება, morbosus - ფორმირება) (Hallpach W., 1929). **დაავადების კლასიფიკაცია და მორფოლოგიური გამოვლინებების შევება** მის კლასიკურ ავტორიობისათან შედარებით გარემოს, ბიოლოგიური და სოციალური ფაქტორების გაყვლით. ხანგრძლივ სამკურნალო-პროფილაქტიკურ ღონისძიებებთან დაკავშირებით აღმუყუნდება თერაპიული მათომორფიზმი. მის შესწავლას კორექციები შეაქვს ღიაგნოსტიკის და ნონოგრაფიის კრიტერიუმში. სამკურნალწამლო ზის გაყვლით ხდება სინდრომატა გენემის არსებითი თვადლება, მაგ. დაუნაბრებელი ფსიქოსინდრომის ფორმირება მიმოფრენით დაავადებულთა ნეიროლოგისური ტერაპიის პროცესში (Аспрунгер Г. 1968-79). სინონ. **ნეიროპათოლოგია**.

**პათოლოგიური პროცესების წარმოშობა** - патологический процесс (ბერძნ. plastic - ფორმირება). დაავადების გარეგნული გამოვლინება, **დაავადებულთა სხადახევა დამატებითი ფაქტორებზე**, რომლებიც გაყვლიან ახდენს დაავადების სურთიბე.

**პათოლოგიური პროცესების წარმოშობა** - патологический процесс ფსიქოლოგიური მეცნიერების ნაწილი, შვისწავლის ავადმყოფურ კვლევებს, მისი ამბის კანონზომიერებებს.

**პალანტოზიზმი** - патологический процесс (ბერძნ. pallo - კანკალი, an - უარყოფა, anthesis - გრძნობა, შეგრძნება). **ხაგნების გაბრუნების აქტის დარღვევა**, აღინიშნება შერვის გენის ხშიობის დროს.

**პალანტოზიზმი** - патологический процесс (ბერძნ. palatos - უბეღვის, phras - გრძნობა) (Pietras, 1955). ამ ფსიქოზისებ **დაავადებულთა ნონოლოგიური ფორმით გამოყოფის ცდა**, რომლებიც გამოვლინდება მძულსური რეაქციებით გამოხატული ანგისიოდური და კრიზანალი გენდენციებით და განსაკუთრებით მძიმე დანამაულებებით. აღინიშნება ეპონიშურად ჩამორჩენილი ქვეყნების ხალხებში, რომლებიც ხანგრძლივი დროის განმავლობაში იყვნენ კოლნოურად დაპოკლებული (მაგ. მაროკო). **პალანტოზიზმი** კონსტრუქციას ახლოსაა **ლევი-ბრულის (Levy-Brull L., 1930)** პირველყოფილი «პრელოგიკური» ამრინენების თეორიასთან, რომელიც თითქმის დამახასიათებელია პირველყოფილი და არაყვლითებული ხალხებისათვის, თუმეა უკანასკნელსგან განსხვავებით, აქ დაპარადა დრმა ინსტრუქტებზე. გრძნობად სეგროზე დავარებ არტეიპებზე (იხ. **შეშნის პალანტოზიზმი შემარწმობა**). მ-ის კონსტრუქცია ამტკიცებს, რომ არაყვლითებული ხალხებისათვის აღინიშნება საკუთარი ზადენი დაანამაულის მეტონის არარობის.

**პალანტოზიზმი** - патологический процесс (ლათ. pallio - დავარება, გასადება, ფრანგ. palliatif - პალიატივი). აქვს შროლიდ **დროებითი გაუმჯობესებების უნარი**, ასუსტებს, შეყრა სრულად არ უქრნავს დაავადების გამოვლინებებს.

**პალანტოზიზმი** - патологический процесс (ბერძნ. palin - ახლადან, ისევ, lalia - შეგველება) (Brissaud E., 1899, Souques M.A., 1908, Pick A., 1921). ერთი და იგივე სიტყვის იმის-სამი **ხაგნების სტერეოტიპული შრადეღვარადი გამოყოფა**, ხშირად დაავადელი გენითი. ურევერეციისგან განსხვავებით, შრონიდ სიტყვის ფრამში მათი ადგილის მიტეღვადება და მისი ყოველივის არ შეგისაყვების პროცესში. სიტყვის **ხაგნადილოგიური გამოყოფის პროცესში ხისი ელრბობა** ამინდება შემოღრდის, რასაც **აფონოზი** მ. ეწოდება, სტრიალული მათოლოგიის გამოხატულება; შეიძლება აღინიშნოს პოსტეყვლიდოგური პარკინსონიზმის სტრუქტურაში, ფსევდოლუბურ სინდრომში. შეტყუებულის ამბის სურათის გიპური ინპერომი პიკის დაავადების დროს.

**პალანტოზიზმი** - патологический процесс (რ. მალწრა **პალანტოზიზმი პალანტოზიზმი**).

**პალანტოზიზმი პალანტოზიზმი** - патологический процесс (ბერძნ. palinprosis - ახლად ამოტეხილი) (Mitscher E., 1901). **ხაგნობა**, დამახასიათებელი **აღკოპილური ორბობა პალანტოზიზმი ფორმისაგან**. გამოვლინდება ორბობის ერთეული დეგრაბობის, ემბობების გახსენების შეუძლებლობით. აღინიშნება ადკოპოლიზმის საწყის პირველ სტადიაში. გრძნობის პირველად გამოვლენად **ლომბროზი** (C. Lombroso, 1899) დაავადებითი მნიშვნელობით საკუთადიების კვლებზე წარწერების აღსანიშნავად. იგი თვლიდა, რომ მათი-საშუალებით შეიძლება გუსაღთა ფსიქოლოგიაში ნაწელობა.

**პალანტოზიზმი** - патологический процесс (ბერძნ. palinprosis - ახლად ამოტეხილი).

**პალანტოზიზმი** - патологический процесс (ბერძნ. palinprosis - ახლად ამოტეხილი). **პალანტოზიზმი**, რომელიც აყალიბებს ავადმყოფის წარსული ცხოვრების რაბე უკანის სურათს (მ. ბიოლოგიაში - ფილოგენეზური თვისებების გამოყოფა ონტოგენეზში). ბოღვა

ახლო მეტემფიქოზურთან რომლის ფაზლაში ფიგურირებს სულების გადასახლება სხეადასხვა არსებებსა და ესელო საგნებში. სინონ: პალეონტოლოგია.

**პალეონტოლოგია** - *палеонтология* (ბერძნ. *παλιον* - ახლიდან, ისევე, *επιτηρη* - წერა); წერითი მეტყველების დარღვევა სოციალის ან შოკულ ფრამების მრავალჯერადი გამეორების სახით. პალეოლოგის ვაშოვლინება წერაში. ამ სიმპტომებს ხშირად თან ახლავს თავის გინის სტრასრული სისტემის დაზიანება. აღინიშნება პოსტტრეუალისტური პარკინსონიზმის, ფსეუდობლბური სინდრომის, პიკის დაავადების დროს.

**პალეონტოლოგია** - *палеонтология* (ბერძნ. *παλιον* - ძველი, *τομος* - მუშაობა) (*Палеонтологический В.А.* 1931). ერთი და იგივე მოძრაობის და მოქმედების მრავალჯერადი, უაზრო გამეორება. აღინიშნება პიკის დაავადების დროს. სინონ: შიშვარბიშვიტი იტარაკია.

**პალეონტოლოგია** - *палеонтология* (ბერძნ. *παλιον* - მოძრაობა). მოტორიკის დარღვევა ერთი და იგივე მოძრაობის, ენის მრავალჯერადი გამეორების სახით. მოძრაობითი სტერეოტიპის გამოვლინება.

**პალეონტოლოგია** - *палеонтология* (ბერძნ. *παλιον* - მესხიერება, *τομος* - მოვირება). ავადმყოფის მესხიერებაში მანამდე აღმოჩენილი მოვლენების აღდგენა.

**პალეონტოლოგია** - *палеонтология* (ბერძნ. *παλιον* - შედეგობა). შედეგობითი აღქმის დარღვევა დანახული საგნის შედეგობითი ხადის შენარჩუნება ან განმეორებით აღმოყენება ხანმოკლე მესხიერების შემდეგ. თემატ, თეთიონი რბივტი ავადმყოფის შედეგობის ელში კარგახანია ადარ იმყოფება.

**პალეონტოლოგია** - *палеонтология* (ბერძნ. *παλιον* - საქმე, *τομος* - მოქმედება). იხ. პალეონტოლოგია.

**პალეონტოლოგია** - *палеонтология* (ლათ. *paleontologia* - ქუთუთი, *specimen* - მხერვა, ქვერა) (*Михайлович Л.И.*, 1987).

ფსიქოტორაკიული ხერხე, აესებს აგტოგურ განჯეშს მისი მიზანია ფოგოსიების გიპის ელემენტარული შედეგობითი შეგრძნების გამოწვევა დასველი თხალის კაელემზე ღომირებული მეწლით და ამაზე პიკების ყურადღების გამახვილებით. ამგვარად მიღებული შედეგობითი აღქმის აღწერაში გათვალისწინებულია უონს (მისი ფერი, ცვალებლობა, შედეგობითი შეგრძნების ინტენსივობის დამოკიდებულება ფერის სიკამპაქმე, რომელიც ვადის დასველ ქუთუთოებში, კალაისოსკარის სახეების წარმოქმნა, აღქმის დაღებითი აუფტური ინიშვნელობა). პს აესს დამამშობლებელ მემოქმედების მნიშვნელობა და შედეგობა მისი გამოყენება ემოციური მგრევის კორექციისთვის ნეგროული მეგრამეოზების და ხასიათის ავადგავისას ელკოპენსაციის დროს.

**პანსალოგია** - *панантология* (ბერძნ. *παν* - მთლიანად, *λογია* - გვყვლი). ტყეფლის შეგრძნება მივლ სხეულში.

**პანსალოგია** - *панантология* (ლათ. *panacea* - შევლებრები ქალმერთი, ყოლისმეკრანად პანაცეა). უნაგერხალური წამალი, რომელიც კრანავს ყველა დაავადებას. მისი ძიებით იფერნ დაკატებული შუა საუკუნეების ეპიტომიკსები. გერმინი გამოიყენება ვადგანითი, ხაგოეანი მნიშვნელობით, როცა სურთ ხაში გაუსუნ საშუალების წინასწარ მარქს, რომელიც აესადებს პრეგენიზის უნეფრისადურ სამკურნალო ეფექტზე.

**პანსალოგია** - *панантология* - *панантология* (ლათ. *panacea* - მთლიანად შევლებრება სასიათება მწკვედ შოთის (პანაქური) რეკურენტული შევლებებით, არ არის შემოფარგლული კონკრეტული სიკუდიით ან მოვლენებით და ამიგომ მისი წინასწარ განჭერება შევლებელთა მორითად სამგომებლ შოთის გარდა ვეყვლენება გამაღიერებული პულსაციო, კოეილი ელემენტარული არის, მსხრბობის შეგრძნება, თავბრუსხვევა, არარეალურობის განცდი (დეპრესიონალიზაცია და დერეალიზაცია). თან ერთვის სიკუდილის, კონტრასტული დეკარეის და შემოილობის შოურეული მიშები.

**პანსალოგია** - *панантология* (ბერძნ. *παν* - ყველაფერი) (*Hoch P., Polstein F.*, 1948). შანსორენის ფსეგლონეროული

შედარებითი ფორმა, რომლისთვისაც დამახასიათებელია აქუთაგებულობის, ისტერიულ-კორეირსიული და ეპილეპტიკოზული სიმპტომების ერთდროული თანარსება. ავადმყოფი პრემორბიდულად გამოორევიან ხასიათის აუტისტური თავისებურებებით. დაავადება მიმდინარეობს ფსიქოზური ეპიზოდებით (*ემოკროსიქოზება*), რომლის კლინიკურ სურათში მესაძლებელია აღინიშნოს იპოქორიკული იდეები, მემოქმედების იდეები, დემერსიონალიზაციური სინდრომი.

**პანსალოგია** - *панантология* (ბერძნ. *παντες* - დარცემა, დამიანება). სხეულს ყველა კუნთის დამშლა თავის გინის ორგანული დამიანების ან ინტექსიკაციის (ნარკოლეფიური და კატალექსური შევლებები, შოგიერთი შხაიანი აულის ნაქენი) შედეგად.

**პანტოლოგია** - სიმპტომი პანტოლოგიალურისტიკა (მრლტონტონის) - *Пантология сиптотом ахсантология (სასმთოლო)* (*Пантология* *Д.* 1968) იხ. სიმპტომი პანტოლოგიალურისტიკა.

**პანტოლოგია** - *пантология* (ბერძნ. *παντο* - მიზნაშებელი). სახის, თავის, კილურების და სხეულის გამოშატულება შორბაოხების ერთობლიობა, რომელსაც თან ახლავს შევყვლება და ემოციები. ამროვნებასა და აუფტურობისთან მ-ის ასოციაციური კავშირი საეუბლად ულეს მამიკურ-ეესტიკულიურ შევყვლებას ყრუ-მუნეების ურთიერობაში.

**პანტოლოგია** - *пантология* (ბერძნ. *παντο* - ყველა, იხ. პანტოლოგია).

**პაპადაკის პაღიტური ტიპი** დემონტონისტიკა - *Пантология ахсантология თი ძალური (Papadaki* 1904). იხ. *დემონტონისტიკა* *კავიტური*.

**პარსიკია** - *парсия* (ფრანგ. *parce* - პავი, შუა საუკუნეების საშეო გვარის ახალგაზრდა, დიდგვაროვანი ქალბატონის პირადი მსახური). შანსიხეხის გამოვლინება, სქესობრივი დაქამყოფილება მსახურის, პავის რილით. სინონ: სპარკილიზმი.

**პარპაქულია** *парпакулия* (ბერძნ. *παρ* - გვირდით, ახლოს, *გასწრავი*, გარეთ, *ხან* - ნება). ნებათი აქტივობის გაუკლებარება, თან ახლავს შესახამის მოქმედება - ნეგატივიზმი, იშუალსურობა და ა.შ.

**პარპაქულია** - *парпакулия* (ბერძნ. *παρ* - გვირდით, ახლოს, *გასწრავი*). გვირდებითი შორბაოხობის გამოვლინება შესახამის გამაღიანებლს არარსებობის დროს. აღინიშნება თავის გინის ქერქში გვირდებითი ანალიზატორების ეფერადური ნაწილის (ოპტოკლარული მილამო და პიოკამპი) ან გვირდებითი შეგრძნებულობის გამჭარბი გების დამხანებლს დროს.

**პარპაქულია** - *парпакулия* (ბერძნ. *παρ* - ნიშანი) (*Brzezicki E.*, 1950). დაავადებამდე არსებულ გარკვეულ ქუევის შეიონე ავადმყოფისთვის არადამახასიათებელი, შოულოდნელი ავადმყოფური ხატყვლი. შიქლდება იყის

შაზოგრებული პროცესის პირველი გამოვლინება, პროდრომული ნიშანი. სიმპტომს აქვს არსებითი მნიშვნელობა სასამართლო-სისტიკური ექსპერტიზის პრაქტიკისათვის, როცა დანაშაულის ჩადენის შემთხვევები არ არის მოტივირებული ბოლოთი განსუბით, აუტენტური ძვრებით, არ არის განპირობებული ცხოვრებისეული სიტუაციით. ამ პრელმინარულ მნიშვნელოვან ცნებას ანალოგიური დელიქტა. სინონ.: პარაპრაზის სიმპტომი, პარაპრაზის ფენომენი.

**პარაპრაზისი** - παραφραση (ბერძნ. παρα - ახლოს, გვერდით, გასწვრივ, გარეთ, εφρασι - წერა). წერითი შეტყვევებები დარღვევა, ანალოგიური პარაფრაზისა უმეტეს შემთხვევაში გამოვლინდება ცალკეული სიტყვების და ასოების ანაწარსი დამწერლობით, ერთი ასოს მეორეთი შეცვლით.

**პარაპრაზისი** - παραφραση (ბერძნ. παραφραση - მხატვრული, ნიმუში). ძირითადი შეცნაურული მიღწევების (თეორიული, მეთოდური) ხსატყვამა. რომლის მიხედვითაც ხდება შეცნირთა კვლევითი პრაქტიკის ორგანიზაცია მოცემულ დისციპლინაში განსამხრულ სხვაორულ პერიოდში. ცნება შემოღებულია ამერიკელი ისტორიკოსის კუნსის (Kun) მიერ, რომელმაც სამეცნიერო დისციპლინის განვითარებაში გამოყო სხვადასხვა ეტაპები: პრეპარატიული (წინ უსწრებს მ-ს დამყარებას), მ-ს გაბატონება (ძირითადური შეცნაურება), კრიზისის და სამეცნიერო რევილუციისა, რომელიც მდგომარეობს მ-ის ცვლაში, ერთიდან მეორემე გადასვლაში.

**პარაპრაზისი** - παραφრაση (ბერძნ. παραφραση - მიუღონელი, უნდათ). მათლოგური სქესობრივი აქტივობა, აღინიშნება ან ნაადრევედ, პუნერტაგულ პერიოდში (მაგ. მასწავლებელსა სიმე წლის ბავშვში, კოტაგი მხივი წლის ასაკში), ან მოხუცებულობით ასაკში. ზავშეთა ბ. მზორად დაკავშირებულია მათლოგიურ შექვიდრობასთან ან მორალთა მავალითთან, მაგრამ შეიძლება ყოს პიპოზიის ან პიპოზიამუსის სიმსივნის გამოვლინება ნაადრევი სქესობრივი მოქრობით და მკოროტიკოსიში. სწავლური ბ. ჩვეულებრივ, წარმოადგენს დემენციის ნიშანს, ამ დროს დიხილოს გამოყოფლება არ შეესაბამება ფიზიკურ შესაძლებლობებს.

**პარაპრაზისი** - παραφრაση (ბერძნ. ψευδος - გუნება-განწყობა, გრძობა). აუტენტური გამოვლინების შეუხაბამობა მის შემოწვევ მიხედვით, სიტუაციასთან, მაგ. გიორი სისხირული ცნობის მიღებისას. ბ. ზოფთათ - ბოღის შინაარსის გასაბამობა ემოციურ გონიან, მაგ. შევადრამიური ბოღეა აუტენტრობის ანათიური ცვლილებების დროს.

**პარაპრაზისი** - παραφრაση (ბერძნ. κλεισις - მოძრაობა). ზაფერკანუბის ფონზე დაბახახითებული რთული უნებლიე კოორდინირებული გარეგნულად ზიანდაახუფი მოძრაობება ეს მოქმედებები და მოძრაობები ავადმყოფის მხრიდან არ ექვემდებარება კონტროლს. აღინიშნება თავის გერინს (ზიორად მარჯვენა პემისფეროს) შუხლის წილის ქერქის დამიანების დროს.

**პარაპრაზისი** - παραφრაზია (ბერძნ. ასო ლამბდა, აღინიშნება ბერძნ «ლ»). შეტყვევების დევექტი, ბერძნ «ლ»-ის შეცვლა სხვა ბგერით «რ», «ვ»).

**პარაპრაზისი** - παραφραση (ბერძნ. lexis - შეტყვევება, სიტყვა). შეტყვევების დარღვევა, კითხვის დროს სიტყვის დაბახიჩება და შეცვლა-ლიტერატურის და გვრზადური ბ. ანალოგიური ლიტერატურის და გვრზადური პარაფრაზის სიმონანურ მეხის შეტყვევებაში.

**პარაპრაზისი** - παραφრაზია (ბერძნ. παραφραση - რეპრეზენტაციული დამზღვს კლნიკში ძირითადი ნიშნების ერთობლიობა: დიხართობა, არგად რობერტსონის სინდრომი და ოტალური დემენცია).

**პარაპრაზისი** - παραφραση (ბერძნ. παραλογος - უგუნური, გონიერების სწინააღმდეგო). იხ. პარაპრაზისი პარაპრაზისი.

**პარაპრაზისი** - παραφრაზია (ბერძნ. παμια - მიხატვა). მამკური გამოშხატელობითი გამოვლინების გუკოფინობა, არ შეესაბამება ავადმყოფის ემოციის ან განიდელ სიტუაციას.

**პარაპრაზისი** - παραφრაზია (ბერძნ. πασις - შესიერება) (Kraepelin E., 1886). შესიერების დარღვევის ხსატყვამი შესიერების გუკუდმარობა. არჩევნა: მარტივ მ-ს, მიუკუთვნება პროფერული დამზღვით დაავადებულთა კონსტრუქციუბი, ფსევდოდემონსტრაციები, ფანტაზიები; ასოტრუბულ მ-ს, დაკოტრებულს ბოღით და პალუდინიური განსუბითან, მაგ, მითოურებით დაავადებულებში, იმ პიოებში, რომლებმაც გადაიტანეს ადკოპოლური ფსიქოზი; იდენტოფიკირებულ მ-ს, რომელიც შეიყავს ორმაც შეგრძნებებს («უკვე ნანახის», «უკვე განცილის», «უკვე გადახდილთ ფინობენები») ამ უკანასკრლს მიუკუთვნება პიკის მიერ მოფიანებით აღწერილი რეგულაციკრუბული ბ. (Schneider E., 1928).

**პარაპრაზისი** - რეპუკლიკირებულ - παραφრაზია რედუპლიკაცია (ლათ. reduplico - ახლადან გაორმაგება) (Pick A., 1901) ყოველდღიური ცხოვრებას განსუბების გარამავების ფინობენი. ერთი და იგივე ყოთორება თოთისი რადენერდებ შეგრძნება ავადმყოფს ეჩვენება, რომ იგი უკვე იწევა ასეთივე. მაგრამ სხვა საავადმყოფოში, ნახა სხვა, მაგრამ იგივე ექში, რომელსაც ასევე ებახდნენ. დაბახახითებელია ს, რომ ყრუ მოგონებებში ფიგურირებული აღინიშნება განსუბები მსგავსია, მაგრამ არა მზუბად იგივე, როგორიც ამახად. ამით განსხვავდება ბრ. უკვე ნახახის) ფინობისგან. ბრ.-ის დროს მიანდება ლოგიკურ-ამრობრივი შესიერება და ჰარზობს შედარებით შენარჩუნებული გრზობით-საგონანი შესიერება. უშუალო მოგონებების იშლება ურამგენებად, შემდგომი აღიქვება როგორც წინაბიღის გამოგრება. აღინიშნება თავის გვინის სხვადასხვა ეტოლოგიის უბში ორგანული დაბახიენების დროს (პრესბიპოფრენია, პროგრესული დამზღვა, კონსოკოვის სინდრომი).

**პარაპრაზისი** - παραφრაზია (ბერძნ. πασις - შესიება). აშუხის ხსატყვამი, რომლის დროსაც იყარება მუსიკალური გონის სიმბალის, მით შორის ინტერვალის, ბერძთა თანწყობის ხსხითის განსამდერის უნარ.

**პარაპრაზისი** - παραφრაზია (ბერძნ. იხ. უარყოფა, ανθεσις - გრამობა, მეგრძნება). გერძობებლობის ანარსებობა სხეულის, სიზრდ კოღერების სიმეტრიულ ადგილებზე.

**პარაპრაზისი** - παραφრაზია (ბერძნ. οὐκ - აღქმა, ამრობენება). გამოყოფილია კაბზაუბის (Kahlbaum K., 1863) მიერ როგორც სუკლური ამდლობა, უპირატესად გინირული მსველობითი მოქმედების დარღვევის სახით. პარაპრაზიური ბოღეა სისტემატიკებულია, მის იტეპში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს რეალური ფაქტების არასწორი ინტერპრეტაცია. კრეტსჩამი (Kraepelin E., 1912, 1915) ბ. გამოყო დამოუკიდებელ ნოზოლოგიურ ფორმად, შეიყვრობა მისი ფარგლებს, ბ-იდან ამოიღო პარაფრენიის შემთხვევები და ცალკე გამოყო ფსიქოგენური ეგვრულანტური ბოღების წარმოქმნა. ზარნაუბი (Mitschkin K., 1915) და კრეტსჩერი (Kretschmer E., 1918) მ-ს განიხილადნენ უკვე მხოლოდ ფსიქოგენური

პათოლოგიის კრილიზი, რომლის კლინიკაში აისახება ისეთი ფაქტორები, როგორცაა ხასიათის პრედისპოზიცია. ფსიქოგენური შიშგამწივრებელი გარემო და საკვანძო განცდების არსებობა განუჭვინა (Гитиушкин П.В., 1914-1933) პარანოსალურ სიმპტომა წარმოქმნას ფსიქოპათურ პიროვნებებში განიხილავდა როგორც პარანოსალურ განვითარებას ისევე, როგორც ეს ხდება დუნდობიანად მიზიარების ფორმებში. ეს შეხედულება ავამაზდას მისიველია და განიხილავს როგორც პარანოსალური განვითარება ფსიქოპათურ პარანოსალურებში და ატყობნავს მათთან განსხვავებულ მახასიათებლებს. პარანოსალური შიშგამწივრების პარანოსალური ვარიანტი (სტახალური, ხანგრძლივი). მიზიარების გიგურ შემთხვევებში დაპარაკობენ ზოგჯერ წარმოქმნის პარანოსალურ ტყაბზე, რომელზეც შეუფერავს იცვლება პარანოსალურად.

2. ალკოჰოლური შიშ - п. алкогольная психика. ზოგჯერ ფსიქოზი, ვითარდება ალკოჰოლიზმით დაავადებულებში. უმრავლეს შემთხვევაში - სისტემატიზებული ექვიანობის ბოლვა, მოცდურ - მასთან დაკავშირებული დენის ბოლვა. ეტიოპათოგენური რთული - ლაპარაკია ფსიქოგენურ პარანოსალურ ბოლვას წარმოქმნაზე ალკოჰოლური ენეფალოპათიის ნიადაგზე.

3. ბრძოლის შიშგამწივრები ტერმინი, შეესაბამება ენება პარანოსალური განვითარების შესახებ, მიმდინარეობს აწეულ აქტივობით, უანგინში და მიმართულია თითქმისდა ვითარული უფლებების დასაცავად.

4. ბრძოლის შიშგამწივრები (Kleiss K., 1912). ფსიქოზი, ხასიათდება უპირატესად სისტემატიზებული ბოლვით და აღმოცენდება ქალებში კლინიკის პერაობა, 40-50 წლის ასაკში დამახასიათებელია მწვავე დასწყისი და ფსიქოკური დარღვევების ხანგრძლივი სტატიონარული მიმდინარეობა. მნიშვნელოვან აქვს კონსტიტუციური ბუნებას (მამობრანოსალური კონსტიტუცია). პრემორბიდი - ხასიათის ფსიქოპათიური ხასიათი. კლასიკურ შიშ-სიაკეთებლად არაპროვინციული მიმდინარეობის კონსტიტუციური ავტოტონური ფსიქოზების ჯგუფი. იხ. ბრძოლა შიშგამწივრებში. პარანოსალური შიშგამწივრები ბრძოლის შიშგამწივრები.

5. ბრძოლის შიშგამწივრები - п. ипохондрическая психика. სისტემატიზებულია მოქმედებითა და მოქმედებით, იწყება სენესტოპათიებით, რომლის ფონზე აღმოცენდება ბოლვითი ინტერპრეტაცია.

6. ბრძოლის შიშგამწივრები - п. сугубая брания. შიშგამწივრები შიშ-სიაკეთებელია ბოლვითა და მოქმედებით.

7. ბრძოლის შიშგამწივრები - п. сугубая (Westphal C., 1876). მწვავე ფსიქოზები, მიმდინარე პალეოსაიკურ-ბოლვითი, აგრეთვე სტატიკური სიმპტომატიკით, განუჭვინა (Гитиушкин П.В., 1904) ბოლვით, შიშ-სიაკეთებელია. შიშ-სიაკეთებელია და არა ნოშოლოგიური ფორმა.

8. ბრძოლის შიშგამწივრები - п. сугубая аномальная. განიხილება როგორც მწვავე პარანოსალური ვარიანტი, რომლის კლინიკურ სურათში ჰარბის შევადობის ხანგრძლივი იდეები (გამოცინების, აღმოცინების, ბლევაბოსილების ან რევიგიური შინაარსის).

9. ბრძოლის შიშგამწივრები - п. перекрученная (ლათ. peractio - მღეკარი). დენის სისტემატიზებული ტერმინული ტერმინული ბოლვა.

10. ბრძოლის შიშგამწივრები - п. сугубая. იხ. ბრძოლა შიშგამწივრებში ხანგრძლივი.

11. ბრძოლის შიშგამწივრები - п. сугубая. დანაშაულები, თვითნებადების სისტემატიზებული ბოლვა, დამახასიათებელია ლეპროსიული ანტილოპათიისათვის.

12. ბრძოლის შიშგამწივრები - п. сугубая-бредовая (Веттер В.М., 1910). პარანოსალური ვარიანტი, დამახასიათებელია უპირატესად ბრძოლებს შიშ-სიაკეთებელი 1905 წ. აქტიური შიშ-სიაკეთებელი ბოლვით კლინიკური სურათისთვის.

13. ბრძოლის შიშგამწივრები - п. жевания. ზოგჯერ ტერმინი, გამოიყენებოდა მწვავეებში. გამოთვლების ან ხანგრძლივი-ერთგვარული (ერთგვარული) სისტემატიზებული ბოლვით დასინიშნავდა.

14. ბრძოლის შიშგამწივრები (Berger H., 1913). დაავადება, ხასიათდება პარანოსალური ბოლვით, აღმოცენდება ინოვაციური ასაკში. მიუხედავად ქრონიკული მიმდინარეობისა, არ იწყება კუპრესტობის განვითარებას მწვავედ ერთი პარანოსალური ერთ-ერთი სახელოდება (შიშ-სიაკეთებელი ბრძოლის შიშგამწივრები).

15. ბრძოლის შიშგამწივრები - паранойя (ბერძ. para - ახლოს, გვერდით, გასწვრივ, გარეთ, მოთ, ძივს, აშროვნება, ειლს - მსგავსი). ფსიქოპათოლოგიური სინდრომი, ხასიათდება პრეველიად ან ხაგოვანი ბოლვით, შიშ-სიაკეთებელი ბოლვით და ახლავს სენიითი პალეოსაიკური, ფსიქოლოგიური, ფსიქოკური ავტომატიზების მოქმედებით. სინონი: ბრძოლის შიშგამწივრები, პარანოსალური შიშგამწივრები.

16. ბრძოლის შიშგამწივრები - п. паранойя. მწვავე ალკოჰოლური ფსიქოზი უწყვეტ უთარდება ალკოჰოლიზმის IV სტადიაში დამახასიათებელია დენის ბოლვა შიშ-სიაკეთებელი, შიშ-სიაკეთებელი ბოლვითი აქვს მასალური ეტიოპათიის პარანოსალური ვარიანტი.

17. ალკოჰოლური შიშგამწივრები - п. алкогольная паранойя (Слимахов А.П., 1918). მწვავე, სწრაფად გარდამავალი ალკოჰოლური შიშ-სიაკეთებელი, დამახასიათებელია სწრაფი განვითარება მოკლე დროში, ფსიქოზიანი კრიტიკული გამოხატულება შიშ-სიაკეთებელი ბოლვით, ეტიოპათოლოგიური ალკოჰოლიზმის განვითარების პერაობაში, მასიური ალკოჰოლიზმის დროს და არამედიკალური ფსიქოგენური და სოციალური ფაქტორების მონაწილეობით. დამახასიათებელია შიშის აქტივობა, დენის გრძობილი ბოლვა, განსაკუთრებული მნიშვნელობის იდეები, ფსიქოკური შემოქმედების რევიგიური იდეები ბოლვა არასისტემატიზებულია, კონსტიტუციული. ფსიქოზის ხანგრძლივობა - არაღმდინარე საათთან 2-2,5 დღემდე. აღინიშნება უპირატესად სასამართლო-ფსიქოპათოლოგიური პრაქტიკაში.

18. ბრძოლის შიშგამწივრები - п. аномальная паранойя (Хусейн Г., 1940). მწვავე შიშ-სიაკეთებელი უნიშვნელო, ცალკე აღებული სივრცითი ფაქტორების და არაკუთრად გამოხატული ეტიოპათოლოგიური კომპლიკაციის დროს. განხილდება როგორც პათოლოგიური მწვაველი ნიადაგის რეაქცია. გენეზი მიმდინარეობს ენიჭება ასეთინას (გადაღდა. გოდაგინილი სომატური დაავადებები, უბოლვით, ალკოჰოლური სასმელების მიღება). დამახასიათებელია დენის ბოლვა, შიშის აქტივობა. შიშ-სიაკეთებელია აღმოცენდება განსაკუთრებულ პირობებში (მგაბურების დროს, უცხო გარემოში და ა.შ.). ძველი სახელოდება - რევიგიზი. შიშ-სიაკეთებელია შიშ-სიაკეთებელი.

19. ბრძოლის შიშგამწივრები - п. аномальная. დამახასიათებელია შიშ-სიაკეთებელი, დენის, მოწმელების, გაქურდვის ბოლვით იდეები, რომელზეც ვრცელდება ავადმყოფის უშუალო გარემომყოფებზე - ნათესავებზე, ახლობლებზე, მეგობრებზე აღინიშნება მოვლენებითი ასაკის ბოლვითი ფსიქოზების დროს.





პალეონიაციებით, ცრუ ამოცნობით. შემდგომში განიხილებოდა სინდრომოლოგიურად სხვადასხვა უსიქოების სტრუქტურაში (მომოფრენია, ინვოლუციური, ორგანული). ჯერ კიდევ დამოუკიდებელ ნოზოლოგიურ ფორმად პ-ის აღიარების პერიოდში, **კრუშელანმა** გამოყო სამი შემდეგი ფორმა: 1) **ხისტეტურა** - დევნის ბოლენს ეკლის შედარებით სტაბილური დიდი მასტაბის მქონე, განდიდების იდეები, ინტელექტი და შესასრულება შენარჩუნებულა საკმაო ემორტური სიციხეებით და სმენითი პალეონიაციების მნიშვნელოვანი როლი; 2) **ფანტასტიკური** - კლინიკურ სურათში ჭარბობს არამყარი, აღივლად აღმოცენებული და აღივლად ევლადი ბოლეთი ასურდული შინაარსის იდეები, თავისი არსით მიკუთვნება განდიდების იდეებს; 3) **კონფაზულიცურა** - მისთვის გაკურა კონფაზულიცური ბოლენს და პალეონიაციების აღმოცენების შესსრულების დარღვევის პრეპტი; 4) **ვქსმანური** - განდიდების კაპური ბოლეთი იდეები შამდინარე პი პერთიმით, მოგჯერ პალეონიაციებით. ამამად, პარაფრენული ბოლენს წარმოქმნა უნაუღესი უსიქიაციების მიერ განახლებება სინდრომოლოგიურ ასექტში, როგორც სხვადასხვა წარმოშობის პარანოიდული სინდრომთა ჯგუფის მიმდინარეობის გასი (Шушанин А.И. 1939). პარაფრენის სისეგმატიკებული და ექსპანსიური ფორმები უმეტესად გეზებება შინაფრენის დროს როგორც ბოლენს დინამიკის ერთ-ერთი მოციანებითი სტადია და ხანგრძლივი ზომდინარეობას იდეებსა ციკური განსჯისა და განსჯის უსიქიების სურათით. კონფაზულიცური და ფანტასტიკური ფორმები ხშირად აღენიშნება თავის გეონის ეგზოგენურ-ორგანული დანადგების დროს, განსაკუთრებით მოგანებით ასაკში. გამოყოფენ აგრეთვე **პალეონიაციურ** პ-ს, რომლის კლინიკურ სურათში ჭარბობს პალეონიაციური განცდები, ხშირად - ევრბალური უსედეოპალეონიაციები და სენესტოპათიები (Koray A.M., 194; Петрова З.С., 1967). **ხალეცკამ** (Халедзк А.М., 1973) მიუთითა შინაფრენისთვის გაკურა პარაფრენების სინდრომის თავისებურებაზე - პარანოიდული სინდრომის პარაფრენული შეცვლა დროს ხდება კანდინსიკულერამბოს სინდრომის უარყოფითი ვარინგის შეცვლა დიდებით, გემოქმედების, შართიქობის შიშიმ განსჯა იდეება კონტრასტული, სხელთებურად შეუწილთ განახლების დიდებით განსჯით. ავადმყოფი თვითონ იყვეტ განსაკუთრებულ ძალის, ახალი კოდნის, ხანყარომე შერძინებლობის გეონე სხეულებად. საქართველოში პ-ის კლინიკის უსიქოპათოლოგიური ასექტები შესწავლიდა **ა. ფხანუშვილმა** (1967) მიერ.

**2. შერტსმელლი** - ი. шертсмельли (Сарнас М.И., 1915). **დაცადება**, გეზებება უპარატესად 40-50 წლის ასაკის ქალებში. დამახასიათებელია ენოტიკული, მოგჯერ შუქარის შინაარსის სმენითი პალეონიაციები. პალეონიაციების შინაარსი შეუცვლა საყვედროს უნაო ყვეებში, გარყვნილობაზე, დაცადებზე. მოგჯერ პალეონიის თან ახლავს ენოტიკულად შეფერული დევნის და დამოკიდებულების ბოლეთი იდეები. დასაწყისი - ქვეშეყვე, შიმდინარეობა - მეტეისმადეკარი. თანამედროვე შეხედულებებით, მიეკუთვნება **ხანშეხუვლით** ასაკის **ჭრინიკულ პალეონიაციებს**.

**3. ინეროლტოვიტი** - ი. инерольтовити (Серто А., 1919). **მოგანებითი** ასაკის **ბოლენს** ფანქოზი დამახასიათებელია შემოქმედების, დევნის ბოლეთი იდეები, რაყ არამეშათად განაპრობებს საკუთარი სიროვნების შეფასების შეცვლას. ბოლენს შინაარსში დიდ მნიშვნელობას იძენს სექსუალური შოგეიები. აღინიშნება კონფაზულიცობი, გენება-განწყობის მეჩეობა, იდეება შეყვეტება.

**4. შელანტოლიტი** - ი. шелантолити **მოგანებითი** ასაკის **ენოტიკური დეპრესიება**, წარმოადგენს ბოლეთი შიმდინარე დეტრესის ელმანიაციის. დეტრესული იდეები (თუთარადლებსა, იპოქონდრიალად, თუთარამყარებს) იძენს ფანტასტიკურ ხასიათს. არამეშათად თან ახლავს ნიაილსტური და უარყოფის და გრანდოზიულობის ბოლენს კოტტარის ხანდარობა. ონეგროიდული ამდლობისა და პროვნების თუთმეკონობის დარღვევების არარებობა პ-ის ფანქრ-ავეტური ბუნების დამახასტრებელია (Иванович Т.Ф., Шелантоли-Иванова И.В., 1963).

**5. შინშანანაიტი** - ი. шиншананити (Roth M., 1965). **ფანქოზი**, აღმოცენებულა 75-80 წლის ასაკში. ხასიათდება **შესატეტატიზებული პარაფრენული ბოლენს** - ხარალის, გაქურდის, ეროგეკლი შინაარსის ბოლეთი იდეებით. შესატეტატიზებული დეტრესული შეფერილობა. ხშირად სმენითი პალეონიაციები. ხანგრძლივი დროის განმავლობაში - სწორი ორიენტირება, კარგი კონტაქტი შესხერებისა და ევრადლების შენარჩუნებით. რაც შემთხვევებში დროთა განმავლობაში ყალიბდება სინდური დეტრესისთვის დამახასიათებელი ფსიქიური დევეტე. პ.შ. ატვროის მიერ განიხილება როგორც მოხუცებულობითი მომოფრენის ფორმა. ამგეზად აკუთვნებენ **მოგანებითი** ასაკის **ენდოფორმული ფანქოზებს** ყვეუბ.

**6. შინშანა** - ი. шиншана **შამდინარეობის შეტყვე**, შიმდინარეობის პარაფრენული სინდრომით და გარდამავალი კატეგორიური ჩართებებით. დამახასიათებელია არასისტემატიკული გრმნობა და ხანგრობა ბოლენს (Шертсмельли О.И. 1976).

**7. შრინშელლიტი** - ი. шриншеллити (Albrecht F., 1914). **ფანქოზი** აღწერილია უპარატესად ქალებში ინვოლუციურ, 45-55 წლის ასაკში. დამახასიათებელია სისეგმატიკებული ბოლეთი სინდრომი (დამოკიდებულების, დევნის, ვანდიდების იდეები, არამეშათად - სექსუალური ხასიათი) და სმენითი პალეონიაციები.

**8. შინშელლიტი** - иншеллити **ეკვეტატიზების დარღვე**, აღიარებს აღქმის ისეთი ფორმების არსებობის შესაძლებლობას, რომელიც არ არის დაკავშირებული გრმნობათა ორგანოტთან. ამ მოვლენას უწოდებენ **ეპიტრასენოტურ** ან **არაგრამატიკ** აღქმას. შთ მიეკუთვნება **ტვლევათა** (ერთი ადამიანის მიერ მეორის აზრის გატეხა ინფორმაციის გადაცემის არების გარეშე); **ხადლებად** (ინფორმაციის მიღება გარე სამყაროს სხეუტურ შეტყვევებზე გრმნობის ორგანოების გამოყენების გარეშე); **შრინსკობა** (სხვა პირის აზრების წინასწარი გატეხა ან მოუღენების წინასწარი განქერება ინფორმაციის გარეშე); **ფანქოკინეზი** (ადინამიზე ან მოუღენებზე ამროვნებითი უშეპელებება, რაყ თითქმის მათში იყვეტ სათანადო ევლადებებს); **პარადიატანტიკა** (ლიანობის დასმა ავადმყოფთან უშეპელ კონტაქტის და ინფორმაციის გარეშე).

**9. შინშელლიტი** - иншеллити **ფანქოზი** (ფანქოზი **ა**, 1976). რეპეტული ბუნების **შინაფრენისმაგეკარი შდგომარეობა**. სიმპტომატიკის მგავსების მიუხედავად, კლინიკური არსით და პროვნობით განსხვავდება ჰემზარაიგი შინაფრენისიგან. დამახასიათებელია შიტი დუარბადლი დაცემულებარება, განსაკუთრებით უსიქოთერაპიისისებში. შ. შინძლებს მიკუთვნის შინაფრენის ფსიქოზების ჯგუფს.

**პარაზი** - ი. паразити - დასტება). ატვორი შობარობების ძალის და (ან) ამბიღელის შემოცრება შესახაპისიკუნთის ინერეციის დარღვევასთან დაკავშირებით.

**პარამელოზიზმი** - парамелиоз (ბერძნ. κιδιων - ვამბახლევა) (Kabliaum K., 1866; Jaspers K., 1913). მუდგელოზობა ელუზას ხახვ. შეუვლილი ვამბახლევა აღსუსტდება რელიური ინფექციის ასევე აღქმის მოდელი. ქობილობა სორცივეს მკვ. მობარების ნახტება დათადარების დროს ათადმოყუხ ხედავს ცვალად. უანგახეკურ კეპინავტის. დამინების ნახტებას. ურველო ცხოველებს და ა.მ. ილუვირული საგანს საუკუელს წარმოადევენ ნიდელი ნახტების დეკალები. მიკოციქებსა შევსების სემბორულ ელუზებას (Merriman M.H., 1976). სინონ: **მლუზეზიზმი პარამელოზიზმი**.

**პარამელოზი** - парамелиоз (ბერძნ. παρα - ახლოს, გვერდითი, ვასწერივ, ვარტი, თგasia - შემაოხა, მოქმედება) (Meyer A., 1908). ურგახელი რეაქციის ხახვ. შევსებაშემა მიმოფერენიას და პარანოიას იხ. **პარამელოზი პარამელოზიზმი**.

**პარამელოზი** - парамелиоз (ბერძნ. παρὰ - ვრინება მიგრანსება). მემარბულების მოშემა სისინანურად აღმოაქნებულ და ეკვირის მხეველას წყის და ა.მ. უსამოთხო შევრინებების სახით. ურვეალად განბრობებულია ორგანიული ფაქტორებით, სინკოციქოტია, მბარამ შეობდება აგრებდება ურველურ, ფსიქოვებურ ხასათის.

**პარამელოზი** - парамелиоз (ბერძნ. parthenos - ქალწული, philia - ხიყვარული). ქალია მომოსეშუალისშხს ხახვ. დამახასიათებელი ამორჩევეითი სეფარული ქალწულების მიმართ.

**პარამელოზი** - парамелиоз (ლათ. paricid - უსოვლი ნათებების შეველოზობა). ეველამე ხნირად ეს არის მობოლებს შეველოზობა. ანტირეპტ. სამნით ან მგრული დამოკლებულების შეხებხევეების ვარდა, ეველემე ავრეთვე ფსიქიკური პათოლოგიის დროს. მოვურეპ ზს სნადინ ძლიერი სულიერი მდელვარების მდგომარეობაში, მზვ. გირანინ ლოთი მასის მიმართ. ურვეალად შეველოზობს სნადის მიმოფერენით დათადებული ბოლეთი ვანსელების შეპოქმედებით ან ათადმოყოფი დეკორიკული ან ზინდიცებური გოთხო შეველოლი ცნობინების ფონზე. ფსახიანად დეტეგოკოხბა ზ-ხ ვამბარეკავე რადიხის ან ურვეტრას კომპლექტობა ჭრელში (Hessard A., 1963). თვემა, კლინიკურად ეს შეხველებს არ დალადგურდა (Burgerois M., Henry F., 1967). იოლიპოსხა მოქლეა მამა, მბარამ არ იყოფა ვინ იყო ივი მიხისის (Porot A., Bardolat Ch., 1959).

**პარამელოზი** - парамелиоз მამკლობა კომპლექტი. კლინიკური სურათით თოქმის არ ვანსხეველები პარკინსონის დათადებებისგან. მოვიერით თვისხებურება შეობდება ვანბრობებული იყოი ევოლოციური მომესტით, რადგან ზ. ილერმისხი სხედაახხე დათადებების დროს (ეკოლოგიური ენეუგოლიგი, ქალ-გვინის გრავმა, თოქის გინის სისინოვე კერხეკული ათეროსკლეროტი, ხვიროლევიერი ენეუგოლოპათია და ა.მ.), რომლებიც თვანხვს ქრექქემა, პირველ რაგმს, მამდურ ხირთთვის და იწვეუს კატექოლამინების ცვლის დარღვევას.

**პარამელოზი დაპამელოზი** - Паркинсонизм (Parkinson J., 1817). ჭრინთველი პარამელოზი დათადებება ებოვირდლება ქიკურთა მბარადი სნაქლით. ევეტრამელოზი მოველენებით (აკნეზურ-რადიკული სინდრომი) და თინდითის ვანეოთარებელი დამალებით. ფსიქიკის შირი - დუექტური ამლილობანი დარესიის სახით. კერულანკური გენდერეკები. პერიოდულად - აწველი ანგმბადობა ან აპათია. ხანგრძლივი მიმდინარეობის დროს - შეხხიერების შეესტება. პარამელოზის გებმს შენელება. ხასათობრივი ევლენებები (აკიროზი). დათადება ატარებს ოქახურ ნექციადრეკობით ხასათის. ვითარდება მოხუცებულობით ასაკში. სინონ: **პანპალა დანგლა**.

**პარამელოზი** - парамелиоз (ბერძნ. πάθος - ჭრინთვა, სუნი). ვრსიხებს გაუვეუქმბადობა. ვრსოთით ილუზიები ან პალეონიყიები. ზ-ის სისტეგომის ევოლოციკისისევის სპეკორა უსამოთხო სუენის შესადებლობის ვამორიყება ცევირ-ხანის დათადებებისან დატევირებით, რომესაყ ივი ეანპრობებულია ვრსოის სნადინბარის პერიფერიული ნაწილის პათოლოგიით.

**პარამელოზი** - парамелиоз (ბერძნ. παρακυσμος - დათადების მწვევე შევევა). კლინიკურად: დათადების ნაწიხის ექვირი. მწვევე ატოქოთორიტი. ჩვეულებრივ. ვანბორებადი ხანმოკლე აღმოქენება ან გაძლიერება. გიკური მბალოთია - ეისლევსიერი გულყრები (სრუნსეითი და პარკუნსეითი ზ.).

**პ. ელემტრონიკისაქლადრბარაშეშუი მამლუმისში** - ელემენტарная (элемента́рная) эпилепсия ევე-ზე ცალკეული ტადლებს და (ან) მართი ჭრეების აღმოჩენა, წარმოადევენ ელენებური ვანხებვის ვამოლინებას მწკავე აღმოყენება და ევერად ვრება. არ არის დამახასიათებელი ფონური ბეკეობისთვის. ურველად ეს არის ზესე ან ბიკ-ტადლება.

**პარამელოზი** - парамелиоз პარამელოზების ფორმით მიმდინარე.

**პარამელოზი** - парамелиоз (ლათ. partialis - ნაწილობრივი). სემპულური დეტოლქმს დარღვევებს ფორმა. დამახასიათებელია მისწრება სექსუალური დაქვაოფილქების მღწვევის სექსუალური პარტეობის სხუელის ვარკველი ნაწილი (ფები, თეფრ, დესლედი და ა.მ.) მებრით. განხებებება ფეტვიშიშისხთან, რომლის დროსყ პარკინსონის იქ ყულს არ არის მტკირი და შის ატარებს სავანი, რომელიც ვეტიკული ნიშხლოს წარმოადეგას.

**პარამელოზი** - парамелиоз (ბერძნ. ἡμιδον - ეკაოფილება, ტკობა). სემპულური მერვერხა, სექსუალური დაქვაოფილების შრება არადეკვიტორი ხვირბით, მზე. მამაკაცებში ევეგიშიზის დროს - ქალის გუალევის ნიფთობს დამატარება ან მათი ხამელებითი მინიკულირება.

**პასივუზი** - пассивизм (ლათ. passivus - უნებისყოფი, პასიური). იხ. **პასივუზი**.

**პასივუზი პასივუზი** - пассивизм (ლათ. passivus - უნებისყოფი, პასიური). იხ. **პასივუზი**. ურველო რეაქციებე. მიმართული ვარემოს მანერ ფაქტორებს თოქოდან ატლებთან აღ შექცებებში ამ ფაქტორების თოქოდან ატლებთან აქვარი გენდერეკების გარეშე პასივუზის ნაწილში ბრუნების ურველო ფორმა - სინკოციქოტია. პარამელოზის მამიკლამოტი (პარკინსონიზმი) (Pascal C., 1907). დავრესილი სიმამკლობები დაწველებული მამოფრენიას ფორმა. დამახასიათებელია არანოტივირებული დურქია და სუქოლელი ციქობი.

**პასივუზის ნაწილში ბრუნების შმამამელოზი** - пассивизм (ლათ. passivus - უნებისყოფი, პასიური). იხ. **პასივუზი** (Pascal C., 1907). შმამოფრენიას ერთ-ერთი მარველი პარველი, რომელიც იწვევა აქვიტებულობის სიმამკლობით. შექცებში თან ვრსოის (გადაფარავს) მიმოფერენიურ აღმოყენის მართთადი სიმამკლობი.

**პასივუზი** - пассивизм (ლათ. passivus - უნებისყოფი, პასიური). მოველო სორმებსა და წყების შესრულებამე მას მბარევე სხედაახხე ფორმით კონტროლის ეანბორცელება. არჩევენ კონტროლის ვარევენ და შნდგან ფორმებს. რომლებიც არეველარებს სუხიეკის მოქმედების (პასიხისმებლობის და მოვალეობის ცრუნობა).

**პატანუს რაბბარება** - Patou болва (Patou K., 1960). ქროზისიზული დაავადება (ტრახომა II). დასახსიათებელია ფსიქიკური განვითარების შეფერხება, ზოგორღი ჩაბორჩენა, სხედიცხვა კრანოცფუალური ღოსკლანები, გუნჩების, ქველა ყბის და სასის განვება, თანდაულოდა სურრე და თვადების დეფექტი, თითების რაოდენობის მომაგება, მრავლობითი კაპილარული პემანგიომები, ცხვირის ძვლების ალაზნია.

**პატერსონ-ზანგვილის სმარცთი პანტონი** - Патерсон-Зангвилл проанхвемия аномалия (Paterson A., Zangwill O., 1945). იხ. პანტონი სმარცთი.

**პატრინაში ზსითიერი ანაღმარეობა** - патрина шитирича болва (ერანტ, რაითიგა - მარველობა, მანველობა). დამოუკიდებლად ცხოვრებისა და მროზისენარსმოკლებულ ავადმყოფთა არასტაციონარული ფსიქიატრიული დაბმარული ფორმა საშკერნალო დაქსეხულებების (უსიქიატრიული საავადმყოფო, ფსიქონეროლოგიური დისანსერი) მეთვადყურების ქვეშ.

**პაპომირმა** - папумрия (ბერძნ. pachy - გასქელება, ანაგ. cyrus - ხეული). თავის ტენახს ხვეულებს ბათოლოგიური გასქელება და ვადობა.

**პაპონინებობი** - папонини ( ანაგ. monia - გარსი, ბერძნ. - tis - ანთება). თავის და (ან) ზურგის ტენახს შავარი განახს ანთება. პ-ის სხედასხვა სახეები განსხვავდება დოკალისკით (სარნალური, ცერხარული და სხვ.), კტოლოგით (სოფლასური, გუნერეოლოგიური და სხვ.), მორფოლოგიური ნიშნების მიხედვით (ფიბროზული და სხვ.).

**პედრასტი** - педраст (ბერძნ. paidarastes). მკვდრატხის, მამაკეთა პოზიციუალმისმათეის დამახასიათებელი თვისებების მქონე პარი. არმვერე მს აქტორის (პელიკატორი) და მახორის (ანდროვილი, კინელონი, ჰაითიკესი). პედრასტიის აქტორი ფორმა თანდაულოდა (იხ. ტრამპს მანდრელო პრეპარატ პალმარება). სინონ: პანინი.

**პედრასტი** - педрастия მამაკეთა პოზიციუალმა. სინონ: პანინი.

**პედმატრომი** - пематра ақтуану მარტინოი მამაკეთა პოზიციუალმის დროს.

**პედმატრომი** - пематра იხ. პედრასტი.

**პედომილა** - педомия (ბერძნ. pais - ბავშვი, pelia - სიყვარული, ღლოლი). ხეჭუალური მარვერსახს ხახვ, სქესობრივი ღლოლია ბავშვებისადმი.

**პედომილა მრცობა** - педомия аномалия (Kraus-Ebner R., 1896). მარვერსახს ხახვ, ხეჭუალური ღლოლია მკვდრებისადმი. აღნიშნება ფსიქოპათორ ქორუნებებში, კუესუსტებში, ალკოლიმშით დაავადებულებში, ართიშიათად პრენტიფორი ასაკის მამაკეთებში, რომლებსაც მანამდე არ აღნიშნებოდათ გადახრა სქესუალურ ქევაში.

**პედომილატრომი** - педоматра (ბერძნ. pais - ბავშვი). იხ. მხმარება მარეპა.

**პიონის სმარცთი თაისი ტპონის უნდვანლო რანარული რანინი** - Пина синдром незначительного отравления поражения головного мозга (Payne R.S., 1966). იხ. სმარცთი თაისი ტპონის უნდვანლო რანარული რანინი.

**პილაზირა** - пелла (იგალ. pelle - კანი, ფრო. უხეში, ხორკლიანი). დაავადება, გამოწვეული ორგანიზმი B გრუვის ვიტამინების (რიბოფლავინი) და ნიკოტინის შეავს უმარსობით. ვლანება კანის, კვ-ნაწლავის ტრექტის დამიანებით, ფსიქიკური აბლოლით. იხ. მხმარება პალმარება.

**პელაზირა ტრამპს** - пелла ртуть იხ. ტრამპს პალმარება.

**პელიტენს-მარცაპანინის რაბბარება** - Пелитенс-Мерцахера болва (Pellicenus F., 1885; Merzbacher L., 1907).

ბროტრესხელი დეკადებისყოფილი მროკობა, სასიათება ნერველი ბოკოების დემილინიზაციით თავის გენში, განსაკუთრებით სორბინის სხელების და ნახსების მდამოში. დაავადება აგარებს ოუახანი-მემვიკიერებით ხასიათის (ავგოსომურ-რეესიული ფუნოგი ჰი) და გამოვლანება ოუახის რამდენიმე თაობაში. გამოყოფენ სამ ფორმას: 1. კლახატური (მარცაპანის ფორმა). იწყება სიციხლს პირველი თვეებში ან წლებში. გე პერია პირამიდული, ექსტრპირამიდული, სოკურ ნახების სმარცთი, კუესუსკობის მუდარებით წელი მამოყალიბება; 2. მატრულმარცთი (Seitelberger F., 1954). იწყება დაახლოებით 10 წლის ასაკში. დემილინიზაცია აგარებს გოგალურ ხასიათს. მიმდინარეობა უკრო არაკეთილსამებლო, სწრაფი, ვიდრე კლასიკური ფორმის დროს; 3. კრამ-ლეგენბერგება (Camp C.D., Löwenberg K., 1941). აღნიშნება მონრელებში, 30-40 წლის ასაკიდან, გრამდენითად ფსიქომური ეპიზოლებით. სინონ: მანდრელო მსტრამორცობა პანინი პალმარება.

**პენილინი** - пеницилин იხ. შვალკანი.

**პენილინი შერა** - пенилин к ртуть (ერმ. Penicillin). ფსიქოპალიზმა ქალის სქესუალობის და ამ უკანასკნელს დამკვეციის განსაზღვრული ვლენება უკოარულთა გოგინებს, სკოლარი ანაღმარული თვისებურების აღმოჩენასაც მათი სურვლია, პქონდეუ პენის (კატრაციუს კომპლექტი). მოგვანებით ოლი პოსტის სტადიაში ეს შერა ვლანება არა სხედასხვაგვარა ფორმის სურვლით: ოქონის პენის სკოლარ სხეული (უფელად გამოვლანება ბავშვის ყოლის სურვლით) და კოიკუსის დროს მიდის უნდის საბრუნება ხმარად მს რეპროსის ბათოლოგიურ და ხეჭუალმარცთულ ფორმებს.

**პენილილის დინდვანლო-პტორცობა მარეპა** - Пенцилин диндванло-аномалия аномалия (Penfield W., 1929). დასახსიათებელია ვეგეტატიური სიმომპატიის სტარბე: სახის გაწითლება ან გაფერმეთალება, ძლიერი ოფიანობა, ნერწყვის დენა, მთქმარება, გულსრეუ, შეტვისმავარი თავის კოიკული, გულსრევის ამქარება. შეიძლება განხილბოლდეს როგორც ვეგეტონის გუნარების განმარტა სინონ: მამარეპა მარეპა მარეპა.

**პენილილის სმარცთი** - Пенцилин аномалия (Penfield W.). ე.წ. მთვლებითი ანოგინება, ეთლესური ექვადენტის ფორმა. შეიძლება განხილბოლდეს როგორც ფსიქიკური ავგომიგამების ეპიზოლური გამოვლანება. აღნიშნება ბრავე-ჟერმონის ევალესიის დროს.

**პენილილის სმარცთი პალმარული პერა** - Пенцилин психонеглектуальная аномалия (Penfield W., 1929). იხ. პერა მხმარება მარეპა მარეპა.

**პერელმუტერის სმარცთი პარაპანინი** - Перельмуттер синдром парангина (Перельмуттер А.А., 1963). იხ. პარაპანინი. პარელმუტერის მეთოდი სერვისების მოწოდება - Перельмуттер метод обслуживания (Перельмуттер М.М., 1949). ფსიქიკომარცული მეთოდი, მთავრდება ან საუბარი უგარდება დროს მელიკანტური ძილის დემილინიზაციაში



ბ. ა. შსიმიტური დანაპარკის შემდგომ - ი. რ. ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ ЗНАКОМЫХИ. მწვეთ უსიქური დაიკალების ვალდებური გამოწვეული ბ. ა. (უვლადებში არ უკავშირდება გადატანილი დაიკალების სტრუქტურას). ამასიოთის სოკოანდური ურთიერთობების ვანდლებს, პასუხობს, ინტერესების შემდგომობა. თავისუფალი დროს აუაღმყოფი იყენებს არააქტიურად, გამოთქვამს იპოქორიული მივლებს. დსფორიულა, აუქტურად დაბადლური.

ბ. ა. შსიმიტური - ი. რ. შსიმიტური. დამახასიათებელი სოკოანდური და სხვა კონტაქტისაგან განირდება. ინდივიდი ამჟღავნებს უანგამიას, განმარგობებს და თვითდაკურვებს. გრძობების გამოხატვის და ხანმოკლეების განცდის უნარი დაქვეითებულია.

ბ. ა. შსიმიტური - ი. რ. С. ТРЕВОЖИ. ხასიათდება შიშის და დაბადებულის შეგრძნებით, მდგომარეობის არასამდობლობის განცდით, მისწრაფებით, აყოს ყველანაირი შიშისგან, შემგრძობლობით უარზე და კრიტიკაზე, შეზღუდული შედეგობობით და მოსალოდნელი ხაზობის გამოვლენისკენ მიდრეკილებით.  
პეტარისის პარანოიკული დეპრესია - Петера параноидная депрессия (Peters U.H., 1967). იხ. დანართი პარანოიკული პეტარისის შესაძლო შემთხვევები - Петера параноидная депрессия (Peters U.H., 1969). იხ. პეტარ-სინდრომი შესაძლო შემთხვევები.

პეტარობა - Петар (ანგლ. peeing). არგამის მიღწევა ერთგული წინების ხელოვნური გადაზნებთ ორმხრივი კონტაქტის პარობებში, რაც გამოიყენებს გენიტალურის ურთიერთობებს (მათაჩიკო F.C., 1976).  
პეტარობის სინდრომი - Петаров синдром (Petrlowitsch N., 1970). იხ. სინდრომი შესაძლოების.

პეტარობის ტარობა - Петаров тарობ (Pözel O.), ხანდაზნა, ხასიათდება ერთ თვალში წინების არსებობით და პარეტეზებით (სხეულე წარსინდრული მარჯვ მარჯვ ადინიზება მიკრობირთული დაიკალების დროს და შეიძლება მუთათიქუსს თავის გარის სისხლის მიმოქცევის გარდაზნად მიზღას მიწინა საბილე არტრის უბნი მივლედობის დარღვევის მიხრის).

პეტარობის სინდრომი - Петаров синдром (Pözel O., 1919). ხასიათდება ლიგნარდური სიბრბეით (აღექსია), ფერების გურჩეულობით (ფერების აგნობია) და მხედლებლის ევლის შევიწროებით. აღინიშნება თავის გუნის ორგანული დამიანების დროს ლოკალიზაციით ლიმინაგური ქეზისფეროს ენის ხეულში.

პეტარობის სინდრომი - Петаров синдром (Pözel O., Boff H., 1937). აგნობია ხახვებზე აუაღმყოფი არტეის მოსაუბრის სახეს, მაგრამ აღქმის დროს კარგებს ინაგნობობის გრძობის. აღამიანთ სახეები მესხირებთ არ აღდება. აღინიშნება თავის გუნის მარჯვ პეზისფეროს ორგანული დამიანების დროს.

პეტარობის სინდრომი შესაძლო რეპროდუციბილიტა - Петаров синдром инактивности (Петаров И.Н., 1975) მოივებს ნარკობის პარეულ, დაგნოსტიკურ მნიშვნელოვან ნიშნებს - ნარკოტიკული სიუვლებების მიხატარებას, ტარებატობას, ორბას ფორმას შეიქვლა და დაქვითა რეპროდუციბილიტა გაქრთბა მელმორების დროს. აუცილებლად აღინიშნება ნარკობის ნებისმიერი ფორმის კლინიკაში უსიქური და ფიზიკური დამოკიდებულების სინდრომებთან ერთად.

პეტარობის სინდრომი - Петаров синдром (Pözel O., Boff H., 1937). აგნობია ხახვებზე აუაღმყოფი არტეის მოსაუბრის სახეს, მაგრამ აღქმის დროს კარგებს ინაგნობობის გრძობის. აღამიანთ სახეები მესხირებთ არ აღდება. აღინიშნება თავის გუნის მარჯვ პეზისფეროს ორგანული დამიანების დროს.

პეტარობის სინდრომი შესაძლო რეპროდუციბილიტა - Петаров синдром инактивности (Петаров И.Н., 1975) მოივებს ნარკობის პარეულ, დაგნოსტიკურ მნიშვნელოვან ნიშნებს - ნარკოტიკული სიუვლებების მიხატარებას, ტარებატობას, ორბას ფორმას შეიქვლა და დაქვითა რეპროდუციბილიტა გაქრთბა მელმორების დროს. აუცილებლად აღინიშნება ნარკობის ნებისმიერი ფორმის კლინიკაში უსიქური და ფიზიკური დამოკიდებულების სინდრომებთან ერთად.

პეტარობის სინდრომი შესაძლო რეპროდუციბილიტა - Петаров синдром инактивности (Петаров И.Н., 1975) მოივებს ნარკობის პარეულ, დაგნოსტიკურ მნიშვნელოვან ნიშნებს - ნარკოტიკული სიუვლებების მიხატარებას, ტარებატობას, ორბას ფორმას შეიქვლა და დაქვითა რეპროდუციბილიტა გაქრთბა მელმორების დროს. აუცილებლად აღინიშნება ნარკობის ნებისმიერი ფორმის კლინიკაში უსიქური და ფიზიკური დამოკიდებულების სინდრომებთან ერთად.

პეტარობის სინდრომი შესაძლო რეპროდუციბილიტა - Петаров синдром инактивности (Петаров И.Н., 1975) მოივებს ნარკობის პარეულ, დაგნოსტიკურ მნიშვნელოვან ნიშნებს - ნარკოტიკული სიუვლებების მიხატარებას, ტარებატობას, ორბას ფორმას შეიქვლა და დაქვითა რეპროდუციბილიტა გაქრთბა მელმორების დროს. აუცილებლად აღინიშნება ნარკობის ნებისმიერი ფორმის კლინიკაში უსიქური და ფიზიკური დამოკიდებულების სინდრომებთან ერთად.

პეტარობის სინდრომი შესაძლო რეპროდუციბილიტა - Петаров синдром инактивности (Петаров И.Н., 1975) მოივებს ნარკობის პარეულ, დაგნოსტიკურ მნიშვნელოვან ნიშნებს - ნარკოტიკული სიუვლებების მიხატარებას, ტარებატობას, ორბას ფორმას შეიქვლა და დაქვითა რეპროდუციბილიტა გაქრთბა მელმორების დროს. აუცილებლად აღინიშნება ნარკობის ნებისმიერი ფორმის კლინიკაში უსიქური და ფიზიკური დამოკიდებულების სინდრომებთან ერთად.

პეტარობის სინდრომი შესაძლო რეპროდუციბილიტა - Петаров синдром инактивности (Петаров И.Н., 1975) მოივებს ნარკობის პარეულ, დაგნოსტიკურ მნიშვნელოვან ნიშნებს - ნარკოტიკული სიუვლებების მიხატარებას, ტარებატობას, ორბას ფორმას შეიქვლა და დაქვითა რეპროდუციბილიტა გაქრთბა მელმორების დროს. აუცილებლად აღინიშნება ნარკობის ნებისმიერი ფორმის კლინიკაში უსიქური და ფიზიკური დამოკიდებულების სინდრომებთან ერთად.

პეტარობის სინდრომი შესაძლო რეპროდუციბილიტა - Петаров синдром инактивности (Петаров И.Н., 1975) მოივებს ნარკობის პარეულ, დაგნოსტიკურ მნიშვნელოვან ნიშნებს - ნარკოტიკული სიუვლებების მიხატარებას, ტარებატობას, ორბას ფორმას შეიქვლა და დაქვითა რეპროდუციბილიტა გაქრთბა მელმორების დროს. აუცილებლად აღინიშნება ნარკობის ნებისმიერი ფორმის კლინიკაში უსიქური და ფიზიკური დამოკიდებულების სინდრომებთან ერთად.

პეტარობის სინდრომი შესაძლო რეპროდუციბილიტა - Петаров синдром инактивности (Петаров И.Н., 1975) მოივებს ნარკობის პარეულ, დაგნოსტიკურ მნიშვნელოვან ნიშნებს - ნარკოტიკული სიუვლებების მიხატარებას, ტარებატობას, ორბას ფორმას შეიქვლა და დაქვითა რეპროდუციბილიტა გაქრთბა მელმორების დროს. აუცილებლად აღინიშნება ნარკობის ნებისმიერი ფორმის კლინიკაში უსიქური და ფიზიკური დამოკიდებულების სინდრომებთან ერთად.

პეტარობის სინდრომი შესაძლო რეპროდუციბილიტა - Петаров синдром инактивности (Петаров И.Н., 1975) მოივებს ნარკობის პარეულ, დაგნოსტიკურ მნიშვნელოვან ნიშნებს - ნარკოტიკული სიუვლებების მიხატარებას, ტარებატობას, ორბას ფორმას შეიქვლა და დაქვითა რეპროდუციბილიტა გაქრთბა მელმორების დროს. აუცილებლად აღინიშნება ნარკობის ნებისმიერი ფორმის კლინიკაში უსიქური და ფიზიკური დამოკიდებულების სინდრომებთან ერთად.

3030 - მოც. 1. ექსტრემუზის წრეგლია 2. 10-75 მმ და 10-50 მკე ამხლიგელის გაღლა ევებზე. ვებებზეა ერთეული და მრავლობითი არარეგულარული და რთული ერთ- და ორფაზიანი დადებითი და უარყოფითი პოლარობის 2 პიკის პარაქორპანგონიზმა - Пика аутостроения (Pick A., 1908). იხ. პატრტაზაბნეშა.

3031 მისი მკაპრებმა - Пика ნილოსი (Pick A., 1892). დააფაგება მრავალწლოვანი დემფტისა და ვუგოლან, გამოწვეული თაოს გინის აგროფითი. დაკალებების დასაწყისი ხასიათდება ან ფსევდოპარაბოტური სინდრომით, ან ასინგანობით. აღორვე უაღრესად და სწრაფ პროგრესირებას განიცდის ღრმა გლობალური ჰეპატოსის. მეტაბოლების რეკუქსია, სპილენძი, დასაწყისში მიტოგრაფიული, შემდგომში ჰემობარიტი ექოლალია. დაშლისათვის დამოკიდებულია დიფერენციალური სიმპტომები (იხ. სიმპტომები მრავალწლოვანი მრავალფაზიანი პარაქორპანგონიზმა). გამოსავალ მდგომარეობაში ფიზიკური და ფსიქიკური მარაგში, გოდაული ჰეპატოსისა. კროვანი სიმპტომები აღმოჩენილია პროექსის ლოკალიზაციაზე (შეზღის ან საფეთქლის ვარანტი). საფეთქლის ვარანტის დროს მეტაბოლების, ენოსისის, პრექსისის და რადიკული მუცევაგონებს ასეთივეს ალკაიმურის დაეალებების დროს. პათოლოგანაგომურად - თავის გინის ნივთიერების, განსაკუთრებით შებლის წილების აგროფია, შიგა ჰიდროფუვალის. პათოლოგიურად - ნერული უარყოფის, ძირითადად ქერის ზედა შრის აგროფია: გლიოზი, არტენოფილიური მარცვლოვანება. არ აღინიშნება სენილური ფოლადები და ნეიროფიბროზის ალკაიმურული გადატარება. არსებობს მონაცემები მეტკიდრეობის ავტოსომურ-დომინანტური გიპის შესახებ (Schenk V., 1959).

3032 მისი მკაპრებმა - Пика ავოსია (Pick A., 1902, 1924). იხ. მკაპრებმა.

3033 მისი მკაპრებმა - Пика перестройки атракции (Pick A., 1906). იხ. პატრტაზა მრავალწლოვანი პარაქორპანგონიზმა.

3034 მისი მკაპრებმა - Пика рецессивной наследственности (Pick A., 1901). იხ. პატრტაზა მრავალწლოვანი პარაქორპანგონიზმა.

3035 მისი მკაპრებმა - Пика септис (Pick A., 1902, 1904, 1917): 1. თავისუფალი ანტიდროზის დადგენა მოხუცებულობით ჰეპატოსის დროს. ავადმყოფები დროდადრო ვერ ხედავენ ნარეგულ საგნებს, მაგრამ იწყებენ მათ დასახვის მაშინ, როცა ურადიკალი გადაიგნება ამ საგნების სხვა ანალიზატორზე მოქმედებით, შიგა ანტიდროზი ვერ ხედავს ანტიდროზი სანთი, ხანამ მისგან მოხვედრის სითბოს არ შეიგრძნობს; 2. ანტიდროზის დადგენა სიმპტომი - იმპუტარია "მე" დაეარტება შედეგისმაგვარად აღმოცენებული შიშა ავადმყოფს ორიენტაცია მენტარულიად აქვს, ცნობიერება ნათელია, მაგრამ ამტკიცებს, რომ საუბრობს არა საკუთარი ხმით, აღარ აქვს გინი. სიმპტომი განხილვის რორტორე ეპილეფსიური გუყურის ექვივალენტი. ახლოსა გურგინის მიერ აღწერილ გამაყოფებელ მდგომარეობასთან; 3. სიმპტომი, რომელიც გამოვლინდება მოხუცებულობით ჰეპატოსის დასაწყის ხაყის სტადიაში. საუბრისას, როცა შემთხვევით ხდება ერთი სიტყვის შევიდა მერეთი (გერმანული პარაფაზია), ავადმყოფი შედომის გამოსწორების ნაცულად, ცდილობს შიშნაბოს ამ სიტყვას სიტყვის შესაგვიის გამოყენება და, ამით დასაბუთოს მისი სისწორე. შიგა, ამტკიცებს (შამის ნაცულად) მე გამარადია, შემდგომში შედომის გასაზრთლებლად იგი აბობნის: «შედეგზე მე გაყვეთ ახალგაზრდა, ამიგომ მას მოუწია ჩემი აღზრდა».

3036 მისი მკაპრებმა - Пика септис (Pick A., 1909). მდგომარეობით ამტკიცებდა ტექტორფიფიბროზის ერთად თავის გინის IV პარკეტის ძირის დაზიანების დროს. ავადმყოფები ამტკიცებენ, რომ «ხედავენ კედლის მიღამს, ოთახის კედლები მოძრაობს, იხრება და გადაადგილდება. ავადმყოფი «ხედავს» გარშემოცოფები როგორ გაღიან კედლებში. ამ დროს არათავიდად აღინიშნება დალოპა და წინაგამბ. პალეინაბური განსაზრების კრიტიკული დამოკიდებულება არ აღინიშნება. განხილვის რორტორე წონასწორობის (ეესტაბლიშმენტი) პალეინაბურის გამოვლინება, რომელიც აღმოცენდება მდგომარეობით და ეესტაბლიშმენტებს შორის შეუსაბამობისთან დაკავშირებით (Ушакон Г.К., 1976). სინონ: მკაპრებმა.

3037 მისი მკაპრებმა - Пика септисის პარაქორპანგონიზმის შემრქანება - Пика фантомн ощущения отчуждения конкретности (Pick A., 1915). სხეულის რეალური არსებული ნაწილების გაქრობის შეგრძნება. სხეულს სჭეპს აშლი. საწარმადლეკო ამტკიცებულების ფანტომისა (ანუ ატური ფანტომის). ცხედება ეპილეფსიის დროს.

3038 მისი მკაპრებმა - Пика-ფანტომიკა ტიპის სიმპტომები - Пика-фантомничека типн отчуждения конкретности (Pick A., 1882; Heilbronner K., 1907). იხ. დაშლის შემრქანება.

3039 მისი მკაპრებმა - Пика-Хелд-Шилдера комплексн отчуждения тела (Pick A., 1908, 1915; Head H., 1911; Schilder P., 1923). აბამიანის მიერ საკუთარ სხეულზე წარმოდგენათა სისგნის შექმნა, ემყარება თავის გინში ანტიტორე და პრინციპალურ სიგნალებს ატკიცებს, აგრეთვე სხვა დამაბნია სხეულის ავტობილბაზე დაეკორექტებს. ამდაგვარი მოხამრებები გამოთქმული იყო გერნაკეს (Wernicke C., 1894) მიერ, რომელიც აღნიშნავდა სხეულის სხვადასხვა ნაწილებზე წარმოდგენის სიგნალების პროექსიას დიდი გინის ქერის განსაკუთრებულ ქერებში. კლინიკში დაიგნოსტური მნიშვნელობა აქვს სხეულის სქემის აშლი.

3040 მისი მკაპრებმა - пиктозния (ბერბ. pycnos - ხშირი, lepsis - შეგება) (Friedman M., 1906). დააფაგება, ჩვეულებრივ, იწყება 4-10 წლის ასაკში და ხასიათდება მრავლობითი (15-დან რამდენიმე ასულამდე დღეში) და ხანმოკლე (2-30 წმ) აბსანის გიპის გულყრებით. ზოგჯერ ჰეპატოგულ პერიოდში ხდება ულყურების შეწყვეტა და დგება პრაქტიკული გამოყანბილება ფოტოკური დეფექტის ნიშნების გარეშე. უზრავალი შემთხვევაში წარმოადგენს გენერალიზებული ეპილეფსიის მემდინარეობის ევას. ამ შემთხვევებში მართებულია გერმინის «მაკრომულტუგზა» გამოყენება. ევებზე ელინდება გიპირ აბსანსები პიკტოზის კომპლექსით (სიმირე 3 რებე წმ-ში).

3041 მისი მკაპრებმა - пиктозния (ბერბ. pycno - მჭარე, easas - ეგმოება). გეოგნება მერნობლებს გაუკვმარობებს ხახე. პარმი მჭარე გეოს აღმოცენება შესაბამისი გამდინინგლის არარსებობის დროს.

3042 მისი მკაპრებმა - пиктозния (ბერბ. piktus - დახატული, ფრათა - ჩანაწერი, ნაბავი). იხ. მერტობი ლეზიას მერტობი პიკტობი.

3043 მისი მკაპრებმა - Пиктофа тест проективных рисунков (Pickford R.W., 1963). ფსიქოლოგიური შთოდება. იყენებს ნაბავების 20 სერის. თითოეული სერია შედგება 6 სურათისგან, რომლებზეც მოხატულია ხავეები გარკვეულ ცხოვერებისეულ სიტუაციებში. გამოიყენება ოქანში, სკოლაში, თანდასობის ე.წ. კლასიკური უროფრობობა თავისებურების გამოსკველვად.

3044 მისი მკაპრებმა - Пиктозния (Pick P., 1793). ფსიქური ავადმყოფობის დამოკიდებულების ძირული შეცვლა.

დასრულებს შეთქმულებას არასდროს, ესეცაგრეთს სადაცდროსი პრაქტიკაში შრომითი თერაპიის დახურვის რეკომენდაცია. **პინტერ-პუტერსონის (1919) არაპრაქტიკული პრაქტიკა** - Пинтер-Путерсона небрежность школы (Pintner R., Putersson D., 1919). ფსიქოლოგიური შეთქმულება, შედეგად 15 არავერხაღერი მეთოდისაგან (სუბტესტი). შთოვლებულია შედეგების და სწავლის დანიანების მქონე პირთა ინტელექტუალური ღირის გამოსკვლევა, აგრეთვე მათთვის, ვინც არ იყის ინტელსურა ენა. გამოიყენება 15 წელზე მეტი ასაკის პირთა ფსიქოლოგიური გამოკვლევებისათვის.

**პირამიდული ტარმული** - перапирамиды (გერმ. Urvordmung). ფსიქოანალიზში: ფრადის მიხედვით, წარმოადგენს გამოდგენის პირველი ეტაპი აღნაზნული პროცესის შედეგად წარმოიშობა ანაქსობიური წარმოადგენის გარეგანი რაოდენობა. გამოდგენის შემდგომ პროცესებში ისინი გველდება ბირთვად და მონაწილეებად და მიიზღადეს შუაში ინსტანციებიდან ჩამოცილებული განდევნილი წარმოადგენის შინაარსს.

**პირამიდული სტრუქტურა** - перапирамида (გერმ. Urszene). ფსიქოანალიზში: ბავშვის მიერ აღნაზნული ან წარმოადგენილი შრომობლები შორის სექსუალური დამოკიდებულების სტრუქტურაზე, ბავშვი მას განიხილავს როგორც ძალადობის გამის მხრიდან.

**პირამიდული უნდატრუქტურა** - перапирамиды (გერმ. Urvordnung). ფსიქოანალიზში: გიური ფანტატიური სტრუქტურები (შედეგად უნდატრუქტურები, პირველი სტრუქტურა, კასტრუქტურა, შედეგად), რომლებიც, ფსიქოანალიზის მიხედვით, სუბიექტის პირადი გამოკვლევის მიხედვებზე, შთაინახობაში აყალიბებს მის შემდგომ ცხოვრებას. მათი უნდატრუქტურა აისხნება იმით, რომ ისინი ფელექტურად გადაეცემა შემკვიდრებაში.

**პირამიდული** - перапирамида ინტელექტის მუარის სოციალური შინაგონების და საზოგადოებრივების განპირობების მიხედვით კომპლექსი. 1. - ეს არის ადამიანი შთაინახობაში, თავისი ცხოვრებით და თვითშეცნობით. 2. ფორმირდება და ვითარდება შირო- და შიქროსოციალური გარემოს გავლენით და, ინტელექტუალურ-გვეტეკური თვისებებების გათვალისწინებით, წარმოადგენს მის ნაყოფს. იხ. *Устав Норм*.

**პ. რუსტრონი** - რუსტრონი (გერმ. dts - ფუნქციის დარღვევა, შეუთანხმებლობა, სინთა- დაძახულობა) (Bostrom A.). ცნება ანალიტიკურია შინაგონური პარტენებების და საწინააღმდეგო-სინტონური პარტენებებისა.

**პ. რუსტრონი** - რუსტრონი (გერმ. dts - რუსტრონი) - რუსტრონი (გერმ. dts - რუსტრონი) - რუსტრონი (გერმ. dts - რუსტრონი).

**პ. რუსტრონი** - რუსტრონი (გერმ. dts - რუსტრონი) - რუსტრონი (გერმ. dts - რუსტრონი) - რუსტრონი (გერმ. dts - რუსტრონი).

**პირამიდული ანალიტიკური** - перапирамиды (გერმ. dts - რუსტრონი) - რუსტრონი (გერმ. dts - რუსტრონი).

**პირამიდული ანალიტიკური** - перапирамиды (გერმ. dts - რუსტრონი) - რუსტრონი (გერმ. dts - რუსტრონი). **მეტოფორა**, ადოქსენიზმი შინაგონური ცხოვრებისეული ცვლილებების და სტრესული სიტუაციის გამო (ახლოდის სოციალური, შიქროსოციალური, დროსოციალური, სოციალური და სხვა), საშაბრიდან დათხოვნა და სხვა) და ანტიდების მის სოციალურ ურთიერთობებს და საწინააღმდეგო. ადატაციურ დარღვევებზე შინაგონური გავლენის ახდენს ხასიათის ინდივიდუალური თვისებებზე და მზადყოფნა. კლინიკურად გამოვლინდება: დეპრესიით, შოთიით და (ან) წყნადით, ანტიდული გახედვით, რომ უძლებს, გადაჭრის პრობლემა, დავდგომის მოთხოვნა, ან შიშით, დარჩენს ამ სოციალურ სიტუაციაში. შინაგონებზე ამ შემთხვევებში ხშირად ქვევითი ანალიტიკური. სინთა-დაძახულობაში **პ. რუსტრონი** - რუსტრონი (გერმ. dts - რუსტრონი).

**პირამიდული ანალიტიკური** - перапирамиды (გერმ. dts - რუსტრონი) - რუსტრონი (გერმ. dts - რუსტრონი). **პირამიდული ანალიტიკური** - перапирамиды (გერმ. dts - რუსტრონი) - რუსტრონი (გერმ. dts - რუსტრონი).

**პირამიდული ანალიტიკური** - перапирамиды (გერმ. dts - რუსტრონი) - რუსტრონი (გერმ. dts - რუსტრონი). **პირამიდული ანალიტიკური** - перапирамиды (გერმ. dts - რუსტრონი) - რუსტრონი (გერმ. dts - რუსტრონი).

**პირამიდული ანალიტიკური** - перапирамиды (გერმ. dts - რუსტრონი) - რუსტრონი (გერმ. dts - რუსტრონი). **პირამიდული ანალიტიკური** - перапирамиды (გერმ. dts - რუსტრონი) - რუსტრონი (გერმ. dts - რუსტრონი).

**პირამიდული ანალიტიკური** - перапирамиды (გერმ. dts - რუსტრონი) - რუსტრონი (გერმ. dts - რუსტრონი). **პირამიდული ანალიტიკური** - перапирамиды (გერმ. dts - რუსტრონი) - რუსტრონი (გერმ. dts - რუსტრონი).



გამოვლენილი წამყვანი ხასიათობრივი თვისებები აყალიბებს შესაბამის ფსიქოპათიას. **განუწყობილი** მიხედვით, ჩნდება პირველი დეკომპენსაციები და ეპსოლეზი. **პ.პ.გ.** ახლოსაა ბავშვთა ფსიქიატრიაში აღწერილ (**Котляра Е.В.**, 1968) პიროვნების ფსიქოგენურ პათოლოგიურ ფორმირებასთან და წარმოადგენს მის ერთ-ერთ უარიანეს. არასასურველი ფაქტორების მებრძოლებით შექმნილ ღინამიკურ დარღვევებს ბავშვებსა და მოზარდებს შორის გააჩნია ხასიათის და შილიანობაში პიროვნების შეგნაკლებად მყარი პათოლოგიური ცვლილებებისადმი გადასვლის გენდენსია. **მოზარდებში** **პ.პ.გ.**-ს განსაკუთრებით, ბავშვებსა და მოზარდებში პიროვნების პათოლოგიურ ჩამოყალიბებას საფუძვლედ უღებს არა უკვე ფორმირებული პიროვნული პათოლოგიური ტერები, არამედ მოუწიებელი პიროვნების ცვლილება პათოლოგიური მიზართაღებთ.

**პ. ბ. პირანტოლი** - **р. а. ПИРАНТОЛО** ბავშვების პათოლოგიური განვითარების ერთ-ერთი ფორმა. ბერი თავდაპირველად შეიღრებელია, მშვეტე - პარანოიული. უეითარდებით ფსიქოპათიურ პიროვნებას ლაპარაკია კონსტიტუციურ განვითარებაში, რომელიც სიკუთაცურისგან (პოსტრეპტული ან ფსიქოგენური) განსხვავდება რაიმე ხაგანგებო გამოძინიანების ნაკლები მნიშვნელობით. პათოლოგიური ღინამიკა, პირველ რიგში, განპირობებულია მინაგანი წინაგანწყობით, ხოლო ფსიქოგენური მოზინგება იბნის უმნიშვნელო, ყოფით გავლენას. **პ.პ.გ.** უმეტესად აღენიშნება პარანოიადური წრის პიროვნებებში, თუქა, აღინიშნება მიმოდური ფსიქოპათიის, ფსიქოსთენიის ღრის და ეპიდეუსიიიიიი.

**პ. ბ. პირანტოლი** - **р. а. ПИРАНТОЛО** ბავშვების ფსიქოგენური განვითარების გარდასტო (იხ. **პირანტოლი - შილანტოლი** **მარტინოვი** **მარტინოვი** **მარტინოვი**). პიროვნების ფსიქოპათიური სტრუქტურა ყალიბდება განხანგრძლივებული რეაქტიული მდგომარეობის შედეგად, განსაკუთრებით მისი რეაქტიული გიითი მიმდინარეობის ღრის მასიური ფსიქოგენური გრავიდაციისი პირობებში. გურავებს და განდკადან (**Урбан В.А.**, **Гилманов Е.Л.**, 1980) მიხედვით, გიკური ღინამიკა; რეაქტიული მდგომარეობა, უარყოფითად შეფერილი ღრინირებული წარმოდგენების გაღრმავება და გართულება, შეღრებული წარმოდგენების კომპლექსის შექმნა, ფსიქოპათიისმადგარი რეაქტივა, ფსიქოპათიური პიროვნული თავისებურებების გამოჩენა. ფსიქოპათიების ფორმირების ერთ-ერთი გმა.

**პ. ბ. შილანტოლი** - **р. а. ШИЛАНТОЛО** ბავშვების პათოლოგიური განვითარების ერთ-ერთი გარდასტო (პათოხასიათობრივი განვითარებისთან ერთად), იწვევს ფსიქოპათიების ჩამოყალიბებას; მიიტყვას პიროვნების ნეეროზულ და პოსტრეპტიული განვითარება.

**პიროვნების ღრინი** **ღრინი** **ღრინი** - **определенные свойства личности, обуславливающие ее отношение к действительности** და **индивидуально-личностные особенности**, ინტერესების შედეგად, მდგომარეობის მომირად გამოხატული შესუსტება, პიროვნების ინდივიდუალური თავისებურებების განსაზღვრა (მოგჯერ პირიქით, ხასიათის პრემორბიდიული ხანების გმკაცრება). ღინამისათვისებელი ძირითადი მორალურ-ეთიკური თვისებების (პიროვნების ხორცი) შეღრებითი მინარჩუნება. ცნება ახლოსაა **ღრინი** **ღრინი** **ღრინი**. განსაკუთრებით პიროვნების სტრუქტურის დარღვევისაგან. შეიძლება იყოს განვითარებად დადავლების სგადა, მატ, ცურებრული ათეროსკლეროზისა ან წარმოადგენს გადაადილი ფსიქოზის შედეგს.

**პიროვნების იმპლიციტი** **პიროვნების იმპლიციტი** - **имплицитная сторона личности** (ლათ. implicita - ნაგლეისმევი) 1) გეუნობიურული ვარაუდ პიროვნების ქვეყის და სტრუქტურის შესახებ; 2) წარმოდგენების ერთობლიობა პიროვნების ცალკეულ ხაგებს შორის კავშირის შესახებ, რომელიც ქმნის მოგად მთახველდებებს ადამიანს.

**პიროვნების მიმართობა** - **направленность личности** მყარი მოტივების ერთობლიობა, განპირობების პიროვნების მოღვაწეობის ორიენტორებას. ხასიათობა ინტერესებით, მიღრეკლებებით, ოგალებით, რომლებიც გამოხატავს პიროვნების მოღვაწეობის მიმართობას.

**პიროვნების სტრუქტურის მიმართობა** - **структура личности по Мерлау (Merleau P., 1967)**. არჩევს ინდივიდუალური თავისებურებების ორ ქუნეს 1) ინდივიდის თვისება (გემპერამენტე და ფსიქიკური პროცესების ინდივიდუალური თვისებრივი თავისებურებები); 2) ინდივიდუალობის თვისებები (მოტივები და დამოკიდებულებანი, ხასიათი, უნარი).

**პ. ბ. მიმართობის მიმართობა** - **с. л. по Мерау (Merleau P.H., 1967)** განიხილება დამოკიდებულებების ფსიქოლოგიის მოზიციადან (იხ. **მიმართობის მიმართობა** **ღრინი** **ღრინი** **ღრინი**) და მოიცავს 1) დამოკიდებულებების ხსტება; 2) ადამიანის ფსიქიკური ღრინი (აქტიურობის ანობობრივი ღრინი, ცინება, მუხსარობა, ყურადღების, აღქმის უნებციონობების ღრინი და ა.მ.); 3) ადამიანის რეაქტიურობის და განცდების ღრინი - აქტიურობა (მისი ხარისხი, გამოვლინების არე და სხვ) და რეაქტიურობა (მისი ხარისხი, აწვეული ან დღწვეული ემოციური აგმნებალობა, ნორმალური ან პათოლოგიური რეაქტიულობა, მათი გამოხატულების შეღრებითი ხარისხი); 4) ფსიქიკური თვისებების თანდაგრებას მთ ერთიანობაში (ფსიქიკის პროპორციული ან არპროპორციული თვისებები, ღრინირებული დამოკიდებულებები - ინტერესები, მოთხოვნები, არსებობა ან არარსებობა, ინტერ-სამოგაოლორება და სკუთხეობის შორის თანდაგრება: პარმონიულობა, პიროვნული მთლიანობა ან მისი მინაგანი წინააღმდეგობრობა, მისი სიღრმე).

**პ. ბ. პირანტოლი** **მიმართობის მიმართობა** - **с. л. по Пирантоло (Pirantolo K.H. 1953)** დამყარებულია პიროვნების ღინამიკური უნებციური სტრუქტურის კონკრეტულად არჩევს ოთხ ქვესტრუქტურას: I - უმარტესად სოციალურად განპირობებული უნებციური (მიმართულება, დამოკიდებულება, მორალური თვისებები); II - გამოვლილება (ყოღნა, უნარი, ჩვეულება); III - ფსიქიკური პროცესების ან ფსიქიკური უნებციურობის ინდივიდუალური თავისებურებები, როგორც ასახვის ფორმები (ემოციები, შეგრინებები, ანობრება, აღქმა, გრინობები, ნებულობა, მუხსარება); IV - ბიოლოგიურად განპირობებული უნებციური (გემპერამენტე და არარებული პათოლოგიური თავისებურებები) აღნიშნულ ქვესტრუქტურებში ერთება პიროვნების ყველა არსებულ ხაგებში, რომლებიც მისი სტრუქტურის ძირითადი ელემენტებია.

**პ. ბ. რანინტოლი** **მიმართობის მიმართობა** - **с. л. по Ринантоло (Rinantolo С.Л. 1946)** 1. მიმართობა (განწყობა, ინტერესები, მოთხოვნები); 2. უნარი; 3. გემპერამენტე და ხასიათი.

**პ. ბ. ურბანტოლი** **მიმართობის მიმართობა** - **с. л. по Урбан (Urbant S.)** გლამირული ფსიქიანალიზის ძირითადი კონცეფცია, შეგასოლოლოგიური მოღვლი. ემყარება ადამიანის მამობრებულ ორ ძირითად ღლეუას - სოციალულობადმი (სოციალური) და სეკულულობადმი, ნგრეუსადმი. პიროვნება წარმოადგენს საჩი სისტემით: **აგა** (**Id**), **აგა**

(Ego) და რე-ეგო (Super-Ego). «ეგო» არის თანდაყოლილი, ინსტინქტური, არაყნობიერის სფერო, ფსიქიკური ენერჯის წყარო. «სუპერ-ეგო» - ინსტანცია ადამიანის და რე-ეგოს შორის, ახორციელებს ადამიანს წამოსული იმპულსების, დღაღობის კონტროლს რე-ეგოში. რე-ეგო წარმოადგენს ბევრფობიან ათეისტულ გრადიულ დასკვნას და საზოგადოებრივ იდეალებს (ადეკვატურ).

**პროგრესიზმის ტიპი პრაქტიკაში** - **პროგრესიზმი** არის მათი პრაქტიკული მიზნების, დამახასიათებელი პრინციპული პიკეტის სინდრომი და დადებელი თვისებები: კეთილგანწყობა, ოპტიმიზმი, ფიქსირებული და ფსიქიკური აქტივობა, უზომო ჰუმანიზმი, პრაქტიკულობა, ცხოვრებაში წარმატებების მიღწევა. აღწერილია პეტერსის და რიეტის (Peters U.H., Rieger H., 1976) მიერ.

**პ. ტ. სენტრალური** - **სენტრალური** რ. ა. (ფრანგ. sentiment - გრძობა) (Peters U.H., 1984, 1987). დამახასიათებელია აწვეული ემოციურობა, აწვევების მიმდინარეობის დახილობა. პირობანდის ქვეყა, პირველ რიგში. განისაზღვრება ემოციებით. ხშირია ექსტაზის მდგომარეობა, სხვა აღმზიანების განცდების მწვევე მეგრძნება, ვაშობაგული ეშპითა. ჩვეულებრივ, ასეთი აღმზიანება სარგებლობენ გარემომყოფთა სიყვარულით. ასეთი გიჟის პრინციპული თვისებებები წინადაც უწინსვლევი მათოლოგით მიმდინარე უსიჭობების, ეკროლ, **მეშე** - **პროგრესიზმის მდგომარეობა** (იხ.) აღმოჩენებას.

**პ. ტ. პრაქტიკული** - **პრაქტიკული** რ. ა. (Peters U.H., 1976). გამოყოფენ მასთან დაკავშირებით, რომ რიგ შემთხვევებში დადგინდა კავშირი პრაქტიკულ და ენდოგენურ დაქრებას შტრუქებს შორის. მაკის მეტევის თან ასევე დაწვეული გუნება-განწყობა. პირველი ცვლილებები შეგახსნა მათეოლოგიური გიჟისა. აღწერილი პირები ხასიათდებიან წყნარებას და სიუფთაობის მიდრეკილებით, შრომისმოყვარეობით, პასუხისმგებლობით, პუნქტუალობით, სიმორცხვით, კეთილგანწყობით და ა.შ.

**პროგრესიზმის ფორმირების მდგომარეობა** - **პროგრესიზმი** (Kosules B.B., 1976). სხვადასხვა ფიქიკური დევეტის (შედეგობის და სმენის დაქეიბება, გულის მანკი და სხვ.) მეორე ბეშეებში პიროვნების მათოლოგიურ ფორმირების ეკროანგე. ამ შემთხვევაში უსიჭობებში წამყვანია განყოფილებული დევეტევი პიროვნების რეაქტია და ამასთან დაკავშირებული სოციალური დევეტევა ანუ თანაგობისგან იზოლაცია მათოლოგიურად შეუცდელი წინადაცის ფონზე - თავის განის რებელაქტორგანული მათოლოგია, წამორჩენა ფიქიკურ და სეექსუალურ განვითარებაში, სენსორული დევეტეები. ყვადობა უშეგესად პიროვნების შეკავებითი ეკროანგე ხასიათში ასთენური და ფსელოპაგისტური ხანებით, იშვიათად ისტროიდული და იპოქონდრიული ეკროანგეები.

**პროგრესიზმის ფორმირების მდგომარეობა** - **პროგრესიზმი** (Kosules B.B., 1976). ამ უგულის აშლოებებში მეოთხე განხორციელება სოციალური, რომელიც მოქმედ მომეტეში ინდივიდის რეალურ საფრთხის არ უქმნის. ინდივიდი ან თავს არიდებს, ან შიშის გრძობით უშეკავება ამ სოციალის. ხდება მეოთხის კონცენტრაცია ცალკეულ სიმპტომებზე, როგორცაა გეოქიკა და ან გულის ფსახელის მეგრძნება, რასაც თან სდევს სიკვდილის, თეთროგროლის დაქრების და სხვა სახის მეორეული მიშეხ. ამ მდგომარეობაში მოხედლის წარმოდგენა ეკროანგეში იწვევს მეოთხის აღმოჩენებას. ხშირად თან სდევს დევეტეა.

**პროგრესიზმის სისტემატიკური და მათეოლოგიური მდგომარეობა** - **პროგრესიზმი** (Kosules B.B., 1976). მათეოლოგია აშლოებებში. ამასთანავე განხორციელება ქვედა, არ გააჩნია გამოკვლილი რაციონალური შიოქიკა, არამართვადი და შიანი შიოქის როგორც ინდივიდისათვის, ასევე სხვათა ინტერესებისათვის. აკადემიკოსის განმარტებით, ქვეყები დაქვემდებარებული გარკვეული იმპულსების აღმოჩენებასთან. ელდება მათოლოგიურ ანარტული თანამების, პირობანის, კლექტანის, გეოქიკოლოგისათვის სახით.

**პროგრესიზმის ტაძარშია რჩენის მიხედვით** - **პროგრესიზმი** (Rogach H., 1920). ეჭყარება პრაქტიკულ, როგორც უსიჭობებში, ინტრო- და ექსტრავერსის გაქევის გამოყოფას. თუნცს მიხედვით, ინტროექსიული პიროვნების ბილი განისაზღვრება მისი საკუთარი შინაგანი ცხოვრებით, ექსტრავერსული პიროვნებისა - მისი ინტროექსიების ობიექტებით. თითოეულ ამ გაქეში არჩევენ მომაროვენ, ემოციურ, სენსორულ და ინტელექტურ ეკროანგებს. უფრო მოგვიდა სახით არჩევენ ექსტრო- და ინტროექტროსული რაციონალურ (მომაროვენ და ემოციურ) და ირაციონალურ (სენსორული და ინტელექტური) უსიჭობებში გაქევის. ექსტრო- და ინტროექსიის განსხვავების კრიტერიუმები ძირითადად დაიყვანება ამროქტების სუბექტურობაზე და ობიექტურობაზე (Levinson K., 1970). აიშტკო (Rogach H.J., 1964) ექსტრო- და ინტროექსიის უკავშირება ექსის აგენტების და შეკავების ხარისხს, ამ უქტროს განხილვად როგორც აგენტებს და შეკავების შორის ბადანს, რაც თანდაყოლილია. გაყორო ინტრო- და ექსტრავერსული პიროვნებები აიშტკო მეორე განხილვებში როგორც ურთიერთსამინდობევი პიროვნებები, კრიტერიუმის ნაპირები, რომლებსაც სხვადასხვა აღმზიანება ამა თუ ამ ხარისხით უახლოვებიან. აიშტკოს მიხედვით, ინტრო- და ექსტრავერსული პიროვნებების გათვლების საფუძველია მდგომარეობის მეორე გამოყოფილი უმაღლესი ნერეული მოქმედების გაქეშთან დადგენილი არ არის. დეკონაქტრო არ ეთანხმებილა აიშტკოს და თვლიდა, რომ არასწორია ინტრო- და ექსტრავერსიის უქტროსის დაქვემდებარება გეოქიკური მეგრძნების ხანებზე, და ამ ცნების განხილვად როგორც ხეკუთარი უსიჭობიკური სფერის, ამასთან, ექსტრავერსიული პიროვნებისათვის განმსაზღვრელი გაეუნა აქვს გარკნივების საშყარის, ინტროექსიული პიროვნებისათვის - წარმოადგენს საშყარის, ერთის წართვა ხდება მეგრძნება, მეორის - შიგნიანი. ექსტრავერსული პიროვნებაში მისი აქვმა, განცევა, ინტროექტროსი ძირითადად დაქვემდებარულია გარე საშყარისთან, ინტროექსიული პიროვნებაში ჰარხობის უსიჭობიკური პროექსების შიგა მაროტულობა.

**პროგრესიზმის ტაძარშია რჩენის მიხედვით** - **პროგრესიზმი** (Rogach H., 1921). ეჭყარება ფეკცლებ ტაძარს დაქვემდებარება რჩენის მიხედვით გამოკვლევის დროს გამოყოფილია პიროვნების ოთხი "განცდის გიჟი": 1) **ექსტრავერსიული** - გარეგანი; ინტროექტროსი უფროს მიხედვით სეპარობის კენსიუგურის, რიშელში უფროსად აღმზიანების მომაროება; 2) **ინტროექტროსიული** - კინესიუგური ინტროექტროსიული სეპარობის სასუბიკური უფროს მიხედვით; 3) **აიშტკო** - კინესიუგური და უფროდ ინტროექტროსიული წარმოდგენილია დიდი, მებრამ თანახარო რაოდენობით; 4) **შეხედვული** (კოარტული) - როგორც უფროს, ასევე კენსიუგური ინტროექტროსიული რაოდენობა მეორეა ამ სულ არასუბიკოს. ფეკცლებ ტაძარს კორელაციოშია ინტელექტის

გარკვეულ თვისებებთან, ხასიათის ხაზებთან, აუქტურობის თვისებებებთან და ფსიქიკური პათოლოგიის სახესთან. ინგროვერსიის ცნება **რორშახის** მიხედვით, განსხვავდება **თუნჯის** მიერ შემოღებული ცნებისაგან (იხ. **პროზოდია ტაძარაძის თანახმად**). ინგროვერსია, **თუნჯის** მიხედვით, არის მდგომარეობა, რორშახის მიხედვით - პროცესი. გარდა ამისა, რორშახის მიხედვით, ინგროვერსია არ უნიონსირდება ექსტრაგენისა. **ბლოლერი** (Bleuler E., 1929) აღნიშნავდა გარკვეულ თანაფარობას ინგროვერსია - ექსტრაგენსთან და ინგროვერსია და მიმოღერ რეაქციებს შორის, იგი მიუიითებდა, რომ გარემოების მიხედვით, ერთი და იგივე ადამიანს შეიძლება აღნიშნებოდეს სინგროვირი ან მიმოიღერი რეაქციები.

**პირიქიანობა** - **პირიქიანობა** (ბერძნ. pyr - ცეცხლი). თერაპიის ხაზებზე **ზოგადი დასახელება**, რაც მდგომარეობს სხეულის გეგმარაგების ხელოვნურ აწევაში (სულელომინთერაპია, მალარიათერაპია), სინონ- **მიქროპია პირიქიანობა**.

**პირიქიანობა** - **პირიქიანობა** (ბერძნ. legneie - ვენება). **სექსუალური პერვერსია**, რომლის დროსაც სქესობრივ აქტებს იწვევს ხანძრის დანახვა ან ცეცხლის გახალება.

**პირიქიანობა** - **პირიქიანობა** (ბერძნ. mania - ღვოლვა, ვენება). ცეცხლის გახალებისაში დაუძლეველი ღვოლვა.

**პირიქიანობა** **პალეოპროსტა** - **პროსტა** **პალეოპროსტა** (Pletzer, 1955). იხ. **პალეოპროსტა**.

**პიტატიზმი** - **პიტატიზმი** (ბერძნ. peitho - შთაგონება, iaios - განკურნება) (**შახინაძე** J., 1900). **სტერეოტიპული განახლება**.

**პიტატიზმი**, ე.ი. «**შთაგონებით განკურნება**» ქვემ იგულისხმება პათოლოგიური ფენომენები, რომლებიც გამოიწვევა თვითშთაგონებით და ასევე შთაგონებით წყდება. ამგვარად, ისტერიიდან გამომდინარეობდა ემოციური და რეაქტიური გენების პათოლოგიური მდგომარეობები, რომლებიც აღმოაჩინდა განსაკუთრებით დაკავშირებით ან კანის, ღორწოვანი ვარსების გაღიზიანებაზე სპასმოსურ ისტერიიდან გამომდინარეული იყო ხორხის შეშუპება, სისხლანა ხანკალი, შებღვლოის ელვის შეუწროება და ა.შ. ისტერიის გენებში ემოციებს შთაგონებებიდან დამატებითი უაქტორის როლს.

**პიტრის პიქსიანობა** **პიტრის** **პიტრის** - **პიტრის** **პიტრის** (Pitres A.). **შეხვედრის დარღვევის ხაზტიპია** **კომპლექსი**, აღწერილია ინგროვის დროს, დამახასიათებელია აქტის მოვლენების გადატანა წარსულში. ავადმყოფი თითქოს ცხოვრობს წარსულში, უკვლავში მის წარმოდგენაში წარსულს ეკუთვნის.

**პიტრის პიტრის** - **პიტრის** **პიტრის** **პიტრის**.

**პიტრის** **პიტრის** - **პიტრის** **პიტრის** **პიტრის**.

**პიტრის** **პიტრის** - **პიტრის** **პიტრის** (Pichon E.) იხ. **პიტრის**.

**პლანეტარული პიტრის** - **პლანეტარული** (ლათ. planetus - გასაგები, ნათელი, topos - ადგილი, ბერძნ. kinesis - მოძრაობა) (Marie P., Bouittier R., Bayley P.). **სტერეოტიპული დრამა** **დარღვევა**, სივრცითი აგრონია, ადგილის გეგმაში, რეაქტიური ინტენსივობის უკანონო იწვევს ნების მოძრაობების არასრულყოფილებას, მუქურელობას (Porot A., 1965).

**პლანეტარული პიტრის** **პიტრის** **პიტრის** - **პლანეტარული** **პიტრის** **პიტრის** (Платонов метод шашки для лечения шизофрении (Платонов К.И., 1930) ავადმყოფს შთაგონებებს სიხარს, რომელიც თავისი შინაარსით ალკოჰოლური თებაგის საწინააღმდეგო ან აკორეცირებს მას. ასეთი **საშუკრილო ხაზტიპული** რეაქცია შეესაძლებულია პიქსიანობის სუანის მომენტში ან პიტრის პიტრის შთაგონების სახით ხორციელდება უახლოეს ბუნებრივი ძილის დროს იმავე დამეს. რეაქტივდრეულია ალკოჰოლისაში ღვოლვის ნარჩენ მოვლენებზე მემორიზაციისთვის (Сенези Г.В., Сирин Г.С., 1965).

**პლანეტარული პიტრის** **პიტრის** **პიტრის** - **Платонов метод шашки для лечения шизофрении** (Платонов К.И., 1925). **ფსიქოთერაპიული მეთოდი**, მიმართული პიქსიანობის დამკავალმდგენი როლს გამოიყენება. ავადმყოფი ხალამის გადაცემა პიქსიანობაში, რომელიც თავისთავად გრძელდება ბუნებრივი ძილით. პიტრის პიტრის სუანის მდგომარეობა შესაძლებელია დამის ძილის გახანგრძლივება დილით გამოვლენებისამდე. პიქსიანობის ხანგრძლივობა დღეში 18-20 სთ. პიტრის პიტრის კურსი გრძელდება დაახლოებით ორი კვირა. დაღებითი შედეგები აღნიშნულია რეაქტიული მდგომარეობების, ფობიური ნევროზების, პიქსიანობის, წყლულოვანი დაავადების პიტრის პიტრის დროს. აღნიშნულ მეთოდთან ახლო რეაქტიული მეთოდი **გახანგრძლივებული პიტრის პიტრის**. (1953)

**პლანეტარული პიტრის** - **Платуа გასთათი** (Pletat F., 1913). იხ. **პლანეტარული პიტრის**.

**პლანეტარული** - **пашენი** (ლათ. pasheni - მოეწონებ, დავამყოფილებ). **ფარმაკოლოგიური ინტენსივობის ნივთიერება** გემოდა და ფერით პიტრის რაიმე სამკურნალო საშუალებას, გამოიყენება ახალი ფარმაკოლოგიური პრეპარატების გამოცდის დროს შთაგონებით და თვითშთაგონებით გამოწვეული ეფექტის გამოსარკუნად. იმპარტება ვეროთვე ფსიქოთერაპიაში და სამკურნალო საშუალებებით თერაპიაში არასასურველი პრეპარატების, მაგ. ნარკოტიკული საშუალებების შეყენის ნაცვლად. პლანეტარული თერაპიის დროს მიღებულ დაღებით ეფექტს უწოდებენ **“პლანეტარული ეფექტი”**. მისი საწინაარმდეგია **“სოციალური ეფექტი”** ანუ მოვლენა, როდესაც პლანეტარული თერაპიის დროს მიიღება საწინააღმდეგო, ვეროთითი ეფექტი.

**პლანეტარული პიტრის** **პიტრის** **პიტრის** - **Плетнев-Краснушкина шизофрения** (Плетнев Д.Д., 1927; Краснушкин Е.К., 1948). იხ. **პლანეტარული**.

**პლანეტარული ტიპი** **პიტრის** **პიტრის** - **Плотичера типология дефазий** (Плотичер А.И., 1964). დამყარებულია **კლანდესტინური ფსიქოპათოლოგიური კრატერული** პათოლოგიური თვისებებების გათვალისწინებით. შეიქმნა საკლანდესტინური ექვს მიმართულებას: **კლანდესტინური ხერათის მხედვით** - სტრესულ-პიქსიანობის, გორპილულ-სიქსიანობის, სიქსიანობის გიპი და გართულებული (ობსესიული, სენსიტივობითი, ბოლოვით) დეპრესიები; **აუქტიუმი** - **სტაბილურობის მხედვით** - მყარი და დაბალი გიპი; **აგადმეოლოგიის მხედვით** - სრული ნომოგენობა, ნაწილობრივი ნომოგენობა, ანომოგენობა, პიქსიანობის ნომოგენობა; **დაავადების მიღწევის მხედვით** - დეპრესია დაავადების მიწი. ან ბიპოლარული სტრესული; **მამდარეობის მხედვით** - ერთკერძიანი (ეპიპროსტი), ციკლური (ფაზური) და მრავალფაზიანი (როდესაც); **ცენტროლოგიური** - მხედვითი მრავალფაზიანი მხედვითი - სიქსიანობის, ინტენსივობის, სისხლმარეოვანი, მიმოფრინული, ციკლური, პიქსიანობის, ინტენსივობის, ალკოჰოლური. სამკურნალებული, სიქსიანობის, სტერეოტიპული, ფსიქოპათოლოგიური, სომატოგენური და შერეული გენებისა.





მოკონტების ("flashbacks") ან კომპარული სიმრეხის სახით, რომელიც ელინდება შეკუების ან ერთგვარი ემოციური სირღუნვის - აღამინებისაგან და გარე მოკონტებისგან განყალკეების, რეაქციის უკონტროლის ფონზე ამავე დროს სიბივიტი გაურბის იმ შექმობებს და სიგუაციებს, რომელიც აგონებს გრამებს. კლასიკაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკრავს ევგეტაგური ნერული სისტემის რეაქტიულობას, მიმის გამოავრებულ რეაქციას და ინსომნიას, დეპრესიულ და შროთითი მდგომარეობებს, სუიციდურ აზრებს. დატენური პერიოდი გრძელდება რამდენიმე ეპირიდან რამდენიმე თვემდე. მიმდინარეობა გააღისებურია. გამოსაბული უმეტეს შემთხვევაში კეთილსამილოა, მოგჯერ აღინიშნება ქრინიკული მიმდინარეობაში გაღასება და მყარი პიროვნული ცვლილებების ჩამოყალიბება. სინონ: ტრანსპლანტი მდგომარეობა.

**კოსტაინეროზი მიმდინარეობა** - постнатальная деградация психики. პაბინის მდგომარეობაში შეყოფის ბრძის მოქმედება, რაც ელინდება პიანონში შთავონებულ ქვეყნების რეალიზაციით პიანონში მდგომარეობიდან გამოსვლის შემდეგ. **კოსტაინეროზი** - постар (ლათ. postar). ღოთი, ალკოჰოლიზმი დაავადებული პირი.

**პრამატაბილიზმი** - прераматизация (ბერძნ. praxma - საქმე, მოქმედება, ნეთი, სავანი, & - უარყოფა, negatio - შესიერება). 1. აღერ მესრულებული მოქმედების აზნებია. 2. აზნებია, რომლის დროსაც იყარება ნაცნობი სათვის გარეგნული მესხედაობის შესახებ ცოდნა.

**პრამერ-მილის სინდრომი** - Прелер-Вилли синдром (Prader A., Willi H., 1956). დაბაბასათიებელი თღოთფრზნა და ცერქურული სხეულზე სახეზეა მეკორიან გამოხატული გონებრივი ჩამორჩენილობა, რაც შემთხვევებში აღინიშნება ასპირგინობა, რომლის ფონზე ეპილოდურად აღმოყენდება აგრესიული ავითქებები. სომატურად - დაბალი განი, რიკოპირია, პიპოგენიტალიზმი, კუნთების ასპიგინობა. არამივითად დაბაბასათიებელი დისლაბინიის ხამბი, რაც განპირობებს ავადმყოფის სისეიფური გარეგნობას - ღოთიქოთეობა, დეფორმირებული და ნორმისთან შედარებით ქვეყნი განლაგებული ყურის ნივარები, რიბილი ყურის ხრტილი, ნუბისებრი თვალის ნაპრალი, ეპიკანტი, პიპერტოლორიზმი, სტრაბიზმი, შიდალი სასა, ნალსებრი ფორმის პირი მოკლე მედა გუჩით, კბილები არასწორი შრდა. ბიქვებში აღინიშნება პიპოგენიტალიზმი, კრიატორქიზმი, გოტონებში - დედა და მყირე ასისრეუს ბავჯების განუვითარებლობა. პუერტატულ ასაკში არამივითად თან ერთვის დაბეგი, ეტოლოგია უცნობია, პათოგენეზში ღილი მნიშვნელობა ენიჭება პიპოთალამუს დაზიანებას.

**პრამიზმი** - праказ (ბერძნ. praxis - მოქმედება). მზანდაბებული მოქმედებებს, მოძრაობების წარმოების უნარი. მოქმედება და რეალიზაცია სხედასხვა ფორმებში ერთიანება აპარატისადა ცნებებში, გარდა ამისა, აპარატისადა დამოუკიდებელი ფორმის სახით მოკუთენება წრის დარღვევა ატრფია.

**პრამულიზმი** - прелузия (ლათ. pra - რაიმეზე წინ მდგომის) დელორიუმის ხაწყყის სტადია, ხსიათდება მოსუენობით, შოთივან-ღაორგუნული ეუნებაგანწყობით, მიშვით სადაშის სათაებში, უბილობით, ყურადღების დაქვეითებით, შიხი კონცენტრაციის განულებით და არამყრობით, ეუგეტაგური დარღვევებით. არამივითად, დროული მყურადლობის შემთხვევაში, სიკუთრივი დელირიუმის სიმკომბატიაკი არ ეთიარდება ან მოგჯერ მიმდინარეობს რეკუთრებულ სახით.

**პრამულიზმი დარღვევები** - прелузионные расстройства (ლათ. diligo, deleri - შიდალი შეუსება). ცალკეული ფსიქიური დაავადების ან შათი ჯგუფების ტიპობრივი დაბაბასათიებელი, თუშყა, არა მკაცრად სიყფიციური, პათოლოგიური გამოვლინებები.

**პრამული-მიონესტაზი** - Прелузия-ионезистаз (Predescu V., Jonescu C., 1976). იხ. რბნბუდა.

**პრამული სინდრომი** - Прелузия синдром (Predescu V.). იხ. რბნბუდა.

**პრამული** - прелузия (ლათ. praevia - გარეხილება). გამაგრბობლებული პრეფილაქტიკური, დაბცაყა. მაგ. პ. პიპიტილიზაცია, პ. სხეულაცა.

**პრამული სინდრომი** - Прелузия синдром (Prevoust). დაბცა და იგაღის კაკლებს მოქმედა დაზიანებას კერბ მზარეს (ავადმყოფი უყურებს სიკუთარ პათოლოგიურ ცერას) ინსულით გამოწყეული პემიპლევის დროს. სიმკომი შოთითებს სეირის ქერქელი ცენტრის (თავის გვიხის შუბლის სველის უკანა ნაწილი) დისფუნქციას.

**პრამიზმი** - прелузия. კომატობური მდგომარეობას ხაწყყის სტადია ცარუების, სოპორის სახით. გამილილი კომბატორი მდგომარეობისგან განსხვავებით, შენარუნებელი რეკუტურული რეაქციები ძლიერ მკაცრულად ბგერით და სინათლით გაღინიანებაზე. სინონ: პრამიზმი-სინდრომი.

**პრამიზმი-სინდრომი** - прелузия синдром (ლათ. praevia - გარეხილება). გამაგრბობლებული პრეფილაქტიკური, დაბცაყა. მაგ. პ. პიპიტილიზაცია, პ. სხეულაცა.

**პრამული-სინდრომი** - прелузия синдром (Prevoust). დაბცა და იგაღის კაკლებს მოქმედა დაზიანებას კერბ მზარეს (ავადმყოფი უყურებს სიკუთარ პათოლოგიურ ცერას) ინსულით გამოწყეული პემიპლევის დროს. სიმკომი შოთითებს სეირის ქერქელი ცენტრის (თავის გვიხის შუბლის სველის უკანა ნაწილი) დისფუნქციას.

**პრამული-სინდრომი** - прелузия синдром (Prevoust). დაბცა და იგაღის კაკლებს მოქმედა დაზიანებას კერბ მზარეს (ავადმყოფი უყურებს სიკუთარ პათოლოგიურ ცერას) ინსულით გამოწყეული პემიპლევის დროს. სიმკომი შოთითებს სეირის ქერქელი ცენტრის (თავის გვიხის შუბლის სველის უკანა ნაწილი) დისფუნქციას.

**პრამული-სინდრომი** - прелузия синдром (Prevoust). დაბცა და იგაღის კაკლებს მოქმედა დაზიანებას კერბ მზარეს (ავადმყოფი უყურებს სიკუთარ პათოლოგიურ ცერას) ინსულით გამოწყეული პემიპლევის დროს. სიმკომი შოთითებს სეირის ქერქელი ცენტრის (თავის გვიხის შუბლის სველის უკანა ნაწილი) დისფუნქციას.

**პრამული-სინდრომი** - прелузия синдром (Prevoust). დაბცა და იგაღის კაკლებს მოქმედა დაზიანებას კერბ მზარეს (ავადმყოფი უყურებს სიკუთარ პათოლოგიურ ცერას) ინსულით გამოწყეული პემიპლევის დროს. სიმკომი შოთითებს სეირის ქერქელი ცენტრის (თავის გვიხის შუბლის სველის უკანა ნაწილი) დისფუნქციას.

**პრამული-სინდრომი** - прелузия синдром (Prevoust). დაბცა და იგაღის კაკლებს მოქმედა დაზიანებას კერბ მზარეს (ავადმყოფი უყურებს სიკუთარ პათოლოგიურ ცერას) ინსულით გამოწყეული პემიპლევის დროს. სიმკომი შოთითებს სეირის ქერქელი ცენტრის (თავის გვიხის შუბლის სველის უკანა ნაწილი) დისფუნქციას.

**პრამული-სინდრომი** - прелузия синдром (Prevoust). დაბცა და იგაღის კაკლებს მოქმედა დაზიანებას კერბ მზარეს (ავადმყოფი უყურებს სიკუთარ პათოლოგიურ ცერას) ინსულით გამოწყეული პემიპლევის დროს. სიმკომი შოთითებს სეირის ქერქელი ცენტრის (თავის გვიხის შუბლის სველის უკანა ნაწილი) დისფუნქციას.

**პრამული-სინდრომი** - прелузия синдром (Prevoust). დაბცა და იგაღის კაკლებს მოქმედა დაზიანებას კერბ მზარეს (ავადმყოფი უყურებს სიკუთარ პათოლოგიურ ცერას) ინსულით გამოწყეული პემიპლევის დროს. სიმკომი შოთითებს სეირის ქერქელი ცენტრის (თავის გვიხის შუბლის სველის უკანა ნაწილი) დისფუნქციას.

**პრამული-სინდრომი** - прелузия синдром (Prevoust). დაბცა და იგაღის კაკლებს მოქმედა დაზიანებას კერბ მზარეს (ავადმყოფი უყურებს სიკუთარ პათოლოგიურ ცერას) ინსულით გამოწყეული პემიპლევის დროს. სიმკომი შოთითებს სეირის ქერქელი ცენტრის (თავის გვიხის შუბლის სველის უკანა ნაწილი) დისფუნქციას.

**პრამული-სინდრომი** - прелузия синдром (Prevoust). დაბცა და იგაღის კაკლებს მოქმედა დაზიანებას კერბ მზარეს (ავადმყოფი უყურებს სიკუთარ პათოლოგიურ ცერას) ინსულით გამოწყეული პემიპლევის დროს. სიმკომი შოთითებს სეირის ქერქელი ცენტრის (თავის გვიხის შუბლის სველის უკანა ნაწილი) დისფუნქციას.

შემოღებულია კალბაუმის (Kahlbaum K. 1863) მიერ, მაგრამ მისი შეხედულებით, იგი გამოირჩეოდა უფრო ფართო შინაარსით და შეესაბამებოდა თანამედროვე წარმოდგენას მოხუცებულობაში ტუკანუსტობის შესახებ.

**პრინციპული** - принципный ტერმინი გამოიყენება ხანმოკლე ასაკის რიგი ფსიქიკური დაავადებების აღსანიშნავად - პ. დენკვაბა, პ. ფსიქოპათია, პ. დემენცია.

**პრინციპული დემენცია** - пресенильная деменция со спастическими параличами. იხ. ურხხტბარ-დროუბ-ბრინშოლ-გაბაგველები დაპავლება.

**პრინციპული ფორმა** - принципальная форма სიმბრამატი - пресенильная форма семейного идиотизма со снотворит. იხ. ბრინტაბა აკამბრეზული პრინციპული.

**პრინციპული** - принципный (ლათ. senium - სიბერე). ასაკობრივი პერიოდი, წინ უსწრებს სიბერეს. მოიცავს 45-60 წლამდე ასაკს (ჯანმრთელი გერონტოლოგიური კლასიფიკაციით, იგი განისაზღვრება როგორც საშუალო ასაკი), როცა ხშირად შეეადრება ან ეითარდება შოკიური ფსიქიკური დაავადება აუტისტურ-ბოლდოით ამლილობით ან მშარდი დემენციით.

**პრინციპული** - принципальный (ლათ. senescentia - ძლიანი) (Walther-Büel H., 1951). ცნობიერების აკლამბიზაციის, მეხსიერების დარღვევების და გაბრუნების კომბინაცია. განიხილება როგორც ორგანული ფსიქოსინდრომის სუსტი გამოვლენა. დამახასიათებელია დემორტივირება, შინაარსში წყლიანობის განმელება, დამახსოვრების შესუსტება. აღმოცენდება შეეადრ. აღინიშნება თავის გინის სიმსივნეების ღრუსი.

**პრინციპული** - принципный (გერმან. präsenz - ავტორიტეტი, გაღვანა). საზოგადოების მიერ აღიქვამის დამახსოვრების აღიქვამის საშუალება. სუბიექტის სოციალურად მნიშვნელოვანი მახასიათებლების შედარება მოცემულ საზოგადოებაში არსებული სოციალურ პირობებთან.

**პრინციპული** - принципный (Юанг Тя, 1941) შიზოფრენიული პროცესების ხაზგასმული ეტაპი, დამახასიათებელია ნეგატიური სიმპტომების არსებობა (ემოციური დაქვეითება, ფსიქიკური პროდუქტიულობის თანდათანობითი ჩაქრობა, ახალი მასალის გახსოვრების გაძნელება, ამოცანებში არამოქმედოვანი დარღვევები), რაც წინ უსწრებს პროდუქტიული ფსიქოზური სიმპტომების მანიფესტაციას. ეტაპი ახლოა პათოლოგიასთან. ხშირად აღინიშნება იუვენილური ავთვისებიანი შიზოფრენიის ეპიდემიური სინდრომით დაწყებისას (ვლადიკა გ. 1982), ამ დროს ნეგატიურ ფონზე განვითარებული პათოლოგია სინდრომი ავარტის რეველირებულ ხასიათს.

**პრინციპული** - принципальный состояние (Травер М., 1949; Кербинов О.В., Гилицкий В.А., 1960). ხტაბა, რომელიც წინ უსწრებს განამარა ფსიქოპათიის საბოლოო ფორმირებას, წარმოადგენს ფსიქოპათიური განვითარების დამამარებელ ეტაპს ამ სტადიაზე ჯერ კიდევ არა აქვს აღიქვამი პათოლოგიური ხანების განვითარება შეეადრ. და სოციალური ადაპტაციის არსებით დარღვევებს, პათოლოგიის ფსიქოპათიური ხანები ჯერ კიდევ შეეადრ. და ეთოლსაიქვამი პირობებში ფსიქოპათია შეიძლება არც ჩამოყალიბდეს.

**პრინციპული** - принципный მტკანებელი ხანგრძლივი და მტკანებული ვრცელება, რასაც არაიქვამიათ არ ახლავს სქესობრივი დროება. აღინიშნება ენის ორგანული პათოლოგიის ღრუსი. საბუნებრივად დაკავშირებულია პრიაპოს სახელთან: იგი იყო ხალხის და ნაყოფიერების ღმერთი, შემდგომში - ავტორიტეტის ღმერთი ძველ ელადში.

**პრინციპული** - принципальный (ლათ. principium - საწყისი). მარცხენა, მარცხ. პ. ბოლო - მარცხენა ბოლო - ეტაპის სინონიმი.

**პრინციპული** - принципный открытая дверь. იხ. პრინციპული შემოღებულობა.

**პრინციპული** - принципный соответствия (Фурман Я.Л., Завалинский И.А., 1964) ფსიქოპათიული

დამოუკიდებელი კონტრასტა, დამოუკიდებელი დამოუკიდებელი დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თანდაყოლობას: 1) ავადმყოფი დამოუკიდებლობა და ანაშნობა, დაავადების მიმდინარეობის ვადების და სიმპტომების განვითარების თავისებურებებს შორის; 2) ნიშნებს, რომელიც გიპურად ასახავს დაავადების არსს, და დამახსოვრების ნიშნებს შორის; 3) ფსიქოპათოლოგიური თავისებურებას და დამოუკიდებელი და სიმპტომ-მეორეოლოგიური გამოვლენის მონაცემებს შორის; 4) სინდრომებსა და მიმდინარეობის ღრუსით დაკავშირება გიპებს შორის (მაგ. ფანა, რეაქცია, პროცესი). მნიშვნელობა ენიჭება დაავადების განვითარებაში დაავადების გიპური და არადამახასიათებელი ნიშნების თანაარსებობისას.

**პრინციპული** - принципный შემოღებულობა - принципный соответствия ფსიქიკური ავადმყოფების სტატიონარში მოთავსების პრინციპი ისეთ პირობებში, რომელიც მაქსიმალურად უზღვევს რეველებრივი სიმპტომის საავადმყოფოს რევიმს, ნებისმიერი იტულებითი მომხმის უარყოფა და აღიქვამა.

**პრინციპული** - принципный моральное поощрение (Prichard J.C., 1835). იხ. შემოღებულობა მარცხენა.

**პრინციპული** - принципный ტატანოლოგიური პიპლატაბა - Природа телесная человека (Prichard J.C.) იხ. გეგულობა ტატანოლოგიური.

**პრინციპული** - принципный (გერმ. Proband). პირი, რომლისგანაც იწყება საგვარეული ნუსხის შედგენა გენეალოგიური ანალიზის დროს. უკანასკნელ წლებში გერმანი გამოიყენება უფრო ფართოდ, კლინიკური დაქვირების ობიექტის აღსანიშნავად, განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში, როცა ცნება «ავადმყოფი» მიუღებელია, მაგ., როცა ლაპარაკი აქვს პრობანდულ პირობებზე.

**პრინციპული** - принципный (გერმ. прогенит - ნაადრევი აღზრდილი). იხ. პრინციპული სინდრომი. პატანოლოგი-განვითარების სინდრომი.

**პრინციპული** - принципный დაპავლებობა - принципный нелегитимный (გერმ. pro - წინასართი, აღნიშნავს რაიქვამს, წინ მდგომს, გენის - ცოლმა). კლინიკის და ეტიოპათოგენების მონაცემებზე დამყარებული ვარაუდი დაავადების შემდგომი მიმდინარეობის და განვითარების შესახებ.

**პრინციპული** - принципный სოციალური-ფსიქოპათიური-ფსიქოპათიური - принципный социальный, психопатический პროცესული გარეული ავადმყოფის სოციალურ-პრობოთა რეაბილიტაციის და მისი განხორციელების რაიქვამის მეთოდების შესახებ.

**პრინციპული** - принципный ფუნქციონალიზმი - принципный функционализм პროცესული გარეული ინდივიდის კომპენსაციური შესაძლებლობების შესახებ, მოცემული დაავადების დროს ითვალისწინებს ორგანოების და სისხლის კომპენსაციურ უზრუნველყოფის, ასევე ინდივიდუალურ (ბიოლოგიური და პათოლოგიური) თავისებურებებს. მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საეტიოპ-პრობოთა და საპრობოთა-პედაგოგიური ექსპერტის დროს.





პროლეტარობის შეწყობის მეთოდები (პუდგინის, მახოვების ტუტტა, ბუკის ტუტა).  
პროსოპოგრაფია - პროსოპოგრაფია (ბერძნ. prosopon - პირი, a - უარყოფა, gnosis - შეცნობა) (Bodumer J., 1947).  
იხ. პერიოდული

პროსოპოგრაფიული ტრანსპორტი - პროსოპოგრაფიული ტრანსპორტის კონსტრუქცია (ბერძნ. პროსოპოგრაფია - საკუთარი). წარმოადგენს განლაგებული კონსტრუქციის აპარატის კონსტრუქციას. კონსტრუქციის მტრობისთვის, პროსოპოგრაფიის პერიოდული რგოლი.

პროსოპოგრაფია - პროსოპოგრაფია (ლათ. prosopon - წინა ხეობა). ავადმყოფის სხეულის მოძრაობის დაუბლოკებელი მძიმეობა სიარულის ან ხელის მუშაობის წაკეთების შედეგად. აღინიშნება პარკინსონის დაავადების და პარკინსონიზმის დროს.

პროსოპოგრაფია - პროსოპოგრაფია (ბერძნ. pros - კიდევ, ამაზე მეტი, gnosis - მოძრაობა) (Leonhard K., 1936). კატატონიის ხმატონია. ნებისმიერი ვარე ვაბლიზანებელი იწვევს მოძრაობით რეაქციას.

პროსოპოგრაფიული ტრანსპორტი - პროსოპოგრაფიული ტრანსპორტი (Προσπονογραφία, 1920). ხმატონიის განხილვისთვის ავადმყოფური ნერვული სისტემის (სიმპათიკოგრაფია) მოქმედების დარღვევით ავადმყოფური სანდროზების სტრუქტურაში: პულსის გახშირება, გუგულის გაფართოება, ყაბზობისაღმე მიღრეკილება. აღინიშნება დაავადების მწვავე პერიოდში, უმეტესად დეპრესიული. მოგვიან მანიკალური მდგომარეობების დროსაც.

პროსოპოგრაფიული ტრანსპორტი - პროსოპოგრაფიული ტრანსპორტი (Προσπονογραφία, 1946). იხ. სინდრომი

პროსოპოგრაფიული ტრანსპორტი - პროსოპოგრაფიული ტრანსპორტი (ლათ. prosopon - განსაზღვრული). განსაზღვრული. მ.გ., მ. რეაქტიული მდგომარეობა, მ. ბანდისებური მდგომარეობა, მ. ანულოზური შოკი.

პროსოპოგრაფიული ტრანსპორტი - პროსოპოგრაფიული ტრანსპორტი (ბერძნ. პროსოპოგრაფია - დამსჯელი) დონისთვის ერთობლიობა მიმართული დაავადების განვითარების და მისი რეაქციის თავიდან ასაკილებლად. მ-ის ამოცანები: L ორგანიზმში ავადმყოფობის გამოწვევის მიზეზების თავიდან ასაკილება; Z დაავადების განვითარების თავიდან ასაკილება ადრეული დანერგვისას და მკურნალობის გზით; მ. მკურნალობა და სხვა დონისთვის დაავადების რეაქციის და მისი ქირურგიული ფორმის განვითარების თავიდან ასაკილების მიზნით.

პროსოპოგრაფიული ტრანსპორტი - პროსოპოგრაფიული ტრანსპორტი (ლათ. prosopon - ღრმა, somnia - ძლი) (Бухарин М.И., 1985). მტრისმტრად ღრმა ძლი, პრაქტიკული მიზნობრივის სიმშრის ვარეში, მინარის ვალეობა გამოხელებულია. ბავშვებში მ-ის დროს აღინიშნება შარდის და განვითარების შეუწყობლობა.

პროსოპოგრაფიული ტრანსპორტი - პროსოპოგრაფიული ტრანსპორტი (ბერძნ. პროსოპოგრაფია - დამსჯელი) (Бухарин М.И., 1934) მიერ, იგი არჩეულა მ-ის როგორც დამოუკიდებელი დაავადება, რომელიც თანამედროვე ფსიქიკურების შეხედულებით, ახლო მართვლ შიშოფრენიასთან და საწინააღმდეგოა ე.წ. ფანტაზიების შიშოფრენიასთან. ამ შეხედულებამ შეზღუდული ვერსიის გავრცელება. ამჟამად, მ-ის იმართება უკიდურესად იშვიათად და აღინიშნება ენდოგენური პროსოპოგრაფიული ფსიქოპათოლოგიის დაავადების, რომელიც იწვევს მკერდ, შეუცვლად პროსოპოგრაფიული ექვოლებების.

პროსოპოგრაფიული ტრანსპორტი - პროსოპოგრაფიული ტრანსპორტი (ლათ. prosopon - საბავშვო) (Dupre E., 1903). მტრისმტრად ფსიქოპათოლოგიის ხასიათდება ბავშვური ქვეით ისტერიულად შევიწროებული ცნობიერების ფონზე. უფრო ხშირად გვხვდება მ-ის უკიდურეს ხაზში, კიდევ მთლიანი პუდგინის სანდროზი (Бухарин М.И., 1944; Тухов З.Г., 1954). ჩვეულებრივი მ-ის მართვლად აღინიშნება განსაზღვრული სანდროზის, ფსიქოლოგიური (ფსიქოლოგიური) პროსოპოგრაფიული სინდრომი დროს მ-ის დამახასიათებელი სიმპტომები: ბავშვური შეფუცვლება, შოკოკაცა, ემოციური რეაქციები. პერიოდული ავადმყოფის ქვედა განვითარება ბავშვის ქვეყნისგან ბავშვობის შერწყმით ისეთ ჩვეულებთან, რომელიც ასახავს უფროსების ცხოვრებისეულ გამოცდილებას (Бухарин М.И., 1988).

პროსოპოგრაფიული ტრანსპორტი - პროსოპოგრაფიული ტრანსპორტი (ლათ. prosopon - მხედველი, ნაზივლელი). შურების ტრანსპორტი უკიდურესად ხიფათის განხელებლა დიქტიორის ადვების მართვლად. გამოიყენება მადეაგნოტიკო (ლიქვიორის ანალიზი და რენგენოკონტრასტული გამოკვლევის მეთოდები) და მამკურნალო (ეპილეფსიური სედატის დროს) მიზნით. ლუმბალური პუნქტია გარდობა ლუმბალური მილაკში, თავის გეინის პარკეტების მილაკში განხელების დროს დაპროსოპოგრაფიული გუნქციასა, კეისი დიდი ხურელის უკან კიდვსა და ადვალის უკან რკალს შორის - სუბოქცილიტადურ პუნქტიაზე.

პროსოპოგრაფიული ტრანსპორტი - პროსოპოგრაფიული ტრანსპორტი (Πίστηρα-Χεβρα ტესტ სეტოთის პარამიდი (Pflister M., 1950; Heiss R., 1951). მართვლების გამოკვლევის ექვმანქანტულ-ფსიქოლოგიური მეთოდიკა. გამოსაკვლევის ნიშნის სხვათა ალექვნი ქალდამე დახატულ კვადრულ ექვმანქანტულ შემდგარ პირამიდის და სხვადასხვა ფურის ქალდამისგან გამოკვრულ 24 კვადრატს. მან უნდა ჩააღვაროს უფრადი კვადრატები სქემაზე და ააგოს შეგნაკვლებად ფერთი სასამოენო და უკალიფონო პირამიდები. ყვადვლებს ექვმანქანტულ ფურების ამორჩევა, მთი ურთიერთშეგნება, განლაგება პირამიდის სტრუქტურაში, სიმეტრიულობის და ა.შ. დადგენილი პათოლოგიის გაუკვლევის მეთოდები. შედეგები იძლევა ემოციების და ინტელექტის თავისებურებების შესახებ ინფორმაციას.

პროსოპოგრაფიული ტრანსპორტი - პროსოპოგრაფიული ტრანსპორტი (ბერძნ. პროსოპოგრაფია - აქვრე) (Kraepelin E., 1910). შიშოფრენის მიმდინარეობის ფორმა, რომელიც ოლიგოფრენული ფორმა აღრეკვ ბავშვობაშია ადრეული. გვალის (Gleiss A., 1936) მიხედვით, არჩევი მტრისმტრებში (შიშოფრენის ორ განსაზღვრული) შიშოფრენის კომპლენიაცია ოლიგოფრენიასთან, ხასიათდება კავსტროფული მიმდინარეობით და დარბია პროლეტარული სიმპტომატიკით; 2) შიშოფრენის დასაწყისში აღრეკვლად ასაკში, რაკი კლინიკური სურათში ოლიგოფრენულითა ერთად ვლენდება პუდგინურილი ხაზში, 20-30 წლის ასაკში აღრეკვლად ნაბეჭდი პუდგინურილი შიშო. გასათვალისწინებელია, რომ შიშოფრენიული პროსოპოგრაფიული დასაწყისი და კავსტროფული მიმდინარეობა თავისთავად განაპირბებს გუნებრივი განვითარების შეუწყობას, ისევეკვადური დევეტის ჩამოვალეობებს. სინონ.: შიშოფრენიული ტრანსპორტი.

ჟ

**შანეს ლაპარაკი** - Жане ხოლვა (Janet P. 1903). იხ. **შანესხანა**.

**შანეს ქონცაფიკა** **სეიქოლოგიური ამტოპატოზისა** - Жане концепция психологического атоматизма (Janet P. 1899). ფსიქიკურ მოქმედებაში ავტომატიზმის, როგორც უწოდებენ, განხილვა, რომელიც თანაფარდობაშია ცნობიერთან და უსასურება არაყნობიერო მოქმედებას გამოვლენას. ცნობიერმა ფანე (Janet P.) გამოყოფდა ორ ხართულს: I - უმაღლეს სტრუქტურა, რომლის უორმირება განპირობებულია ნებისით, ცნობიერი მომენტებით და გარედან არის ინტეგრირებული; II - უმაღლესი სტრუქტურა, არაყნობიერი, ივტომატური. ფანეს მიხედვით, უსიქიკური პათოლოგიის შემთხვევებში ავტომატიზმი მოიცავს ან პაროენების ნაწილს (პარსიკალური ავტომატიზმი, მაგ. აკეიატებული და ფიქსირებული იდეები), ან მთლიან პიროვნებას (ტოტალური ავტომატიზმი, მაგ. კატალექსია).

**შანეს ტმტი ანესოზიზმსა** - Жане теория анезиозизма (Janet P.). კანს მგანძობვლობს ფუნქციური და ორგანული დარღვევის სადფერენციალური ხერხა ავადმყოფთა სიკვით - «დაახს ან არაა უნდა უპასუხოს, გრძობს თუ არა იგი კანზე შეხებას. ფუნქციური დარღვევის დროს ავადმყოფები ყოველთვის ამბობენ - არაა, თათს ტენის ორგანული პათოლოგიის დროს - დაახს».

**შანეს სეიქოლოგიური ბრძობა** - Жане психофизиологическая борьба (Janet P.). იხ. **ბრძობა სეიქოლოგიურში**. **შარბინაშა** - шарпинизм (ფრანგ. ქვეთ - ვარტონი, ბერნ. ფრანგ. შეტყულების დაკარგვა). გამოხატული გორტიკალური სენსორული ავადმყოფთა სეიქოლოგიის, ხასიათდება ლოგორეით და მრავალბოთი ვერბალური და ლიგორალური პარაფსიებით. სიქიარა **შარბინაშა** (იხ.) განსხვავება.

**შეიქონს ლაპარაკი** - Желание ხოლვა იხ. **სეიქოლოგიის**.

**შანესის სიქოლოგიური გენეტიკური სეიქოლოგიისა** - Жанециология психологическая генологическая (შანესის ფსიქიკური განვითარებას გამოკვლევაში, შექმნილია ფ. შაფეტი (Piaget J.) და მისი მიმდევრების მიერ. შესწავლის საგანია ბავშვის ინტელექტის აღმოცენება და განვითარება; ძირითადი აზოყანაა - ბავშვის შემოცნებითი მოქმედებების შექმნილობის გამოკვლევა, რომელიც დაფარულია მისი ქვეყის ვარუგნული გამოვლინებით; გამოკვლევის ძირითადი მეთოდი - კლინიკური საუბარი, რომელიც ორენგირებულია არა მოუღენს გარეკანის ნიშნების ფესიკიკაზე, არამედ იმ პროცესებზე, რომლებიც განპირობებს მათ აღმოცენებას.

**შეიქონს სინდრომი** - Желтый синдром (Gibbs A., 1934) **ფსიქოპათოლოგიური გამოვლენება**, რომელიც აღინიშნება ფილავის ტვინოლოგიით დაავადებულ მოცირთ ავადმყოფთა და ხასიათდება საკუთარი დაავადებისაღმი არასწორი ქვეით. პირველ რიგში, გამოვლინდება თავის დაბეღებას იგნორირებით და სმქერნალო და შემზღვეველი ხასიათის ლინისიტიზითა დაყვის უკუღებულყოფით სრულ უარყოფილად ფ. შანესარტობის პიკომანიაკალური მდებრების ფონზე მთიარული, შვირამ არაყანარი უნებუაგანწყობის, ხშირად უმიზეზო სიყლით, ურთიერთსაყანადავტელო ქვეყებით (Paton A., 1975).

**შეიქონს სეიქოლოგიური სეიქონა** - Желтый синдром (Желтый СГ., 1960) იხ. **სეიქონა** **სეიქოლოგიური**.

**შეიქონს სეიქონა სეიქონის ბარანეტოლოგიისა** **შარბინაშა** - Желтый синдром септического характера в прошлом (Желтый СГ., 1956) იხ. **სეიქონა** **სეიქონის ბარანეტოლოგიისა**.

**შეიქონს სინდრომი ბარანეტოლოგიისა** - Желтый синдром похмелья (Желтый СГ., 1929) იხ. **სინდრომი ბარანეტოლოგიისა**.

**შეიქონს ბარანეტოლოგიური ბარანეტოლოგიისა** - Желтый синдром влечения (Желтый СГ., 1940) იხ. **ბარანეტოლოგიური ბარანეტოლოგიისა**.

**შეიქონს სეიქონა** - Жоффева септика (Joffe A.). დემეტრე ნაშანი ბროგრებული დაშლას დროს ავადმყოფები უმეტეს უხემ შეელომენს მარტივი გაანგრომებებისას ანალოგიურად, კრებულენს მისიულით, ანგრომის დარღვევისა, რომელიც აღინიშნება თელის დროს.

რ

რავსონის ტესტი - Ravena test (Raven J.C., 1936) იხ. რავსონის ტესტი.

რავსონის სტერეოსტრესტიკური პალეონეოსტრესტიკა - Равкина стереострессистика (Равкина И.Г., 1940) იხ. პალეონეოსტრესტიკური სტრესტიკა.

რავსონის სინდრომი სხეულის სიმძიმის დინამიკური პულსა - Радовского синдром нарушения ритма тела (Радовский И.Л., 1933) იხ. სინდრომი სხეულის სიმძიმის დინამიკური პულსა.

რავსონ-დენის ვიზუალური ორსახეობის დინამიკური სინდრომი - Радовский выделил семейный дисритмия (Riley C.M., Day R.L., 1949) მუცელზე დადგება; უღიბდება ავტონომური ნერვული სისტემის დისრეგულირება. გადაცემის ავტონომური რეგულირება გია. პათოგენეზში მნიშვნელობა ენიჭება ვეგეტატიური ნერვული სისტემის მოქმედების დინამიკური რეგულირების დარღვევას (ეპინეფრინის და ნორაპინეფრინის წარმოქმნის დონეზე). პათოლოგიური სინდრომი - დეპრესიონული კრეტიზმი შერვის გინის უკანა ფსევდოსის და უკანა სეგმენტის მდამოში, დეცენტრალური ცენტრები პათოლოგიური ფორმის მიღების შემდეგ ან ნერვული სისტემის დისრეგულირებით, პუსტული კანტი, ჭარბი ოლიგონია (გრანულოციტული ნერვული სისტემის დროს), ყდაპის გაბნელება, ნერვული დენა, ემოციური ლაბილობა, მოძრაობის აკორდინაციის დარღვევა, პიპო-ან არეულუქია, გულის მგრძობილობის დაქვეითება მოცურ აღინიშნება არტერიული წნევის მომატება, პერიოდული ლეზიონები, პერიოდული ცხელებითი მდგომარეობა, პოლიკიურია, ენურეზი, ენდოციტოზული გულყრები. ძალიან იშვიათ შემთხვევაში - ტუალსეგოზა. სინონ: დინამიკური ორსახეობის ვიზუალური სინდრომი.

რავსონის სინდრომი - Радовский синдром (Reiter P.J., 1956) ფსიქოგენური დაზარალება, რომელიც დგება სერიოზული სტომატოლოგიური ხარვეის, მუც, კბილის ეპიტელის შემდეგ დამახასიათებელია დამოკიდებულების ბოლესხაგარი იდეები, აკუაგებული მიმეტი. მიში უმეტესად დაკავშირებულია პირის დრუსთან. ავადმყოფები ამტკიცებენ, რომ ენა არ ეტევა პირში. პრემორბიული ბუნებრივი ავადმყოფს აღინიშნება ნერვული რეაქტიულობის მიდრეკილება, კვების წყლულოვანი დაავადება.

რავსონის სინდრომი - Радовский синдром (Reichardt M.) I. თვითი ცხელებითი მუცრობილი ავადმყოფის მიერ სუფთა ურცელის დათვალვებისათვის მთავრებული მხედველობითი პალეონეოსტრესტიკის აღმოცენება. პალეონეოსტრესტიკის სახეები მცირე ზომისაა, ევალდი, მავი ან ფერადი, შობრავი და უმრავი. რ.ს. აღინიშნება დელარიუზისათვის დამახასიათებელი მხედველობითი პალეონეოსტრესტიკის მუცრევის შემდეგ და აიხსნება ალკოჰოლიზმით დაავადებულთა აწეული მთავრებადობით და თავისებური დათვალვითური მხედველობითი. აღწერილია 1905 წ. სინონ: სინდრომი მთავრული სინდრომი. II. თავისებური ფაგოციტული სახეუ კატაგონიური მთავრებით დაავადებულებში კანის ცხიმის ჯირკვლების სერეული ფრეტილის დარღვევის შემდეგ, შეიძლება ავტოგენი აღინიშნებოდეს ენეფალიტიკების დროს.

რავსონის ტრიადა - Радовская триада (Reichardt M.). ფსიქიკის, მოცრობის და ვეგეტატიური დარღვევები ენეფალიტიკების დროს.

რავსონის სინდრომი - Радовский синдром (Ranschburg P., 1905) მუცრეგულდება, ძირითადი წერითის პათოლოგიის ნაშან. მსგავსი ხმოვანების (პოპულეონე) სიყვების ან მარცხების ნაწილები კონტამინირდება, ურწყობის ერთმანეთს ან პირიქით, გამოყოფილება აღინიშნება გადაღლის დროს და მთავრების ფორმლებში.

რავსონის სინდრომი - Радовский синдром (Ranschburg A.M., 1924) გამოიყენება თრომბოზის ხადაგნოსტიკად. დაზარებული ამონასუნთქი პერეტი ვილიის სპირტის ორთქლის აღმოჩენაზე. რეაქტივი - ქიმიურად სუფთა კონცენტრირებული, გოგირდმდებარე გამოხდილი წყლისა და კალიუმის პერმანგანატის ხსნარი. ეთილის სპირტის შემცველი პერეტი ნახერვისას რეაქტივი ხარვე უფრულდება.

რავსონი - Радовский (ფრანგ. Радовский - კავშირი, დამოკიდებულება). კონტაქტი, რომელიც პიპონომური სიანის დროს მყარდება პაციენტსა და ფსიქოლოგებს შორის. გამოირჩევა აღმის მდელი ხარისხით პიპონომურ მდგომარეობაში მუცრობის ენციპიკების შედეგად და თავის ენის ქერების პიპონომურ-ფანური მდგომარეობის არსებობით - შეუძარებელი სუსტი ენობალური გამლიანებული (ანუ სიყვეფიერი მთავრების ფორმულა, პიპონემა) აღმოჩნდება უფრო მნიშვნელოვანი, ძლიერი სხვა წაროებიდან წამოსულ მემოქმედებისთან შედარებით.



წამყვანი როლი, შეიყვანეს ფსიქოფარმაკოლოგიურ საშუალებებს; ფსიქოქური სიმპტომატიკის ლიკვიდაცია ან მერხილება ქრის ფსიქოსოციალური ღონისძიებების ორგანიზაციითთვის წინაპირობას); II - რეაქტივობის ვეტიკალიზაცია და მდგომარეობის ავადმყოფის შეგუების შესაძლებლობაში გარე პირობებთან (აქ ძირითად როლს ასრულებს ფსიქოსოციალური მდგომარეობა. მიმართული ავადმყოფის სოციალური აქტიურობის სტიმულაციამ, ბიოლოგიური საშუალებები ასრულებს შემანარჩუნებელი თერაპიის როლს); III - საკურსო რეაბილიტაციის ვეტიკალიზაცია, რომლის დაშორება ავადმყოფის საკუთარი უნებების აღდგენა გარე სინამდვილეტან მის დაავადებულ მდგომარეობებში (საყოველთაო ღონისძიებები ავადმყოფის ყოფის და შრომითი მოწყობის მოსაწესრიგებლად).

**რეპროდუქციის** - *репродукция* ბიოლოგიაში ან მეტყველებათა მოქმედება, ხსნის ფსიქიკურ დაძაბულობას. გერმანიის მოწოდებული ბრაუნის და ფრაილეს (Braun J., Fraend S., 1895) მიერ იმ პროცესების აღსანიშნავად, რომლის დროსაც ფსიქიკური გრძელბა და მასთან დაკავშირებული აუტეტი გამოისაჯავს პოლუბს სიყვავება და მოქმედებებში, რომლის შედეგია ინტერსუბიექტიური დაძაბულობის თავიდან აცილება. რ. ხდება ფსიქოთერაპიის (შაინაზის, კაიარხის) დროს.

**რეპროდუქციის** - *репродукция* (ლათ. re - ხელახლა, *recreare* - შეგება). ღონისძიებების კომპლექსი, მიმართული გარე პირობებთან ამა თუ იმ ღონეზე შესაგუებლად. კაპანოვის (Капанов М.М., 1978-1985) მიხედვით, რ. წარმოადგენს რეაბილიტაციის ვეტიკალიზაციას, რომელშიც ვარაუბის ფსიქოსოციალური მეთოდებით შემოქმედება, ავადმყოფის სოციალური აქტიურობის სტიმულაცია (შრომითი თერაპია, პროფესიული სწავლება, სპეციალური პედაგოგიური მუშაობა ფსიქოთერაპიის მიმართულებით, რომელიც გარეგანად ავადმყოფთან და მის ნათესავებთან).

**რეპროდუქციის** - *репродукция* (გერმ. *Reproduzieren*). ფსიქოანალიზში ფრაილეს მიხედვით, ფსიქიკის უნებქონირობის მნიშვნელოვანი პირობებია, უწყობლობა საპროცესების პროცესებ და ცულის მის მოქმედებას: როგორც კი რეაქციის ბრძანება იღებს ღონისძიებულ ხასიათს, მანინე წყდება დაქმავიყვადების პირდაპირი და არაპირდაპირი ძიება, იძებნება გერედიტი გემბი და ვარემე ფაქტორების ურთიერთობაში ხდება საპროცესების მიღების დროს გადავადება. ენერგეტიკის თეორიის მიხედვით, რ. თაყისეულ ენერგის გარდაქმნის შეკავშირებულ ენერგიაზე; გოპიის თეორიის მიხედვით, იგი ახსნათებს ძირითადად წინაქმნიების-ცნობიანებას ხსენებებს; დინამიკის თეორიის მიხედვით, რ. შემოქმედებს დროლის განსაზღვრული გიპის ენერგიაზე, რომელიც ემორჩილება "შე"-ს.

**რეპროდუქციის** - *репродукция* (ლათ. *recreare* - გაყოფილება). ღონისძიებების კომპლექსი, რომელიც გერმანიის მდგომარეობის დროს მიმართულია ადამიანის სასოციალური უნებქონის აღსაფხვანად. რ.-ს მოსწავლის მტყნოვანება რეაბილიტაციის ვეტიკალიზაცია. გერმანიის მდგომარეობა შეიძლება განვითარდეს სხვადასხვა მიმების (მომე გრავება, მოწამება, დამწერლობა, სხისხდება, დახრილობა, მოქარდომის ინფარქტი, თირკმლების მწვავე ემბოლიზაცია, გუგანუსი, მწვავე კავადონიური მდგომარეობები და სხვ.) შედეგად. რეაბილიტაციულ ღონისძიებებს მიეკუთვნება ხელეწიერების სუნთქვა, გულის არაპირდაპირი და პირდაპირი მასაჟი, ლევიზორაცია, ატრეოვუ ნათიერებათა ცულის მწვავე დარღვევის, სისხლის მიმოქცევის, სუნთქვის, თირკმლის და ღვიძლის მწვავე ემბოლიზაციის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებები. რ. არ არის მიმანმეწონილი ხანგრძლივი (3 წთ-ზე მეტი) და სასოცლებლთან შეუთავსებელი დაზიანებების არსებობის დროს.

**რეპროდუქციის** - *репродукция* (რუსული *воспроизводство* (Boshoeff K.). იხ. **რეპროდუქციის**).

**რეპროდუქციის** - *репродукция* (რუსული *воспроизводство* (Boshoeff K.). იხ. **რეპროდუქციის**).

**რეპროდუქციის** - *репродукция* (გერმ. *Reaktionsbildung*). ფსიქოანალიზში თაყისეულს ეროვნული მქმნიანობა მუშაობის შედეგად; განსპირობებს ისეთი ქვეყის აბოცენებას, რომელიც არაქონიერი გამოდევნა მსწავლების საწინააღმდეგა (მაგ, ლელის გადაბეჭვული მბრუნელობა ბემეზე, რომელსაც იგი (ღელა) ვერ იგანს და მ.).

**რეპროდუქციის** - *реакция* (რუსული *реакция* იხ. **რეპროდუქციის**).

**რეპროდუქციის** - *реакция* (რუსული *реакция* იხ. **რეპროდუქციის**).

**რეპროდუქციის** - *реакция* (რუსული *реакция* იხ. **რეპროდუქციის**).

**რეპროდუქციის** - *реакция* (რუსული *реакция* იხ. **რეპროდუქციის**).

**რეპროდუქციის** - *реакция* (რუსული *реакция* იხ. **რეპროდუქციის**). ფსიქიკური მოქმედების პათოლოგიური ცვლილება ფსიქიკური გრავების ან არასასურველი ცხოვრებისეული სიგუაციის საპასუხოდ. მათ წარმოშობაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს კონსტიტუციური წინაგანწყობის ფაქტორები, პიროვნული თავისებურებები, ავადმყოფის სიმბავური მდგომარეობა, მისი ასაკი. მიმდინარეობს ნეგროზულ (იხ. **მმბრუნება**) ან ფსიქოზურ (რეაქტიული ფსიქოზები) ღონეზე. ერთი და მეორე მიეკუთვნება რეაქტიული მდგომარეობების კლასიკურ ჯგუფს თუქმა, რეაქტიული ფსიქოზები ნეგროზებისგან განსხვავებით, ხასიათდება განვითარების მეტი სიმწვავეით, სიმბავურიცის დაზიანებით, მეტი სიმბავით, გამოსავალი ფსიქოპოლოგიური და აუტეტური დარღვევებით, ფსიქოპათოლოგიური პროცესების (ბოღვა, პალეუნაცია, ცნობიერების დარღვევა) არსებობით, ქვეყის დარღვევით. რეაქტიული ფსიქოზებისათვის დამახასიათებელია ფსიქოპათოლოგიური დარღვევების მნიშვნელოვანი შექცევადობა.

**რ. აღკვეთის** - *реакция* (რუსული *реакция* იხ. **რეპროდუქციის**). აბტერული რეაქცია ალიკოპოლური თრობის მდგომარეობაში. თრობა, როგორც წესი, ავადმყოფის რეაქტიურობის ასტერულიც გამოვლინებას იმ პირობებშიც, რომლებშიც მანამდე არ იყო გამოსავალი ასტერულიც. ხასიათდება განზრახ დებონსტრაციული ქვეყით, გარემოზე გადაბეჭვული რეაქტიურობით, სუციალური გამონათქვამებია და ცუდით, რომელიც ჩვეულებრივ სრულდება გარემომცემოვანთან დასასწრაფობით და გამოშვავება, მაგ, ავადმყოფი აღნიშნავს მრევლებს მრევლებს ვინაშისთვის წინაშის კანის არეტი. ჩვეულებრივ, აღნიშნება პიროვნების ფსიქოპათომატავიერი გიპით ალიკოპოლური ღვერდარების დროს, ალიკოპოლში II სედაიში.

**რ. აღკვეთის** - *реакция* (რუსული *реакция* იხ. **რეპროდუქციის**). დარღვევების ვებრტიცები ელემენტარული ფორმების შეადგენს ინდივიდუალობის ანომალის ფორმირების საწყის ელემენტს. დამახასიათებელია სიმბავური რეაქციის ფორმის ცვლილება, არაადეკვატური რეაქტიუბი სტიმულის ძალისა და შინაარსის მიმართ. კლინიკურად არჩევენ ნეგროზულ;



მიხაქვასთან. უზრაველს შემთხვევაში არა აქვს პათოლოგიური ხასიათი ანუ წარმოადგენს ხასიათობრივ წრს, თუმცა, ამ დროს შესაძლებელია ნერვოზული დარღვევის და სოციალურად უარყოფითი ქცევის განვითარება.

რ. **მარქსიზმი** - პ. **МАРКСИЗМ** ელინდება საკუთარი ჯანმრთელობის მიმართ შეშფოთებით, რწმენით, რომ ავადმყოფი დაავადებულა მძიმე სომატური დაავადებით. არაიშვიათად ხასიათდება **რეაქციულად** გაქცევას ისტერიული მქინიზებით.

რ. **მარქსიზმი** - პ. **МАРКСИЗМ** ელინდება რეაქციების ისტერიული ფორმად.

რ. **პირველადი და პირველადი პირველადი** - პ. **КОМПЕНСАЦИЯ И ГИМЕКОМПЕНСАЦИЯ** (Ковален В.В., 1979). ქვეყნის გარდასაქვლი დარღვევებს ფორმა ბავშვებსა და მოზარდებში. ხდება პიროვნული გამოვლინებების გამოკარება და რწდება ქვეყნის დაცვით ფორმები, რაც ნიღბავს პიროვნების სუსტ მხარეებს. ერთგვარი ცდა, თავიდან აიცილოს საკუთარი არასრულფასოვნების განწყვა. შეიძლება იყოს როგორც **სახსიათობრივი**, ასევე **პათობსახსიათობრივი** რ. წრს ასეთ სახეს მიეკუთვნება მანავალდებით ხასიათის კომპენსაციური უნაგვამები, მოქმედებებით ქედმადლობის გამოვლინება, სასკოლო დისციპლინის დარღვევა, დანაშაულის საკუთარი თავისთვის მიწერა და.ა.ა.

რ. **პირველადი სიამაღლის** - პ. **ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ** რ. გარეგნულად ელინდება სრული უმოძრაობით.

რ. **პირველადი** - პ. **ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ** და აღნიშნება ავტოტური დაძაბულობა, აგწნება, მოუსვენრობა, მძიმე, მოგვარე პირობით, უმძიმეო სინარული.

რ. **პირველადი** - პ. **ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ** რ. **პირველადი**

რ. **პირველადი** - პ. **ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ** (Ковален В.В., 1973). რეაქტიული მდგომარეობები ბავშვებსა და მოზარდებში, უპირატესად ელინდება ქვეყნის დარღვევით, რაც განაპირობებს სოციალურ-ფსიქოლოგიურ დეზადაქციას და არაიშვიათად თან ახლავს ნერვოზული, სომატურ-ვეგეტატიური დარღვევები. მძიმედ მიმდინარეობს, გრძელდება რამდენიმე კურსი, თვე ან წლები. ხშირად განაპირობებს ფსიქოპათურ განვითარებას და პიროვნების პათობსახსიათობრივ ფორმირებას.

რ. **პირველადი** - პ. **ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ** ხასიათდება ბოღვით განცდებით და მადეინაციებით, რომელთა მინაარსი ახლოა წრის გამომწვევ ფსიქოგენურ-მატაბოლურ სიტუაციასთან.

რ. **პირველადი** - პ. **ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ** (Михайлов А.В., 1940). ფსიქოგენური რ., საფუძვლად უდევს მდირებელი იდეები, ბრ ასახავს პათოლოგიურ მიმანდასებულობას. გიპურა მოდევნება და ევეიანობის ბოღვა. მდირებელი იდეების გადაზრდა ბოღვითი ხდება ავტოტის მწვერვალზე, რაც განსაკუთრებითაა გამოხატული ამროვნების კატათიზურობა რეაქტიული მარანდობისგან განსხვავებით, მძიმეულთან როდს ასრულებს ფსიქიკის თავისებური სტრუქტურა, რომლის გარეშე შეუძლებელია მდირებელი იდეების გადაზრდა ბოღვითი - სოციალურ-სადმი ლტოვიას ხასიათი, ევოენტირში, ირგურების განსაკუთრებული მიმართულება, კატათიზური ამროვნებისკენ მდირეკილება. მარს წინასირობაა - პიროვნების ებლევსოლოგიური ხასიე. ლეონარდის (Leonhard K., 1976) მიხედვით, რ. განსაკუთრებით ხშირად აღინიშნება ფსიქოპათიის და პიროვნების აქვენუაციის პირანოიულ-შეკავებულ და ევილევსოლოგიურ-აგწნებულ შემთხვევებში. პირანოიული რეაქციის გამოვლენა განვითარებისგან პირობითია. როგორც მანს, მარს დამთავრებამდე, იმ მხვიათ შემთხვევებში, რაც იგი შემდგომ აღარ ვითარდება, შესაძლებელია ეიმსჯელოთ მხოლოდ რეგროსპექტულად.

რ. **პირველადი პირველადი პირველადი** - პ. **ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ** (Важнов К., 1981). ხასიეკე ან შედარებით ხანგრძლივი რეაქციები, გამოწვეული ავტოტური დაძაბულობის მდგომარეობით, ხასიათდება ქვეყნის დეკუატიური ფორმირებად ვადსართი. ისინი ახლოა ნორმალურ აღმამარე განცდვითან. ამროვნება იმენს მდირებელი იდეების ხასიის და არასოლეს არ აღწევს ბოღვის ხარისხს. აღნიშნულია ფსიქოლოგიურად ჯანმრთელებს და პიროვნული აქვენუაციის დროს. მათი ბუნების ინტერპრეტაცია დაკავშირებულია ერთიანი ფსიქოპათოლოგიური ავტოტურ-ქვეყნითი სისტემების გამოყოფასთან, რომელიც ავრთმანებს უპირობო რეგულესურ (ინტანტეს) და პირობით-რეგულესურ მოქმედებას, რაც ევევლებარება **ფუნქციონალ-შეგვარების რეგულესური** (ანტესეს) და **პედოლოგიური რეგულესური** ინტექციის მონტესტის გამოყოფილია რის ირთი ძირითადი კომპლემენტური და ინტენსიული პირველის დროს მოქმედების ხასიათი რწება უკვლავი, იყვლება მხოლოდ იმიეცი; მართის დროს მოქმედება ვადის სხვა ქვესტრუქტურაზე, მაგ. ავგოარესია იყვლება ავრესით. პირანოების ავტოტური მარანდობისკენ რს მოგვრით ვირანგი ფუნქციონალიზურად ახლოა ფსიქოლოგიური თავდაცვის მექანიზმებს გამოვლინების ცალკეულ ვირანგებთან (Freyd S.).

რ. **პირველადი** - პ. **ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ** რ. განპირობებული პიპოვლიური მექანიზმებით (Kretschmer E., 1922). მოიცავს გაქცევის, პანიკის, მომწენებით საკვლის და სხვ. რეაქციებს, მათ შორის ექსპლოზიური - პანიკის, ცვირილის, იმპულსური რეაქციები, ავტოტური სკუპირობი.

რ. **პირველადი ბრევიტი** - პ. **ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ** რ. გამოვლინდება ირგვლე მომზარის ბოღვითი ბრევიტი-ფალოთ. თავის გენგში დაკავშირებულია შიშის ავტეტთან. გარე სინანდილის მოვლენების ინტერპრეტაცია ბოღვითია, რაც განპირობებულია ფსიქოგენური ტრენვითით, მაგ. აღამგირების მიმი წარმოქმნის დამოკიდებულებას ლეუნის (მოჩენებითი თავდაცვის) ფსიქოგენურ ბოღვით იდეებით.

რ. **პირველადი** - პ. **ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ** (Ковален В.В., 1979) ქვეყნის გარდასაქვლი დარღვევებს ფორმა ბავშვებსა და მოზარდებში. შეიძლება იყოს სახსიათობრივი და პათობსახსიათობრივი. პირველი გამოვლინდება დავუარებლობით, უნებობით, მოგვარე ავრესიული ქვეყნით. აღინიშნება ფსიქოგენურ-მატაბოლურ სიტუაციებში, აქვს მკაფიო მპაროვლება, არასანაწმელობა. ხშირად აღინიშნება ეპოყურად აგწნებულ ხავშებში. მგორე გამოირჩევა გამოვლინების ირგვსირობით, ავრესიული, სასკოლო ქვეყნით, გამოხატული ვეგეტატიური კომპონენტით. აქვს მდირეკილება ვანოურებისა და ფქსიკოსამი, ქვეყნის დარღვევა ამ დროს იმენს მწველ ხასიათის. შესაძლებელია მასწერი ბრევიტებს რ. ელევტიური შემგამი, განსვლა, სუციდური ქვეყა. სინონ.: რ. **ИСТОРИЧЕСКАЯ**.

რ. **პირველადი** - პ. **ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ** რ., შენარჩუნებულია არასასურველი სიტუაციის დამთავრებამდე











**რიქელს-დაუნინგის სპალა რეპრესიის** - RICKELS K., DOWNING R.W. (1972). ლეპროსიული მდგომარეობების კლინიკური სურათის და გამოსხაველების ხარისხის შეფასებას სპალა-რიქელსისწინებულა კუნება-განწყობის, ფსიქომოტორიკის, ანროვნების, სომატიკის დარღვევის 23 სიმპტომის, რაიმდღი დავრეუბულია შესახამხად ექვს ორთოგონალურ ფაქტორებად (მაგ. მოუსუნებობა, დამხრეუბება, სტრელი ვანწყობა და ა.შ.). გამოიყენება დიფერენციალური დაგნოსტიკისათვის, დაავადების მიმდინარეობის დინამიკის და ჩატარებული თერაპიის ეფექტურობის შესაფასებლად.

**რინგელის პრესპიციტოზის სინდრომი** - RINGEL E. (1953). ფსიქოლოგიურ ხმატკობათა კომპლექსი, რომელიც, ავტორის აზრით, აღნიშნებათ სოციალური ქვეყნისადმი ტრენსიციების ქმონე პირებს (როულ სიგუაციებში (სოციოლოგიათა), სოციული - ფსიქოკრი სოციოლოგებ შეზღუდულია პაროუნული ოპიციფიკაციების ან ხასიათის განვითარების დინამიკის, ინტერპერსონალური კონტაქტების შესახამხად. ამასთან დაკავშირებით. მხრეუბება გარეთ მიმართული ავრესია, ჭარბობს ავტოავრესული ტრენსიციები, აღმოყენება სიკვდილის სურული, ფანტასირება სიკვდილის შესახებ. ფსიქოკრი სოციოლოგებ შეზღუდულია მეთოდება იყოს უსიყუკრი დაავადების მრედე. სინდრომის ხანგრძლივობა რამდენიმე წუთიდან კვირამდე ან თვემდე. მის დიაგნოსტიკას შინაინტელექტობა აქვს თვითმკვლელობის პროვოცირებისათვის.

**რიტუალური ქიუტია** (ლათ. ritualis - წეს-ჩვეულება), მარტვი ან როული მომართობათა აქტები, სრულდება ავტოპსიქოების წების და შინაგანი წინააღმდეგობისგან დამოკიდებულად, სიმბოლურად გამოხატავს იმის და ამტკობად, ავტოპსიქოე ქვლიობის, თვითნა აქილის შესახებ შეზღუდულია განხილვებზე როგორც ფსიქოლოგიური თავადიკების შექმნისხამ ავტოინტელექტობა. მიმბოლოვანი ენობახვეულების მიღვეუბას რ. თვითთავად ხელის მტარული ანსაკსკერი ფრთხვით. აკვადტებულ რს თან ახლავს აქიტიგებული აზრები და მიშები ობსესიური-კომპულსიური სინდრომის ფორმლებში. სიმბოლური-მარტვი მოქმედებები შეესახამება მათ გამოწვეულ მიშებს. ამტკობად, აქიტიგებულ დაბანა ქვლიტიის ან წარმოადგენს მხრეუბებში (ობ.) მრედეც. შეიძლება ავტოინტელექტობა დროის განხილვით, რომელიც ავტოპსიქოების საკვითარ უწყველდოვრ ცხოვრებას აქვეყნს სტრუქტურული განარების სისხამდე, რომელიც ვატიარტული იერემონით დილის დგომიდან საღამოს გუალეგის ჩათვლით (საწოლი ოთახის რსგულაა). ზრთადმდ ვამოყო ორს სახის დავითია შექმნიბში: განადგურება და აზრობა. განადგურებათა მავალითია - ხელისგან აკვადტებულ დაბანა მიმბოლოების დროს. აზრობათა - იერემონიად. არასახურეულ სავანთან შეების შესაღებლობის არტობად (ტკბე შეტებას).

**რიუმკის სიმპტომი მხრეუბების შეტებათა** - RUMKE H.C. (1957). მიმბოლოებით დაავადებულთან საუბრის დროს ექიმ-ფსიქიკატრს უნდება ხვეცოფიური ვანკობა, რომელიც, მიმბოლოების პირველი რანგის სიმპტომების ანალიზებზე, ენიჭება დიაგნოსტიკური მნიშვნელობა. ხამგისმულია ექიმის ინტუიციის როლი. მისი, როგორც დიაგნოსტის პაროუნული თვისება, თავისებური პიროუნული გრძობისანი, რომელიც აღმოყენდება პიროვნებამორისი კომპლექსის პიროვნებში. ავტორის აზრით, მიმბოლოების იერემონის ვარეულ ყველა ენობალი მიმბოლოებული სიმპტომი მოკლებულია დამახასიათებელ შეტებათა.

**რიუმკა-ცუკის მხრეუბების სიმპტომი** - RUMKE H.C. (1958; Zec N., 1966). იმ. მხრეუბების სიმპტომი.

**რიუმკის მხრეუბების მხრეუბების მხრეუბების** - RICHÉ Ch. (1899; Toulouse E., 1900). მხრეუბების გამოყენება დიეტათან ერთად (ორგანობის დეკლორირება - საკვებში მარილის სიტირ შემცლებობა 3 გ-მდე დღეში) ამტკობად, როგორც დამოკიდებულ მეთოდს არ გამოიყენება, თუმცა, წარმოადგენს სპალიკრანლო და დიეტური რეჟიმის შესაღებებლ ნაწილს ენაუქსისის დროს.

**რიუმკის სინდრომი** - RABIN P. (1929). შეტებათა დაავადება. ვალეუების ავტოსომურ-რეკესიული გიტი. დამახასიათებელია გრადი: 1) ელსოლოგობა პირის დრუს სხვა ასომბლიტობან ერთად. რაც არამოყიბათად განაპირობებს სურთების მიმი დარღვევებს; 2) მიკროსეფალია; 3) ცრნებრივი განვითარებლობა.

**რიუმკის სინდრომი** - ROTHENBERG M. (1912). მარეუბება-მარტების ორთგონების დარღვევა მარტობათა გამოყენებებში. სხველს სქებებს აშლებ ერთ-ერთი სიმპტომი.

**რიუმკის სინდრომი** - ROTHENBERG M. (1927). პაროქსიზმულად განვითარებული შიშის კატაბოლური და პალეოკატაბური სინდრომი. შეიყვის სმეტი. მრედელობით და ტავტოვრ პალეოკატაბიკების, სიტირანურიად, ყოველგვარი მიშების ვარეულ აღმოყენებულ შიშის ვრძობას და კავადტელოგორმულ დარღვევებს (დეკლიციის შეტებათა დამის საკვებში) აღწერილია ენკეფალიტების და მიმბოლოების დროს.

**რიუმკის სინდრომი** - ROTHENBERG M. (1964). მრედელობით მავალი შეტებათა პალეოკატაბიკები, თან ახლავს შეთთვის შიშის ვრძობა, არამოყიბათად იძებს ვახანგრძლივებულ მსდინარეობას. აღნიშნებათ ორთგონების მტავას დიოლითამიდას ხშირი მიმბოლოების დროს.

**რიუმკის სინდრომი** - ROTHENBERG M. (1945). პრევეციული შეტებათა პაროუნული თვისებებების გამოსავლევად. ავტორის თვითობის თახამხად, ფრესტრეყია აღმოყენდება (მისი, როცა ორგანობაში (პაროუნება) აწყდება მტკ-საქვებზე დაქვლილ წინააღმდეგობის რაიმე ცხოვრებისეული მოთხოვნილობის დაკმაყოფილების ვამბე ურტგრეყი სიმტარე - სტრუსულ სიუციასთან შეტებათა უბარი. გამოსავლევებს აჩვენებს სურათებს: მათზე მოუებულა ფრესტრეყი სავაყიებო და იგი სურათზე გამოსახულ ერთ-ერთი პერსონაჟი მთავრის სატყვეობს, რომელიც მან უნდა თქვას ამასთან დაკავშირებით. გამოსავლევებს რეაქციის დრო-ერთი მათი მიმართულების (ფრესტრეყი ვატიარის ან საქუთიანი თვის გატყება, კონსიქტური სოციალის სიკვდილრებისადმი მხრეუბება), რეაქციის გიტი (ფრესტრეყი ვატიარის ხამგისამ, თავადიკა, სიგუაციის ვადტების მისიორენებება) მიხედვით. მეთოდიკა გამოსავლევია ნევირმებით, ფსიქოპათიოგეით დაავადებულთა პიროუნული თვისებებების გამოყენების დროს.

**რიუმკის** - RICHÉ (ფრანგ ოსი). სოციალურ ფსიქოლოგიაში მარტების სოციალური ფუნქცია. შესახამხად აღნიშნა ქვეის სამოლოლოგიაში მიღებულ ნორმებს, პიროვნებამორისი უთიორობების სისტემაში მისი სტატუსის ან პოზიციის მიხედვით.

**როჯინოს ბიოფიზიკური მეთოდი** (როჯინოვი) - მოქმედებს აქტიური სამყაროს (როჯინოვი, 1951). ფსიქოლოგიური მეთოდი, დაყრდნობა თვითშეგნებებზე და შედეგად ორი - სტაბილური და მოძვლური ტექსტები. პირველი ღრის ავადმყოფი შესწავლიან აქტიურად (რაბინოვი) თვითშეგნებების მოხსენებულ და კონტოლირება რეალური მდგომარეობაში. მეორე ეგაი ეძლევა აქტიულებზე მიზარული თვითშეგნებების რეალიზაციას. სეკუნდარული პროცესები აქტიური თვითშეგნებით ხდება საკონტროლოდ იმ უნარის სწავლება, რათა ახალდასახულად იმოქმედონ ფსიქოლოგიურად პროცესების მიზნად დახმობაზე ორგანიზმში (მაგ. საკუთარ თავში ანხლებების ან სიკვდილგეგმის გამოწვევა, სხეულის გემო-საქონლის შეცვლა და ა.შ). მეთოდის მნიშვნელოვანი პირობაა თვითშეგნების ათვისება მოკლე დროში (1,5-3 კვირა).

**როჯინოს განახლებითი მეთოდი** (როჯინოვი) - როჯინოვი აღნიშნავს მეთოდს (როჯინოვი, 1953). პანოტიკური მეთოდი ხედავს ერთგვარად 1-3 სთ, რაც ხელს უწყობს პიზნოური შეცვლების გაღრმავებას და ახალგაზრდა სამყაროში მთავრობის თერაპიულ აქტივობას. რეკომენდებულია ჭრუჭური კი პნოტიკური მეთოდების სტაბილიზაციის და ამხელადროულ პირობებში. ექვი მდის ავადმყოფთან ყოველ 15-20 წთ-ში და ატარებს სამკურნალო მეთოდებს 2-3 წთ-ის განმავლობაში.

**როჯინოს კონსტრუქციული მეთოდი** (როჯინოვი) - როჯინოვი კონსტრუქციული მეთოდი (როჯინოვი, 1979-80) დაყრდნობდა სამკურნალო, ხანგრძლივი სტრუქტურული მდგომარეობის მიზნებზე სხვადასხვა, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა ფსიქოლოგიური ემოციური ხერხებით, მათ შორის რეკონსტრუქციული მეთოდები. უმოკლესი პანოტიკური მეთოდები. კონსტრუქციული მეთოდები უზარება ართიკულ და ელემენტარული მეთოდების (იხ. პანოტიკური) და ხელახლა ემოციური სტრუქტურის (ურთიკული) დასტაბილიზაციის მოკლებულ დისტრესის მოქმედების (იხ. ხელახლა სტრუქტურული) შესახებ წარმოადგენს. განვითარდა ბერნის (ბერნი, 1962), ბაქანევის და მელნიკოვის (ბაქანევი, 1962) გამოკვლევები.

**როჯინოს ბიოფიზიკური მეთოდი** (როჯინოვი) - როჯინოვი კოლექტიური მეთოდი (როჯინოვი, 1971) გამოიყენება ადგილობრივ სამკურნალო. პიზნოური მეთოდების საშუალებით გამოიყენება პიზნოური მეთოდები უმოკლესი რეკონსტრუქციული მეთოდების გამოყენება და სხვებ როდესაც სხვადასხვა რეკონსტრუქციული მეთოდები, დრეკტიულობა, სტრუქტურული სტრუქტურის შექმნა, ურთიკული და ა.შ. როჯინოს მეთოდი - როჯინოვი (როჯინოვი, 1921) პანოტიკური მეთოდების გამოყენებით მეთოდები, მეთოდი 10 სეკუნდური ცხელის (ლეკია) გამოყენებით. გამოიყენება პანოტიკური, თუ რას ხელახლა იგი ამ ელემენტარული, ურთიკული ექვეყნის მეთოდების, როგორცაა ლექია დეკლარაციის ფორმა, ურთი, მომა, რამ მიუყრთ მისი ურთიკული, სახის სტრუქტურული და ა.შ. ხდება ამ მეთოდების ინტეგრირება. მეთოდების ანალიზის დროს ხელმძღვანელებზე შედეგი მართალია კრიტიკული: 1) რას ხელახლა გამოიყენება ლექია-გამოსახულებებში (ადამიანის, ცხოველის, საგნების სილუეტები); 2) სახის შექმნისას იყენებს ცალკეულ დეკლარაციებს თუ გამოსახულებას მთლიანობაში; 3) რა ჭარბობს პანოტიკური - ურთი, ფორმა, მორალია და ა.შ. კონსტრუქციული მეთოდი (როჯინოვი, 1978) გამოიყენება (ბერნი, 1978). 1975, 1979). ტექნიკის (როჯინოვი, 1978) და მეთოდის (ბერნი, 1978) გამოკვლევები.

**როჯინოს მეთოდი** - მეთოდი (როჯინოვი) - როჯინოვი-მელნიკოვი-როჯინოვი (როჯინოვი, 1901; Melkersson, 1928; Rosenthal C., 1931). კონსტრუქციული მეთოდი მათი ემოციური სისტემის პირველი დახმობის დახმობით. დახმობით: სახის ცალი ნახევრის მოწყობილი მეთოდი; სახის ნერვის პიზნოლოგიური ტიპის მოწყობილი მეთოდი; მეთოდი მეთოდი მეთოდი; ნეკლინიანი ენა (lingualina). მეთოდები აღინიშნებადს მეთოდები მეთოდი მეთოდი, ცრემლები, სკოტები, პანოტიკური, ინტელექტის დაქვეითება, პანოტიკური ხელის თიკებში, განახლებითი მეთოდი მეთოდი. სინონ: სახის ნერვის პიზნოლოგიური მეთოდი.

**როჯინოს მეთოდი** - მეთოდი (როჯინოვი) - როჯინოვი მეთოდი (როჯინოვი, 1901). ფსიქოლოგიური მეთოდი ფსიქიკის მრავალმხრივი, პირველი რიგში, ინტელექტუალურ-მნიშვნელოვანი ღრისა, შედეგად შედეგად რეკონსტრუქციული ხერხებისგან, რომელიც იძლევა ურთიკული მდგომარეობის, სახეების მეთოდებით მეთოდებით (ფიქციის, რეკონსტრუქციული და რეკონსტრუქციული, ევრბალური და რეკონსტრუქციული მასალის დახმობების, გაგრძობის, სიყვითლი კომპლექსის დახმობების საშუალებას.

**როჯინოს მეთოდი** - მეთოდი (როჯინოვი) - როჯინოვი მეთოდი (როჯინოვი, 1901). ფსიქოლოგიური მეთოდი ფსიქიკის მრავალმხრივი, პირველი რიგში, ინტელექტუალურ-მნიშვნელოვანი ღრისა, შედეგად შედეგად რეკონსტრუქციული ხერხებისგან, რომელიც იძლევა ურთიკული მდგომარეობის, სახეების მეთოდებით მეთოდებით (ფიქციის, რეკონსტრუქციული და რეკონსტრუქციული, ევრბალური და რეკონსტრუქციული მასალის დახმობების, გაგრძობის, სიყვითლი კომპლექსის დახმობების საშუალებას.

**როჯინოს მეთოდი** - მეთოდი (როჯინოვი) - როჯინოვი მეთოდი (როჯინოვი, 1901). ფსიქოლოგიური მეთოდი ფსიქიკის მრავალმხრივი, პირველი რიგში, ინტელექტუალურ-მნიშვნელოვანი ღრისა, შედეგად შედეგად რეკონსტრუქციული ხერხებისგან, რომელიც იძლევა ურთიკული მდგომარეობის, სახეების მეთოდებით მეთოდებით (ფიქციის, რეკონსტრუქციული და რეკონსტრუქციული, ევრბალური და რეკონსტრუქციული მასალის დახმობების, გაგრძობის, სიყვითლი კომპლექსის დახმობების საშუალებას.

**როჯინოს მეთოდი** - მეთოდი (როჯინოვი) - როჯინოვი მეთოდი (როჯინოვი, 1901). ფსიქოლოგიური მეთოდი ფსიქიკის მრავალმხრივი, პირველი რიგში, ინტელექტუალურ-მნიშვნელოვანი ღრისა, შედეგად შედეგად რეკონსტრუქციული ხერხებისგან, რომელიც იძლევა ურთიკული მდგომარეობის, სახეების მეთოდებით მეთოდებით (ფიქციის, რეკონსტრუქციული და რეკონსტრუქციული, ევრბალური და რეკონსტრუქციული მასალის დახმობების, გაგრძობის, სიყვითლი კომპლექსის დახმობების საშუალებას.

**როჯინოს მეთოდი** - მეთოდი (როჯინოვი) - როჯინოვი მეთოდი (როჯინოვი, 1901). ფსიქოლოგიური მეთოდი ფსიქიკის მრავალმხრივი, პირველი რიგში, ინტელექტუალურ-მნიშვნელოვანი ღრისა, შედეგად შედეგად რეკონსტრუქციული ხერხებისგან, რომელიც იძლევა ურთიკული მდგომარეობის, სახეების მეთოდებით მეთოდებით (ფიქციის, რეკონსტრუქციული და რეკონსტრუქციული, ევრბალური და რეკონსტრუქციული მასალის დახმობების, გაგრძობის, სიყვითლი კომპლექსის დახმობების საშუალებას.

- რედის სინდრომი** - Ред. синдром (Red E., 1927) განთავსების თანდაყოლილი ანთაქსის ნაწილის ტრიადა: იქითიისი, იდიოტია, ვილესოტორმული გულურები.
- რედნაისის რეზოლუციური შემდგომარეობები** - Резолюция (Реднаиса) П'улиха Р.Н. 1911. იხ. **შეზღვევარეობების რეზოლუცია**
- რეზინაცია** - Резинация (ლათ. resinatio - გაღაღკვა, ვაზოტრება). დაღეილი საკეების საყლაპაიდან და კუვიდან პირის ღრუში დაბრუნება და ვაზოტრებითი გადაკლაპა. აღინიშნება ნეეროზების დროს.
- რეზინაცია შემდგომი** - Резинация (Реднаиса) აკვიატებული ზღოტარება, აუღმულის ცნობიერებაში

# ს

**სპარსის ბატონის შემოქმედითობის ტიტულუსი** - *Шаха багаташ пошадархондого титული* (Шаха ИОМ, 1952) უმაღლესიწიგნული მოქმედების გამოხატულება უმთავრესად შიშველობის გამოხატულება, რომელზეც მდგომარეობდა მესხეთის გესგი, უმაღლესი მხარეთმცოდნე, ასოციაციური უმთავრესად, ანგის გესგი, კორექტორული გესგი, უმაღლესი რედაქციური, უმაღლესი და სხვათა სხვათა, კანის ელექტრული წინადადებათა, არტერიული წნევის გამოკვლევა, შედეგების ანალიზი განხილვა უმაღლესი წიგნული მოქმედების ფიზიოლოგიის პოზიციონირება განსაზღვრება ანგნების და პინგანა შეკავების პროცესების მდგომარეობა, აგრეთვე უმაღლესი წიგნული სისტემის რეაქტიულობა და გონიერი. გამოხატულება ფსიქოლოგიაში და ფსიქოფარმაკოლოგიაში სინონი: ბატონის ტიტულუსის შემოქმედითობის ტიტულუსი.

**სპარსის სიმბოლო (შეიქმედებულია) - Шахна ошати** (Шахна ИОМ, 1953) წყვეტილობის გამოხატულება: ავადმყოფი არ ასახვობს მიმართულ შეკითხვებზე, მაგრამ აქტიურად მონაწილეობს გარემომცემოვით საუბარში.

**სპარსის შიშველობის სინდრომის ტიტულუსი** - *Шахна рушас ошати* (Шахна ИОМ, 1974) არჩევენ შედეგ სინდრომებს:

- 1) წყვეტილობა - ემოციური დახილვა, ასეთური, აქტიონდროული, ფსიქოსთენიური, აქვიატებულ მდგომარეობათა, მტერიული და სეზუალური დარღვევები; 2) აფექტური - მანიაკალური, დეპრესიული, დისფორიული; 3) შეშველობის დარღვევა - ფსიქოსენსორული, პალეონიაური, პარანოზიული, პარანოზიული, ფსიქიკური ავტომატებების, პარანოზიული; 4) მტერიული (ფსიქოფარმაკოლოგია) - კატაგონიური სეპორი და ანგნება, კეხეფრენიული, აპათური-მტერიული; 5) ცნობიერების შეშველობა - გახრება, რეგირიული, დეპრესიული, აბნეხური, ბინდისებური, კრეპიტაციული; 6) მტერიული უმაღლესი-შეშველობა (ფსიქოფარმაკოლოგია) - კორსაკოვისა, ოლიგოფრენიული დეპრესიოსა.

**სპარსის - სახელი სეზუალური პერვერსია**, დამახასიათებელია მისწრაფება, სექსუალური პარენოზის მიყვარის კავილი რიგ შემთხვევებში საღმისის გამოხატულება წახება და მკვლელობაც კი, შემდგომი სექსუალური აქტიონი (ბ. ბატონის ტიტულუსი). გრძელად შემოღებულა კრაფტ-განგაღ მთავრად, დიკემპრობულია XVIII ს. ფრანგი მწერლის შარკონ დე სალის სახელით, რომლის ნაწარმოებებში დედაურადაა აღწერილი პერვერსიის ეს სახე (ფრანგ. Sadomas) ფსიქოანალიზში: საღმისი თივლება არა მარტო სექსუალური გაკუდამართების სახე, არამედ განხილვა გაცილებით უარყო მასშიცა. იგი ყვადილება ბავშვობაში და წარმოადგენს სეკსუალური დეტალის წინაშეწინააღმდეგარეული ელემენტი. საღმისი და მათთანში არსებობს ერთდროულად სინონი: პარენოზიული აბნეხი, სეზუალური ტიტულუსი.

**სპარსის-განსახილველი - სახელი სეზუალური პერვერსია**, დამახასიათებელია **სპარსის (nb.)** და **მანიაკალური (nb.)** ერთდროული არსებობა.

**სპარსის ბანაჟი (Kretschmer E., 1922)** განტულება, რომელიც სეკსუალური განსაზღვრული პარენებისათვის და მასში იწყებს დამახასიათებელ განსაკუთრებით ძლიერ რეაქციებს. შიშველობა თიქვას, რომ საკუთარი განსახილვა და სასიით შეუფერება ერთმანეთს ისევე, როგორც გასაღები და ბოქლომი. უმაღლესი სეკსუალური-ფსიქიკური დარღვევის განსაზღვრება შიშველობა იყოს სეკსუალური სენსიტივი გიამს პარენებისათვის, ხოლო კერძოდანგული შორეულელების აღმზანისათვის დარღვის შეუშველელი, ჩაიაროს უკვალოდ კრეპიტაციის მიხედვით, ს.გ. შიშველოვან როლის ასრულების სენსიტივი ხოლვის წარმოქმნაში.

**სპარსის-განსახილველი ბანაჟის სინდრომი** - *იუსიუარხიუსიო ნარეხი იუსიუარხი* ფსიქიკური აშლილობა, აღმოცენდება საკონიუგაციური ბანაჟის გველებში ხანგრძლივი ფსიქიკური გრძელბანაჟის შედეგად. დამახასიათებელია დეპრესია, აქტიონდროული განსახილვა, აქტიული ანგნებალობა, სისუსტე, დაღლილობა, თავის კავილი, შიშველობა, მესხეთების დატეხილება, ურადილბის კონსერვაციის განხილვა, ინფიაციის დაკარგვა, პარენებისათვის კონტაქტების განხილვა, ძილის დარღვევა - შეშველობა სიმბოლო, რომლებზეც რეპროდუქციონება განსახილვა, შიშველობის გრძობა, კრეპიტაციონა, სიმადლის შიში, ხეხურის აუგნლობა, მომატებული ოფლიარობა, ინტელექტუალური ალკოჰოლისმი. ხ.ხ.ის ვარიანტებია მანიაკიკის სინდრომი, ტრაგედიის სინდრომი განადგურების ბანაჟისათა, გოპინდი დაჯიტიკი შიშველობათა. სინონი: KZ-სინდრომი.

**სპარსის-განსახილველი-შეშველობის სინდრომი** - *Сальватори-Шварц-Гурлаша ошати* (Salvatori 1817: Esquirol, 1838. (ფრანგი). დეპრესიის, ალკოჰოლის დიდი რაოდენობით გამოყენების მოთხოვნილება, რასაც წინ

ესწერებს მოსვენების, გაღვიძების პერიოდს. ავადმყოფი სიძამე ინტოქიკაციის მოვლენების აღმოცენებად.  
რის შესდეგაუ გაიადის ძაღლი. იმეათად დაფხიმანური შეგვება შეიძლება განვითარდეს რუსეთსან დაკავშირებით (Janet).

**ხალტრატორული სანჯიბი** - (Халтраторный санжиби) (ლათ. salitrio - სანაბი), იხ. ბაზილინიანის სინდრომი.

**სალტონის ძილდის შემკაპველობა** - (Салтонский шилдის შემკაპველობა) (Salton (A. 1927), იხ. შემკაპველობა ძილდის).

**სალფიდის სიმპტომი** - (Салфидный синдром) (Salfeld, 1966), იხ. ბაქტერიოლოგიის სიმპტომი.

**სამპოლიანო ფსიქოლოგია** - (Самполянская психология) ფსიქოლოგია დაჯგ. იუნგის ფსიქოლოგიის კანონზომიერებებს დაიკავებთა დაიუნსტეკამი, მკურნალობასა და პრიოდატეკამი: იკლდეუ: ექიმის, სამედიცინო პერსონალის ნილიერობას, მათ დამოკიდებულებას ავადმყოფისადმი, ავადმყოფის ფსიქოლოგიას, მათ ურთიერთდამოკიდებულებას, ფსიქოლოგიური ფაქტორების როლს დაავადებათა წარმოშობაში.

**სამპონი სიმპტომები** - (Сампони синдромы) (Freyhan F.A., 1957). ცნება შემოღებულა ფსიქოფაზმატოლოგიურ გამოკვლევებთან დაკავშირებით. დაპარკია ფსიქოპათოლოგიურ სიმპტომებზე, რომლებზეუ თითქოს დაბნეულია ესა იუ ის პრეპარატი, რომლის უწყვეტობის ძალიდა ითვალისწინებენ ამ სამუღების მიმართეს არა დაავადებასა და სინდრომზე, არამედ განსაზღვრულ სიმპტომზე ურეიანის მიხედუით, მკურნალობის პროცესში მნიშვნელობა ენიჭება საბინი-სიმპტომის ფსიქოპათოლოგიურ სტრუქტურას და იგნორირებულა მისი ნიშნოლოგიური მიკუთვნება, რაუ არ არის მართებული, რადგან სინდრომი-სიმპტომი უწრდება სხვა ფსიქოპათოლოგიურ სიმპტომებს და საქარება მათს კომბინირებული მკურნალობა ის ადუნიერების იკოსპოლიტიკურ თავისებურებას ვამო. მოთხოვნა უფრო არასიქელოგიურ მკურნალობას, მაე, უნდა და ეჭობეგური დეპრესიების დროს.

**სამპონალ-პროფილაქტიკური რეჟიმული გეგმა** - (Сампонал-профилактический режимული გეგმა) დაწეილია, რომლებუეუ საბინდოების უწყვეტ სამკურნალო-პროფილაქტიკურ დახმარებას, ფსიქიატრულ, ნარკოლოგიურ ს.-ბ.გ.ის მიკუთვნება საავადმყოფოები, დესანსერება, ნახვერდესკაციონარები (დღის და დაბის), სასწრაფო დახმარების ხეყოფიერებული ბრეგლები.

**სამპონალი სამუშაო** - (Сампоналский труд) წამალი ან ფიზიოლოგიურად აქტიურა ბუნებრივი ან სინთური გემო მიღებული სამკურნალო ნეოთერებები ან მათი ნარევები, რომლებუეუ ნებადართულა სამედიცინო გათვლებებისათვის.

**სამპონალი-სამკარგილი სხელოწინები** - (Сампонал-санитарный режимული წინები) წარმოებულა ორგანიზებულ ფსიქიატრულ საავადმყოფოებსა და დესანსერებთან, შოწლებულია ფსიქიკური ავადმყოფების შროშითი თერაპიისათვის. ს.-ს.ს.ის მიკუთვნება მუდის ექის-ფსიქიატრი, ოტაგა-წარმოებული, შროშითი ინსტრუქტორები.

**სამპონალიტალო რეჟიმული გეგმა** - (Сампоналительный режимული გეგმა) ფსიქიკური და ზოგჯერ ორგანოში დასაყურა მედიცინის, რუსული; ურთიერება ორგანიზმის და სამკურნალო-პროფილაქტიკური ერთიერთებებით, ხისსაყურა ვარეული უწყევითი (სანი და სანი) სხვა რეაქციებით, რომლებუეუ განპარობებს დახვეიებით მოთხოვნილებას, მკლდეად ან პერიოდულად მოიღოს ეს ნეოთერება, რათა თავიდან აიცილოს ამ ნეოთერების მიღების შეწყვეტით გამოწვეული შესაძლოა სიმპტომები.

**სამპონალიტალო ნეოთერების მიმართ პატარობა** - (Сампоналительный режимული პატარობა) აწეულია მკურნალობა მოიკურნოს სამკურნალო ნეოთერების მიმართ, რომლებუეუ ორგანიზმში მინიშლური სამკურნალო დახმებით შეუცინის შემდეგ იყუეს არასანურად გეგრდით რეაქციებს, სამკურნალო სამუღებათა დაბნევის დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს ავადმყოფის სამსწრე მონაცემები ამა თუ იმ ფსიქიკურად არეგულირება მიმართ ასეგრის შესახებ, ავრთუეუ პათოლოგიური ვარეებების არსებობა, მაე, თავის გეინის რეზილენტური ორგანული პათოლოგიის არსებობა განსაზღვრავს სეროლოგიური სინდრომების არეული გამოყენებას და მბიეუ მიმდარებას. **სამპონალიტალო სამუშაო** - (Сампоналительный труд) ნებისმიერი ნეოთერება, რომელუეუ ორგანიზმში შეეყინის ცელებს მის ერთ ან რამდენიმე ფუნქციას. აღნიშნული ნეოთერებები არ არის აუცილებელი შეიღეს წამლების სწრაფი და გამოიყენებოდეს ავადმყოფის სამკურნალო. ცნება პერიოდულა ყველა ფარმაკოლოგიურად აქტიურ ნეოთერებას.

**სამრეწველი რეპბლიტაცია** - (Самрестительная реабилитация) შროშითი თერაპიის მეოთხე სამრეწველო საწარმოში. ავადმყოფი ვადლის ფსიქიატრული სტატიონარდან რამბიტული აღამიანების სამოგალოებაში, მონაწილეობის კოლექტიურ შრომაში. მოყავს შრომითი თერაპიის უწყვეტებას, თერაპიას ვარეშითა, თერაპიას დასაქებით, დასარკავთ სოციალურ თერაპიასი და წარსიების პირობები. შრომით პროცესებში მონაწილეობის პროგრამა ინსტრუქციულიტებულია და სრულდება სამუღეული კონტროლს ქუე, შრომით პროცესებში ჩართვა შენდგომში შრომითი სწავლებით და შრომითი მიწოდებით აკარებს ეგაპორზე, ხანუფრეებზე ხასისა.

**სამხედრო-ფსიქიატრული მანუალებები** - (Самоединительная психиатрическая мануальная) სამხედრო-ფსიქიატრული ექსპერიმენტებისა და სიმბოლო მოხამარეულებისათვის ეგაპორებზე, აბსტრაქტიულად და სტატიონარულად მისი მორიხადი მანუა - განსაზღვრავს დაავადების სხე, ხარისხი და დაავადების ინდივიდული ვარეობაში სამხედრო სამსახურისათვის, დაავადების კუშირი სამუღის სამსახურთან. წეუეადმელთათვის ექსპერიმენტის პირველად რეაობს წარმოადგენს თავდაცვის სამსახურის რაობი: და საქადაუ (რეკონსტრუქცი) სამხედრო კომისარიატების საქეში კომსიატები, მებადარეობაში შედის ექიმ-ექსპერტი ფსიქიატრი, რომელიუ ყველა საქეში შემთხვევაში ვამოსკლდეუ ავადანების ფსიქიატრულ დაწეიერებებს და შენდგომში მიხედული დასკენის გათვალისწინებით. იღებს გამოყვეტილებას, ფსიქიატრულ დაწეიერებებს იქნება სავებში სტატიულიტაციუ კომისიები (სს), რომლებიუ ეგაპორეუების შედეგების განსაზღვრებით დებულის საბოლოო გადაწყვეტილებას და ადენს ლიანობს. სამხედრო მოსამხადრეების ფსიქიატრული ექსპერიმენტის ვარდება არასამდგომო პილდინიკურ და პოსამდგომო სამხედრო სიქეიზო კომისიებში, რომლის ვადაწყვეტილებასუ მკლდეუა შეთარალებული ძალების ცენტრალურ სამხედრო სავებში კომისიაში (ქსს).

**სამხედრო-ფსიქიატრული მანუალებები რეპბლიტაციაში** - (Самоединительная психиатрическая мануальная реабилитация) დაავადებებს ცხლადი მკლდეუა თავდაცვის მინსტრის ბრძანებით. შეიყავს დაავადების სახეების (სიქილიტიკური), მათი გამოხატულების ხარისხის გამოკლდევის აუცილებულ მეოთხებს და შესაბამისი ხანუფრეული









- 1) ანჩევინ მზადი ალაგკაციური სინდრომის სამ ფაზას: 1) შუთოთეს რეაქცია, 4) ალაღრმა (Alarm), მობილიზაცია; 2) წინადადლეგობის, რეზისტენტობის სტადია; 3) გამოყოფის სტადია, როცა ამოწურულია ალაგკაციური შესაძლებლობები. ადაპტაციური სინდრომის ვაღდამ შწამეან როლი ენიჭება პორმოების; ანგეარად, პროცესების დიაბოლიზაციაში, რამიხეი შეღის სტრესის ცნებაში, მუშაიდება შილოდ დროი ხროლი. ფსიქიაგრიამი ავრკიყე აინამსმება მოყვართ დავიდების, პირელ რავნი, ენლოვერისი, აღმოყვების ახსნის 1) რ სგრესის კონცუციის კომპოზიციად. სელოფ კონცუცია ხელს უწყობს შილოფრენის სომატური საუვუელის ცოდნის ვადრმაეებს, მავრამ საკმარისად არ შეუძლია ავალსოფიური ემოციონების არხის ახსნა (Knyazev I.V., 1963). ამ კონცუციამ მოშინულიანი როლი შეასრულა ბონდიფერის სწავლების შემდგომ შემუშავებებში. ადაპტაციური სინდრომის თავისებურებები კარგიკალურ, ფსიქოლოგიურ ღონეებზე შეიძლება შეესაბამებოდეს რაშინეკიკოთეს ფრენტრაციუს თვორთას.
- სემომიციის სინატირმი** - (Հայաստանում) (Հայաստ. [A. 1916] არაბანბარა წომის გუგება, მოყვარ აღინიშნება ეპილეფსიური გუღყრის შემდეგ და კრძეღდება ღღის ვანგაღობამო, არ აღინიშნება ვუყყრაითრის პერსოდში, რთოყ იგი ნანსეიდლება მყარი ანსოკორობტან თვის გენის ორჯანულ დამინების დროს არ აღინიშნება ისტერიული გუღყრის დროსყ.
- სემომიტი** - (Հայաստան) (ბერბ. semitikon). სწავლება დააეიდებს ნიშნებს (სიმგომების) და პათოლოგიური მკოლონოების შესახებ.
- სენსატოპათი** - (Հայաստան) (ბერბ. koines - მზადი, essthesia - გრძობა, მეურინება, pathos - დააეიდება) (Dupré E., Camus P., 1907). ვუღერება მძიმე უსომორი, ვარკეველი ხეუღოფან შუვრანებში. ღოკიღიშეული სხუელის მეღღარბე ამ მინგან ორგანიზმი და მოკლებული ობიექტურ საუვეულს. უბეტვად შეღის ობოქნარღული ბოღფხ სკრ უღკრამო.
- სენსატოპათია** - (Հայաստան) (ღათ. senso - დაბერება). დაბერება. სხეუღვანი და ფსიქიური ცუღიღებები დაბერების შეღღება.
- სენსატოპათია** - (Հայաստան) (ღათ. senilis - მოხუცეუღობითი) აბრღული ან ნადღრევი ხანგრე. მოხუცეუღობითი სხეუღოფანი და ფსიქიური ცუღიღების ვანეითარება შედარებით არაბოხე ადინიანებში. მოწიფულ ასაკში.
- სენსორი** - (Հայաստան) მოხუცეუღობათი, მოხუცეუღობის ასაკოთის ციკური მაგ. ს. დემენცია, ს. ფსიქოზები.
- სენსორი დეპრესია** - (Հայաստան) ხაროშის ობ. ბმწახარება მზწახარებაში.
- სენსიბილზაცია** - (Հայաստան) (ღათ. sensibilis - მგრძობობარე). წერღული ცენტრების მგრძობიღობის მომადტება ნაღიღიღიშების შეიქეღებში.
- სენსიბილზა** - (Հայաստան) (ღათ. sensus - გრძობა). აწველი მგრძობიღობა. ვულერობა, საკეთარ თაემი მოყვარება. ვადღარბეული სინდსორება. იქვეუღობისსადი მიღრეიდება, საკეთარ ვანეიდებუ ფისორება.
- სენსიტივია** - (Հայաստան) (ღათ. sensus - გრძობა, ბერბ. pathos - დააეიდება). სენსორული შექეღების (შუვრანება, აღკმა, წარიდლება) დაღრევე ფსიქიური დააეიდების დროს. რეუქტორული, მარგიტი, ელეგენტარული დარღვევა.
- სენსორული დეპრესია** - (Հայաստան) (ინგლ. depression - ნიღლ, deprivation - მოკლება, დაკრევა). სენსორული ილოზადია, იღორბაციული მიშშილი, ურთიერთობის უკმარისობა აღინიშნება ვესტრებაღურ სიგუაებში (დამბინთა ხანგრძლივი მარგოობა გაიგებში, ვამრეუბულში, ოკანებში და ა.შ.). შესწეღა ხდება ექსტერნებეული მოღღარების დროს.
- სენსიტივობა** - (Հայաստան) (ღათ. sensus - გრძობა, მგრძობა). ფსიქოლოგიაში: სწავლება იმის შესახებ, რომ ფსიქიური ცხორების საუვეულს შეადგენს გრძობადი მოადვეღებები. (Հայաստ. փսիქოლოგիայի օქթ. 2-ը)
- სენსიტივობის ფიზიოლოგიური** - (Հայաստ. [A. 1912] ობ. პმპაბი ფიზიოლოგიურად მოწივრება მადღრმა მინდოღობის ობიექტი)
- სენსიტივის ანდროგინულ-ტროპიკური ეპოჟება** - (Հայաստ. ანდროგინოტროპიკული ანდროგინი (Հայաստ. M.J., 1926). ობ. პოღოფანი პერპიკოლორბარბარა
- სენსიტივის ეტიოლოგიური ტრამა** - (Հայաստ. ეტიოლოგიკალი უქება) (Հայաստ. փսիქოლოგիայի օქթ. 2-ը)
- სენსიტივის ფასეოფიკა** - (Հայաստ. փსიქოლოგიაში) (Հայաստ. M.J., 1939). ობ. შურწინების რამბინების მუსხაბა.
- სენსიტივის ნარბი** - (Հայաստանում) (Հայաստ. M.J., 1955). მოწივუღულია ეპილეფსიის სამკურნალოდ. ფენილის მესადღვლობა შეღის: ფენიბარბავლი, პრამისოელი, კოფინი, პაპვერინის პიდრქოროლი, კალციუმის ვლკოնადი. დააეიდების სიმბების მიხედვით, არსებობს ღობრების სამი ვარიატი. მკურნალლობის უკრს ხანგრძლივი.
- სენსიტივის სოღრეფი** - (Հայաստան) (Հայաստ. M.J., 1955). ფსიქიური აქღვობა, აღინიშნება თავის გენის დომინანტური კემისეფრის შეზღის წოდის კონცეფსტური მიღამოს დამინების დროს (ახელი, აღინამა, ასპოგინობა). სინონ: სოღრეფი საბო პ.
- სენსიტივობა** - (Հայաստան) ობ. პმშბბ.
- სენსიტივიტეტი** - (Հայաստան) (ღათ. sens - მრადი). დიაგნოსტიკურ სეროლოგიური რეაქციების (ფინგრამანს, კინან, ზაბს-ციტებსელს და სხე) საუვეუღებუ სინონ: სენსიტივობა მანტინსეტი.
- სენსიტივობის რამბინა** - (Հայաստანում) (Հայასտ. ანტოფრ-ანტისებობის ტლანს რეაქცია ამ დროს არსებული ერთ-ერთი ეფემების ვთიელისწებით. ობწერი კომპლესების ფორმარბით (პრეპიტაცია, აგღუტინაცია, კომპლექტის შებოჟება).
- სენსიტივობის უღიღი** - (Հայასտ. მოლოგიურად აქტიური ნეოფორება ბმწახარამ კამპანს (ობ.) უღეღდ. შეღის ორგანიზმის უღღღი ქსოვილი. ცნობილია სის, რავრყე მოვიერთი სინავის მელიაგორის, როღი.
- სენსიტივობის უღიღი** - (Հայასտან) (ღათ. sens - სტიტი, ბერბ. სიღვ - შეეინებება, სწავლება). მკურნარება, რომელიუ შეისწავლის სქესობობის ცხორების სოციღურ, ფსიქოლოგიურ და ფიზიოლოგიურ ასექტებში.
- სენსიტივობის უღიღი** - (Հայასտან) (Հայასտ. მკურნარება, შესწავლის სქესობობი დარღვევებს, მათ კლინიკას, სინღინარგობას და მკურნალობის მეთოდებს. შეიღეშაეებს დიაგნოსტიკის და სქესუღური პათოლოგის თაიდან აციღების საშუალებებს.



გასლიმინებელი, რომელთა მოქმედება განსაზღვრება არა უმცირესი პარამეტრებით, არამედ ინფორმაციული, სისივრავლო მნიშვნელობით, ნეკროზი - დაავადება, გამოწვეული ინფორმაციით. ასეთი შიდაგონა ემყარება ნეკროზის არჩის გაჯებებს ევოლუციურ პრინციპს. ესეითიერაბია განსაზღვრება როგორც მეკროზალა ინფორმაციით, რომელიც შეიძლება სიმართლი იყოს ერთი ავადმყოფისადმი ან ავადმყოფთა ჯგუფისადმი ერთდროულად. ინფორმაციის სიძველდება შეიძლება იყოს უშუალო ან დროში ჩამორჩენილი, მიწოდებული იყოს არა მარტო მეტაბოლურებითი გზით, არამედ ესეითიერაბეების მიხედვით, ვესტებით, ინგონაციით და ა.შ. ინფორმაციით განსაზღვრება ავტოთე ექიმის ასეულირი შემოქმედება ავადმყოფზე ესეითიერაბის სახეები, შესაბამისად, განსხვავდება ინფორმაციის მიწოდების, გადასწავლების ან მოქმედების ხასიათით.

**სხამორეების ტრამლე თანდაყოლილი პოზიციონირება ნაწინებობა** - (თი ჩინი ტიხიი იოხისიი იოხა ჩინიიი) **СХАМОРЕИЕВЫЕ (Схаморев А.М., 1974) ახ. ტრამლე თანდაყოლილი პოზიციონირება ნაწინებობა**

**სხამორეების შთაბრუნების მემორიზაციული ტრეკეზობა** - (СхАМОРЕИЕ ВЪПРЯЖАЮЩИМЪМЪ КЪНУМЪМЪ МЪШЪМЪМЪ (СхАМОРЕИ А.М., 1982) შთაბრუნებამი ამრობრეი (ხუბანგიური) კომპონენტის ვარდა ვაზოფილია ინფორმაციის ევოლუციისი ევოლოტი. ესეითიერაბეების მერ შეჯანლი ინფორმაციის მნიშვნელობა და უკუეარობა ევოლუციურება მათი ავტომატური, ვაუენსიბიერებულ შეესების გზით. ამის წყალობით, ორგანიზმი დაეუღია სინგალებზე ავტომატური რეაქციებისან, რომლებსაც ან არ აქვთ მითვის არსებითი მნიშვნელობა, ან ავარებს ცრუ, ან არაეფექტივლებული ინფორმაციის ხასიათს. ასეთი დამატებითი (ევოლუციურება) ინფორმაცია მაღლა სწევს ტაროთადის (სეხანგიურის) უკუეარობას. ევოლუციურება ინფორმაციის მატალითა - ესეითიერაბეების მეტაბოლურების იტალიეისა და მშიკა, ჩინი ავტომატური.

**სხამორეების რეაქციის მემორიზაცია პრინციპური პარამეტრის** - (СхАМОРЕИ-РЕАКЦИА МЪМЪМЪМЪ (СХАМОРЕИ А.М., ЧИХИ А.С., 1963) ავტომატური ვარჯიშის მეოთხედ მლოდეიკაია, ვარჯიშის დაწყების წინ იყენებენ მსიახმადებელ ვარჯიშებს, რომელიც მიმართულია რეაქციის განმარტების შესწავლასზე. შეუკლილია ავტომატური პირეული სუბეხების მოვლერით ვარჯიშის ხასიათს. მაე, ეულის მოქმედების რითმზე შემოქმედების წინ წინასწარ იწყებენ სითბოს შეგრძენებას ევოლუციონის მიღამობა.

**სთინეპრეზია** - СТИНЕПРЕЗИА (ბერძნ. stenos - ძალა) შროვნული წყობა, დამახასიათებელია მაღალი სისაყოცლო ტანტის, მნიშვნელოვანი ესეიკური აქტივობა, სურვილების სიმყარე, მაღალი შროვნული თვიომეფისება. მოვლენა ასოთნის საწინააღმდეგოა, რაც არ გამოიყვება რეაქციის სახეთნიურ პირებს ტემპერამენტის თაიესიური პროპორციის პრინციპით.

**სხამორეების პრინციპი** - ПРИНЦИПЪ СХАМОРЕИ (გერმ. Lasterprinzip) ესეიკანდალამზე ფროდის მიხედვით, ერთიკონი მნიშვნელოვანი პრინციპი ესეიკური მოქმედების მიზანდა, თაიდად აიკლიოს ესეიკანდერება და მიიღოს სისაყოცობა. რადენე ესეიკანდერებათან დაეკამრებულია აქმნების რაოდენობრივი მრდა, ხოლო სხამორეებისთან - შეიკირება, ამიგომ სხამორეების პრინციპი თაილება ეკონომურ პრინციპად.

**სხამორეობა** - СХАМОРЕИ. შოხ თაიებუბრებებს და მოძრაობის ერთობლობა სხის მოვლერით სხის აქეს დიაგნოსტიკური მნიშვნელობა.

**ს. პრამეპრეი** - II СХАМОРЕИ. იმერელი ხაარულია - ნათხების დამინების დროს, იშტამპური ხაარულია - ქარია ბავარიეების დამინებისას.

**ს. მსტრინეპრეი** - II СХАМОРЕИ. გამოვლინების მიხედვით ევალდება. ისგეროული ქემიკლევის დროს ავადმყოფი ისე მოაქერებს შინამე ვებს, თითქოს სრიალებს ყინულზე; ხან გრეფი მიგნით აქეს შემოპრუნებული და გვრის მერვით მათორებს მიწაზე. შოე შემთხვევამი გერეფი შემპრუნებული ვარტო და გერეფი აბიეყის გერეფის მიგნითა კიდებ დაეკონსოხით. შოეგერით, შოეგერით, შოეგერით, შემპრუნებულა მიგნით და ადგამს გერეფის ვარტოა კიდებ დაეკონსოხით. შოეგერ სხარული მიგნებისებურია. შოეგერ ნახიჯები დიდა, ნახიგმისებური, რასაც უწოდებენ შერინაცი, ფრთის სიარული, ავადმყოფი იყრება მხოლოე წინააღმდეგობის ვაქციისას. შოე შემთხვევამი ავადმყოფი პარალელიზებულ იყეს; ხელის დხმარებით მათორებს (ტოფის ხაარული).

**ს. მორეინეპრეი** - II СХАМОРЕИ ვითარდება ექსტრაპირამიდეული დამინების დროს (პარკინსონიზმი) ავადმყოფები დაიდანს მოკლე ნახიჯებით, უქროს შობრაობის დაწყება და ციხერება, შობრუნება, დამახასიათებელია შობრადი შეხოქილობა, ხელების შეუკლეობის არარებობა სხარული დროს (იქტორიკანზე).

**ს. მსამეპრეი** - II СХАМОРЕИ. ვებება შოათითის დროს, შეხჯის ეკნების პარების გამო ავადმყოფი ვადალის ერთი მორადან შოერე მხარეს. ვების აქციის სხეული იხრება საწინააღმდეგო მიმართულებით.

**ს. პრამეპრეი** - II С. СХАМОРЕИ სისაყოცლო პარამეტრის დროს ყოველი ნახიჯის ვადადება იწყებს გერეფის კლუნეს, რის ვამყო სიარული დებულობს მოხგუნავე ხასიათს.

**ს. ლეკენეპრეი** - II СХАМОРЕИ სიარული მოკლე ნახიჯებით (ნახიჯის სიგრძე უტრის 10-15 სმ). ვებები დამორებულია ერთიკონი. ავადმყოფი შთა მითორებს, ვერ აუღებს მიწას. ვებებდა პირამიდეული ვებების ორმბრეი დიდანების დროს, ვანსაკუტრებით დამახასიათებელია თვის გინის სკლეროზისათვის.

**ს. ვეპლემეპრეი** - II СХАМОРЕИ (სეკანგი, ინგლ. spencer - ვადეატი). ვითარდება შოერე წვეიის ნერვის დამინების დროს კილერის პარების ან დამილის გამო (შეუკლებელია გერეფის ვაგლობის მოძრაობა). ავადმყოფი ვადადეგობისას ათილებულია ვები აწოის მაღლა, რას შემევევ ვების დადემისას ჯერ ადგამს გერეფის წვერს, შემდეგ კი ქესლს.

**ს. ვეპლემეპრეი** - II СХАМОРЕИ აღინიშნება თაიეს გინის შებლის წილების დამინების დროს. ავადმყოფი სიარულსას გერეფის ადგამს ერთ ხანზე.

**ს. მრეიკეპრეი** - II СХАМОРЕИ. დამახასიათებელია ქორესათვის ხაარულის დროს ავადმყოფი აქეთებს დამატებით არასაკირო მოძრაობებს.

**ს. ნაბრეინეპრეი** - II СХАМОРЕИ. იხ. ს. პრამეპრეი.

**ს. კლეიპრეი** - II СХАМОРЕИ დამახასიათებელია მოკლე ნახიჯებით სიარული ავადმყოფი ვერდობა გერეფის წინა ნაწილს ორთქლის მიხედვით თაიეს სამიშის ცენტრს (შობრუნება) სიარულს არ ერთობ ხელხებით ბალანსირება (იქტორიკანზე).

**ს. პარამეპრეი** - II СХАМОРЕИ. ვითარდება ქვედა სისაყოცლო პარამეტრის დროს. იხ. ს. სხამორეობა.

**ს. პარამეპრეი** - II СХАМОРЕИ. აღმოებება ქვედა კილერების პერიფერიული პარების დროს.

**ს. სანსამეპრეი** - II СХАМОРЕИ. დამახასიათებელია ქვედა კილერის ცენტრალური დაბლხისათვის და ვანპრობებულია

ქმნისა მიჰყვარისათა. გერეების ატაკიდან მოყოლებს გაძილებს ვაიო ავაღმყოფი ფეხის ვადალაგლებიანს

**ბ. ტრეზობა (მრავლობა)** - *Трибуна* (საზოგადოებრივი ადინიონი) იხილეთ: დამბლის დროს. ავადმყოფი ჯანმრთელ

ფეხს დაგანა შეეულებოდა ხოლო (დადაბლადაცხელ) ფეხს პასიურად მათარყეს.

**ბ. ტრეზობა მარჯობა** - *и вышшая* (საზოგადოებრივი) გეგებულს სპასტიკური პარალიტის დროს. ავადმყოფი ვერ ყურდნობა

ფეხებისა მარჯობა. იძულებულია იარბის ყუარყვნიო. ხანრულის დროს სხეული ქანქარასებრად მოძრაობის.

**ბ. ტრეზობა მარჯობა** - *и вышшая* (საზოგადოებრივი) განპირობებულია სპასტიკური პეშიპარეზით. ქვედა კიდურის განმრელებლის

კანქმის მოსიგების ვაიო ფეხი თითქმის «დაგანმელებულია» და ავადმყოფი იძულებულია. ფეხის ვადალაგლებიანს

შეისახისის ნახეგრანყო. ზედა კიდურების ფლექსორების პიჰერგონუსის გამო ავადმყოფს აქვს ე.წ. **ყვრბეგე-მანახ**

**სიბერე** *Сивирь* ხაიოცხლის დამამოავრებელი ზერიოდე, დამახასიათებელია ინდიფიდის ალაპიკაიურა

შესაძლებლობის განახიკული დაქვეითება და შესაბამისი მორეოლოგიურა ცვლილებების არსებობა ორგანიზმისა

და სხეულისში.

**სიბღანბე** - *Сивирь* ფსიქიკურა პროცესების მოზღზარეობის პათოლოგიურა ინერტულობა, მათი შენელება,

საკლებად ქრანობა, ვიღზირიის უქმირსობა, შეიძლება ვისივლინდეს ამრონიცხამში (აფექტის რიგივდობა

ესპეციალის დროს, ვადგინილი ვრეულოგიის შედეგად კიბეუსით დაქვეითებულში აუქტურის ს. სხრად შერწყმულია

ფსიქიკალბისთან. უქმირავრობისთან (გემქრამენგის ფუნქციონერ-ქსიპლომიური პროპორციის კრემინგის (E. Kretschmer, 1922) მახვდით).

**სიბრეპეპე მერპაღეპე** - *Сивирь* მუნი რეზი იბ. **პლემბა**

**სიბრეპეპე მუხისაღეპე** - *Сивирь* მუხისაღეპე მუხის ხახე, სანოგო სიმნების ენობის უქარის დაკარგეა.

**სიბრეპეპე სიტრეპეპე** - *Сивирь* სიტრეპეპე იბ. **პლემბა**

**სიბრეპეპე სიმპროპეპე** - *Сивирь* სიმპროპეპე იბ. **პლემბა**

**სიბრეპეპე მერპეპე** - *Сивирь* მერპეპე იბ. **პლემბა**

**სიბრეპეპე მერპეპე** - *Сивирь* მერპეპე იბ. **პლემბა**

**სიბრეპეპე მერპეპე** - *Сивирь* მერპეპე იბ. **პლემბა**

**სიბრეპეპე მერპეპე** - *Сивирь* მერპეპე იბ. **პლემბა**

**სიბრეპეპე მერპეპე** - *Сивирь* მერპეპე იბ. **პლემბა**

**სიბრეპეპე მერპეპე** - *Сивирь* მერპეპე იბ. **პლემბა**

**სიბრეპეპე მერპეპე** - *Сивирь* მერპეპე იბ. **პლემბა**

**სიბრეპეპე მერპეპე** - *Сивирь* მერპეპე იბ. **პლემბა**

**სიბრეპეპე მერპეპე** - *Сивирь* მერპეპე იბ. **პლემბა**

**სიბრეპეპე მერპეპე** - *Сивирь* მერპეპე იბ. **პლემბა**

**სიბრეპეპე მერპეპე** - *Сивирь* მერპეპე იბ. **პლემბა**

**სიბრეპეპე მერპეპე** - *Сивирь* მერპეპე იბ. **პლემბა**

**სიბრეპეპე მერპეპე** - *Сивирь* მერპეპე იბ. **პლემბა**

**სიბრეპეპე მერპეპე** - *Сивирь* მერპეპე იბ. **პლემბა**

**სიბრეპეპე მერპეპე** - *Сивирь* მერპეპე იბ. **პლემბა**

















ბ-ის სტრუქტურის და დინამიკის გათვალისწინებით. ხენგუნგის (Сингулярный А.Л. 1983) მიხედვით, უსაჩივრ დაბალიდან თან ახლავს სიმპტიუმის რაყის გამრღვა, ახლს აღმოცენება. მათი ევლდობა კლიოტრამდამოკლებლობაში, რაე იქვეს ერთი სინდრომის ვარდაქმნის მეთრე, ხინდრომა ეკლა. მათი ერთობის ამხავს დაბაღდობის სპეციფიკურ პათოლოგიურ პროცესის ვანტიარების შექმნამს (*Аномалии ИЛ 1982*). გრემის ხ. შივჯერ გამოიყენება დაბეღების აღმინამნებელ, ძირითადე ეს კეკიუის შექყიდრეობით დაბეღების.

- ბ. **ახსოვნობა** - *С. АМНОУТОУМОУ* იხ. *ახსოვნება*.
- ბ. **ახსოვნობა** *АХСУОУОУОМОУ* - *С. АМНОУТОУМОУ* იხ. *ბ. შივჯერ*.
- ბ. **ახსოვნობა** - *С. АМНОУТОУМОУ* დამახასიათებელი სურველებს არანდგობს, უსაჩივრობა და გულგრილობა. აღმინამნებელი მინორეობის, თავის გვიის ღრგანელ დამინების დროს (*ამათურ-ახვლური ხ-ის სინა*).
- ბ. **ახსოვნობა** - *С. АМНОУТОУМОУ* იხ. *ახსოვნება*.
- ბ. **ახსოვნობა** - *С. АМНОУТОУМОУ* იხ. *ახსოვნება*.
- ბ. **ახსოვნობა** - *С. АМНОУТОУМОУ* იხ. *ახსოვნება*.
- ბ. **ახსოვნობა** - *С. АМНОУТОУМОУ* იხ. *ახსოვნება*.

ბ. **ახსოვნობა** *АХСУОУОМОУ* - *С. АМНОУТОУМОУ* დამახასიათებელი სურველებს არანდგობს, უსაჩივრობა და გულგრილობა. აღმინამნებელი მინორეობის, თავის გვიის ღრგანელ დამინების დროს (*ამათურ-ახვლური ხ-ის სინა*).

- ბ. **ახსოვნობა** - *С. АМНОУТОУМОУ* იხ. *ახსოვნება*.
- ბ. **ახსოვნობა** - *С. АМНОУТОУМОУ* დამახასიათებელი სურველებს არანდგობს, უსაჩივრობა და გულგრილობა. აღმინამნებელი მინორეობის, თავის გვიის ღრგანელ დამინების დროს (*ამათურ-ახვლური ხ-ის სინა*).

ბ. **ახსოვნობა** - *С. АМНОУТОУМОУ* დამახასიათებელი სურველებს არანდგობს, უსაჩივრობა და გულგრილობა. აღმინამნებელი მინორეობის, თავის გვიის ღრგანელ დამინების დროს (*ამათურ-ახვლური ხ-ის სინა*).

ბ. **ახსოვნობა** - *С. АМНОУТОУМОУ* დამახასიათებელი სურველებს არანდგობს, უსაჩივრობა და გულგრილობა. აღმინამნებელი მინორეობის, თავის გვიის ღრგანელ დამინების დროს (*ამათურ-ახვლური ხ-ის სინა*).

- ბ. **ახსოვნობა** - *С. АМНОУТОУМОУ* იხ. *ახსოვნება*.

ბ. **ახსოვნობა** - *С. АМНОУТОУМОУ* დამახასიათებელი სურველებს არანდგობს, უსაჩივრობა და გულგრილობა. აღმინამნებელი მინორეობის, თავის გვიის ღრგანელ დამინების დროს (*ამათურ-ახვლური ხ-ის სინა*).

- ბ. **ახსოვნობა** - *С. АМНОУТОУМОУ* იხ. *ახსოვნება*.
- ბ. **ახსოვნობა** - *С. АМНОУТОУМОУ* დამახასიათებელი სურველებს არანდგობს, უსაჩივრობა და გულგრილობა. აღმინამნებელი მინორეობის, თავის გვიის ღრგანელ დამინების დროს (*ამათურ-ახვლური ხ-ის სინა*).

ბ. **ახსოვნობა** - *С. АМНОУТОУМОУ* დამახასიათებელი სურველებს არანდგობს, უსაჩივრობა და გულგრილობა. აღმინამნებელი მინორეობის, თავის გვიის ღრგანელ დამინების დროს (*ამათურ-ახვლური ხ-ის სინა*).

- ბ. **ახსოვნობა** - *С. АМНОУТОУМОУ* იხ. *ახსოვნება*.

არასრულყოფილია, აღნიშნა, ამითა, პირო ან კონკრეტ, შეგულებულია აქტიუობის დაქვეითება. აღინიშნა თავის გაცნის მუდგის დოკუმენტაციის თარგმნის დიხინების დროს.

ბ. პაპალიანი - C. ПАПАЛИАНИ, იბ. პრეზიდენტი პაპალიანი სტენოგრაფი.

ბ. პაპალიანი-შორიანი - C. ПАПАЛИАНИ-ШОРИАНИ (ბერძნ. παπαλικος) - დარგში დაბინდული, ლთ. formis - მსგავსი). ყოიარლება მწვავე და დასახბობებელი ზოგადტენიან და კერაგანა წყროლოფოური ხამტომების არსებობა, რისთვისაც მოვადგონეს შემორადიული ინსულგის სურათს, მარამ განმარობებელი სხვა მიზნით, მაგ. გენის ვაერობითაი ინფრექტი.

ბ. ასთინერი-ბრევიანი - C. АСТИНЕРИ-БРЕВИАНИ დასახბობებელი ახინა და ადინაბა. აღინიშნა ენადასურნა და ენობრერ-ორგანული ფსიქომების დროს.

ბ. ასთინერი-მარტინი - C. АСТИНЕРИ-МАРТИНИ ასინა გუნება-განწყობის მყარი დაქვეითებით. აღინიშნა ნეკროზების, ფსიქომების (ხშირად სობაგოკურნი, ფსიქოტერ-რეაქტიული, თუბა, არამედიაციად გუხლება ატრეთე ექსკლუიციის დროს), რაგი სობაგური დაეადრების დროს.

ბ. ასთინერი-მებბარტონი - C. АСТИНЕРИ-МЭББАРТОНИ დასახბობებელი ასინა, მიმდინარე გამოსატული ვაერობოური, ძირითადი ვაერობოური დარღვევით. აღინიშნა ნეკროზების, რეაქტიული მდგომარეობების, პირაყების პათოლოგიური განვითარების ზოგადი ეარინგის დროს.

ს. ასთინერი - C. АСТИНЕРИ, იბ. ბრევიანი.

ბ. ასთინერი-ბარტონი - C. АСТИНЕРИ-БАРТОНИ ასინა, რომელიც თან ახლავს ხელოვარ ვანობრელობაზე გადამტებული ზრუნვა. ამ დროს ხშირია უსამებო სხელოვანი შევრანებები, ცალკეული სერვისოპასუხები. განსაკუთრებით ხშირად ვებლება მოსახლერ ფსიქოგრაფის პრეკციებში.

ლ. ბო-ბო-შემორანების - C. БО-БО-ШОРИАНИ (Exner S. 1914). სობაგობა კომპლექსი, რისთვისაც საუბრელო დროის ხედავს და ხარკითაი თანდაზრობის აღქმის დარღვევა. დებორეგირება ხახობილება სიყვარით კონსერვის დარღვევით, რაც ავადმყოფს ექმის ვარემო არსებული საცნების 180-ით შემობრუნების მოახვედრების შესაძლებლობა. ავადმყოფი თითქოს გრადობებელი საწინააღმდეგო მხარეს უსგვარად აღმოქმდება პაროქსიზმული. ავადმყოფური მდგომარეობა ვრცელდება რამდენიმე საათიდან რამდენიმე დღემდე. აღინიშნა თავის გინის მუდგის დოკუმენტაციის თარგმნული დიხინების დროს. ამ შემთხვევებში ატრეთე აღინიშნა ავადმყოფი, ანბოკორია, აღადლოქიქური, აღინიშნა სინდრომის შეისხვევები აღწერილია დაბინდების თვისის დოკუმენტაციის დროს (Ljapunov I. L. 1940), რახაც თან ახლავს სხეულის სქემის აბლა, თბერევიანი ავინობა და ავინის ვლენებები. ეს შემთხვევები მომდინარეობს ყნობრების მუქვლით განსაკუთრებელი მდგომარეობების გიპთ. ხედავის აღქმის ასეთი დარღვევა აღინიშნა ატრეთე ძალადგონის მდგომარეობებში (Pick A.).

ბ. ბრაზინერი - C. БРАЗИНЕРИ ბრინიანი ბრინიანი (Ljapunov I. L. 1955) დასახბობებელი კონტრასტული ფსიქოპათოლოგიური გამომდინებების არსებობა ამროზებში, ავექტროზებში, ქვეყანი (კრიოთერაპიოლოგიაზე) მუქვლით. ვრთობითი ხბლვეის და არადეკადური ავექტური რეაქციების ერთდროული არსებობა, აბლუა და არსობეგირებელი და ვარე სინამდლეფსამი შეესახამო ქვეყნებში) განიხილება რაიოირე საყის გენის ქერქის უღრამარადიული ფამის გიპოვინება მიმორენობის დროს.

ბ. ბრაზინერი-ბრევიანი - C. БРАЗИНЕРИ-БРЕВИАНИ ავექტური დარღვევა ზოგადი (პარანოლიდი ან პარანოლიდი) ყნობ. აღინიშნა მრავალ ფსიქური დაეადრების დროს.

ს. ბუბკური - C. БУБКУРИ, ფსიქოპათოლოგიური ხანდრობების ზოგადი სასელოება, რომელთა კლინიკურ სურათში ვარობის ავექტური დარღვევები, აღინიშნა მრავალი ფსიქური დაეადრების, პირედ რაში, ავექტური ფსიქომების დროს.

ბ. ბუბკური-ბაბრანების და სანდრკონაბინის - C. БУБКУРИ-БАБРАНИ И САНДРКОНАНИ (Ljapunov I. L. 1968) თარკლებს ვეპრისობაბინ დაეკემრებული პაროქსიზმული ფსიქოპათოლოგიური ვანობრეობების ერთ-ერთი ფორმა. აღმოქმდება აბოტკვიური ინტოქიკაციის და პადრკლების ფორმა. დასახბობებელი ვანობრებადი აღქმის არსებობა, რომელსაც თან ახლავს თავისებური სენსეგოპათიები. ვაპირებული აღქმა ხიკუთენება საკეთარ სხეულს აბლთა სხვა ინგოქსიკაციის დროს აღწრულ სიმგომბინ (სურბ: ბრევიანი, სობარევი ბანკური ბაბრანების, სობარევი ხარევიანი ფამინარი პრეზიდენტი ბაბრანების სანდრკონა ბანკური, სობარევი ბანკური ბანკური ბანკური ბანკური ბანკური).

ბ. ბლანტარანი-ბრევიანი - C. БЛАНТАРАНИ-БРЕВИАНИ (Miyake I. L. 1967) ენადგებური ქვეყანობის ვრ-ვრთი ვარანადა. დასახბობებელი ვანობრეობა აბთობა. ინველექტიული მოქმედების და ესოყური ვანობრეობების ვიდეურები მუნელება და ნაქველად ბერაობა. ავექტური დაბბბლობის და ქლადობირობის არარსებობა. აღინიშნა ენადგებური პრეყების ხანგრძლივი მიმდინარეობის დროს ხშირი კონტრასტული ვლენებობი. ენადგებური სეგავით და ენობრების დარღვევის ენობრებით. მსგავსი დევენბური სინდრომისა და საწინააღმდეგო ექსტრომობობისა. აბლთა ინტეგლოგიოგოფიზური ქვეყანსგობისა ენადგების დროს (Miyake I. L., Kawanishi I. L. 1964).

ბ. ბრაზინერი-ბრევიანი - C. БРАЗИНЕРИ, იბ. ბრევიანი.

ბ. ბრაზინერი-ბრევიანი - C. БРАЗИНЕРИ (Ljapunov I. L. 1929) ტანური აღკომლობისათვის და ვანობილება რაიოირე აბტანტები შედეგი. თრობის ვანობრეობის აღინიშნა ზოგადი სხესეც. გუნება-განწყობის მუქვარი რაიოირეობა, მუოთე, ექვანობა, თავის გკოლი, გულსრევა, ღებინება, სხეულის გრემორი გავქარლია, ოფლანობა, ყსალაობა, კონსერვალი სიმგომბინ, ზოგადი - პიანდეთური ქალკუნიციები. ამ მოვლენების თავიდან ავილება ან შესქეგება სხვა აღკომლობის მიღების შემდეგ. ზგ. არის ფორმირებული აღკომლობის ნიშანი. სინანი. სტენოგრაფია

ბ. ბრანდერანი-ბანკური - C. БРАНДЕРАНИ-БАНКУРИ (Trautmann E. C., 1961). აღინიშნა ნეისტური საკონტრასტული პანკური ყოფილ ფსიქური აბლადილება გამიხილენება ვანობრეობებელი აურელებების შემდეგ დასახბობებელია მიმის მდგომარეობა, დეპრესული რეაქციები, წანხლად სურათების განუწყობებელი გიოტსებება აღინიშნა ვეავტოური დარღვევები, სქეუალური უკმარობა, ერთდროობის









შესაძლებელია ელემენტარული ან დროს, როცა კლასიკური სურათი სახეობა ხასკოციების საში ვეკუილიან ორს - ნეკროტიკული, ფსიქოსაბიური და ფსიქოსერული ტიპები (Fisher T. 1989) მხ-ის ნიშნებს მათკეთების დიფერენციალური (სასაბიური) და (სასაბიური) მისს. შრადილიანი ფიბრების, ატროფიკულია) უფრო უფრო ნაკლები, კონკრეტულად სიმსივნის, დიფიკულტური რეპროდუქციის, ლიმფის სინდრომებს, პოლიმორფულ-მეტაბოლურ სეკუნდარულ და ამოღების მკაფიულებას კონკრეტული გამორჩეული დაკარგვის მხ-ის დამახასიათებელი ნიშანი - კლასიკური სურათის პოლიმორფიზმი და მისი ელემენტარული (სიმსივნის) ისეთივე არასტანდარტული, სინონ: **პლასტოციტოზი**, **პლასტოციტოზი** (Pfeifer E., 1974).

ს. **მომსახურებელი ფიბროზი** - ე. ნეკროტიკული ან **პლასტოციტოზი** სინდრომი.

ს. **მომსახურებელი ფიბროზი** და **პლასტოციტოზი** - ე. ნეკროტიკული ან **პლასტოციტოზი** სინდრომი.

ს. **მომსახურებელი ფიბროზი** - ე. ნეკროტიკული ან **პლასტოციტოზი** სინდრომი.

ს. **მომსახურებელი ფიბროზი** - ე. ნეკროტიკული ან **პლასტოციტოზი** სინდრომი.

ს. **მომსახურებელი ფიბროზი** - ე. ნეკროტიკული ან **პლასტოციტოზი** სინდრომი.

ს. **მომსახურებელი ფიბროზი** - ე. ნეკროტიკული ან **პლასტოციტოზი** სინდრომი.

ს. **მომსახურებელი ფიბროზი** - ე. ნეკროტიკული ან **პლასტოციტოზი** სინდრომი.

ს. **მომსახურებელი ფიბროზი** - ე. ნეკროტიკული ან **პლასტოციტოზი** სინდრომი.

ს. **მომსახურებელი ფიბროზი** - ე. ნეკროტიკული ან **პლასტოციტოზი** სინდრომი.

ს. **მომსახურებელი ფიბროზი** - ე. ნეკროტიკული ან **პლასტოციტოზი** სინდრომი.

ს. **მომსახურებელი ფიბროზი** - ე. ნეკროტიკული ან **პლასტოციტოზი** სინდრომი.

ს. **მომსახურებელი ფიბროზი** - ე. ნეკროტიკული ან **პლასტოციტოზი** სინდრომი.

ს. **მომსახურებელი ფიბროზი** - ე. ნეკროტიკული ან **პლასტოციტოზი** სინდრომი.

ბ. **პარანოიკალიზმი** - *ე. იუიხისი, იამილ ხსტემატიზებული ბოდეა, ჩეკელებრიე, თან ახლავს ქვეყის ბილესათი ფარსება და ბუექსერი (ხულებერესული ან სპიპომსიაკლერი) ანლალობები. აღნიშნება ცნობავაქუსრი ესოქიშების (პარანოიკალია, ანთელეოქუსრი პარანოია) დროს.*

ბ. **პარანოიკალიზმი** - *ე. იუიხისი, იამილ ხსტემატიზებული ბოდეა, ჩეკელებრიე, თან ახლავს ქვეყის ბილესათი ფარსება და ბუექსერი დარალაქებს. აღნიშნდება ესოქიშეხებად. აღნიშნებათ ხასიათის პარანოიკალი თესესების შესანი კლასიკალი და კლასიკალი პარანოიკალი განსაჯარების გიათს.*

ბ. **პარანოიკალიზმი** - *ე. იუიქიარომილი ბოდეათი მდგომარება, რომლის დროსაც განიხილება განდიდების ფანტატიკური ბოდეა, ლექსია და მესოქიშების ბოდეათი ილუბი, ესოქიქური ანთელეოქიშის მოქალაქური ანთელეოქიქური ცხალდების ფორმე, ანთელეოქიშების (ხსტემატი) არჩევენ მქეციე და ქორსიკულ პარანოიკალი, სტრუქტურის მისიქლეს, ხსტემატიზებული, პალეოქიკალური და კონტაბულიკური. ცხებდება მიზოქიქის და თრგანული ესოქიშების დროს.*

ბ. **პარანოიკალიზმი** **პეპოქიქირიზმი** - *ე. იუიქიარომილი (Polzien R., 1962). შეტყეებმავე გარად აღმოქეხებული მდგომარება, ხასიათდება ხსტემატი გემქიქარგურის დაქექიქებითი 0,7-1,30 C-ით. ანთელეოქიქი ამ დროს ესოქის ხსტის მეგნატიზების, თელანობის, სიქლილის მისი, ავრქეციე აღნიშნება გარქიქარდა, თანეგნესხებე, გულანბრება, შოგად ხსტემატი. ხსტემატი განსაჯლება, მეგევა არქელეგა რამდენსე ვეთიდან რამდენსე სათიანსე და სიქიქრება სიქის მეგნატიზით ხსტემატი ან მეგნატიზით, განსაჯელი ათიანთი. აღნიშნება სტრუქტურის დროს.*

ბ. **პრეზი** - *ე. გირე (Gairer P., 1935). აღნიშნება პეკის დათეაქების დროს და შეკეციე პალეოქიკალის, ექოქალის, შეტყეებმა. ანთის (ხსტემატი) სიქელეოქიშები მართულია თრთიანი სიქიქარადი ხსტემატი (ესოქიქი). სინდრომის დათესიქიქური მნაქიქილეობა ხამეპასულია ათურეებ და პეკიქის (Ajuria Guerra G., Hecea H., 1960) შიერ.*

ბ. **პრესი** **ქექემატი** - *ე. იუიქიარომილი (Ekblom K.A., Lindholm A., Ljungberg L., 1972). დესტროქიქური სინდრომი, დათესიქიქური თანდითი სიქოქიქექიქური პრეპარაქებით ხანტემატი პერსიქიქის დროს პარანოიკალიზმი და განიშაქიქებული. დათესიქიქებულია თელანობის მდგ ნაქლის, ქორის, თავის ცალმხრიუ გაღნობა, სხიქიქური და აღნიქიქური განიქიქი და გულეს მერგეში. შოქექურობის მეგნატიზის, შოქემატი, შოქელის, შოქელ სიქიქეციე, ქექი თესიქიქრის, მსხეჯერ ამ დროს აღნიშნება ავრთეციე შეციგინებით დესტროქიქის სიქიქიქიქის ხასიქ კექიქების ქექიქური შექემატი, ათეციქური პარანოიკალი ქოქურეში.*

ბ. **პრესიკალი** **პალეოქიქური** **პრესი** **(პრესიკალიზმი)** **პეპოქიქირიკალი** **პრესი** - *ე. იუიქიარომილი (Polzien R., 1962). აღნიშნება თესესების დათესიქიქური მნაქიქილეობა ხამეპასულია ათურეებ და პეკიქის (Ajuria Guerra G., Hecea H., 1960) შიერ.*

ბ. **პრესიკალი** **პრესი** - *ე. იუიქიარომილი (Ekblom K.A., Lindholm A., Ljungberg L., 1972). აღნიშნება თესესების დათესიქიქური მნაქიქილეობა ხამეპასულია ათურეებ და პეკიქის (Ajuria Guerra G., Hecea H., 1960) შიერ.*

ბ. **პრესიკალი** **პრესი** - *ე. იუიქიარომილი (Ekblom K.A., Lindholm A., Ljungberg L., 1972). აღნიშნება თესესების დათესიქიქური მნაქიქილეობა ხამეპასულია ათურეებ და პეკიქის (Ajuria Guerra G., Hecea H., 1960) შიერ.*

ბ. **პრესიკალი** **პრესი** - *ე. იუიქიარომილი (Ekblom K.A., Lindholm A., Ljungberg L., 1972). აღნიშნება თესესების დათესიქიქური მნაქიქილეობა ხამეპასულია ათურეებ და პეკიქის (Ajuria Guerra G., Hecea H., 1960) შიერ.*

ბ. **პრესიკალი** **პრესი** - *ე. იუიქიარომილი (Ekblom K.A., Lindholm A., Ljungberg L., 1972). აღნიშნება თესესების დათესიქიქური მნაქიქილეობა ხამეპასულია ათურეებ და პეკიქის (Ajuria Guerra G., Hecea H., 1960) შიერ.*

ბ. **პრესიკალი** **პრესი** - *ე. იუიქიარომილი (Ekblom K.A., Lindholm A., Ljungberg L., 1972). აღნიშნება თესესების დათესიქიქური მნაქიქილეობა ხამეპასულია ათურეებ და პეკიქის (Ajuria Guerra G., Hecea H., 1960) შიერ.*

ბ. **პრესიკალი** **პრესი** - *ე. იუიქიარომილი (Ekblom K.A., Lindholm A., Ljungberg L., 1972). აღნიშნება თესესების დათესიქიქური მნაქიქილეობა ხამეპასულია ათურეებ და პეკიქის (Ajuria Guerra G., Hecea H., 1960) შიერ.*

ბ. **პრესიკალი** **პრესი** - *ე. იუიქიარომილი (Ekblom K.A., Lindholm A., Ljungberg L., 1972). აღნიშნება თესესების დათესიქიქური მნაქიქილეობა ხამეპასულია ათურეებ და პეკიქის (Ajuria Guerra G., Hecea H., 1960) შიერ.*

ბ. **პრესიკალი** **პრესი** - *ე. იუიქიარომილი (Ekblom K.A., Lindholm A., Ljungberg L., 1972). აღნიშნება თესესების დათესიქიქური მნაქიქილეობა ხამეპასულია ათურეებ და პეკიქის (Ajuria Guerra G., Hecea H., 1960) შიერ.*

ბ. **პრესიკალი** **პრესი** - *ე. იუიქიარომილი (Ekblom K.A., Lindholm A., Ljungberg L., 1972). აღნიშნება თესესების დათესიქიქური მნაქიქილეობა ხამეპასულია ათურეებ და პეკიქის (Ajuria Guerra G., Hecea H., 1960) შიერ.*

ბ. **პრესიკალი** **პრესი** - *ე. იუიქიარომილი (Ekblom K.A., Lindholm A., Ljungberg L., 1972). აღნიშნება თესესების დათესიქიქური მნაქიქილეობა ხამეპასულია ათურეებ და პეკიქის (Ajuria Guerra G., Hecea H., 1960) შიერ.*

ბ. **პრესიკალი** **პრესი** - *ე. იუიქიარომილი (Ekblom K.A., Lindholm A., Ljungberg L., 1972). აღნიშნება თესესების დათესიქიქური მნაქიქილეობა ხამეპასულია ათურეებ და პეკიქის (Ajuria Guerra G., Hecea H., 1960) შიერ.*



- b. **ფანქაროვარაბილიზმი** - *с. фанкоровабилизм* იხ. *მხარგრევატაბლა*.
- b. **ფსიქიკის რამპრისმა** - *с. психики рамприсма* 'ბტრული ფსიქიკის ფორმა. დამახასიათებელია ფსიქიკური ფუნქციების ამაღლებული მდგომარეობის ცნობიერების და ქვეყნის ფონზე, რამდენადაც მათგან განსხვავდება ფსიქიკის ქვეყნის უთანადო ან მწველ, მძიმე ფსიქოგენიკის მდგომარეობის და წარმოადგენს რეაქტიული ფსიქიკის ერთ-ერთ დამახასიათებელ სტადიას. აღინიშნება ისტერული განდობისა და შესაძლებელია შექმნილი სტადიის განხილული მდგომარეობის აღნიშვნა ნიუთაოდ. სინონ.: *ბ. მამპრისმატა*.
- b. **ფსიქიკური-მამპრისმა** - *с. психическая мрамприсма* (Emil-Well P., Cohen R., 1928). ფსიქიკური აშლილობა პერნიციოზული ანემიის დროს. ილარუსი მამპრე შესაძლებელია - აბათიური ფაქტორია. მამპრე შეესაბამება და ხშირად - დელორული მდგომარეობა და კონსტრუქციის სინდრომი. სომატური მდგომარეობის ვაქციოზების დროს ფსიქიკური აშლილობები ქრება, რაც მეთოდიკის ნაყოფიერებას იქვით განპირობებული გოქსიკოსის არსებობას და არა თავის გენიის ორგანულ დამახასიათებლობას.
- b. **ფსიქიკური-მამპრისმატიზმი** - *с. психическая мрамприсматизм* (Thiele W., 1958). სომატოზებელი ფსიქიკური აშლილობის ვარიანტი. დამახასიათებელია პათოლოგიური ვივიტატიური დარღვევები - კანის შედარების გაყვანილობის ან სპიკრების, ჰიპერალბურმი, გაქვირული, არტერიული წნევის მომატება ან დაქვირება, ალკოჰოლი მოკლებულია, ხშირად აღინიშნება ქალებში 30-40 წლის ასაკში. ამ დროს ხშირია თავის გაქვირება უსაბუნსო მდგომარეობები გულის არეული მდგომარეობის სისუსტე, მიუხედავად დარღვევების მიხედვით, თავის ვარსიანობა, თავბრუსხვევა, სეკსუალური დარღვევების მიუხედავად სქესობის დაქვირება, სქესობის განსვლიანობა. ეტიოპათოგენური როლი ეწმუება გენეტიკური, კონსტიტუციური, სოციალური, ფსიქოლოგიური და სომატური ფაქტორებს. სინონ.: *სინდრომი შენსიკური, ფსიქიკური-მამპრისმატიზმი* (Stachel B., 1965). შტრ.: *მამპრისმატიზმი*.
- b. **ფსიქიკური-მამპრისმატიზმი** - *с. психическая мрамприсматизм* (Grünberger J., Zapotocky H.G., 1970). აღწერილია ფილტვის ტუბერკულოზით ხანგრძლივი დაავადების დროს. დამახასიათებელია პირთუნული ცვლილებები (გულის-განწყობის შეზღუდვის მიღწეობის დარღვევა, დეპრესია, აუტონია). მის აღსრულებებში რიღის ასრულების ისეთი ფაქტორები, როგორცაა ვარე განდობიანობის უსაბუნსობა. შედარებითი ფსიქიკური აშლილობა. მუცლის-მამპრისმატიზმი სქესობის მრავალჯერადი არარსებობა ხანგრძლივი პოსტგინაქსიის დარღვევებით, აუტოტური ნაჭიერება, აწვეული ვივიტატიზმობა, დაავადების ქრონიკული მდგომარეობა და მის შესახებ მრავალჯერადი სტადიების, ვივიტატიზმობის და ვივიტატიზმის განხილვის მიხედვით. შეფასებულია როგორც პოსტგინაქსიის შედეგი.
- b. **ფსიქიკური-მამპრისმატიზმი** - *с. психическая мрамприсматизм* (M.C., 1936). ხელოვნური სანთიზმის დარღვევის შედეგი. იწვევს ვარე სანთიზმის და სპიკრის სხეულის რთული აღქმის დამახასიათებელი უეჭვოდ გრძობობა ორგანიზმით მალეული შედარების შესაბამისობის დროს. ფს-ბ მთავრებებს სხეულის სქესობა აღქმის ამა. საგნის ფორმის, სიგრძის, დროში კეთილის (მთავრების იანმამდგრეობის), ვარემოს უკლებლობის აღქმის დარღვევა. ორი ძირითადი ფს-ბ - *დეპრესიონალიზმი და დეგრადაციზმი*. მუცლებრივ, ვითარდება პარაქსიზმული და აღინიშნება თავის გენიის დარღვეული დამახასიათებლობის დროს (ვივიტატიზმი ვარედავით, ვივიტატიზმი, სიხივით, პარაქსიზმი და სხვ.). დამახასიათებელია ვივიტატიზმი - თავის გენიის ვივიტის ქვედა თხემის და თხემის კენების ევლვით. მტერიპაროტიკური დარღვევა. *ბ. დამახასიათებელი-მამპრისმატიზმი* (იხ.) აღინიშნება ავტოტუვი ენოლოგური ფსიქიკების - მიმოტურისას მსგავსი კლასიკაში.
- b. **ფსიქიკური-მამპრისმატიზმი** - *с. психическая мрамприсматизм* (Bradfigem W., Christian P., 1981). იხ. *სინდრომი ფსიქიკური-მამპრისმატიზმი*.
- b. **ფსიქიკური-მამპრისმატიზმი** - *с. психическая мрамприсматизм* (Vexhüle Th., 1979). იხ. *სინდრომი ფსიქიკური-მამპრისმატიზმი*.
- b. **სანთიზმი** - *с. психическая мрамприсма* (Stankard A., Grace W., Wolf H., 1955). ზეგანი კვამი გენიის ხილვით. განიხილება როგორც ფსიქიკური-მამპრისმატიზმი სინდრომი, ხშირად აწვევს დამახასიათებელი სიხივით. სანთიზმის ვარესდება ვივიტატიზმობის, მთავრება სოქვიერობა, ვივიტატიზმობა, მადა ნახიარწყლების მიღება ავტოტუვიტის ვივიტატიზმობის და თვითმდგრეობის. დამახასიათებელია პათოლოგიური მრულის ბრევილი გი. მუცლებში განიხილულია როგორც ფსიქიკური-მამპრისმატიზმის ვივიტატიზმი. ანამნეტიკური მუცლებრივი (Simon R.J., 1963) ზეგანი იტერიპაროტიკური დარღვევა როგორც "დეგრადაციის ვივიტატიზმი" ან უახლოვდება ფსიქიკური-მამპრისმატიზმი სინდრომის ნეკრიზმის ფარგლებში (Jarosz M., 1905). სინონ.: *სტანდარტიზმი-მამპრისმატიზმი* *სინდრომი*.
- b. **სანთიზმი** - *с. психическая мрамприсма* (Hoche A.E., 1912). ფსიქიკური-მამპრისმატიზმი სინდრომი, აღინიშნება ამა იუ იმ ფსიქიკის მანდარეობის ყველა ფორმით (პირთაოდ დაპარაქსი ენოლოგური ფსიქიკების) და წარმოადგენს დაავადების ძირითად კრიტერიუმს. მამპრისმატიზმის დროს ეწმუება შეესაბამება ე. ბლოლივლის მიერ ვივიტატიზმი ძირითადი მამპრისმატიზმის ერთობლიობას.
- b. **ფსიქიკური-მამპრისმატიზმი** - *с. психическая мрамприсматизм* (Григорьянц И.Л., 1975). ნარკოპანის დაავადების ვარიანტი. მამპრისმატიზმი - ნარკოტიკული სიხივების მოხმარების ფორმის შეცვლა. ტოლერანტიზმის შექმნა, დაავადების რეაქციების ვივიტატიზმი ზეგანიზმის დროს და თირბის ფორმის შეცვლა. აუტოტუვი აღინიშნება სქესობითი ფორმის ნარკოპანის კლასიკაში ფსიქიკური და ფიზიკური დამოკიდებულების სინდრომითან ერთად.
- b. **სანთიზმი** - *с. психическая мрамприсма* (Иванов И., 1966). იხ. *სინდრომი-მამპრისმატიზმი* *სინდრომი*.
- b. **სანთიზმი** - *с. психическая мрамприсма* (Stertz G., 1929, 1931, 1933). ფსიქიკური აშლილობა ორგანული დაზიანების დარღვევების შედეგად. ვივიტატიზმი ეპილეპსიის, აპოპიური ცვლილებების, ვივიტატიზმის დარღვევა. ინტელექტუალური და მსესიკური დაქვირება, დაავადების შეწყობის არარსებობა. მამპრისმატიზმის სიხივითა და ვივიტატიზმით აღინიშნება უეჭვანობა. ვივიტატიზმი თავის გენიის და მიმოტუვის სიხივით, ვივიტის ანტიკის, ქვერეული ანტიკის, ვივიტული სკლეოზის, გენიის სიხივით, ვივიტატიზმის, თავის გენიის გრადიის დროს.
- b. **სანთიზმი** - *с. психическая мрамприсма* (დამახასიათებელია ფსიქიკური აქტივობის ევლვობა (ასპონანობა, ან პირითი შობა, შიკარი - ან მდგომარეობის მონივრება), ინტელექტუალური-მამპრისმატიზმი დაქვირება, კრიტიკის დარღვევა.





**სინსტრონიზი** - синструзия (ფრანგ. sinusité - ლაზარულელი უბედური შესოსხევისგან) (Brisaud E., 1909). ფსიქიკური ანტილოზის ხანგრძობი, რეაქტიული აღმოცენდება იმ პირებში, რომლებიც დაზარალდნენ უბედური შესოსხევის ან კოლაგროვის შედეგად. ტერმინი ძირითადად გამოიყენება ფრანგულ ფსიქიატრულ ლიტერატურაში (Perot A., 1975) და შეესაბამება გენდინეობა უნებართვების მიერ შემოღებულ ცნებას - ტრაგული ნეგროზი. ავადმყოფები ამ დროს არ კარგაფილდობენ შვიდახებულ კოსმოსაყოფით და მოთხოვენ როგორც ერთჯერად, ასევე საკენსო სკიპისილერ უბრუნველყოფის, რის გამოც სის ცნება უახლოვდება ე.წ. რეტულ ნეგროზს. ავადმყოფები მუდმივად ატყისუნენ საკეთილი, ძირითადი უნებართვი დარღვევების გამოხატულების ხარისხს, ცდილობენ დაარწმუნონ გარემოსათვის საკეთილ შრომის შესრულებაში, აელენენ მოზხდარის იამო შერისთვის გრძობის დამსაძინებების მისათით, მთავროვენ მათ მკაცრ დასჯას. სის სინდრომის პათოგენეზში მნიშვნელობა ენიჭება თვისობათვის მისიერების და ვარშემოყოფების მხრიდან ეულითადი აღმოკლებულების ფაქტორს. ხამგასსულია იატროგენური მოსიერების მნიშვნელობა (სამედიცინო მუშაების გაუფრთხილებელი შენიშვნა, ლაბორატორული გამოკვლევების ნორმატივების ავადმყოფობისთვის გაყნობა). აღინიშნება ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის ფიქსირებისადაც, იმდენიარობის პროგნოზირებისგან გენდინეობა, რაც არ წარმოადგენს სიმუდყოფას.

**სინსტროზი** - синструзия (ბერძნ. syn - ერთობლივი, kinesis - მოძრაობა), უნებლედ დამატებითი შეუღლებული მოძრაობანი აქტიური. ნებისყოფითი მოძრაობის დროს არსევენ ფსიქოლოგიურ და პათოლოგიურ სის. პირველის მკაალათია სთარულის დროს ფეხების და სხეულის მოძრაობის პარალელურად ხეღულის მოძრაობა. ფსიქოლოგიურ ს. ნიღბლება შეშეირღებს ან სრულად გაქრეს რიგი პათოლოგიური პროცესების დროს (მაგ., ექსტრაპირამიდული მოსიერების). პათოლოგიური ს. შეიღლება გამოვლინდეს შემდეგი სისებით: 1. კოორდინაციული ს. - პარეული (ან დაღამდაღებელი) კიდურის ამოძრავების დის დროს ამავე კიდურში უნებლიედ ულინდება სხვა მოძრაობა (მერკულის გობიალური ფენომენი - მულის მოზრეს ცდის დროს ხდება რეტევის და | თითის გაბლა); 2. გლობალური ს. - აქმბაშევის დროს ხალი კიდურის ფორსირებულ მოძრაობას მისდებს დაღამდაღებელი კიდურის უქნისების შეკრეშვა; 3. მატაცური ს. - ხალ კიდური რიაშე მოძრაობას თან ახლავს ასეთივე მოძრაობის განვითარება დაღამდაღებულ კიდურში.

**სინსტროზი** - синструзия (ბერძნ. synkope - შეკუმშვა, გამოფარდა), ცნობაერებას უეცარი ხანმოკლე (1-5 წთ, ზოგჯერ 30 წთ ან მეტი) დროში დაკარგვა. თან ახლავს სიფერქითაღე, სხეულის უმოძრაობა, ციფო ლილი, ეულ-სისხლძარღვთა მოსიერების და სუნთქვის მნიშვნელოვანი შესუსტება. წარმოადგენს გენის-შეევე შიპოქსის და ევბატატიურ-სისხლძარღვთვანი გროვნის დაღუბის გამოვლინებას. მისი უშალო მიზეზი შეიღლება იყოს ნერვიულობა, ძლიერი კალოლი. სითბური დაკერა, ფულგეტის შიპერეგულიაყო. ხშირად აღინიშნება ეულ-სისხლძარღვთა სისკების პათოლოგიის დროს. ისტერიის დროს ატარებს მონომორე ხახათის, ცნობიერების დარღვევა არასრულია, სობატრე-ევეეტიკური გამოვლინებები ვაობხატელი ნაკლებად. **როთოსტატოკური** ს. აღმოცენდება სხეულის პორიზონტალური მდგომარეობიდან ვერტიკალურში წარაფი ვადახელისას და არამივითად ვებულება ნერვოლევისური პრეპარატებით იქერალობის დროს.

**სინსტროზი** - синструзия (ბერძნ. synkope - შეკუმშვა, გამოფარდა), ს. რომლის დროსაც გამოხატულა და ხანგრძლივ კერებულ იმების ენობიერების დარღვევით, თან ახლავს ტრუნსხვები - გონური სისხმი, შესაბუნებელი შესტეკიში კლრური მოძრაობების თანადროთა. საჭიროა მისი განსხვავება ეხლდფსური კრუნხითი ეულერებისან (Gastaut H., 1975).

**სინსტროზი** - синструзия (ბერძნ. synkretismus - გაერთიანება, შეერთება), ფსიქიკის ელემენტების სხვადასხვა ელემენტ ფსიქიკის ფუნქციის დაუნარეგებლობა.

**სინსტროზი** - синструзия (ბერძნ. syn - ერთობლივი, opsis - მხედველობა), სინთეზიზის გამოვლინება. მხედველობითი ურალი შევრბების აღმოცენება მუსიკის მოზმნის დროს.

**სინსტროზი** - синструзия (ბერძნ. psuche - სული, sleep - ტყილი), ტყილიან შეტევის აღმოცენება ემოციას ვაღვლით, რაც დაკემარებელია მტკიენულ პროცედურასა და გამოკვლევაზე დაკერებასთან.

**სინსტროზი** - синструзия (ბერძნ. opsis - მხედველობა), სინთეზიზის გამოვლინება. მხედველობითი ურალი შევრბების აღმოცენება მუსიკის მოზმნის დროს.

**სინსტროზი** - синструзия (ბერძნ. psuche - სული, sleep - ტყილი), ტყილიან შეტევის აღმოცენება ემოციას ვაღვლით, რაც დაკემარებელია მტკიენულ პროცედურასა და გამოკვლევაზე დაკერებასთან.

**სინსტროზი** - синструзия (ბერძნ. psuche - სული, sleep - ტყილი), ტყილიან შეტევის აღმოცენება ემოციას ვაღვლით, რაც დაკემარებელია მტკიენულ პროცედურასა და გამოკვლევაზე დაკერებასთან.

**სინსტროზი** - синструзия (ბერძნ. psuche - სული, sleep - ტყილი), ტყილიან შეტევის აღმოცენება ემოციას ვაღვლით, რაც დაკემარებელია მტკიენულ პროცედურასა და გამოკვლევაზე დაკერებასთან.

**სინსტროზი** - синструзия (ბერძნ. psuche - სული, sleep - ტყილი), ტყილიან შეტევის აღმოცენება ემოციას ვაღვლით, რაც დაკემარებელია მტკიენულ პროცედურასა და გამოკვლევაზე დაკერებასთან.



ლესარსიანობით. ამგვარი ყრადღების დარღვევით, ბოლოში და ქალკინაიური სინდრომების ან მესტორების და არაკლესის პათოლოგიით მიმდინარე ქრონიკული პარაფრენული დემენციით.

**სხპარული ფორმირების** - **СХПАРУЛ ФОРМИРОВАНИЕ** ინტელექტის მოსზღერე (იოლი) დეზოლისის სიმპტომები და იმდენი კონტრუიტი ვანკუთარეულობის დიაგნოსტიკების საუვეუქეს. ცნება ახლია კონტრუიტი სხუელელებისა, განუქესანს (1933) მიხედვით.

**სხპარული პიპარამეტიური-მეორეული** - **СХПАРУЛ ПИПАРАМЕТИური-МЕОРЕУЛ** (Bonhoeffer K., 1910). აბთენური სანდრომა, აღსოცებელი სიმპტომურად განპარობული ფსიქომის ან შიმში სომატიკური დაავადების შედეგ, დასახსიათებელია სისუტის შეგრანება. აწეული დადლობა, გამზინიანებლობა, მესხტორი დაავადების შესუსტება. ემოციური დასილობა, ძლიერი ვარე ვამზინიანებლების აუვანლობა, კომპარული სიმპტომები: ვადმყოფები ხორად ვანოყდის ვრე შეგრანებებს, რომლებიც კუდად ვანარსიკვა რეპარე ვანუდებისაგან წარსოადვენს ვარდამავალ სინდრომს შეწევე ვესაიკური გიპის რეპრესების დროს. მრავალი ავტორის მიერ ვამოიყენება ვართო შინშენელობით სომატოლოგიური და სხვა ასთენიური დასახსიათებელიად.

**სიტორეანობა** - **СИТОРЕАНОБА** (ბერძნ. sitos - საკვება, monia - ენება). საკვებასაში შინშენელოვანად აწეული ლტოლვა როვარი ვადმყოფური ვაპოვინება. სინონ.: სიმორეანობა.

**სიტრეანობა** - **СИТРЕАНОБА** (გერმან. situation - მდგომარეობა, ვითარება). სუბიექტის მიმართ ვარე პირობების სისევისა, რომელიც ადრავს და ასაშუალეობითებს მის ავტეობას. **"სიტრეანობი სარეანობი"** - **СИТРЕАНОБА САРЕАНОБА** (გერმან. Situation und Situation) შეტყველებით ვაბლერის უკაფურება ხარისხი შინშენელობის დროს. ვადმყოფის შეტყველება შედეგება ცალკეული, როვარიც ამობრევიად, ასევე ვრამატიკვად, ვრამსინეთთან დაკავშირებული სიგვევებად. სპირიტო მისი ვანსხევაგება ენობრევიზის დაბინდვის მოვიერიტი ვირისის დროის დაკავშირებული შეტყველებისაგან.

**სიმპარეანობა** - **СИМПАРЕАНОБА** 1) ემოციური დადებითი დამოკიდებულების უმადლეს ხარისხი, რომლის საუვეუქეზე ვარეშისმოყვითავან ვამოთეოვა იობიექტი და თავსდება იგი სუბიექტის ცხოვრებისეული მოთხოვნებისუბინების ცენტრში. 2) სუბიექტის ინტენსიური, დასახული და შედარებით მყარი ვრამობა, ენობრიკორად ვანპარობება სესუალური სიმოთხილებებით, ვამოვინდება სოციალურად ვორმირებული მისწრაფებით, შავსიმადკურად სრულად რუს წარსილენილი საკუთარი პაროვლენი შინშენელოვანი თვისებებით იობიექტის ცხოვრებაში.

**სიქოლი მესალეანობა** - **СИХОЛИ МЕСАЛЕАНОБА** (ბერძნ. syntonos - ხარმობა და მესალეანობა). აღინიშნება ვეგანუსის დროს და სისის კენთების კრუნხიტი შეკუმშვის შედეგად. დამახსიათებელია მყარი ვრამობა, რომელიც იქმნება პირის კუსხების ქვევით და უკან გეგითიობს. ამ დროს რდება ნაოჭები და კანის ნაკვეთი, წარბები და ცხვირის ნესტოები შევით იქნეს. ყებები შეკრულია.

**სიტორეანობის შესტება** - **СИТОРЕАНОБА** (ბერძნ. syntonos - ხარმობა და შესტება). **სიტორეანობის შესტება** - **СИТОРЕАНОБА** (ბერძნ. syntonos - ხარმობა და შესტება). **სიტორეანობის შესტება** - **СИТОРЕАНОБА** (ბერძნ. syntonos - ხარმობა და შესტება). **სიტორეანობის შესტება** - **СИТОРЕАНОБА** (ბერძნ. syntonos - ხარმობა და შესტება).

**სიქოლოგიური ტრეანობა** - **СИХОЛОГИური ტРЕАНОБА** (ბერძნ. syntonos - ხარმობა და ტრეანობა). **სიქოლოგიური ტრეანობა** - **СИХОЛОГИური ტРЕАНОБА** (ბერძნ. syntonos - ხარმობა და ტრეანობა). **სიქოლოგიური ტრეანობა** - **СИХОЛОГИური ტРЕАНОБА** (ბერძნ. syntonos - ხარმობა და ტრეანობა).

**სიქოლოგიური ტრეანობის შესტება** - **СИХОЛОГИური ტРЕАНОБА** (ბერძნ. syntonos - ხარმობა და შესტება). **სიქოლოგიური ტრეანობის შესტება** - **СИХОЛОГИური ტРЕАНОБА** (ბერძნ. syntonos - ხარმობა და შესტება).

**სიქოლოგიური ტრეანობის შესტების შესტება** - **СИХОЛОГИური ტРЕАНОБА** (ბერძნ. syntonos - ხარმობა და შესტების შესტება). **სიქოლოგიური ტრეანობის შესტების შესტება** - **СИХОЛОГИური ტРЕАНОБА** (ბერძნ. syntonos - ხარმობა და შესტების შესტება).

**სიქოლოგიური ტრეანობის შესტების შესტების შესტება** - **СИХОЛОГИური ტРЕАНОБА** (ბერძნ. syntonos - ხარმობა და შესტების შესტების შესტება). **სიქოლოგიური ტრეანობის შესტების შესტების შესტება** - **СИХОЛОГИური ტРЕАНОБА** (ბერძნ. syntonos - ხარმობა და შესტების შესტების შესტება).

**სიქოლოგიური ტრეანობის შესტების შესტების შესტების შესტება** - **СИХОЛОГИური ტРЕАНОБА** (ბერძნ. syntonos - ხარმობა და შესტების შესტების შესტების შესტება). **სიქოლოგიური ტრეანობის შესტების შესტების შესტების შესტება** - **СИХОЛОГИური ტРЕАНОБА** (ბერძნ. syntonos - ხარმობა და შესტების შესტების შესტების შესტება).

**სიქოლოგიური ტრეანობის შესტების შესტების შესტების შესტების შესტება** - **СИХОЛОГИური ტРЕАНОБА** (ბერძნ. syntonos - ხარმობა და შესტების შესტების შესტების შესტების შესტება). **სიქოლოგიური ტრეანობის შესტების შესტების შესტების შესტების შესტება** - **СИХОЛОГИური ტРЕАНОБА** (ბერძნ. syntonos - ხარმობა და შესტების შესტების შესტების შესტების შესტება).

**სიქოლოგიური ტრეანობის შესტების შესტების შესტების შესტების შესტების შესტება** - **СИХОЛОГИური ტРЕАНОБА** (ბერძნ. syntonos - ხარმობა და შესტების შესტების შესტების შესტების შესტების შესტება). **სიქოლოგიური ტრეანობის შესტების შესტების შესტების შესტების შესტების შესტება** - **СИХОЛОГИური ტРЕАНОБА** (ბერძნ. syntonos - ხარმობა და შესტების შესტების შესტების შესტების შესტების შესტება).

**სელპირისი გვარდობის ანტიროსიზმი** - (ჯორჯ ნოთონი ნაიტიქიჩიკოვი ს. *სელპირისის გვარდობის დასავლეთი*, სელპირისი თავის რაიონის სინამდვილე) - (ჯორჯ იუ. იუ. ნოთონი ს. *სელპირისის გვარდობის თავის*

**სელპირისი დასავლეთი** - (ჯორჯ ნაიტიქიჩიკოვი ს. *სელპირისი დასავლეთი*),  
**სელპირისი დასავლეთი** - (ჯორჯ ნაიტიქიჩიკოვი ს. *სელპირისი დასავლეთი*).

**სელპირისი დასავლეთი** - (ჯორჯ ნაიტიქიჩიკოვი ს. *სელპირისი დასავლეთი*),  
სანაწილი ატროფია და შეკუმშვა. ძირითადად ვითარდება ბავშვთა ასაკში ანთებითი (სეპტორინული), ნაწლავობრივი ან მუცლის ღრუბლის დარღვევების შედეგად. სიმპტომები განისაზღვრება დაზიანების ლოკალიზაციით და თავის გენის კომპლექსური შესაძლებლობებით.

**სელპირისი გვარდობის** - (ჯორჯ ნაიტიქიჩიკოვი ს. *სელპირისი გვარდობის*).

**სელპირისი დასავლეთი სინამდვილე** - (ჯორჯ იუ. იუ. ნოთონი ს. *სელპირისი დასავლეთი*),  
**სელპირისი დასავლეთი თავის რაიონის** - (ჯორჯ იუ. იუ. ნოთონი ს. *სელპირისი დასავლეთი*).

**შეკუმშვა** - დაავადება, ვადეკუმის აგროსომერ-დომინანტური გიპი. უმეტესად იწყება ანატომიური ასაკში, ხასიათი სიმპტომური დაავადებით. დაზიანებულია პროტრუსული ჰერნიები, სისხლსისხლური დაზიანება, ხალხის დაზიანება. სიმპტომები ძველებში ნერვის აგროსომერი, ღრუბლის შეკუმშვით და ქრონიკული მოუღრუნებლობით. სინამდვილე ირაციონალური (თირკმელი, გულს კუთხი) სისხლსისხლური. ხშირად - ცხიმის ჰერნიების აგროსომერი, ეტიოლოგიის სინამდვილე პათოლოგიის გამოვლინება. მნიშვნელოვანი პროტრუსული, არაქრონიკული, ესტეოციტური მხრივ - ისტეოციტური დეფექტი. კვანძოვანი მოუღრუნებლობა სინამდვილად (Kritcheley, Earl, 1932; Zlotow M., Kleiner S., 1965) სინამდვილე: ბუნებრივი სინამდვილე, მუცლის ნაწილის დაზიანება, სინამდვილე დაზიანება.

**სეპტორინული** - (ბერნ. სტოპ - დათავიერი). რიუს - სეპტორული. ლგოლე). ს. *სეპტორინული*  
**სეპტორინული დასავლეთი** - (ბერნ. სტოპ - სინამდვილე, სინამდვილე). ავადმყოფის მიერ რაიმე რეალური

**განხილვები**, ფაქტები შეიძლება, უარყოფი, რაც შეუძლებელია დაკუმშვულია ესტეოციტური გრავიტაციის დაზიანება. აღნიშნულია ესტეოციტური დაზიანების დროს; თავისი ფრაგმენტულობით, ლოკალიზაციით, ეტიოლოგიით განხილვით სინამდვილად, ამ მოქმედება იკუმშვით. იგი განხილვად დასაძლავისაგან.

**სეპტორინული დასავლეთი** - (ბერნ. სტოპ - სინამდვილე, სინამდვილე). ავადმყოფის მიერ რაიმე რეალური  
ავადმყოფის ვარაუდობა. მნიშვნელოვანი ესტეოციტური გრავიტაციის დაზიანება. ავადმყოფი ამჟღავნებს განხილვით, ისტეოციტული სეპტორინული ავადმყოფი არ არის.

**სეპტორინული** - (ბერნ. სტოპ - სინამდვილე, სინამდვილე). ავადმყოფის მიერ რაიმე რეალური  
ან შეკუმშვა შეიძლება, უარყოფი, რაც შეუძლებელია დიფერენციალური გრავიტაციის შეკუმშვით. მისი სინამდვილე შეიძლება აღწესდეს მის წესით. აღნიშნულია ინტელექტუალური, თავის გენის რეალური დაზიანების (სეპტორინული, თავის გენის შეკუმშვა. თავის გენის მოკლეობით პროტრუსული). კვების დაავადებების, ისტეოციტის დროს. შუა საეკუპეტი აღნიშნულია ისტეოციტული ეტიოლოგიის, რომლის ძირითადი სინამდვილე იყო ს.

**სეპტორინული დასავლეთი** - (ბერნ. სტოპ - სინამდვილე, სინამდვილე). ავადმყოფის მიერ რაიმე რეალური  
ს. *სეპტორინული დასავლეთი* - (ბერნ. სტოპ - სინამდვილე, სინამდვილე).

**სეპტორინული დასავლეთი დასავლეთი** - (ბერნ. სტოპ - სინამდვილე, სინამდვილე). ავადმყოფის მიერ რაიმე რეალური  
ს. *სეპტორინული დასავლეთი* - (ბერნ. სტოპ - სინამდვილე, სინამდვილე).

**სეპტორინული დასავლეთი დასავლეთი** - (ბერნ. სტოპ - სინამდვილე, სინამდვილე). ავადმყოფის მიერ რაიმე რეალური  
ს. *სეპტორინული დასავლეთი* - (ბერნ. სტოპ - სინამდვილე, სინამდვილე).

**სეპტორინული დასავლეთი** - (ბერნ. სტოპ - სინამდვილე, სინამდვილე). ავადმყოფის მიერ რაიმე რეალური  
ავადმყოფის ვარაუდობა. მნიშვნელოვანი ესტეოციტური გრავიტაციის დაზიანება. ავადმყოფი ამჟღავნებს განხილვით, ისტეოციტული სეპტორინული ავადმყოფი არ არის.

**სეპტორინული დასავლეთი** - (ბერნ. სტოპ - სინამდვილე, სინამდვილე). ავადმყოფის მიერ რაიმე რეალური  
ს. *სეპტორინული დასავლეთი* - (ბერნ. სტოპ - სინამდვილე, სინამდვილე).

**სეპტორინული დასავლეთი** - (ბერნ. სტოპ - სინამდვილე, სინამდვილე). ავადმყოფის მიერ რაიმე რეალური  
ავადმყოფის ვარაუდობა. მნიშვნელოვანი ესტეოციტური გრავიტაციის დაზიანება. ავადმყოფი ამჟღავნებს განხილვით, ისტეოციტული სეპტორინული ავადმყოფი არ არის.

**სეპტორინული დასავლეთი** - (ბერნ. სტოპ - სინამდვილე, სინამდვილე). ავადმყოფის მიერ რაიმე რეალური  
ავადმყოფის ვარაუდობა. მნიშვნელოვანი ესტეოციტური გრავიტაციის დაზიანება. ავადმყოფი ამჟღავნებს განხილვით, ისტეოციტული სეპტორინული ავადმყოფი არ არის.





გაიწმინდეს. როგორც დახვეწილი-საწმინდო, რაც თავისთავად განაპირობებს ობიექტურ დამსკდებულებას სტრუქტურის ამსოპილენციობისათვის.

**სტარდია სპარდისა** - (ლათ. *stardis*) (გერმ. *Spiegelstufe*). ფსიქოანალიზში: ადამიანის არხების ნაყოფიანობის ერთ-ერთი ადგილია 6-18 თვეების შორის უსუსური ბავშვი. რომელსაც ვერ ხარკვლავ კი უკირს, თავის გამოსახულების სარკეს ადგილითავე სხეულისა და აღიქვამის როგორც მადიანის, სრულყოფილს და დამორჩილებულს. სხ. წარმოდგენის შემდგომში ჩამოყალიბებული "შე" ს მატარებს.

**სტარდია შალდისა** - (ლათ. *stardis*) (გერმ. *phallos* - მამაკაცის სისქესო ორგანი) (გერმ. *phalliche Stufe*). ფსიქოანალიზში: ორდელი და ანდელი სტადიების შემდგომი ლბდობის ორგანიზაციის სტადია. მოსკავს 3-5 წლის ასაკს. ხასიათდება ვერტკალიზებისადაც ინტერესის მოსაგებით, რაც უდინდება ამ ასაკისათვის დამახასიათებელი მსიკერბოისა. აღნიშნულ სტადიაში, ვინსხევიანობა უბერტაკული პერიოდის გვირგვალური ორგანიზაციისა. სხისმსიერი სქესის ბავშვი აღიარებს მხოლოდ ერთ სისქესო ორგანოს - მამაკაცისას. ეს სტადია წარმოადგენს ოიადამიანის კომპლექსის მწვერვალს და ერთდროულად მის ჩაქრობას. მისთვის დამახასიათებელია კატრკაციის კომპლექსის გაწმინდული ვაიედა. ამ პერიოდის მთავარი სიმბოლია მამაკაცის სისქესო ორგანი, ფადოსა: ძირითადი ამოყანა-სქესობრივი დედნტოიკეცა. ბიჭი ვადადახავს დედისადმი პრაციონიერ დტოლვას (ოიადამიანის კომპლექსი), გოგონა-მამისადმი (სტადიის კომპლექსი). ანტეარად, ბავშვი ცდილობს მამისადმი იფტეტიკეცასა, ცოცონა-დედასთან ფადური ფიზა აყვლება სარკისულთ.

**სტარდია-გრანდ-სტადისა** - (ლათ. *Starkard A. Grace W., Wolf H.*, 1953).

**სტარდია** - (ლათ. *stardis* - მდგომარეობა). სოციალური ფსიქოლოგიაში: პირიუცხათმორის ურიოიერობებში ხეობიანი მდგომარეობა, რომელიც ვინსმდგომებს მის უფლებებს, მოვალეობებს და პრივილეგიებს.

**სტარდია აბსანდისა** - (ლათ. *stardis* - მდგომარეობა). ემიგრაციის სტადიის ხახე, რომლის დროსაც ერთი ამსახისი მოსდებს მეორეს, ხოლო მათ შორის ინტერვალში ცნობიერება ვერ ახერხებს აღდგენას. შოე შეიძლება - ამსახისი ვრდებდება რადიანდებო ხათი ამ დტე კონსიკრულ სხ. ულანდება სხედასხვა ხანგრძლივობის ექსპერიმენტის ვინსმდგომის დარდვევით, რომელშიც შეიძლება ვასოციფოსი ვისეულენიერი ფუვა. ევანზე უსკვლავ აღიარებენ პიკეადლებს კომპლექსი ამ შრადლობით: გაღდა-პიკების კომპლექსი.

**სტარდია კალიფორნიისა** - (ლათ. *Calneil*, 1824). დტეომარეობა, ხასიათდება ემიგრაციის ველოფსურა ველოფსურა სურათით, შინდინარობის მსიეთი სხმართი და იმდებალ ხანმოკლე ინტერვალში, რომ ცნობიერება მათ შორის ვერ ახერხებს აღდგენას. დამახასიათებელია პიკეტიერობა, შესამდლებელია პიკეტიერობული კონის ვინსიარება, რომელიც დროული მეკრნლობის ვარეშე შეთარდება ლეგალურად. არსიევენ ეს-ის იმდეს სხხეს რადიკალ სხის ველოფსურა ველოფსურა არსებობს: ვერტკალიზებული კრესნიხვითი (გონსერ-კლონსური, გონსერ-კლონსური, მოკლინური); ვერტკალიზებული არაკრესნიხვითი (ახ. სტარდია სტარდისა); ქალსარევი; ფოკალური ქრონიკოროტული ფსიქოპროტული). ხშირად აღმოვედება რევიმის, ვინსკეტიერობით დეკტრის, დარდვევისთან დაკავშირებით. ანტიკონულსური პრეპარატების უეყარი შეწვევის დროს.

**სტარდია სტადისა** - (ლათ. *stardis* - მდგომარეობა, უმობრბო). სტრუქტურული ქვედადაყოფი ან ხამკურნალ-პროფილაქტიკური დამცემებულები ფორმა ავანტორობა დხმარების აღმოსაჩებალ მათი სიდდელანსო მოთავსების პარობების სანქლეიკოა შემაკების მუდმივი შეთავსებულობის ქვეშ არსებობს ავანტოფ დლის და დამის ნახეკრად სეკვირბობისა.

**სტარდია სტადისა** - (ლათ. *stardis*) (ახ. *stardis* - მდგომარეობა, უმობრბო).

**სტარდია სტადისა** - (ლათ. *stardis*) (გერმ. *stardis* - მავარი, ვამბლე, *stardis* - სენა). ბეკრებებს მოღდანობის ბეკრებს უნარი, რომილებიც ვანდავებელია სხედასხვა ადვილებზე ან ვანსხევილება თავიანთი წყაროთი (ორეკტრის ლტრადობისა).

**სტარდია სტადისა** - (ლათ. *stardis*) (გერმ. *stardis* - მავარი, ვამბლე, *stardis* - ალქმა). ხახელების შეხებით ბეკრებს, ასოცონობის უნარი. შინდლება თივის გინის ორგანული პათოლოგიის დროს. ახ. *stardis*.

**სტარდია სტადისა მტრეპლადისა** - (ლათ. *stardis*) (გერმ. *stardis*). ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი ვამოვლანება, უსკვლავლად ვერტკალიზებაში ხშირად უნარი ან არამატეკლად არასტრიალად ავებული ნაკლებად შეუვლელი ან უსკვლავი ქალქული სიკვებების, ფრამების, ვამოთქმების უხეხლიე შრედალქურადი ვამოვრება. აღნიშნება თავის გინის ორგანული დავადებების დროს (ფიქსირებული ბრუნებები, ვრამოფონის ფიქსირების სმპტომისა).

**სტარდია სტადისა მტრეპლადისა** - (ლათ. *stardis*) (გერმ. *stardis*). ფსიქოლოგიის ინტერვალის ერთ-ერთი ვამოვლანება, ერთდროული, არსნობიკებული ან არაროით ვამოვლენილი მოძრაობების უხეხლიე მრავალჯერადი ვამოვრება. აღნიშნება თივის გინის ორგანული დავადებების (პიკის დავადება, შოვიერთი ინტელექტის მუდმივი მდგომარეობა), კავადანსური შოიოფრების, ცნობიერების ბინდისებრი დარდლევების დროს. ვინსკეტიერობით ემიგრაციის დავადებულებში. სინონ: *stardis*, *stardis*, *stardis*, *stardis*.

**სტარდია სტადისა** - (ლათ. *stardis*) (გერმ. *stardis*). სოციალური ობიექტების (მოვლენების) აღქმა, ქალსიკეცა და შეთავსება, რომელიც ხორციელდება ვერტკალიზებული წარმოდგენების საეუბლებზე.

**სტარდია სტადისა** - (ლათ. *stardis*) (გერმ. *stardis*) (Sturge W.A., 1879; Weber F.P., 1922; Krabbe K., 1934). ახ. *stardis*.

**სტარდია სტადისა Q-SORT** - (ლათ. *stardis*) (გერმ. *stardis*) (Stephenson W., 1953). შარტენული შეთარდება, ვამოვლენება სოციალური ფსიქოლოგიაში და მათი ფსიქოლოგიაში.

სოციალური ვერტკალიზებული ბეკრებები და მათი დავადებების რაციონალიზებული შეთავსების საეუბლებით ვანსახელებუბა აღიარების ქვეყის 6 ძარითად გენდენივა: დამოკიდებულება - დამოუკიდებლობა, კომუნიკაბელურობა - არაკომუნიკაბელურობა, ბრძოლასადაც მხმწარფება - ბრძოლასადაც გეკვეცა.





**ბრანშოლი რაბათმა შუააზი**

**თეოფი სტრეჩანის ქოხში** აღმოაჩინა, რამდენიმე უთარღებია **პრაქტიკულად** უცნობოდ აღმოაჩინებენ ძველი უთარღები და ფსიქური სერების მსგავსად ხაასების და დღეების განმავლობაში ის დროს, გარდა სერისული სოკოებისა, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ანთიფუნგალური ნაირსახეობისა და მისი აღმოჩენის ერთი. ჩაქვის კვანძე გამოყვანილდება ვაზრების, ცხიმბუნების მდებარეობის და უვრადღების დაქვეითების ხაინდრისის ხაასთ. ინსტიტუს ან შექმნისა ალკოჰოლიური რეაგირება მოახდინოს ვაზრების განსაკუთრებული. შუაქვთ განთავსდება დეპონირებული მდებარეობა, რასაც მოსდევს მითვის ან შესდგის განსაკუთრებული სოკოების, ვაზრობების **რეცეპციონიზმი** **ბრანშოლი** (ის), ან პრაქტიკა - ავტიკაცია და **პრაქტიკულიობა** (ვინმეს რეაქცია ან ფუნქცია). ხშირია პრაქტიკული მითვისი ევგენიკური ნაირსახეობა: ვაქიკანალია, თვალისმათი, სხვის პრაქტიკული. სიმსივნები აღმოუჩენდება სერების მდებარეობისთანავე და რუკუცების განსაკუთრებით დიდი განსაკუთრებით. ხშირად აღეკოს ჩაქვის სოკოებიდან ან სრულ განსაკუთრებით. **რაბათმა (ბრანშოლი) შუააზი კრისტოლოგი**. **შუააზი ბრანშოლი რაბათმა**, **ბრაშოლი** ბაქალა, **სიმსივნური შუაი შუააზი**.

**ბრანშან-სტრეჩანის სოფელი** (Strachan, Scott, 1918). დადავლება განსაკუთრებულია სოკოების რაბათობის და ციოგელური ცვლების უკონკრეტო და ნახაზრელებს შედგენენ რაბათობა. ვაზრობები პროსექტიული დაქვეითების (საქვში ციანობის რეაქციის) შესაძლებლობის ნაირსახეობები: სერისო ხაასები, მათის ანთრუქობა, ქილოგი, დიარეა ქიმიების და ცხიმბუნება მთვების დიდი რაბათობით გამოყოფათ: ვინსექციის განსაკუთრებულ ვახქვლიანობას, განსაკუთრებით ქელოგობებზე. რეაგირება ახალი ხაასობარდების კონსისტენციის სერიზულად უვრადღები. ნახერეები შარის კვანძებში, ცხადრად, ყურის სოკოებზე, თვალის კეთილგონი, ვაქიკა სხვის ხერხეზე. ს. სოკოებზე ანთისა. შუაქვთ ველის ფუქსიისგანა. ნეგროლიცოგურად - პარსიკონებზე და სოკოების და ტოქიკოლოგიური ავტიკანი სიარულის დროს, მდებარეობს - შუა კიდურებში, პროგრესირების მდებარეობის სერიზულად უვრადღების დროს. კონსილანციისგანა - ვეხმ ცვლილებებში პერსონალური სერების მასის განცხადებით, ვინსექციის და სხვათა ვერტიკალების უვრადღების, კრისტოლოგიურად, კლარსის სერების და სხვათა ვერტიკალებში უვრადღების, სიმსივნური რეაქციის მდებარეობის.

**ბრანშანის ჰემოციტური უმარობა** (Strachan, Scott, 1918). ფუნქციონირება მითვისი ვაქიკური, თქვირული ოგონის მდებარეობის რეაგირებადობის (ავტიკაციის დარწმუნება მისი დათვლების განსაკუთრებით) მდებარეობის გვით ვისი შარის უმარობისგანა ვაქიკაციისთანავე.

**ბრანშან-სტრეჩანის** (Strachan, Scott) უმარობის დროს უმარობის რეაგირებადობის (ავტიკაციის დარწმუნება მისი დათვლების განსაკუთრებით) მდებარეობის გვით ვისი შარის უმარობისგანა ვაქიკაციისთანავე.

**ბრანშან-სტრეჩანის** (Strachan, Scott) უმარობის რეაგირებადობის (ავტიკაციის დარწმუნება მისი დათვლების განსაკუთრებით) მდებარეობის გვით ვისი შარის უმარობისგანა ვაქიკაციისთანავე.

**ბრანშან-სტრეჩანის** (Strachan, Scott) უმარობის რეაგირებადობის (ავტიკაციის დარწმუნება მისი დათვლების განსაკუთრებით) მდებარეობის გვით ვისი შარის უმარობისგანა ვაქიკაციისთანავე.

**ბრანშან-სტრეჩანის** (Strachan, Scott) უმარობის რეაგირებადობის (ავტიკაციის დარწმუნება მისი დათვლების განსაკუთრებით) მდებარეობის გვით ვისი შარის უმარობისგანა ვაქიკაციისთანავე.

**ბრანშან-სტრეჩანის** (Strachan, Scott) უმარობის რეაგირებადობის (ავტიკაციის დარწმუნება მისი დათვლების განსაკუთრებით) მდებარეობის გვით ვისი შარის უმარობისგანა ვაქიკაციისთანავე.

**ბრანშან-სტრეჩანის** (Strachan, Scott) უმარობის რეაგირებადობის (ავტიკაციის დარწმუნება მისი დათვლების განსაკუთრებით) მდებარეობის გვით ვისი შარის უმარობისგანა ვაქიკაციისთანავე.

**ბრანშან-სტრეჩანის** (Strachan, Scott) უმარობის რეაგირებადობის (ავტიკაციის დარწმუნება მისი დათვლების განსაკუთრებით) მდებარეობის გვით ვისი შარის უმარობისგანა ვაქიკაციისთანავე.

**ბრანშან-სტრეჩანის** (Strachan, Scott) უმარობის რეაგირებადობის (ავტიკაციის დარწმუნება მისი დათვლების განსაკუთრებით) მდებარეობის გვით ვისი შარის უმარობისგანა ვაქიკაციისთანავე.

**ბრანშან-სტრეჩანის** (Strachan, Scott) უმარობის რეაგირებადობის (ავტიკაციის დარწმუნება მისი დათვლების განსაკუთრებით) მდებარეობის გვით ვისი შარის უმარობისგანა ვაქიკაციისთანავე.

**ბრანშან-სტრეჩანის** (Strachan, Scott) უმარობის რეაგირებადობის (ავტიკაციის დარწმუნება მისი დათვლების განსაკუთრებით) მდებარეობის გვით ვისი შარის უმარობისგანა ვაქიკაციისთანავე.

**ბრანშან-სტრეჩანის** (Strachan, Scott) უმარობის რეაგირებადობის (ავტიკაციის დარწმუნება მისი დათვლების განსაკუთრებით) მდებარეობის გვით ვისი შარის უმარობისგანა ვაქიკაციისთანავე.

**ბრანშან-სტრეჩანის** (Strachan, Scott) უმარობის რეაგირებადობის (ავტიკაციის დარწმუნება მისი დათვლების განსაკუთრებით) მდებარეობის გვით ვისი შარის უმარობისგანა ვაქიკაციისთანავე.

**ბრანშან-სტრეჩანის** (Strachan, Scott) უმარობის რეაგირებადობის (ავტიკაციის დარწმუნება მისი დათვლების განსაკუთრებით) მდებარეობის გვით ვისი შარის უმარობისგანა ვაქიკაციისთანავე.

**ბრანშან-სტრეჩანის** (Strachan, Scott) უმარობის რეაგირებადობის (ავტიკაციის დარწმუნება მისი დათვლების განსაკუთრებით) მდებარეობის გვით ვისი შარის უმარობისგანა ვაქიკაციისთანავე.

**ბრანშან-სტრეჩანის** (Strachan, Scott) უმარობის რეაგირებადობის (ავტიკაციის დარწმუნება მისი დათვლების განსაკუთრებით) მდებარეობის გვით ვისი შარის უმარობისგანა ვაქიკაციისთანავე.

**ბრანშან-სტრეჩანის** (Strachan, Scott) უმარობის რეაგირებადობის (ავტიკაციის დარწმუნება მისი დათვლების განსაკუთრებით) მდებარეობის გვით ვისი შარის უმარობისგანა ვაქიკაციისთანავე.



წილის მოსაკრებს, აქვს უკმაობობის, პეჯორატიული ინსულის, მოციურობის ანგოქსიატივის დროს.

**სუპერ-ეგო** (სუპერ-ეგო) (ინგლ. Super Ego). ფსიქოანალიზში: **ეგო**რული ცნება, აღნიშნავს ამ ფსიქიკურ ფუნქციებს, რომლებიც თავიანთი ცხოველურად განიხილებს დროს ანაბაქს სარალურ ატიგულეს, ცხოველურებს და ექსტრინსიკურ განიხილბს. ავი შედეგია ამ სამიგოლოებრივი ვისკერა სკანდარტების ინტერნალიზაციისა, რომელშიც პრინციპები ცხოვრობის და ვითარდება შსობლებსა და ბავშვის ვარებუცეაში მყოფი სხვა პრინციპების ატიგულბის ინტერაქციის სარეალობა. სუპერ-ეგოს ფუნქციები შეიძლება ადისოს ორ კატეგორიად: 1. შერეულობის და დისპოლიტელები ფუნქციები, რომლებიც აუტენებს იდეალებს და დარტულბებს ეგოს იდეალის კრწმის ქვეშ. 2. კრიტიკული და დისპეული ფუნქციები, რომლებიც იწვევს დანაშაულის კრწმის და სარდლის ქვეშის (სანბნ. **სუ-მე**).

**სურსათი** - (კიბოლოგი) (ლათ. suppressio - დაიბრუნება). ფსიქოლოგიური თავდაცვის მექანიზმი, დანახიბობიქლია სკიკარა აბრების და ვრწმობების ახსნის, გამართლებების ცდა, რომლებიც ეწინააღმდეგება სარეალობის სარეალობად იბრუნებს. ს-ის ექსტრული დამოკიდებელია ადამიანისთვის ამ ვახლებების სწიშნელობაზე, შთი ვახლებს დარტულბებს ს. ვოკლებიც აბარებს ვახსობიერებელი, სწიბით დაიბრუნების ხახობის, რეპრესიისკან განიხილბების, რომელიც არის ვაქსობიერებელი, ავგობადობელი.

**სურსათობრივი** - (კიბოლოგი) სხ. **სურსათობრივი**

**სურსათობრივი** - ლ. ვანსეჩი განდებ, რომელიც ვანსათობის მოიხობს და წარბადებს მოქმედ აბრს იბაზე, სკ რა სურს სხელებს, რომ სქიბდეს ამ განახობიერობის. შეიძლება აფის ვაკწმობიერებელი და ვაკწმობიერებელი. ს. აბქიკებს მოსახილი მოქმედების შახნის და აბქიკობებს შიბი ვახსობიერების ვეცის შედეგებს (გერმ. Wunsch, begerle, Lust). ფსიქოანალიზში: ფროიდის დანახიკამი - დეიქსიტი კონფლიქტის ერთ-ერთი პოლუსი, არაკნობიერი სერეობის ცდაობს ვახსობიერებს პირველადი პროექციის ნიშნით, დისყარებელია სარეაობების პირველ ვახლებლებზე.

**სურსათობრივი** - (კიბოლოგი) (ლათ. suppressio - დაიბრუნება). ფსიქოლოგიური თავდაცვის მექანიზმი, დანახიბობიქლია სკიკარა აბრების და ვრწმობების ახსნის, გამართლებების ცდა, რომლებიც ეწინააღმდეგება სარეალობის სარეალობად იბრუნებს. ს-ის ექსტრული დამოკიდებელია ადამიანისთვის ამ ვახლებების სწიშნელობაზე, შთი ვახლებს დარტულბებს ს. ვოკლებიც აბარებს ვახსობიერებელი, სწიბით დაიბრუნების ხახობის, რეპრესიისკან განიხილბების, რომელიც არის ვაქსობიერებელი, ავგობადობელი.

**სურსათობრივი** - (კიბოლოგი) სხ. **სურსათობრივი**

**სურსათობრივი** - (კიბოლოგი) სხ. **სურსათობრივი**

**სურსათობრივი** - (კიბოლოგი) სხ. **სურსათობრივი**

**სურსათობრივი** - (კიბოლოგი) სხ. **სურსათობრივი**

**სურსათობრივი** - (კიბოლოგი) სხ. **სურსათობრივი**

**სურსათობრივი** - (კიბოლოგი) სხ. **სურსათობრივი**

**სურსათობრივი** - (კიბოლოგი) სხ. **სურსათობრივი**

**სურსათობრივი** - (კიბოლოგი) სხ. **სურსათობრივი**

**სურსათობრივი** - (კიბოლოგი) სხ. **სურსათობრივი**

**სურსათობრივი** - (კიბოლოგი) სხ. **სურსათობრივი**

**სურსათობრივი** - (კიბოლოგი) სხ. **სურსათობრივი**

**სურსათობრივი** - (კიბოლოგი) სხ. **სურსათობრივი**

**სურსათობრივი** - (კიბოლოგი) სხ. **სურსათობრივი**

**სურსათობრივი** - (კიბოლოგი) სხ. **სურსათობრივი**

**სურსათობრივი** - (კიბოლოგი) სხ. **სურსათობრივი**

**სურსათობრივი** - (კიბოლოგი) სხ. **სურსათობრივი**

**სურსათობრივი** - (კიბოლოგი) სხ. **სურსათობრივი**

**სურსათობრივი** - (კიბოლოგი) სხ. **სურსათობრივი**

**სურსათობრივი** - (კიბოლოგი) სხ. **სურსათობრივი**





**ტანსანის რამბლა** - Тантанум ზურგის ტანის ხშირა პროგრესულ დამხლასთან ერთად პროგრესულ დამხლასთან შედარებით ხასიათდება წელა ვანიოთარებად ჭკუასუტობით. პარალიზურ დუზენიასთან შედარებით, სინსლურ-კურსული სიმპტომები ელინდება არე (მოცურ 5-10 წლით). პროგრესული დამხლის სურათი ხშირად შეესაბამება მის ლექსიურ ფორმას. თუშკა შესაძლოა ექსანსიური, აეიტირებელი და დეპრესიული ფორმების სიმპტომთა კომპლექსების არსებობას. ხშირია მსუდეველობით ქალუენისციები, პარანოიდა.

**ტანტ** (ან). ფსიქოანალიზში პოლიემიური სიგყა, აღნიშნავს ხელშეუხებელ საგნებს ან ცოცხალ არსებებს. ფსიქოანალიზში ცნება ტ-ს მსგავსი შემოგანილია ფროიდის (S. Freud, 1913) მიერ როგორც იჩვეულებრივი საყოველთაოდ მიღებული ხაწინააღმდეგო. ამავე დროს განიყოებოდა მისი ზოზიტურა («წინიდანია», იგანქმედლი) და ნეგატიური («სამიშო», «უწმინდური») ასპექტები. ტ-ში ჩანდა არსებული აქსალეებისადმი არიყების ახბეალებური გამოილება. გარდებოდა ანალოგია ტ-სა და აკვოტებულ მდგომარეობათა წეროზს შორის, რიშლის არსს ფროიდი ხედავდა ძლიერი არაყნობიერი ლგოების განმეციელების შეუძლებლობაში. ამით მოვეყა აკრძალვის აღმოყენების პრობლემის ფსიქოანალიზური ინტერპრეტაცია, რაყ მნიშესილუიდან რიულ' თამაშის პროყენების ხტრუქტურის, შორალის და რელიგიის ვასაკებად.

**ტანტარას რამბლა** - Такара Такара-Ара (Takara M., Ara K.), კოლოიდური რეაქცია. გუგოვან ლექორზე სკლეის და უეჭინის ხნარის დამატებით ნორმამ აღინიშნება ახსანსიური ნარევი, სითხის გაუყურების და სილქის გამყოფის შემთხვევაში რეაქცია მეგასიოლისურია (პროგრესული დამხლა), წითლად შეფერვისისა - მქანვიტური.

**ტან(მარას) შიოქრისა შემოშობრაპობისა** - Таиошя ишо иша шшшшшшш (Таиошя M/L 195მ აკვოტებულ მდგომარეობათა შეყრნალობის ფსიქოთერაპიული შეთოდი ნეგატიური შემოქმედების ცმით. აეგორის მიერ შიწოდებულია შეთოდის პათოზიოლოგიური განმარტება: რადგან აკვოტებულ მდგომარეობებს საფუძვლად უღებს ასრრული აგზების პათოლოგიური კრის ფორმირება, ამ მოქმედებათა შრადეაღური გამეორებისას აღნიშნულ კრამი ხდება აგზების ვადასაზე მასში ინერტული შეკაების აღმოყენებით. ავადმყოფს ურჩევენ სახლში 3-4 ჟერ რაბუდსიქე წუთის ვანაქელობაში გააკეთოს გყოფლის სიმტომის გამომწვევი შოდრაობა ან 10-15-ჟერ წარმოიღვირის აყ. იხ. **შანტარას შიოქრის ნახარბი შიოქრისა, შანტარას შიოქრის პარალელური ინტენსიობა**.

**ტარანტიზმი** - Тагантис მასობრივი ისტერიული ეპიდემიები, რომელთაყ ადგილი ჰქონდა პოლანდიას და ვერსალიში (XIV-XV სს) და იტალიაში (XVI-XVII სს). გამოხატებოდა ძლიერი ხანგრძლივი გამოშფოვი კრუნებებით. ცაყებით, რომელიყ აღმოყენებოდა ინლექციის შექნისებით. იყეა აგარებდა გარანტელას სახელდობლბას და დღებულ შეინარსუნა პირეინდელი სახე, რადგან დაევირებულ იყო ცრურწმენასთან, თითქოს ამ ცმით იყო შესაძლებელი თაილან აყილეობით გარანტელის ცხნა.

**ტარტარა შიოქრის შემოშობრაპობა ტანტარას** - Тагантис шшшшшшшшшшшшшшш (Тагантис K.M. 1952). იხ. **სარასა ტარტარა შემოშობრაპობა ტანტარას**.

**ტანტარას** - Тагантис-иш (ბერბ. tasis - გუნდწყა, მიდრეკილება, kinesis - შოდრაობა) (Sicard J., 1923). კანუიის ჰარადიშული ფორმა, ხასიათდება შობიტებული შოდრაობით აყეობით. შოდრაობის და სიარულის დაუძლეული სურვილი აღმოყრებოდა, შესაყსი აკალიზია. აკალიზიასგან განსხვავებით, არ ვეხვდება მგანყეულ მეგონებში, შიოსიოხის შოთხოყილება წარმოადგენს პარტელად გუნდწყის, განისამღერება როგორყ დაუძლეული შინაგანი ხიყი (Пихлик И. Кириш К., 1976). ვეხვდება თაიის გეინის შოგიერთი ორგანული დამიანების (ეპიდესიური ყსიყუაობა) და როგორყ ვართლება ნეაროლესიური პრეპარატებით თერაპიის დროს. შიეყთენება ტრანსიტორულ ნეაროლესიურ ხანდრაშებს, თუშკა, შოე შემთხვევაში დებულობს ქრონიკულ შიმღინარეობას (იხ. **არ სინდრომი**).

**ტარ შიოქრის** - Тагантис (ფრანგ. tancer). კანზე სხეულისგა ნახატების და წარწერების გაკეთება კანქვე უხნალი შღბაყი ნიყოიერების მეფეანით. ტ. შესაძლოა აგარებდეს ბულ პროყესიულ გუნდწყებს, შიე, მეგდეაურებში, იყესა, უმრეულს შემთხვევაში ამტყესის სუბიექტის დანამულებრივ წარსულს. ნახატებისა და წარწერების ხასიათი













ვაისექცია პოლიციის დარეგულირებული ნიშნების და წინააღმდეგობის ხარისხის ...

- ბ. შ. მარტინოვიჩი ... ბ. შ. მარტინოვიჩი ...



**ბრანსა ხაჭუმბარო** - იუსოუ ქიხილი. 1. შობიარობის (სმირად ჰაიოლოგიურის) დროს ნაყოფის ორგანიზა და ქსოვილით გრავსტამბია (სწრაფი შობიარობა). მშობის დაღება და სხვ. წარმოადგენს ნაგავლი უცქერის ორგანიზმს ცერებრული ჰაიოლოგიის ერთერთ ძირითად მემბს. 2. ფსიქონალში ცნება 2. ტ. მეშობლებული დაბადებისთანა ანუ დღის სამოს ეპლევის განვლებთან დაკავშირებით (Rank O., 1929). **ფროიდის** (S. Freud, 1913) მიხედვით, ხ.ტ. წარმოადგენს ფაქტორს, რომელიც განაპირობებს შფოთვისადმი განწყობას; ამასთან დაკავშირებით, ხსთიონებრები შეხადება განიხილებოდა როგორც გრაველი ნეკროზის საყვედურეო ფორმა. ამასთან, გრავის სახით ფაქტორებს ჰაიოლოგიურ ფსიქოლოგი, დაკავშირებული დაბადებს უტვთან.

**ბრანსა შიშინა** - იუსოუ იხილირუალ ადამიანის ფსიქოტაზე ჰაიოლოგიური ფსიქოლოგიური შემოქმედება. რასიქლადი საყვედურეო პირობული შნიშინებლის და ფსიქოლოგიური დაფეთი შეხანშიშინის არის რადიუსიონის შემხიშინაზე იგი შიშინე ფსიქოლოგი დაუადებაშედეგ. ამგვარად, ტ.ტ. შესაძლოა იყოს ფსიქოლოგიური-რეაქციული დაუადების აღმოცენების მიზეზი ან ენდოგენური პროცესის დასაწყისის მაკროეოცენტრული ფაქტორი.

**ბრანსა-პარამიამ-ბინდლიმინს პრეშინოპათიში** **მღვობარობა** - ტრამერ-კოპინიჩი-ნი-იხილი იუსოუიხილირუალ-იუსოუი (Tramer M., 1949; Копинич И.П., Яхонкин И.П., 1960) ან. **ბრანსა-პარამიამ-ბინდლიმინს**

**ბრანსის უკვამბინი მუტაზი** - ტრამერ-კოპინიჩი-ნი-იხილი (Tramer M., 1934). ან. **მუტაზი მღვობარობა**

**ბრანსის ტრანს ფიზიკის პატარობისა** - იუსოუი რუტ-კიხილი-ნი-იხილი (Tramer M., 1953). **ნაოცნება** პირიქულიც ენაქრამბტულ-ფსიქოლოგიური შფოდი. გამოცენება ბავშვთა ფსიქოლოგიაში. განისაჯედევი შის ანდედე დაუადებას. 430 წიგნისად შეხადებრი სიიად ამოიჩინოს შისთვის სანეტროვი წიგნისა 100 დასახელებს. სიამი შიყენილი წიგნები დაეკუთვნულია «ფსიქოეკოლოგიის» მიხედვით 24 კატეგორიად და ასახავს ინტერსების შესაძლო განაწილებას ინტერსები განაწილებულია ენეტროფეურად (სათავადასაელო, სამოიჯიარო, სიაშიარო) და უცნობიპეურად (სოციოლოგი, ოჯახოლოგი). გამოყოფილია აგრეთვე ისეთი ექვეობები, როგორცაა სიფინაგლობა, ინტროეგნია, ინტერესი შობილის საკითხისადმი ან აბსტრაქტული, ფილოსოფიური თემებისადმი და ა.შ. განთავსდება განვითარების დისპარსიის, ნეგრომული გამოვლენების და ხსითის თვისებურების ფსიქოლოგიური-კოსმოსიის **ბრანსის ფიზიკისა** (Tramer M., 1958). ან. **ფიზიკისა**

**ბრანსტრანსი** - იუსოუილი (ლათ. transus - გადასვლა, გადაადგილება). **ბოდეგოი ფენომენი გეგვდება** კანდამბ-კრ-ტერამბა შინდრომის დროს და ელენება აუადამოვის რწმენით, რომ აუადამოფორეო შეგნობისა და გავრცელები აღიქვამს არა მარტო აუადამოვის, არამედ შისი ნათესავების, ახლობლების, გარემოშფოტების (მყარ, იუს. შიქსეკლები ჰალეინაიუსება ესედეოპალეინაიუსება). გარემუ მალის შემოქმედების განვდას. აუადამოვი დარწმუნებულია, რომ შის ორგელზე შფოვი ადამიანები აუადამოვები არიან, თითონ კი ფსიქიკურად განმრთვლია. **შფურევი** (Альцус И.А. 1988) ტს მიაკუთვნებს იმ შემთხვევებსაც, როცა აუადამოვი ამტიკებს, რომ გარემოშფოტები უკლებიურში ჰაიოქრ მას. შისი ორგელები ხეზიანს.

**ბრანსტრანსტროპი** - იუსოუილირუალ (ლათ. transus - დაშფილება). **ფსიქოტროპული მოქმედების პრეპარტების უკუთო**. ხსნის შფოთვას, ემოციურ დაბახლებას, შის და არ არდელებს (თერაპიული ღომების) შექმნის და აღქმის მოიუსება. ნეიროლეგისი პრეპარტებისაგან განსხვავებით, არა აქვს ეამობადელო ანტიჰისტოკინური უკლები. აუადამს შობრედაქსიტიურ და კრუნჩხესაწინააღმდეგეო თვისებებს. შათ მიეკუთვნება ბენზოდიამბესიისების წარმრებლები **Alprazolam-ქანბანი**, ნეუროლი, **Bromazepam**, **Diazepam**-აპაურინი, ეალიმი, დამბამბი, რუდანიმბი, ბედექსიტი, სიაშიარო, ფუბანბი, **Dicali Klorazepam-გრამბენი**, **Klorazepam**, **Klobnarr-გრამბენი**, **Lorazepam-ლორამბი**, სედეკატი, **Meclizepam-მეკლაპამი**, რულოგელი, **Oxazepam-ხომხამბი**, გამბამბი, **Temazepam-ხიგნოპამბი**, **Tofizopam-გრანდიქსისი**, **Fenazepam**, **Chlordiazepoxyd-ხალოპოკრი**, ულენბი, **Estazolam**: კარბამბატის წარმოებლები - შერობამბატი; დედექსიტიკიანის წარმოებლები - ამბილი; და ტრანკვილიზატორები, რომლებიც მიეკუთვნება სხვადასხვა ქიმიურ რუკებს - მესიკარი, გროუქსამბინი, ბენზოკლიდინი, ჰიდროქსიმინი, უენიბოტი.

**ბრანსტრანსტრანს** - იუსოუილი (ლათ. trans - შიშა, vestis - ნიყმა) (Westphal C., 1870; Hirschfeld M., 1910). **საწინააღმდეგეო სქების ტრანსცემლის ტრანსხანბი პერეკრსოული დტოლოცა და, შესაძამსად, საყოთარო ვარეგნობას შედეგა**. ქალი-გრანსიუსტები აგარებენ მამაკაის განხაყელს უწევიან თამბაქოს, არიან უბეშები ქიქული. შისი კიქები აგარებენ ქალის განხაყელს და საყილებს, იყენებენ კოსმეტიკას, იყებებენ საყილურ დასამარეიებას მყარლხა და თუბიბინი და ა.შ. ამ დროს სქების განსხვადრეული ყველა მანიქენბული ნორმამბი, შეყვილია ფსიქოლოგიკალური ორგანიკაია. ხშირად ვესილებს მამაკაიებში, ულინდება უკვე ბავშვთა და შობარბოთა ასაკში. გრანსიუსტების 10% არიან ჰომოსექსუალისგები. შოგერეო შეიშინევა სქესობრივი დტოლეის შესუსტება. გესილებს აგრეთვე იმობილიტიკიით და ცარტალური ფსიქოლოგი დაუადებლებში (Ильинский И.С. 1972).

**ბრანსი** - იუსი: **ტრანსე transel**. **ამბულატორული ატრომატიზმის სახე**, შოგერეო საქმოდ სანსრბოლო (რასიქსინსე დედეუ). გრანსის დროს აუადამოვიო შოგერეობრბი. გარეგნულად გოეებულ ბილიანის, შეყვედექის შიბაქცადილბისა ცნობიერების ადრეების შიშვე აუადამოვიო აღმობინენ, რომ იმყოფებიან ისეთ ადრეულ, ხალცი არ უნდა კოლოლიკინენ. აღნიშინებთა შიშობარე ამსხიდა. ყველაზე ხშირად გეხილება ეთილევის დროს.

**ბრანსპორტიზობა მრანსოპმინს** - იუსოუიხილირუალ-იუსოუი (ლათ. transus - გადახაყილება). განსახლურდ შოდელებთან. პეროლეპთან დაკავშირებული ემოციური შუხტის გადატანა მასთან კავშირში არმყოფი დამიანისებზე სანებზე. ამის შვალილითა ახლოვლებისა და სათესაებისადმი მტრობა. გეხილება შიშოფეგნის დროს.

**ბრანსისმსპალიზმი** **Ильинский Е.М.** (Elis H., Symonds J.A., 1896; Benjamin H., 1953). **ფსიქოსექსუალური განუთარება გედეხრის ფრამბ**, სქესობრივი თვითშეყნობის დარდევა. ტ. - შფარბა, ბინსიშიება აკეო დარეულ ბავშვობაში. აუადამოვი დარწმუნებულია, რომ მიეკუთვნება საწინააღმდეგეო სქებს, თუქია. ეს ეწინააღმდეგება აუადამოვის პირეულად და შფორად სასქესო შიშისებს, შის სახასობროგ სქებს. პირეულ პლანშია ქიქუის დარდევეა დამახასიათებელია არა შობლო სახასობროგო სქების შეეელის სურვილი, არამედ აუადამოვიეობი ხშირად შიშობიოფენ ქირურეულად ჩარევი სქების შეეელის. კომპლესიონის შეუხლებლობას აუადამოვიო შიშაქებს სეკულიარ ქველიანბდე. აღნიშინება აგრეთვე სქესის შეეელის ბოდეოთი დდევა. აღმოცენებული ენდოგენური რეაქციის (შიშობარეობა) პარანოლიზმი მდგომარეობების ან თვის ბეკიის ორგანული დამიანების დროს. ამ შემთხვევებში ფსიქოსექსუალური განუთარების ადრეული ეტაპები მიმდინარეობს ვედეხრის გარეზე და სქესის შეეელისადმი დტოლეკი ელსილება

ესეც ვინ დააქვეყნა ლებეგის ერთად (Левинский Л. С., 1983). ტიპი დაავლებული თავიან სექსუალურ ლეკლებში არ არის ჰომობიქვალისებრი, მაგ, მამაკაც განისხვავებულია გზით ცვლადის ანაკის სექსობრაცი პარკონორი მამაკაცში, რადგან თავი ქალად წარმოუდგენია. ამდენად, ქალთან კავშირი მისთვის ჰომობიქვალურად აღიქვამება (Green L. Money J., 1969). ტ. განიხილება როგორც პირთუქვის ვსლავტერო (კოსმეტოლოგიური) ამოწმება (Бухачихин А. Л., 1986) (იხ. შენიშენი). სინონ: პერგამენი (რომისში შინიშენი (Bluch J., 1936).

**ტრანსფერო** - ირანტი (ფრანგ. transfert, გერმ. Übertragung, დანი, transfare - ვადაავსლება, ვადავანი) ფსიქონალიზში: აღნიშნავს პროექტ, რომლის დროსაც არავსობრერი სურვილები ვადაავსება ამა თუ იმ ობიექტზე ვადკვალა ტრანს დანიკობებულებში. მაგ, ავადსურთის მიერ ვსიში ვროგოკვალა ლეკობის ვადავანი, რომელსაც ავადსურთის ქვინობა წარმოადგენს ნაქონი ავადსურთის მისთანა, ნაქონიების ვაკონსტრუქციულ სექსუალური ვარდებულობის ვადსება ავადსურთის შობებშიან და ნავსავსებობის სავსრის დროს. ფროიდის აზრით, ქ.ვ. ვადავანის სექსონის ვაკონსტრუქციები აკონსტრუქციები ნაქონი სურვილი. ტ-ში მსოფლდარება ავადსურთისთვის დანიხისათვის ველი სურვილის სავსრის, იყურებება (Forst J.B., 1957) დღის, რომ ტ. არ არის სარკე სიდე არავსება ავადსურთის წინაშე მღარი ველია შობებულება და იმის დანიკობებულება ვარემე რეალობისთან.

**ტრანსფორმაცია** ბოლოში - ირანტი (ლათ. transformatio - ვარდებულება). ბოლოში ვარდებულება. შინი შინიანობის სექსუალ, სავს. დენის შობი ვარდებულება სექსუალისთან. ვსიქსუალ ვსიქსუალ ბოლოში წარმოქმნის ვანის სექსუალის - პანიხის ველი დენის ვარდებულების პანიხის ველი (Linnarsson H., Patten H., 1988).

**ტრანსფორმაციის სინტაქსი** - ირანტი (ლათ. transformatio - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება).

**ტრანსფორმაცია** - ირანტი (ლათ. transformatio - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება).

**ტრანსფორმაცია** - ირანტი (ლათ. transformatio - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება).

**ტრანსფორმაცია** - ირანტი (ლათ. transformatio - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება).

**ტრანსფორმაცია** - ირანტი (ლათ. transformatio - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება).

**ტრანსფორმაცია** - ირანტი (ლათ. transformatio - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება).

**ტრანსფორმაცია** - ირანტი (ლათ. transformatio - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება).

**ტრანსფორმაცია** - ირანტი (ლათ. transformatio - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება).

**ტრანსფორმაცია** - ირანტი (ლათ. transformatio - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება).

**ტრანსფორმაცია** - ირანტი (ლათ. transformatio - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება).

**ტრანსფორმაცია** - ირანტი (ლათ. transformatio - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება).

**ტრანსფორმაცია** - ირანტი (ლათ. transformatio - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება).

**ტრანსფორმაცია** - ირანტი (ლათ. transformatio - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება).

**ტრანსფორმაცია** - ირანტი (ლათ. transformatio - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება).

**ტრანსფორმაცია** - ირანტი (ლათ. transformatio - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება).

**ტრანსფორმაცია** - ირანტი (ლათ. transformatio - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება).

**ტრანსფორმაცია** - ირანტი (ლათ. transformatio - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება). სინტაქსი (ლათ. syntaxis - ვარდებულება).

საქანაღმდეგო სქესის პირის სახით ფუნქციონირებს და მისი ტანსაცმლის ტარებისადმი მისწრაფება. **3. სქესობრივი ლტოლვის მიმართულება თავისთავად სქესობრივი ლტოლვის ანერგია.** სისისტიკა, კალანის რეპროდუქციული (სარეპროდუქციო) გამსრულებელი ფორმისთვის (აქტიური მამაკაცებში და პახური - ქალებში) დახასიათებულია გრძელად მზიდვად მქანის ნაწინა.

**ტრინამი ლინტონისა** - იყენი ი. სიუნი. იხ. **ლინტონის ტრინამი.**

**ტრინამი მინდარაძისა** - იყენი ი. მინდარაძის აბოციაციების ამქარება, გუნება-განწყობის აწევა, ნებათი და მოქმედებითი ხეობის ამქარება. გვხვდება მღვთის მინდარაძის უფის დროს.

**ტრინამი მინდარაძისა** - იყენი ი. მინდარაძის შედეგების ცვლილება ხშირად ხსიანგობებითა: დრამატული, დიონეა, დეპრესია. სისისტიკა: სინდრომი სინდ. 2.

**ტრინამი პრეტორიანისა** - იყენი ი. პრეტორიუსი. იხ. **პრეტორიუსის ტრინამი.**

**ტრინამი რამბარტისა** - იყენი ი. რამბარტი. იხ. **რამბარტის ტრინამი.**

**ტრინამი რამბარტის მემკვიდრეებისა** - იყენი ი. რამბარტი მემკვიდრეებისა: **ტრინამი რამბარტისა** - იყენი ი. რამბარტი მემკვიდრეებისა: **ტრინამი რამბარტისა** - იყენი ი. რამბარტი მემკვიდრეებისა.

**ტრინამი რამბარტის მემკვიდრეებისა** - იყენი ი. რამბარტი მემკვიდრეებისა.

**ტრინამი რამბარტის მემკვიდრეებისა** - იყენი ი. რამბარტი მემკვიდრეებისა.

**ტრინამი რამბარტის მემკვიდრეებისა** - იყენი ი. რამბარტი მემკვიდრეებისა.

**ტრინამი რამბარტის მემკვიდრეებისა** - იყენი ი. რამბარტი მემკვიდრეებისა.

**ტრინამი რამბარტის მემკვიდრეებისა** - იყენი ი. რამბარტი მემკვიდრეებისა.

**ტრინამი რამბარტის მემკვიდრეებისა** - იყენი ი. რამბარტი მემკვიდრეებისა.

**ტრინამი რამბარტის მემკვიდრეებისა** - იყენი ი. რამბარტი მემკვიდრეებისა.

**ტრინამი რამბარტის მემკვიდრეებისა** - იყენი ი. რამბარტი მემკვიდრეებისა.

**ტრინამი რამბარტის მემკვიდრეებისა** - იყენი ი. რამბარტი მემკვიდრეებისა.

**ტრინამი რამბარტის მემკვიდრეებისა** - იყენი ი. რამბარტი მემკვიდრეებისა.

**ტრინამი რამბარტის მემკვიდრეებისა** - იყენი ი. რამბარტი მემკვიდრეებისა.

**ტრინამი რამბარტის მემკვიდრეებისა** - იყენი ი. რამბარტი მემკვიდრეებისა.

**ტრინამი რამბარტის მემკვიდრეებისა** - იყენი ი. რამბარტი მემკვიდრეებისა.

**ტრინამი რამბარტის მემკვიდრეებისა** - იყენი ი. რამბარტი მემკვიდრეებისა.

**ტრინამი რამბარტის მემკვიდრეებისა** - იყენი ი. რამბარტი მემკვიდრეებისა.

**ტრინამი რამბარტის მემკვიდრეებისა** - იყენი ი. რამბარტი მემკვიდრეებისა.

**ტრინამი რამბარტის მემკვიდრეებისა** - იყენი ი. რამბარტი მემკვიდრეებისა.

**ტრინამი რამბარტის მემკვიდრეებისა** - იყენი ი. რამბარტი მემკვიდრეებისა.

უ

**უპსონის სიგლერობა** - Уайс (Hoyce R., 1962). აღნიშნება როგორც ეაროლება პროლონგირებული მოქიქლებს ბენცილანბს პრეპარატებს შეყვანის დროს. აღმოყრლება სწრაფად, შეუყვანისთანავე და ყრსოვლება რაინდრამე წყოს. მარამა შოყვერ რამდენიმე საათი და დღე. დამახასიათებელია ფსიქოპათოლოგური და სომატური სანქტომება. პირველი მკეყეთენება სკელახს მში, ფსიქოპოგორული ავანება. აღოყბეკეყი დემორიგნარება, ესკეკრობის შეყრანება, სქესოთ. შიყვლელობით და ყნობითი .აღყვანისყბი, დეპერსონალიზაციის მოყდყრები. სანსკერ სიმკემბებს მკეყეთენება გეყკარლი, არგერიული პიპერტანია, სიმძიმის შეყრანება ეულშყრდის არეში. ხეყლა, კანის სოყერყრთაღე ან ყანობი, ძლიერი თელიანთხა, ყულერთა ყლოყრი კრენსყვები, პაროსთიყბი, თაყეს გ.სიყილი და თაყბრ.ესხეყეა. შემდგომში, ხანგრძლიყ დროის ვანშეყლობაში. შეამლება დარჩის ნყრსამა.მაცყარი (დემარესულ-ფობიური ან არქთაშელ-ფობიური) სანსკრამაყაყ. ეეგეგბეყური დარღყეყი. უბ არ არს გემოყვეყელი ანაფლაყბური მოყდყებთ. აგორის ამრთი, იგი წარმოადგენს ყგოსკეყრეშბოთლყრ რეპიყსათა. ანამსეში აღნიშნულია ყნს-ის ორვანული დამიანებისადმი და სხეადახევა ფსიქოპათოლოგური გამოყდინებისადმი წანაგანწყობის როლი.

**უპსონი** - Уайс (ერმ. Verneiseq). ფსიქოანალიზშე პროყდურა, რომლის ხიშვალეობიყ სეხსეყი გამსახარეს მას შიყრ აღრე გამოღეყილ სერეყებს, ამრებს და გრძნობებს, ყეებს მათვან თაყდოყეს და უარყოყს, რომ ეს არის მისი სერეილები, ანრები და გრძნობები.

**უპსონურიება, უპსონურიება და მამეშ დანსაქმნი** - Уайс (XVH H TBAK H XHHA. ეს მეგომარობებს ანალიგერიია ხინდროსისა, რომელყ აღმოყრლება ხეყვარულის ობიექტს დაკარგვანთან დაკეშანებათ. უბეყრების რეპიყსა ბეყალეზბად არ ნიშნეს საყერიული ადამიანის სიყლილმე რეპიყსის და შეიძლება აღმოყრდეს შემდეგი მარბების ვიხსი: 1) საყერიული ადამიანის დაკარგვა ვანშობების, ვანტორწინების ან დაპატიმრების ვიხსი; 2) ობიექტის ან მდგომარეობის დაკარგვა, რომელყს სქორდა ემოყური მნიშენსლობა, მაც, საყურების, ხელაყრელი სანყშაის ან სანსყალეობაში მდგომარეობის დაკარგვა; 3) სოყვარულს ობიექტის დაკარგვა, მაც, მკედარი ან არამარულეისიყინი ბეყიყის დაბადება; 4) დანაკარგი, დაკეშობებული დაეაღებასთან, გრადემას ან ჭრილობასთან. მაც, ამ.ს.გ.ყსათა, მისიეყკომბი. უბეყრების და მძიმე დანაკლისის სეადიები ბოყდბის (Bowley J.) მიხეღით: I. გაშტყრება ან პროტყბტა. აბასიოთეს შეყსლო ყონა, შიში და შრისხანება. ფიზიოლოგური შოყ შეიძლება ფყის წინაყრი, ან ღლეყის, ან თეყბი. II. სეყდა და დაკარგული ადამიანის დაბრუნების ხეყვლია, სამყარი სანს ყარიყსი და ეარსი, ოყსევა თეყსშეყსება არ არღეყა, ავადმყოფი მოყულია დაკარგულ ადამიანზე ფიყრესით. ეერიოყდოდ ფიზიოლოგური მოყსეებრება, გირილი და მისხანანება მეგომარობა შეიძლება ეგრბელეს რამესწისე თეე ან წყელი ყი. III. შეშტყრანაშეყა და სიმოწარყეეთილება, დაუყვარლობა და ემშანი მოქმედეები. მოყეყბრისობის ვისლიყრება, საყეთარ თეში ნაყევა, ინგროყრსიყრება და ჭარი. მუღმეო მოგონესები დაღეყელის შესახებ. IV. რეორგანაშეყა. აბადი შითაშეყლებების, ობიექტების და შინების აღმოყრება, დარლი ეგრკრობილება და ყეყლეება მყარფასი მოყოსიყებით. უბეყრების და მძიმე დანაკლისის სეადიების პარყრების (Parkes C.) შიხედეთ: I. შეფოთა. ხგრესის მეგომარობა, ხასიათლება ფიზიოლოგური ყელილებითი, მაც, არგერიული წნევის მობადება და იყლისიყვის ვანშობეი (შეყსაბაბეე I სეადის ბოყდბის მიხეღით). II. გაშტყრება. არაღრსა ვანყდესი დანაკლისთან დაკეშობით და ფიყტერი თაღეყეა მძიმე სგრესიანება III. ტანყდა (ძეყა), დაკარგული ადამიანის ძეყნისა,ყნ მისწრაფება და შეღმეო მოგონებება მასზე (შეყსაბაბეე II სეადის ბოყდბის მიხეღით). IV. დეპრეზია. შიშაყდის უბეღობის ვანყდა, სიყყხლას ეგრბელების შეუღებლობა და ჩანმოზრება იყიანისა და მკეყრბეიისიგან. V. გამოყანაშეყება და რეორგანაშეყა. შეყნება იშია, რომ ვრსულდება ხეყოყბე.

**უპსონის უპსონი** - Уайс (XVH H TBAK H XHHA. ეს ფსიქოლოგურ ტიპტრატებში დემოგორეული ტრენიბი. აღნიშნულია აღქმის ხეგადახევა სდოლობაში აღმოყრებულ წინაგანწყობისეული ოყსების, ამ ოყსიების წარმოყრის წინასირობა წყეყდის ობიექტთა რომელიმე აბმოყრული მამარობების (მაც, ეყლისობის) ვანშობებითი აღქმა, რის შესკლეყი ამ მამარობების შირო ოყბეგერ (მაც, გოლ) ობიექტებს სეიბეყე ოლეშიურად ადუყსანს. ამ ოყსობაა





დატოვებით, პაილომაგნით, ქაღალსზეა ორხრივი კალკონობით (თანველობის ფრთხილი). ცალკეანი და წარმარწვლიანი ყდას მიაღობ. აღრევი აღინიშნება ხმის ჩახლეჩა ხორხისა და ხმის ბოგების დაშინების გაჩი. ჯიან თქულება სარსევე ტილები. ფსიქოს მხრივ - ებლუესიფორული გულკრები (დღი ან ფსიქომოტორული). შესასერების მნიშვნელოვანი დაქვეითება შედარებით შენარჩუნებული ისტელექტის ფონზე. ფსიქიკური ინფილიმის მსუფულები. მესკვიდრების გიმი - ავტოსომურ-რეკლუხული.

**პრონომობა** - (არსით). აღინიშნება შორის კონტაქტის დაწყების და განუთარება რთული შრავიანობითანი პროცესი, რომელი განპირობებულია ერთობლივი მოღვაწეობის ინფორმაციის ვაკულის, ერთიანი სტრატეგიით ურთიერთმსკლავების მოთხოვნისგან. შვირე აღინიშნება. როგორც პიროვნების აღქმით და მისი ვაკულის.

**ურნიცხი** - ყიშირ (ინგლ. urine). იხ. პარაპარაფი.

**ურთააბნობა** - ყიშირის ზეშუალური პერფერენია, რომლის დროსაც ხეჭობრივი აბნობა და დაქვეითულია მთავარი პარტნიორის მიმართ მისი უკლებიანი ას მარდის აქტის თვალთვლით.

**ურთიწობა** - ყიშირის იხ. პარაპარაფი.

**უსუსრობის მდგომარეობა** - რუსთაინის ურთიწობა (გერმ. Hilflosigkeit). ფსიქოანალიზზე დაქვეითულია ბაგეის მდგომარეობის, რომელი მთლიანად დაშორებულია სხვა აღინიშნებზე საკუთარი მოთხოვნილებების (შეშინა, წყურვილი) დაქვეითების დროს.

**უსინიწობა** - იხ. ურთიწობა. პიროვნების მიერ საკუთარი სამოქალაქო უფლებებისა და მოვალეობის შესრულების უუნარობა ფსიქიკური მოქმედების დროს დარღვევების შედეგად. განისაზღვრება და დგინდება საკუთარი სასიამოლო-ფსიქოპათოლოგიური უსინიწობის დასტვის საფუძველზე რომელი ინშიწება სახამართლოს მიერ სამოქალაქო საქმეების განხილვისას.

**უსიამაზუნებლობა** - ურთიწობის ფიზიკური შირის უფლება პირობის სამოქალაქო უფლებების და მოვალეობის, რომელი წარმოიშობა მისი დახატვის მომენტთან. (შეშედირობის უფლება სასახისთანადე). ურთიწობა მთელი ქიტირების წინაშე და წყდება მისი ვარდავების მომენტში.

**უსიამაზუნეობის დროის დამზადება** - ურთიწობის დროს დასტვის მომენტში.

**უსიამაზუნეობის დროის დამზადება** - ურთიწობის დროს დასტვის მომენტში.

**უსიამაზუნეობის დროის დამზადება** - ურთიწობის დროს დასტვის მომენტში.

**უსიამაზუნეობის დროის დამზადება** - ურთიწობის დროს დასტვის მომენტში.

**უსიამაზუნეობის დროის დამზადება** - ურთიწობის დროს დასტვის მომენტში.

**უსიამაზუნეობის დროის დამზადება** - ურთიწობის დროს დასტვის მომენტში.

ფ

**ფაზის-ქომა** (ბერძნ. phasis-ვაშლიანობა). ფსიქიკური დაავადების შეტევა, რომლის ჩათაყვის შემდეგ არ რჩება ფსიქიკური დეფექტის მნიშვნელოვანი ნიშანი. ფსიქოზის მიმდინარეობაში ფ-ის რაოდენობა ვარიაბელურია - ცალკეულ შემთხვევებში სიყოფილი მანძილზე ავადმყოფს შეიძლება ქონდეს ერთი ფაზა, სხვა შემთხვევებში - ფ-ები ძალიან ხშირია. სიმპტომატურად ფ. ხშირად გამოხატულია აფექტური ან აფექტურ-ბოლოებითი სინდრომებით. ფ. გიჟურია მდგომარეობა, რომლის დროსაც ავარებს მანიაკალურ (იხ. მანია), დეპრესიულ (იხ. დეპრესია) და შორაყელე (ერთი ფაზა ეწეის მეორეს მათ შორის ნათელი პერიოდის გარეშე) ხასიათს. მიმდინარეობა ბიპოლარული და მონოპოლარულია. ეს უკანასკნელი, ზოგი ავტორის მიხედვით, განიხილება როგორც დამოუკიდებელი ციკლოიდური ფსიქოზი. ფ-ზე პირობითად შეიძლება ლაპარაკი ვიზუალური მიმოფერხვის დროს, თუმცა ამ შემთხვევებში შეტევების შირის აღნიშვნა ფსიქიკური დეფექტის ნიშნები, რომლებიც პლურელურ დაავადების მიმდინარეობასთან ერთად აუქსიური იერაყობა მიმდინარეობს ფაზურად ფსიქოპათიას ზოგიერთი ვარიანტის, უმეტესად ციკლოიდურის, დროს.

**ფაზისრენოვანი** - ფაზისრენოვი (Kleist K., 1921). ანტიფსიქიკური ფსიქოზების ჯგუფი. გამოყოფილია მათი ფაზური მიმდინარეობის მიხედვით. პათოგენები დაკავშირებულია ცენტრალური ლერძული მექანიზმების დარღვევასთან. ფ-ს მალკოფინდენ გუნება-განწყობის ფსიქოზებს (მელანქოლია, მანია, მანიაკალურ-დეპრესიული ფსიქოზი), აფექტურ ფსიქოზებს (მიმის ავტიორული ფსიქოზი, მიმის სტაორული დეპრესია, მიმის ავტიორულ-ტეკუორული ფსიქოზი), ბოდევის წარმოქმნელ აფექტურ, ანტიფსიქიკურ და აქტიურ ფსიქოზებს. ფ-ის კონკრეტია განავისარა ლეონარდო. თუმცა მან უარი თქვა ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომების გინში ლეკალიზაციის პრინციპზე ავიპურ ესპლანტურ ფსიქოზებს იგი განიხილავდა ციკლოიდური ფსიქოზების ფარგლებში, ისინი შეესაბამება კლინიკურ ბოდევის წარმოქმნელ აფექტურ ფსიქოზებს.

**ფაზისრენოვანი** - ფაზისრენოვი (ბერძნ. phasis - ღაქა). მუცლისრეობითი დაავადების ჯგუფი გადაყვების დომინანტური რეჟიმი, ხასიათდება სხვადასხვა ორგანოებსა და ქსოვილებში (კანი, ენა, თვალის ბადურა და სხვ.) სიმსივნისმავარი წარმოსაქმნების არსებობით, პროგრესული დეგენციით, ეპილეფსიურმული სინდრომით. კანის გამოვლინება - დიკროფორმის უჩრები. მიკრობიოგენეტიკა, ანვიომები, გულკანგიუტეგამები. ფ. მოიყვას: გუბეროჩელ სკეროზი (ბანენიშვილის რეპარაქტა), ნეიროფიზიოლოგიკოს (რეპარაქტა-რეპარაქტა), ენეფალოლოგიკოსინალურ ანვიომეგალიზ (სტრუქტ-მეგალიზ-რეპარაქტა), ცერებრორეგინალურ ანვიომეგალიზ (რეპარაქტ-რეპარაქტა) (იხ. სინდრ. რეპარაქტის რეპარაქტის რეპარაქტა).

**ფალატია** - ფ. phallia (ლათ. phallia - გუელი). ცრუ აღქმის, დეპრესიის, პალკინაციების აღნიშნული მოქველკუვლი ტერმინი. აღარ იხიარება.

**ფალატია** (ქალბ. ან დედა) - ფალორია (ფალირია იხი ფალი) (გერმ. phallische (Frau an Mutter)). ფსიქიკანალიზა: ქალი, რომელიც თავის ფანგამებზე საკუთარ-კაცს აღიქვამს ფალატია; ეს სახე შეიძლება იყოს ორგანი: ქალი, რომელიც ვაჟინია ვარეგები ფალატია ან შინს (სამნიშნებელი თიხებები, ან ქალი მასში მამაკაცის ფალატია).

**ფალატია** ფალატია - ფ. phallia (ლათ. phallia - გუელი). ცრუ აღქმის, დეპრესიის, პალკინაციების აღნიშნული მოქველკუვლი ტერმინი. აღარ იხიარება.

**ფალატია** - ფ. phallia (ლათ. phallia - გუელი). ცრუ აღქმის, დეპრესიის, პალკინაციების აღნიშნული მოქველკუვლი ტერმინი. აღარ იხიარება.

**ფალატია** - ფ. phallia (ლათ. phallia - გუელი). ცრუ აღქმის, დეპრესიის, პალკინაციების აღნიშნული მოქველკუვლი ტერმინი. აღარ იხიარება.

**ფალატია** - ფ. phallia (ლათ. phallia - გუელი). ცრუ აღქმის, დეპრესიის, პალკინაციების აღნიშნული მოქველკუვლი ტერმინი. აღარ იხიარება.

კანკლების აგრეთვე განხილდება ქალბინ სამჯლო ასაკის, ხშირად მშობიარობის შემდეგ, მიხედნარეყის  
პროვინციულად, სვედის კიკიქის, დიხისბათხებელა აღრეული დახრების წინმე-წინადა, დანადგერული  
წინად, კბილების ყვეს, ხესხისაფრეო ვეკების ვადრება, ფიხის მინაე - ასევე, ასობის, ასობის, აკრამბის მიოვენიქსა,  
მისობლქლელო პალ კრინიკერა და სიღლითის განილება.

**ფანციონი - შლესინგერიის სინდრომი** - (ფანციონი III. ფანციონი (Fancoi G. 1952; Schlesinger B., 1952).

ქრონიკული ფეიმათიფერი პაქეკლეცეზი ოსტეოსკლეროზთან ერთად, დიხისბათხებულ წიგითიფრებისა  
ქროის მიხედა-პიქრადეცეზია, პიქრადეცეზია, პიქრადეცეზია, პიქრადეცეზია, პიქრადეცეზია, პიქრადეცეზია, პიქრადეცეზია, პიქრადეცეზია,  
პიქრადეცეზია, პიქრადეცეზია, დიხის ბინ, ოსტეოსკლეროზი მქლელო განიბარეკული ქალის ფიხის მქლეობს,  
ხშირად აღაბნინება ველის ობნადილლი მანკეტი, ქალის საკერების ნადრევი მვერთხება, კრეცერეკული სკრინიბიზი,  
ფიხის მინაე - ვანცერეკული ვანკეუობიბიფიზია.

**წანრანა** (წანრანეზი) - ფანციონი ფანციონი (გერმ. Phantasi). ფეხებანდლნზე წანრანიაყოთი სქქენიანი რანბილნიე  
ხრკლეფება ხეხიქეს ეს ოუ ის ხერვილი (პრეცნობიფი).

**წანრანეზი ბაქფეზი პეიროზიზი** - ფანციონი ბინე მიოთეფიფი: ვადლეტეფული წანრანეზი,  
ქალსდება ბაქფეზია განიბათიქეტიბი, ობიბის დრის განიქლების მინიბინი, აღნიშნება ხეფრინების და მიხეგრენის  
დრის მიქლეობის ოქის აქეტიბის (ბრკლდობის) აკედეტელს ან ბოლითი ბეცების განიქლეობს.

**წანრანეზი ბიქლიბინეზი** - ფანციონი ბინე (ბინე), ობ. ბიქლიბინეზი

**წანრანეზი ბიქლიბინე** - ფანციონი ბინე (Kleist K). მათეფრენული ვეკნებს პარაფრენული მდგომარეობა, ხასიათდება  
ხეხიქესობიფიფი, პრინციფიფი, ვანსდება ოფეციბი, აუაქტიფი ვანკემპიფიფი პარეპის დენკეფიფიფიფი  
დახრევესობი, ლეონარდის K. Leonard, 1936) ხიხედი, მიქეცეფიფი პრინციფიფი, ოფეცი-მიხეფრენიბის, მის  
ობნობრეკულ მდგომარეობის ობიქლიბინე და ქრბილენ და ვეცეც-პლექსობიბინი ვრთად; აფეცერეკულ  
დრინბი ფინსების კი მიქეცეფიფი და კემპინეფული ლეცი-მიხეფრენია ან აუეტიფი მათეფრენია, მინათად  
განსხევეტა - პრეფეციფი ან სეფეციფი სანკრინიფიფი სიბინებ.

**წანრანეზი მარკეზი** - ფანციონი ბინე (ბინე), ობ. მარკეზი

**წანრანეზი პეიროზიზი** - ფანციონი ბინე (ბინე): ტყელებს შეტხეკაბეში მდგეკელეცე, რიე  
აფეციფი ობეფ სეფია, აღანიშნება ფეციფიფი პარეციფიბი (ობ. ბინეზიბი სინდრომი), მიხეფრენის,  
პრინციფი მდგომარეობის დრის.

**წანრანეზი** - ფანციონი ბინე phantoma - მრდლი წანრანეზი, წანრანეზი: 1. სტეტიანი სეფრე წანრანეზი,  
აღნიქეციფული მრდლერი განსინაბელის ვარემე: მიქეციფიფი პალკეტიფიფი და ფეციფიფიფიფიფი; 2.  
წანრანეზი ფეხებანტიაში ვანეკული რეფრიე ფანტეზიაში მანქანობი ვეცემა-ბიფიფი სეფრე, რანბილნიე  
ფეციფიფიფი ცნობიფი და ანაგინობიფი მრდლერი, ვრეფიფი ოქეცები ცხეზი: 3. ფ. მებინეზი, არ  
აგრენის მიხეციფიფი ხასიათს, ვანოფიფიფი აუადსეციფი მერე საკეფიანი ობიფი კარეკულ წანრანეზი, არნიქენ  
ფის ატრეციფი, რანბილნიე აუადსეციფი ოქეციფი ობიფი განიქონდას (ობ. ფეციფიფი ფანტეზიფი),  
და პრინციფი, რანბილნიე აგრენის დეციფიფი ანაბეციფი და წანრანეზი განსიღლები პრინციფი (დინბილნი  
მეხეციფი) ბიღის მიხეციფილ სეფრე.

**წანრანეზი პეიროზიზი** - ფანციონი ბინე (ბინე, ლეონარდ, ბინე, phantasma-მრდლი, წანრანეზი,  
წანრანეზი): ქრანბილნიე, მანქე (გერმე, პრინციფი) შეფრანეცე, რანბილნიე ეპიფიფიფი მანქანეზიფი  
კაქლერი. ქრანბილნიე, რანბილნიე ანაბეციფი სხეულის ხესხის ობიბინა.

**წანრანეზი წანრანეზი პრინციფი** - (ბინე, ფანციონი ბინე (ბინე, ლეონარდ, ბინე, phantasma-მრდლი, წანრანეზი,  
წანრანეზი).

**წანრანეზი ბეკეციფი** - მანქე (ბინე, ლეონარდ, ბინე, phantasma-მრდლი, წანრანეზი,  
წანრანეზი): წანრანეზი, დანაფიფი აღნიშნება სამჯლო ასაკის, აგრენის ოქეციფი-შეციფიფიფიფი ხასიათს,  
კაქლერი სეფრეციფიფი სინციფიფი-სეფრეციფიფიფი სინციფიფი, სეფრეციფი პიქრანეციფი, ხასიქეციფი  
დინბილნიე, ვანეციფიფიფი ვანეციფიფი.

**წანრანეზი სეფრეციფი სეფრეციფი** - ფანციონი ბინე (ბინე, ლეონარდ, ბინე, phantasma-მრდლი, წანრანეზი,  
წანრანეზი): ფანციონი, მანქე (გერმე, პრინციფი) შეფრანეცე, რანბილნიე ეპიფიფი მანქანეზიფი  
კაქლერი. ქრანბილნიე, რანბილნიე ანაბეციფი სხეულის ხესხის ობიბინა.

**წანრანეზი წანრანეზი პრინციფი** - (ბინე, ფანციონი ბინე (ბინე, ლეონარდ, ბინე, phantasma-მრდლი, წანრანეზი,  
წანრანეზი): წანრანეზი, დანაფიფი აღნიშნება სამჯლო ასაკის, აგრენის ოქეციფი-შეციფიფიფი ხასიათს,  
კაქლერი სეფრეციფიფი სინციფიფი-სეფრეციფიფი სინციფიფი, სეფრეციფი პიქრანეციფი, ხასიქეციფი  
დინბილნიე, ვანეციფიფიფი ვანეციფიფი.

**წანრანეზი სეფრეციფი სეფრეციფი** - ფანციონი ბინე (ბინე, ლეონარდ, ბინე, phantasma-მრდლი, წანრანეზი,  
წანრანეზი): წანრანეზი, დანაფიფი აღნიშნება სამჯლო ასაკის, აგრენის ოქეციფი-შეციფიფიფი ხასიათს,  
კაქლერი სეფრეციფიფი სინციფიფი-სეფრეციფიფი სინციფიფი, სეფრეციფი პიქრანეციფი, ხასიქეციფი  
დინბილნიე, ვანეციფიფიფი ვანეციფიფი.

**წანრანეზი სეფრეციფი სეფრეციფი** - ფანციონი ბინე (ბინე, ლეონარდ, ბინე, phantasma-მრდლი, წანრანეზი,  
წანრანეზი): წანრანეზი, დანაფიფი აღნიშნება სამჯლო ასაკის, აგრენის ოქეციფი-შეციფიფიფი ხასიათს,  
კაქლერი სეფრეციფიფი სინციფიფი-სეფრეციფიფი სინციფიფი, სეფრეციფი პიქრანეციფი, ხასიქეციფი  
დინბილნიე, ვანეციფიფიფი ვანეციფიფი.

**წანრანეზი სეფრეციფი სეფრეციფი** - ფანციონი ბინე (ბინე, ლეონარდ, ბინე, phantasma-მრდლი, წანრანეზი,  
წანრანეზი): წანრანეზი, დანაფიფი აღნიშნება სამჯლო ასაკის, აგრენის ოქეციფი-შეციფიფიფი ხასიათს,  
კაქლერი სეფრეციფიფი სინციფიფი-სეფრეციფიფი სინციფიფი, სეფრეციფი პიქრანეციფი, ხასიქეციფი  
დინბილნიე, ვანეციფიფიფი ვანეციფიფი.

**წანრანეზი სეფრეციფი სეფრეციფი** - ფანციონი ბინე (ბინე, ლეონარდ, ბინე, phantasma-მრდლი, წანრანეზი,  
წანრანეზი): წანრანეზი, დანაფიფი აღნიშნება სამჯლო ასაკის, აგრენის ოქეციფი-შეციფიფიფი ხასიათს,  
კაქლერი სეფრეციფიფი სინციფიფი-სეფრეციფიფი სინციფიფი, სეფრეციფი პიქრანეციფი, ხასიქეციფი  
დინბილნიე, ვანეციფიფიფი ვანეციფიფი.

**წანრანეზი სეფრეციფი სეფრეციფი** - ფანციონი ბინე (ბინე, ლეონარდ, ბინე, phantasma-მრდლი, წანრანეზი,  
წანრანეზი): წანრანეზი, დანაფიფი აღნიშნება სამჯლო ასაკის, აგრენის ოქეციფი-შეციფიფიფი ხასიათს,  
კაქლერი სეფრეციფიფი სინციფიფი-სეფრეციფიფი სინციფიფი, სეფრეციფი პიქრანეციფი, ხასიქეციფი  
დინბილნიე, ვანეციფიფიფი ვანეციფიფი.

**წანრანეზი სეფრეციფი სეფრეციფი** - ფანციონი ბინე (ბინე, ლეონარდ, ბინე, phantasma-მრდლი, წანრანეზი,  
წანრანეზი): წანრანეზი, დანაფიფი აღნიშნება სამჯლო ასაკის, აგრენის ოქეციფი-შეციფიფიფი ხასიათს,  
კაქლერი სეფრეციფიფი სინციფიფი-სეფრეციფიფი სინციფიფი, სეფრეციფი პიქრანეციფი, ხასიქეციფი  
დინბილნიე, ვანეციფიფიფი ვანეციფიფი.





**ფიქსირება** - fixatio (ლათ. Fixierung). ფსიქოანალიზში განსაზღვრულ პირებისა და სახეების (imagos). ასე თუ ის დაკავშირების ხაზგაღებითან ის დაკავშირებისა ანა თუ ის სკალის სტრუქტურულ ორგანიზაციასთან მიკროსა კავშირს. ფ. შეიძლება იყოს აქტიურული. ნათელი ან დარჩენი წამყვანი გაცნობიერებ სუბიექტის მიერ მდგრადობისთვის. ფსიქოკრიტიკი მდგომარეობა. ფ. წარმოადგენს ლიბიდოს განვითარების მძაფრავლევებს, ხილს ანაკლამბატის ერთმსგეულ თეორიას, ეს არის არაქსიოტერში მოვლერაი უცვლელი მიზანრის (გამსილდლება, ხასიყვი, ვარცხლილა) წარსლის ხაზგაღება, რაც დღევანდელ საფეხვედლს წარმოადგენს.

**ფიქსირებაში ბრუნვა** - ხმამაღლა - ბრუნვა, ფრაზის, ნაწყობის, მოკლე ვაგონატიკობის შრავილდერადი ვაგონება, შეტყველებითი სტერეოტიპის გამოვლენება. გაკურნა მის დაავადებასთვის, რომლის მიმდინარეობაში გაიწილს განსაზღვრულ დამოსესი ინტენსივათა თაღდასარულად ერთმანათა ცვრამოვლის ფორფიტობა სიმსილსი. შეუძლოდ იხრობა სულ უფრო მარტივდება, რეკურსდება და დავიწყდება სუველებს. ფრაზის ნაწყობების სტერეოტიპულ ვაგონებებზე. ხდება უფრო და უფრო ვარსა. მოვლერ საფეხვედ მძაფრანდელ მსილდელ დამხმარებელია, რომ შეუძლებელია მათი საწყისი ფლერადობის და აზრების გაცემა.

**ფლაგელატიონი** - ფლავიონი (ლათ. flagellatio - ცეცხი). სუბიულური პერფორება, რამდენიმე დროსა) სექსუალური აქტიუბა და დაქრთვულია მსილდელი პირფორების ექსთი. იხ. **საფლავი**, **პანფორება**, **საფორება**.

**ფლაგელატიონი სიმპტომი** - ფლავიონი (ლათ. flagellatio - ცეცხი). სუბიულური პერფორება, რამდენიმე დროსა) სექსუალური აქტიუბა და დაქრთვულია მსილდელი პირფორების ექსთი. იხ. **საფლავი**, **პანფორება**, **საფორება**.

**ფლემინგის მსილდელი** - ფლემინგი (ლათ. Fleming K., 1814). იხ. **ფლემინგი**.

**ფლემინგის მსილდელი** - ფლემინგი (ლათ. Fleming K., 1814). იხ. **ფლემინგი**.

**ფლემინგის მსილდელი** - ფლემინგი (ლათ. Fleming K., 1814). იხ. **ფლემინგი**.

**ფობია** - ფობია (ბერძ. phobos - შიშ, ჯერმ. Phobie). აკუტივებულ შდგომარეობათა ხსიყ, ელსდება ინტენსურინ და დაქრთვული შიშისათა. აკუტივების სტრუქტურაში ჭარბობს შვიდის აუციუბი. ფსიქოელოსის თან ახლავს გაისიზავლს ვეგეტოლიკორონი სიმპტომსიკა (ხსიშის კანის სუფერქრიალუკ კლდერების და ხსიყვის კანკი, ოქლამბობა, გაცეცხი). შიშის მამყის შეიძლება იყოს ყოველდღიური ეხოტორების ნებისმიერი შიშისათა, ასე, კი, ნებისმიე ავადმყოფს მხოლოდ ყური თუ მოუკრავს. უმეტესად აღიწინებს აკუტივებულ შდგომარეობათა წყურბობის და სუფრასიმიკორნი შდგომარეობების დროს, შიყ, შიშოტყურების სუფრასიმიკორნი მიმდინარეობის სტრუქტურაში. ფსიქოანალიზის და შიშ ფიქსაციის განმარტობების შფოთიან-განვითარებული საშეების მაკარტყუბა ხასიათის. არჩიყყნი ფსიქოანალიზის რამდენიმე მსილდელი ვეგეტოლიკორონი ელკევი კანკრტყული მოვლერაი, და რამდენიმე, რომლის შიშისათა ყოველმსილდელია შიშისათა. ფ. მრავალფეროვანია. **დასველდების** (Langfeldt G., 1951) მიხედვით, ახსიშისათა 4 ჯგუფია: I ფ. განსაკუთრებული სიგუებისა და დამოკიდებულებისა (აკროფობია, აგროფობია, აგროსიფობია); II ფ. ვარდ სახარისხად (იფსოფობია, სოფოფობია, შოფობია); III ფ. ამა თუ იმ შიშისათა ორგანიზმის ახსიყვის დასუკეციუსის (ჯეროფობია, დეუცეციუსობია); IV ფ. ძალადობის საკუთარი თიყისაღნი ან სისიყის (სუცილდობია, სიცილდობია). ფობიების ხსიყები იხილეთ ქვეთი. **ფსიქოანალიზში: ფობია** გამოყოფი ფობიის (თან დღი ჯგუფი: I. "საყოფაცხოვრებო შიშები" (სიყვლის, დაავადების და ა.შ. შიშის); 2. სუცილდური ფობია (და სუციუსი შიშის, რომელიც ყოველდღიური შიშის და ა.შ.). ფ-ის შიშებში სუციუს მისწრაფებათა არჩიყვის ყოველდღიური შიშისათა შიშისათა შიშისათა შიშისათა. ქვეთი შეყვანება ფობიების ხსიყები ვაგონებია ანაწიყ.

**ფორაფობია** - ფორაფობია (ბერძ. φόρος - შიშისათა). I. სიფრეს, განშდელი შიშისათა შიშისათა (Westphal C., 1871). 2. დადი რამდენიმეათა თიყისათა ხაღის შიშისათა (Cordes E. 1871). სიწონ: **ფორაფობია**.

**ფორაფობია** - ფორაფობია (ბერძ. φόρος - შიშისათა). I. სიფრეს, განშდელი შიშისათა შიშისათა (Westphal C., 1871). 2. დადი რამდენიმეათა თიყისათა ხაღის შიშისათა (Cordes E. 1871). სიწონ: **ფორაფობია**.

**ფორაფობია** - ფორაფობია (ბერძ. φόρος - შიშისათა). I. სიფრეს, განშდელი შიშისათა შიშისათა (Westphal C., 1871). 2. დადი რამდენიმეათა თიყისათა ხაღის შიშისათა (Cordes E. 1871). სიწონ: **ფორაფობია**.

**ფორაფობია** - ფორაფობია (ბერძ. φόρος - შიშისათა). I. სიფრეს, განშდელი შიშისათა შიშისათა (Westphal C., 1871). 2. დადი რამდენიმეათა თიყისათა ხაღის შიშისათა (Cordes E. 1871). სიწონ: **ფორაფობია**.

**ფორაფობია** - ფორაფობია (ბერძ. φόρος - შიშისათა). I. სიფრეს, განშდელი შიშისათა შიშისათა (Westphal C., 1871). 2. დადი რამდენიმეათა თიყისათა ხაღის შიშისათა (Cordes E. 1871). სიწონ: **ფორაფობია**.

**ფორაფობია** - ფორაფობია (ბერძ. φόρος - შიშისათა). I. სიფრეს, განშდელი შიშისათა შიშისათა (Westphal C., 1871). 2. დადი რამდენიმეათა თიყისათა ხაღის შიშისათა (Cordes E. 1871). სიწონ: **ფორაფობია**.

**ფორაფობია** - ფორაფობია (ბერძ. φόρος - შიშისათა). I. სიფრეს, განშდელი შიშისათა შიშისათა (Westphal C., 1871). 2. დადი რამდენიმეათა თიყისათა ხაღის შიშისათა (Cordes E. 1871). სიწონ: **ფორაფობია**.

**ფორაფობია** - ფორაფობია (ბერძ. φόρος - შიშისათა). I. სიფრეს, განშდელი შიშისათა შიშისათა (Westphal C., 1871). 2. დადი რამდენიმეათა თიყისათა ხაღის შიშისათა (Cordes E. 1871). სიწონ: **ფორაფობია**.

**ფორაფობია** - ფორაფობია (ბერძ. φόρος - შიშისათა). I. სიფრეს, განშდელი შიშისათა შიშისათა (Westphal C., 1871). 2. დადი რამდენიმეათა თიყისათა ხაღის შიშისათა (Cordes E. 1871). სიწონ: **ფორაფობია**.

**ფორაფობია** - ფორაფობია (ბერძ. φόρος - შიშისათა). I. სიფრეს, განშდელი შიშისათა შიშისათა (Westphal C., 1871). 2. დადი რამდენიმეათა თიყისათა ხაღის შიშისათა (Cordes E. 1871). სიწონ: **ფორაფობია**.

**ფორაფობია** - ფორაფობია (ბერძ. φόρος - შიშისათა). I. სიფრეს, განშდელი შიშისათა შიშისათა (Westphal C., 1871). 2. დადი რამდენიმეათა თიყისათა ხაღის შიშისათა (Cordes E. 1871). სიწონ: **ფორაფობია**.

**ფორაფობია** - ფორაფობია (ბერძ. φόρος - შიშისათა). I. სიფრეს, განშდელი შიშისათა შიშისათა (Westphal C., 1871). 2. დადი რამდენიმეათა თიყისათა ხაღის შიშისათა (Cordes E. 1871). სიწონ: **ფორაფობია**.

**ფორაფობია** - ფორაფობია (ბერძ. φόρος - შიშისათა). I. სიფრეს, განშდელი შიშისათა შიშისათა (Westphal C., 1871). 2. დადი რამდენიმეათა თიყისათა ხაღის შიშისათა (Cordes E. 1871). სიწონ: **ფორაფობია**.

**ფორაფობია** - ფორაფობია (ბერძ. φόρος - შიშისათა). I. სიფრეს, განშდელი შიშისათა შიშისათა (Westphal C., 1871). 2. დადი რამდენიმეათა თიყისათა ხაღის შიშისათა (Cordes E. 1871). სიწონ: **ფორაფობია**.





**კანცეროზიზაცია** - კანცეროზიზაცია (ლათ. cancer - კბი). ავთვისებიანი ხასიათის დაავადების აკრძალვას შიშის, სიმსივნის ხსენებით ახსენებენ აკრძალვას მდგომარეობაში წყურბლის, ანტიკონსერვატიული განსჯისთვის, ფსიქოლოგიის დროს.

**კანკეროზიზაცია** - კანკეროზიზაცია (ლათ. canis - გული) (Kullenkampf C., Bauer A., 1960). გულს მუშაობისა და რეგულირებადი შედეგებისთვის წარმოადგენს შიშის განმარტება. ავადმყოფის უკეთესობისთვის განკურნება და სიყვლის შიშის რეგულირება განსჯისთვის და უკუ - ით გულს მხოლოდ უკუკეთესი ცვლილებების არ აღსანიშნავად ხშირად განსჯისთვის განსჯისთვის, ანტიკონსერვატიული განსჯისთვის, უნდა იქნას დარღვევის, უნდა იქნას დარღვევის, უნდა იქნას დარღვევის დასახელება.

**კაიფორინი** - კაიფორინი (გერმ. Keiferin - ზურა, შერტა) (Oppenheim H.). აკრძალვას შიშის, აღსანიშნავად დაავადების, ჰარისკის დროს, კლინიკის დამინების შიშის.

**კაიფორინი** - კაიფორინი (გერმ. Kaitos - ხინი). უკეთესი სიყვლების, შიშის, მოყვლების აკრძალვას შიშის, ცრება ახლავს ავადმყოფობისაში.

**კამპოკოზიზაცია** - კამპოკოზიზაცია (ბერძ. kamatos - ეფა). გულს-ქუჩის და ეფის აკრძალვას შიშის. ხშირად კის აღსანიშნავად და რეგულირებადი ავადმყოფობისთვის და მათი შედეგების შესახებ სინჯისთვის, აღსანიშნავად აკრძალვას შიშის, აღსანიშნავად განკურნების და ფსიქოსთაის დროს. განსჯისთვის და შედეგებისთვის.

**კანკეროზიზაცია** - კანკეროზიზაცია (ბერძ. Kaper - სიყვრულის ქაღალდისთვის ავადმყოფობისთვის, უკეთესი სიყვლების და რეგულირებადი აღსანიშნავად აკრძალვას შიშის, სინჯის დასახელება.

**კლავსტროზიზაცია** - კლავსტროზიზაცია (ლათ. claustrum - საკვამლე, უკეთესი, დამწყობი). დახმული სიყვლის, დახმული შიშისთვის აკრძალვას შიშის.

**კლიპოზიზაცია** - კლიპოზიზაცია (ბერძ. klepto - შიშისთვის). სიყვლების აკრძალვას შიშის. ხშირად აღსანიშნავად სინჯისთვის, სინჯისთვის და მათი შედეგების შესახებ სინჯისთვის, აღსანიშნავად აკრძალვას შიშის, აღსანიშნავად განკურნების და ფსიქოსთაის დროს.

**კლიმატოზიზაცია** - კლიმატოზიზაცია (ბერძ. klima - კბი). სიყვლების აკრძალვას შიშის. აღსანიშნავად აკრძალვას შიშის, აღსანიშნავად განკურნების და ფსიქოსთაის დროს.

**კლინოზიზაცია** - კლინოზიზაცია (ბერძ. klinos - მთავალი). ხალხობრივად მუშაობისთვის აკრძალვას შიშის.

**კონკოზიზაცია** - კონკოზიზაცია (ლათ. conio - წიხი). შიშის გამოწვევი სიყვლის წინადასახელებისთვის დასახელებისთვის, რეგულირებადი შედეგებისთვის, რეგულირებადი შედეგებისთვის და მათი შედეგების შესახებ სინჯისთვის, აღსანიშნავად აკრძალვას შიშის, აღსანიშნავად განკურნების და ფსიქოსთაის დროს.

**კოპოზიზაცია** - კოპოზიზაცია (ბერძ. kopos - დაღლილობა). გაღლილობის აკრძალვას შიშის. აღსანიშნავად აკრძალვას შიშის, აღსანიშნავად განკურნების და ფსიქოსთაის დროს.

**კრანოზიზაცია** - კრანოზიზაცია (ლათ. cramen - დანაშაული) (Frankl V.E.). დანაშაულის დროს აკრძალვას შიშის.

**კრანოზიზაცია** - კრანოზიზაცია (ბერძ. kranios - ყბის, შიშის ბრალი). შიშის სიყვლებისთვის სიყვლის, აკრძალვას შიშის, აღსანიშნავად განკურნების და ფსიქოსთაის დროს.

**ლატერალის** - ლატერალის (ბერძ. lateralis - გვერდითი) ერთ-ერთი გვერდი, ხშირად მარჯვენაზე, წოდის აკრძალვას შიშის, აღსანიშნავად განკურნების და ფსიქოსთაის დროს.

**ლენოზიზაცია** - ლენოზიზაცია (ბერძ. lenos - ჰერკულიანი). კეთილ დაავადების აკრძალვას შიშის.

**ლიტოზიზაცია** - ლიტოზიზაცია (ბერძ. litha - ციხე). იმ, **სინჯისთვის**

**ლიტოზიზაცია** - ლიტოზიზაცია (ბერძ. lithos - სიყვლე, შედეგებისთვის). სიყვლების წარმოების, ცქარისთვის შედეგებისთვის დასახელების აკრძალვას შიშის.

**ლიტოზიზაცია** - ლიტოზიზაცია (ლათ. lita - სიყვლისთვის). სიყვლის დაავადების აკრძალვას შიშის, აღსანიშნავად განკურნების და ფსიქოსთაის დროს.

**მაიკროზიზაცია** - მაიკროზიზაცია (ბერძ. mikros - მცირე). მცირე სიყვლებისთვის აკრძალვას შიშის, აღსანიშნავად განკურნების და ფსიქოსთაის დროს.

**მაიკროზიზაცია** - მაიკროზიზაცია (ბერძ. mikros - მცირე, სიყვლე) (Beard G.M., 1880). დახმული სიყვლების აკრძალვას შიშის, აღსანიშნავად განკურნების და ფსიქოსთაის დროს.

**მაიკროზიზაცია** - მაიკროზიზაცია (ბერძ. mikros - მცირე). მცირე სიყვლებისთვის აკრძალვას შიშის, აღსანიშნავად განკურნების და ფსიქოსთაის დროს.

**მაიკროზიზაცია** - მაიკროზიზაცია (ბერძ. mikros - მცირე). მცირე სიყვლებისთვის აკრძალვას შიშის, აღსანიშნავად განკურნების და ფსიქოსთაის დროს.

**მაიკროზიზაცია** - მაიკროზიზაცია (ბერძ. mikros - მცირე). მცირე სიყვლებისთვის აკრძალვას შიშის, აღსანიშნავად განკურნების და ფსიქოსთაის დროს.

**მაიკროზიზაცია** - მაიკროზიზაცია (ბერძ. mikros - მცირე). მცირე სიყვლებისთვის აკრძალვას შიშის, აღსანიშნავად განკურნების და ფსიქოსთაის დროს.

**მაიკროზიზაცია** - მაიკროზიზაცია (ბერძ. mikros - მცირე). მცირე სიყვლებისთვის აკრძალვას შიშის, აღსანიშნავად განკურნების და ფსიქოსთაის დროს.

**მაიკროზიზაცია** - მაიკროზიზაცია (ბერძ. mikros - მცირე). მცირე სიყვლებისთვის აკრძალვას შიშის, აღსანიშნავად განკურნების და ფსიქოსთაის დროს.

**მაიკროზიზაცია** - მაიკროზიზაცია (ბერძ. mikros - მცირე). მცირე სიყვლებისთვის აკრძალვას შიშის, აღსანიშნავად განკურნების და ფსიქოსთაის დროს.

**მაიკროზიზაცია** - მაიკროზიზაცია (ბერძ. mikros - მცირე). მცირე სიყვლებისთვის აკრძალვას შიშის, აღსანიშნავად განკურნების და ფსიქოსთაის დროს.

**მაიკროზიზაცია** - მაიკროზიზაცია (ბერძ. mikros - მცირე). მცირე სიყვლებისთვის აკრძალვას შიშის, აღსანიშნავად განკურნების და ფსიქოსთაის დროს.







შეკარება ის ვაქცინა) ვისაფუძვლებით დაიკავებულა კრწმისქაწინაადღედა სკერსადობის გაკლებით, რომელსე შეკარებასედა კრწმისქაწინა ვუღერებას სხინორის შეკებრებას ან მათი სრულ გაქრობას, თუკია, ამ დროს შესაძლებელია ვისაქმუნო ვისამარტობების აღსაყვენება (ყნობადრების ზინდსებური დარღვევა, დასუფორა, მიმოფრქვისისიგებას სკრაობა). აჯგორის მისაღრებოთ, აჯგას იმადღადვე ნორმადღსაყეთა წარმოადგენს ფსიქოზური ვასიადგებს კონკრეტად, ხ. მტყველბ და თ. ვედაბის (1979) მისაყენებოთ, ეს ვინომში ხშირად აღნიშნება სავუკელბს დროს ვასაღუფისა დროს, კლინიკური ფსიქოზური ვასიადღებები ეს ამ დროს ვამოწყველია კერის არსებობას აღნიშნერ სიგებოში გავის ღერის აღნიადეა შემადკებელი გაკლების შედარებითი უკმარისობისა.

**ფრანკისმემა** - ფრანკის (ბერან, პინძახიფი, opis-მხედველობა). მხედველობის ველში შობრავა მრეყვადლა, მათილი ფუკერების, წერადგების, დაქების და ა.შ. აღმოყენება, აღნიშნება ბადერბას დადავებების დროს, როგორე ფსიქოსაოლოგადეა ფრანკინ-ელმეკარულ მხედველობითი ქაღკენობისი.

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E., 1935). იხ. **ბრეშპატორ შპრეზანე**

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E.), იხ. **ბრეშპატორ შპრეზანე**

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E., 1961).

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E., 1961).

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E., 1961).

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E., 1961).

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E., 1961).

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E., 1961).

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E., 1961).

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E., 1961).

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E., 1961).

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E., 1961).

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E., 1961).

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E., 1961).

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E., 1961).

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E., 1961).

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E., 1961).

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E., 1961).

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E., 1961).

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E., 1961).

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E., 1961).

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E., 1961).

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E., 1961).

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E., 1961).

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E., 1961).

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E., 1961).

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E., 1961).

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E., 1961).

**ზრანკლის ბრეშპატორ შპრეზანე** - ფრანკის ვიქტორი-ფრანკისი (Frankl V.E., 1961).



































**ბაროქო** (Barocco) ილ. (1713) ნეროპებს ვანხალავს რაგარეე ნესტარე დაედეპებეს ნოსიყუეს ფს და ხამს ესეის შის ესქიპებურ ბერებს. ამჟამე. გრმასე ნოსიყუებეს მსოლიდ ისტორიულ ასექტქსში.

**ზნაბნანაშრაშა** - ილიანაშრაშა. I. ფხვერობალოლეთას მომხვედაე დარეე. მესწაელის ნეროპებუა და სხეა მოსამლეე მეგოსბრებებს (ეროშ მხალეობა-ზნაბნანაშრაშა 2. გერმანი აღნიშნავს ესქიპარეულ დაწქებულებებს. მიღებულა მარნიიდაე დესნოსლოგიური მისამჩრებთი.

**ზნაბნანაშრაშა** - ილიანაშრაშა. ბანგლ. იყნებს ესქიპაობალოლიერე გამორეკლევებს კონტრეტიკულ ხალელებს მაროების ხანგებებს შესახებლად.

**ზნაბნანაშრაშა ბინდრეშა** - ილიანაშრაშაში ბინდრეშა შიკვის გეგმის ორგანული დამახარების, მარეულ რაგვი, ოქვალეს-ბერეკონსერეკურა დაქვეითების ხამკომების ერთობლობა. შოგეონი მქელევანი განხალავს რაგარეე დაწქებულას ხანბინდრე. ლინიკამ ბინგუქვის დაქვეითების ან ხანალობრიე ცვლილებების მახვდეიო, არნეკენ ფხ-ს ორ ნოეს - ფხვენაეფორი და ბიოთხაბაბობოვა. ესქიპორგანული სინდრომის ვარსანეს წარმოსავეუს მ. ბლოლერებს კეროეზი ცვრებრული ესქიპანდრომა და ბლოლერებს ენდოკრანული ესქიპანდრომა სინონი: **ზნაბნანაშრაშა ბინდრეშა**.

**ზნაბნანაშრაშა** - ილიანაშრაშა. ესქიპაობით დაედელებუი, ესქიპაობითური პროერებს.

**ზნაბნანაშრაშა** - ილიანაშრაშა პროერების ანბინგობა, ხანბილიგე მახი ესქიპურე წერობის დისბინდროსულინაშრა. ფხს დაწქებებს ორბილიე კრეფერებს I. პროერების მასოლოგურე თვისებების გამოხადებუი დალგეკის დარეეკვის ხანბინდრე 2. ესქიპაობითური თავისებურებახს გოგალერობა, რაე განხალავრებს ინდვიდის მიულ ესქიპურე პორეკტიეს 3. მახი მედარეხიხთი სეგბილერობა, მეორე შექვევებობა (ილიანაშრაშა II, 1913; ნოქმათი (I), 1914). ნალეე ობდერედილიე ბინდრეგლობა, ნოსიყუენ შექენად ფ-ს (ობ. **შანბანაშრაშა-ზნაბნანაშრაშა ბანბანაშრაშა** და **ბინდრეშა** **ზნაბნანაშრაშა**). განუშკანი ფ-ს მესწაელიე არა მხოლოე სეგეკიკამს, არამულ დანიხიკამი და ფხ-ს ერეკლებში კონსერეკურე ნანხიიხთარეგლობის ერთაე ნიციულ ხიტეუკერობე - ფ. აღნიშნეტიული ნოსიპური ორბილის შედეგად და ფ. სინდრეგ პროერების თვისებრიე ცვლილებების წარმოსმობით: ამბიოან, კონსერეკურე ნოსიპურე განვითარების პროერებში ვრეეგეზი არა გოგალერება, არამულ ამორნიშეითად სივლეუის ხანბილია და ნანბინდრის შესახებხილად.

**1. ბინდრეშა** - ილიანაშრაშა ნოქ. **ზნაბნანაშრაშა ბინდრეშა**.

**2. ბინდრეშა-ბინდრეშა** - ილიანაშრაშაში ილიანაშრაშა ბინდრეშა ფ-ს ვარიანტი. ხანბილიგე აგრესიული ესქიპებების ანგეხობით.

**3. ბინდრეშა** - ილიანაშრაშაში ილიანაშრაშა.

**4. ბინდრეშა** - ილიანაშრაშაში აღნიშნება უეე ბანგეზა ახავში. ხანბილიგე ესქიპურე და ფორეკური დალილილიით, ენგვლიბიბა, მეგოსიქე სეგისეკიკობით, დაქვეითებული თვიომეუბესებით, ხელმეხალითი, ესქიპიციეობითი. სინონი: **ი. ბინდრეშა-ბინდრეშა**.

**5. ბინდრეშა** - ილიანაშრაშაში ხანბილიგე გამოხადებული ამოცურე კომოსონგეტი (ფორეკური სიციე, ხანბილიგების უქნისეობა, უეეგნესობა, თანხანგეობის არარესეობა, ეკოეკტიცონისი, დაქვლილიობა ახალიბის მინდრე). ილიანაშრაშა **ბინდრეშა**.

**6. ბინდრეშა** - ილიანაშრაშაში ხანბილიგე გამოხადებული ესქიპის არამგეგობობა, რაე ნანაბინდრობის სინდრეგების ნანხიის, ნანხიიხთარე დალილილიებები სიკონორგებს (ბინდრეშა-ბინდრეშა) განსაკუთრებით ულნდება არაეკეობის გრეულ ვარეგში. ხანბილიგე აღნიშნება ანგეკტიცონი ნოსიპურების, პროეგეტიცონი რეკეტიცონი. მიხედვად ქვეყნის მკარხ სტრეტიკის ორბინდრობის და დალიბილიე ნოსიპურების ნანხიიხთარების სანხიიხთარების (ილიანაშრაშა A.I. 1911), უნარელეს შემთხვევებში დანიხიკამი შესახადებულა ანგეკტიცონი დალილილიე ცხოველებების უეეობის გრეულ პროერებში.

**7. ბინდრეშა** - ილიანაშრაშაში ხანბილიგე პროერული ანბინგობის უნარეკტიცად ანგეკტიცონი გეგმეტიცონებობით. მათი სიციეკტიცონი ციკლიდერე წრის ესქიპაობითური პროერებები და აგრეთვე ამა თუ იმ ანგეკტიცონი პოლექსის სიტიცონის მახვდეიო, მბინდრობით და ბინდრობითური პროერებები.

**8. ბინდრეშა** - ილიანაშრაშაში ილიანაშრაშა.

**9. ბინდრეშა-ბინდრეშა** - ილიანაშრაშაში ილიანაშრაშა ილიანაშრაშა ილიანაშრაშა.

**10. ბინდრეშა** - ილიანაშრაშაში დამახალავებულა ბინდრობითური ესქიპური ანგეტიცონი, უნიანგეტიცონი ბინდრობითი ანგეტიცონი ნოსიპურების მეტეტიცონი, რომლებუი მინდრეტიცონის ცხოველებების მეტეტიცონი და სიციეკტიცონი მბინდრობითი ანგეტიცონი, ეს სანგეტიცონი დამახალავებულა გ-ის ესქიპოლოგიური პოლექსისითესის მეორე, დიქეტიცონი პოლექსი-ეტიციცონი ხანბინდრე, ანგეტიცონი, ანგეტიცონი პროერებები დეგლიბინდრობის ნინდრეტიცონით. ილიანაშრაშა **ბინდრეშა**. სინონი: **ი. ბინდრეშა** **ბინდრეშა**.

**11. ბინდრობა** - ილიანაშრაშაში ილიანაშრაშა.

**12. ბინდრობა** - ილიანაშრაშაში ბინდრობა ფ-ს (ობ.) ვარიანტი.

**13. ბინდრობა** - ილიანაშრაშაში ბინდრობა ფ-ს (ობ.) ვარიანტი. სინონი: **ი. ბინდრობა**.

**14. ბინდრობა** - ილიანაშრაშაში ბინდრობა განუშკანა (ილიანაშრაშა II, 1913) მინგედიო, ფ-ს მერეული გეგმა სინბინდრობის დამახალავებულა ესქიპურე ფ-ს სტრუქტურირების სეგლიბინდრობის, თუქე, ფ-ის ფორმირების ეს დროორითი უეეკი მეტეტიცონი იყვლება განსალავრული პროერულ-ბინდრობის სტრუქტურის ფორმირებათ (ილიანაშრაშა I, I. ილიანაშრაშა II, 1914). მინბინდრობა დამახალავებულ ეტიცონი რეგეზი ხანბილიგე მინბინდრობის პროერების რეგეტიცონი. რამდენუმე პროერული თვისების ერთობლობა უეეტიცონი ანგეტიცონი მათი უროერეთეკტიცონების, მეგ. ესქიპოლოგიური და სეკეტიცონი ესქიპაობითური ხანბინდრობის ერთობლობის მათი სეკეტიცონი ანგეტიცონი აღნიშნულია დიქეტიცონის (Leonhard K., 1968) შორე პროერების ანგეტიცონის ანგეტიცონი და სეკეტიცონი თვისებების განხილვის დროს. აღწერულია ესქიპაობითური ხანბინდრობის სეგლიბინდრობის თანხიიხთარების-ბინდრობის, მახ. ესქიპოლოგიური და ენდოკრანული ესქიპობითური და ციკლიდერე ანგეტიცონი და არამგეგმობი-ბინდრობის და სეკეტიცონი (ობდერეტიცონი) ესქიპაობითური სინდრომის არესეობა მ. ფ. ფ-ის ფორმირების დროს დალილილიე არ არის (ილიანაშრაშა I, I. ილიანაშრაშა II, 1914).









- შხმპროპინი** - მოცილიყოლი ნეოტენურგების ნაწილი. შეისუპაქებს ფსიქიკური დაბადებების და ფსიქოპათოლოგიური სინდრომების (უბილეტია, პარკინსონიზმი და სხუ) შეკრნილობას ქირურგიულ მეთოდებს.
- შხმპროპინი** - მოცილიყოლი მეტენურგების ფსიქიკური ჯანმრთელობის ურენეულაციის და შენარმენების ღონისძეობითი საბუნების შესახებ. უმელოდ დაკენმრეგელა ფსიქოპროფილაქტიკისთან. ფსიქიკური დაბადების აღმოქმენების და განუსაბუნების თაქადის ბუნებისთან. ფ-ის დარენები ვანსიარმევი რთვარე ღონისძეობითა შესახბისა აბაკობრთეუ პეროდების (მაგ. ფ. ბაქუნთა აბაკება, მოზარდთა, მოზარდთა), ასევე აბამიანის მთევიწეობის სანათის (ფ. პრობება, ფ. ხახლოლი და ა.შ.) მიხელოთ.
- შინბა** - ჭარბი (ღარი, სუბინექსი). ამბულატორული აქტომატკიზმის სახე. ეღინება მოძრაობითი ბქმების ხანმოკლე ეპიოდებით. ელენქტრული მოძრაობების და მოქმედების ფორმით (ბიბდსეოფები იბლარ განსაბუნებს. სიღლიე ებრბანის). ენობიურების შექეღის ეპისოდის აბსარებების მქმდე აღინიშნება იმეზთა. ფ. ექხეღება ენობიურების ბბდსეოფი ურ მეღლის ეარვლდბის ესლეუქსას და ესლეუქსორმული სინდრომებთა მოხდმარე უბრბანული ფსიქიკების ბუნბ.
- შუნლტონის სინდრომი პრიპტორული შხრბისა** - ფილტონ ჟონიფი იფოზიფიფი იფიფ (Fulton J. F., 1935). ის. სინდრომი პრიპტორული შხრბისა.
- შუნსელტანბის ტმბტი** - ფანკელსტინი იურ (Funkelstein, 1957). პრთონული სინჯი ელენქტორენქმისეთი იფრბსამე ბუნდსეოფის რეგებების ხანობის ბბბდენად. ბუნებითად ფანდბრა სინტოლური წენეს ბბბბბბბბ 50 მმ ექს. ხუნდე ბტუნბლბნის. ბუნდსეოფობის 0.1% -5 მლ ხსნარის ინტრბუნსტრად შექეღის შექმდე და შექეღებბ ბრბუნული წენის ბბბბბბბბბთ 25 წუთის განბბბბბბბბ 0.01 გ ბუნბბბბბბბბბბბბბბბბბ შექეღის შესედე.
- შუნს-ფორმბბის ტმბტი** - ფან-ფახსი იურ (Drey-Fachs Ch., 1958). ბრბუნული მეოლობი, რობრბბბბ ტმბტი პრბბბბბბ. განსკეღბისეთის ებბბბბბბბ 10 ებრბლი შებუნბონ და ფერბდი ბბბბბბბ. ბნბბბბბბბბ ბუნ-რობრბბბბ ტმბტიბბ. ბსიწოლბებულბ ბბ ბუნდსეოფთა განმეორბბბბთ ებბბბბბბბბბბბ. ბრბბბბბბ ბნბბბბბ განსკეღბული ბუნბ რობრბბბბ ტმბტი.





ღ

**ღაპის საზინოღებანი (აქვებრები)** - იოსებ კახია, აღინიშნება ვიწოდებებისა ღაპის პირველ შეხაიდღი სწრაფი ძალის ფაშის დროს. ავადიყოი ზედაეს შემადრწნებელი მისაარის სმხარს ვაშოღებებისს. ყოველიყის წინ გაწრეხის წამოღებრება ან გირიღი. თან ახლავს მოქებნობა. შუოთა ან პანაიკის შეგვეუბი.

**ღაპის სიბერეპე** - იოსებ კახია. იხ. **პეპერაკუნება**.

**ღაპის სტატიონარი** - იოსებ კახია. ფიქსიონეროლოგიური დახანხერის ნახვერადტკაცონარული ვანყოღებება. ვანყოღებება შრომისუნარანაი ავადყოღებების პროვიღებტკაცია და ანგარევიღული მეურნაღობისათვის წარმოღებანი შოქწიქვღღე. ავადყოღებები დღის განმეღობანი ეწვეიან აქტიურ შრომით საქმიანობას. ხოლო საღაპის საიოიუბში საიქვღებანი ვანყოღებებში, სადაჟ უგარღებათ მეურნაღობა.

**ღებონება მხტმრეწი** - იოსებ კახია. აღმოყენება კუჭანწლევის გრატის მოქმეღების დარღვევის ვარემე. ორგინელი ცერებრული პათოლოგიის არარსებობის დროს. მევეღებრე. დაკემირებულია ფსიქოპეკურ-მატრაიპირებელ საგაუკასიან (ქაქიში ასლ. 1942). ად. აღწერიღია როგორე ომის პერიოდის სეროში. ორსულებში შოქვარ აღმოყენება ორსუღობის მეწვევის სერეღთან დაკემირებთ. არამეიათად ხლებს სმქკოსთა ფიქსაია. აკუბაკის (Jakubik A., 1979) მიხედეთ. ღ. ა. ხანათღება მეუბერობით (10 თიემელ და მეტი). მაღალი სხმირასი (რანაღუერე) დემე. ხაქების ყოველი მიღების შეზღვე. წინასწარი გუღისრევის არარებობით, კარგი ან მოსაგებული შაღით. სხეულეღანი ვანყოღების ნმნების არარსებობით. პარსაღებ მასაში აღმოზღნება ვადაუქუმავეღული საქვების ნარჩენები. მთოღად ვანსაგული ოღერის დროს მეუბერო მეწვევეღელი ღებონების შეღვეად აღინიშნება სიგამხარე კახიქსაიადე (კახიქსაიასი ს.ლ. 1944).

**ღებონება (მეღმეღი)** - იოსებ კახია. აღინიშნება ბეშებში. ღ. იყება უურად. მევეღისაყვარად რამღენიშე დღის განმეღობანი და უურად წყღება. შემდეგი ცელი მეორღება რამღენიშე კერის ან თვის შემდეგ. ვეკოლოფია უქნობა.

**ღებონების რმზღებანი** - იოსებ კახია. აღკოლოღიზმის ვანყოღების მანვენებელი; ერო-ეროი საღადასოკო რევექსა. დრ-ის ვარობა გოღერინგობის მომეღების, ხოლო დაავღების მოვეანებით სგაღებში მისი ვანენა. აღკოლოღის ვანსკეორებულად გოქსიკური ზემოქმეღების მაივენებელია.

**ღემიღი** - იოსებ კახია. სერეული სისგებში. შისა ფუნქციური მღგომარობის აქტივაიის ქვეითა ვაშოღინება ონიოყიდის მიერ ან თუ იმ მოქმეღების რეაღობაიის პირობებში. ძიღღებობის ცელში არჩვენენ ღ-ის მეზღვე ონიოყი; დაბაღობის უკადრები დანი; აქტიური ღ; შმეღი ღ; თღება, რამეღი ღის ღობის დაქვეითებასთან ერთად ვადადის ძიღში. ღ-ის თითოველი დონე ვანსბავღება ევეგავაღერი, მოგორული და ელექტრო-ენერეკოლოფიკოვიღი აქტივაიის თანავარღობით.

**ღემიღის ქოშა** - იოსებ კახია. იხ. **არამხარს კაკუნარი სინდრომი**.

**ღიპ პარის სისტემა** - იოსებ კახია. ფსიქოტროღული სტატოონარების რევემა. ორღის დროსაჟ აჟადმიოიის ვადავადღება სემკრნოღო დაწებულუბასა და მის მიმღებარე გრიგორიამე არ აზღუღება კარებებე საღებების არარებობა კომპენსირებული პერსონაღის შირიდან სავეღდაველო მეთოღავეურეობით.

**ღრეშული სმა** - იოსებ კახია. არჩვენენ ერე ღრეველ სმბ და ჭეშმარიტ ღრეველ სმბ (იხ. **კარეშული მრეშა**).

ყ

**ჩვირილი პილენსერი** - ყრილ უნებლიე ყვირილი. გამოწვეული ზედა სახსოთქ გზებში პირის გატარებით კონურ-კლონური ვასლესური გულყრის კლონური ფაზის დასაწყისში. ვრსულდება რაბდენიშე წაში. შესაძლება წინ უსწრებდეს ხმაურთან სლოკინი.

**ჩრუპნეჟობა** - ჩრუპნეჟობა (ლათ. sordomulismus) შეტყველების და სმენის ერთდროული არარსებობა. შეიძლება იყოს თანდაყოლილი (კორტის ორგანოს განვითარებლობა); შექვნილი, თავის გვიზის ორგანული დაზიანების დროს; სკერაქლი. უსიქოგურად გამოწვეული. ამ უკანასკნელის დროს არაპირდაპირი მეთოდით შესაძლებელია სმენის არსებობის დადგენა. მხარება შავიგონებით პიანობურ მდგომარეობაში, ასევე ხანმოკლე ნარკოზის დროს ავტოტების სკედაიში. ხინონ: სურლომუზიზმი.

**შურაღლება** - შურაღლება. შოტეულ მომენტში ფსიქოკური მოქმედების მიმართ რაიმე ობიექტზე. არწევენ ყს: აქტუარს - გაციოპიურებულად. მოხარდასახულად რაიმე ობიექტზე კონცენტრირების უნარი. და პასუნს, რომელიც წარმოადგენს გასაღისიანებლზე ავტომატიზებულ რეულესურ რეაქციას. პათესოქოლოგიური და ფსიქოპათოლოგიური გამოკვლევების დროს მსმენებლობა ენიჭება ყრის მძეუ მახასიათებლებს, როგორიცაა ამორწვეითობა, შოტელობა, ხამყარუ. დაფოფის შესაძლებლობა და გადაანტელებს უნარი.

**შურაღლება პეტშირი** - შურაღლება პეტშირი. ტანისამლურება ინდივიდის ინტერებებით. ემოკური ვანწყობით, მიღებულ სოქოლოგური გამოკვლევებით და შოტეულ მომენტში მოქმედებათა ვანწყობული სპირობებით.

**შურაღლება პასშირი** - შურაღლება პასშირი. დამოკიდებული გარედან მოზეაღლ გამოღისიანებლის ხასიათის და ანტესიკობაზე.

**შურაღლება პაღატანა** - შურაღლება პაღატანა. ყურადღება, მისი სმყარის დარღვევა. დამახასიათებელია ყურადღების სწრაფი ვადართეა ახალი გამოღისიანებლის ან შემთხვევითი ასოქიციების აღმოყენებასთან დაკვეშირებით. აღმინუნება შირაკალური და პიოზინაკალური მდგომარეობების დროს.

**შურაღლება პანწოღება** - შურაღლება პანწოღება. ყურადღება, რაბდენიშე სხვის მოქმედების ერთდროული შესრულების უნარი. ირღვევა პრეაღლი ფსიქოკური დაეაღების და მდგომარეობის (ასთენია, პიკერმეტამორფიზი და სხე) დროს.

**შურაღლება პანწარლოება** - შურაღლება პანწარლოება. ყურადღების დარღვევა. ამორწულე ობიექტზე ხანგრძლივი დროს ვანწყობაში ყურადღების მიმართების უნარის დარღვევა; ამ დროს ირღვევა ყურადღებას კონცენტრაციობა, მისი ხამყარუ, ვანწილება. დამახასიათებელია ვადაღლის ნეგროშული მდგომარეობების დროს, უკანასკნელი აუღისიკობის ქმნის შესიკრების დავეითების შეერმუნებას. შოტეურ ყ ვ-ად მიღება საკეთარი საქმიანობით ვატყუების შესაღისიკობა, როცა აღმზანი ვერ ამწნებს ვარშემოყვით.

**შურაღლება შურაღლება** - შურაღლება შურაღლება. ხანგრძლივი დროს ვანწყობაში რაიმე ობიექტზე ყურადღებას კონცენტრაციობა შეუქვმლობა. ყურადღების ვადატანა ერთი ხანწიდან მეორეზე. მისი არასყარობა. დამახასიათებელია პიოზინაკალური და შირაკალური მდგომარეობებისთვის.





ახსენებენ სერხეხმლის კასრის ნაწილის შემოხრებებით, რაც აწვევს გულის მპროფიციერებას. 3) შუკეგის დრის მკვლელობის მიხედვით შუკე ვნეი. 4) თავის გულის მპროფიციერებას, კურონი ენოციერ მერეფობისანი სწრაფი ძლიერი უპრობა და შეკეუების განხრება გამოხრება და შემოდგომზე გულის შუკევი აღმკვეთება უფროა. ინტენსიუობა სწრაფად აღწევს პის. გულის აქვს წყითა, მხელეკათა. ელსიხრებილი ხასიათი: ვრძელეს შემოსხვევაში ენოციერნალურა და მოკვლეუბა გრძობა და ისევე მხარეს; ძალითაღა აღმკვეთება თვალის კონსტრუქციის განხრებას საუკუნის ხასიათში, ინიკაოდა კასრის, კევის, ეკრის ან ხელის მამარიულებით. შუკევი ვრძელდება 30 წო-დანი რანსესზე საკითხზე, ანათელთა შერითიდი ხანგრძლივია 3) თვალის რანსესზე წლახზე. ასეთი თვალის კონსტრუქციის არათანაბრობის, შინსისმსილგებრე, აქეთ კარგი დამოკლებულება ახლის რანსესში, შიგნით ვარევე აღმანსიხრებადნი არათანაბრობით, რაციონალურები, თითო კონსტრუქციის და ქვევე მქვევე, ახრეხილად და კონტრაბერეციაში გრძელესუბსი არ თანგრეხება შეკვების შიგნით. ვრეკემა (Cerebum) მთავრად ასეთი ავადმკვეთების დახასიათებას; მიეკუთვნება პორციის სინდრომისა აქეთ "დემის ფიხიკური და ენოციერნი ხასიათი და თავისი უსუსლოციური სერეკტურა".

შ. შარქოვიჩი - ან არ ხოხობილი. თბ. შარქოვიჩი სინდრომი.

შ. შარქოვიჩი - ან ხოხობილი. თბ. შარქოვიჩი სინდრომი.

შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში - შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში (Charcot J.M. 1869; Kikashvili A.J., 1942).

სერეველი სისტემის ეტიოლოგიურად არავითარაფერს (ურბულეს მქსიხევიანი ინფექციური ცენების) ქრონიკული პროგრესირება და დაავადება. ქრონიკული-პროგრესირებადი და ენტრალურ დამბლები, შეესა და პერიოსტიტური რეულაციების გაქსივლება, პათოლოგიური რეულაციების განხრება, პროციის ლოკალმაკიუსის თავის გეგმის ქსიხევიანობა ქრონიკული გეგმის დღრის სერეკტურებში (ეგრებული ფორმა) შეხალხვებია ენციკური ანალაბილი, ბულებანი მოვლენები.

შარქოვიჩის სინდრომი (Charcot J.M., Magnan V.). თბ. შარქოვიჩის სინდრომი.

შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში - შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში (Charcot J.M., 1892). თბ. შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში.

შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში - შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში (Charcot J.M., 1892). თბ. შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში.

შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში - შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში (Charcot J.M., 1888). თბ. შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში.

შარქოვიჩის სინდრომი - შარქოვიჩის სინდრომი (Charcot J.M., 1889). სტურა. რომელიც მანდინარუმის დიდი კრეტიზიანი გულებების ხასით სერეკტური სტიმების ფონზე, რაც დაავადების შედეგი სინსისა (მგრებულობის) დარღვევა, სერეკტური, მრეკტური ელის შეკვრება, პარეზი, დამბლები.

შარქოვიჩის სინდრომი - შარქოვიჩის სინდრომი (Charcot J.M., 1889). სტურა. რომელიც მანდინარუმის დიდი კრეტიზიანი გულებების ხასით სერეკტური სტიმების ფონზე, რაც დაავადების შედეგი სინსისა (მგრებულობის) დარღვევა, სერეკტური, მრეკტური ელის შეკვრება, პარეზი, დამბლები.

შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში - შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში (Charcot J.M., 1883). ფუნქციური სულეანი სინდრომი რანსესში.

სულეანი სინდრომი რანსესში კომპლექსი, დამახასიათებელი მრეკტულობის ხასიების აღდგენის შეკვლევითა. ენციკური უნიკური მრეკტულობის ხასიების განხრება და მათი სიმუხვებებით ამრეკტუების უნიკური და კარეკტის, ენციკური ვრეკტუბა ენციკურების დრის, ინიკაოდა - სტურა, ესესიხრების და მრეკტურ-დეგრესული სინდრომის მანდინარე მხოციურების დრის.

შარქოვიჩის სინდრომი - შარქოვიჩის სინდრომი (Charcot J.M., 1865). ითვლებოდა ხეცეფიკურად ვაფანტული სულეანი სინდრომი. მხოციური სინდრომი, ინფექციური გრემობის, სულელებული მრეკტუების. აღნიშნული სინსისიხრის შეხალხვება პერეკტური, რომელიც ამ დაავადებისთვის ეკური პათოგენობითა.

შარქოვიჩის სინდრომი - შარქოვიჩის სინდრომი (Charpentier). ანტიკურული დეგრესიის ვიბლერება ავიდმეფობის ვარევის შეკვლევას. აღნიშნება ენციკურნი, ენციკური და ინციკური დეგრესიის, მხოციურულიანთა და ანციკური-ქრონიკული ენციკურების დრის.

შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში - შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში (Scharfetter Ch., 1970). თბ. შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში.

შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში - შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში (Chaslin P.H., 1912). თბ. შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში.

შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში - შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში (Chaslin P.H., 1914). თბ. შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში.

შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში - შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში (Charcot J.M., 1865). ითვლებოდა ხეცეფიკურად ვაფანტული სულეანი სინდრომი. მხოციური სინდრომი, ინფექციური გრემობის, სულელებული მრეკტუების. აღნიშნული სინსისიხრის შეხალხვება პერეკტური, რომელიც ამ დაავადებისთვის ეკური პათოგენობითა.

შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში - შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში (Sjogren T., 1955). მემკვიდრეობითი სინდრომი კატარაქტიის, ილიოგურეობის და ეგრებული რანსესში.

შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში - შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში (Sjogren T., Larsson T., 1956, 1957). მემკვიდრეობითი დაავადება გადაეყვით ავტოსომურ-რეკესიული გეგმა. ანიკურს რანსესში დამახასიათებელი სხვადასხვა ენციკურების ხარისხის ოლიგურეობა, თანდრომული უნიკური-დეგრესიის, ინიკური და სინსისიხრის ენციკური-დეგრესიის მანდინარეობა არ პროგრესირებადი აღნიშნება ენციკური-დეგრესიული ეგრებუბა, მანდინარე გადაეგრება, სპერეკტორეობითი, ქილგების დასილხება. შესხალხვებია პათოგენური დარღვევები.

შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში - შარქოვიჩის სინდრომი რანსესში (Sjogren T., Larsson T., 1956, 1957). მემკვიდრეობითი დაავადება გადაეყვით ავტოსომურ-რეკესიული გეგმა. ანიკურს რანსესში დამახასიათებელი სხვადასხვა ენციკურების ხარისხის ოლიგურეობა, თანდრომული უნიკური-დეგრესიის, ინიკური და სინსისიხრის ენციკური-დეგრესიის მანდინარეობა არ პროგრესირებადი აღნიშნება ენციკური-დეგრესიული ეგრებუბა, მანდინარე გადაეგრება, სპერეკტორეობითი, ქილგების დასილხება. შესხალხვებია პათოგენური დარღვევები.



**შვარცანაში ბაილარბერი** - (Шварцанъ Байларберъ) ვლადიკავკასიის მერხობელობით გამოვლენა გირე ვალიზანების გარეშე და წარმოადგენს ფოკალური ეპილეფსიური გულყრის ძირითად (სიმრავლეს) სიმპტომურ ერთადერთ გამომავალს ეპილეფსიური კრის არსებობისათვის გენის ქარქის სენსორულ ჩანჩხი. სწრაფი დაკადამხიის მისჯელი არჩევენ - სმენა, შედეგობობა, გემოვნებით, ყნოსვით, სიმატურ-ხუნსორულ თაბრუბრებებს შვარცანებებს.

**შ. შ. შვარცანაშვილი** - ი. ა. ილიაშვილი (Шварцанъ Ш. Ш.). მოიყვანა შიდა სხეული, გინაქორეობით დაკრების დასახისაბრებლად კრის ლოკალიზაციისათვის თავის გენის საფუძვლის წილნი, შუალის შუა შვარცანაში, შვარცანა ან დასაკებით შვარცანობის ველში. ავადმყოფები აღწერენ სიმძისის, სისხტის, დეპრესიის, სიყვიის და ა.შ. გრძობისა.

**შ. შ. შვარცანაშვილი** - ი. ა. ილიაშვილი. აღმოცენდა ეპილეფსიური კრის ლოკალიზაციისათვის თავის გენის საფუძვლად ისტელორბიკალური შიდაში და აბრებს დიფტერიული (პირის სიმრავლე, შიკრა ყველა, უსამოქრო შვარცანა ეპიგლიტი, გ. კუილი შეუცლნი), გულის (გაქიკარდია), რესპირაციული (ხველვა ხორხში, შხორხისა), კრისი, სკრეტი (სათის, სიყვიის შვარცანები) შვარცანების ხასიისა.

**შ. შ. შვარცანაშვილი** - ი. ა. ილიაშვილი. აღმოცენდა ეპილეფსიური კრის ლოკალიზაციისათვის თავის გენის საფუძვლის წილნი, რეპრადის ქვედა შიდაში, დასაკებით ან შვარცანაში შვარცანობის ველში. ავადმყოფები აღწერენ სიმძისის, თავის საფარველს, დეპრესიის და ა.შ. გრძობისა.

**შვარცანის ზღმურება** - (Шварцанъ) ვალიზანებლად სიდედე, რომელი იწვევს ან იწვევს შვარცანებს. ვალიზანებლის მინიმალურ სადღეს, რომელი იწვევს შვარცანებს, ეწოდება შვარცანებს ქვედა აბსოლუტური ზღმურება. ხოლო რომელი იწვევს შვარცანებს ვალიზანის ან შიდა თვისებრივ ექლიყვას - შვარცანებს ზედა აბსოლუტური ზღმურება.

**შვარცანის დერილი შვარცანობის ნერვისა** - (Шварцанъ Дерматитъ) ილია (ლათ. papilla dermatosa n. ovicis) რეპრადიკაციური სიმძებობა, ძირითადი შიდეშა ქალსმეცა წიდევის შიდეშა. უმეტესად აღინიშნება თავის, კრის სიმრავლის დროს, აგრეთვე თავის გენის გემის, სოფიკარული გუბრეკულობის, გენის ვარისების და ქალის აქვლების სიმძისის, შვანხებრებლის შიდეშის ფორმის, სხედასხვა ვეიოლოგის ფსევდოგემორული მდგომარეობების და სხვ. დროს. ხასიიდედა დერილის გემუბებით, შიდა გამზებრეკით ხადურის დროდას. დერილის სადღესად წიდასა, ფერი - რეპრადიკური ექვნი ვაფოროფული, არტერიები შეცურებულად, დაკადამხილი, სიმძისობა აღმოცენდება შიდეშულიანი არა იმდენად სიმძისის ხასიიდედა შიდა შიდეში, რამდენად შიდა ლოკალიზაცია და შრდის გემში. ვანსკურებით აღწე ექლიყვას საიხების, ოთხგორაკის შიდეშის, IV პარკეტის სწრაფად შიდასი სიმრავლის დროს.

**შვარცანი** (лат. ovicis Nachtraglichkeit). ფსიქიანალიზში: ფორმად შეხედვებით, გერმანი გამობრებე ფსიქიკური დროს და შიდეშობობის გამყოფლების, შიდეშედალების, სწეგორი კვალის ფორმების ექლიყვით ეს გადაქცევა ახალი გამყოფლების და ვანხებრების ახალი საფუძვლის შესაბამისად და იქნის ახალ შიდეშისა.

**შვარცანაში** (ევრმ. Avechuan). ფსიქიანალიზში: ფორმად შიდეშით, სწეგორი ლეკლეა დასკრეპობის იდეის მოციანებით. თავდაპირველად ის ურთიდას ამა თუ იმ სასიყვებლო ფუნქციას, რომელიც წარმოადგენს შიდა ორგანივლ წყაროს. ვანსაფორმის შიდეშა და ობიექტი.

**შვარცანის სიბერობი ხედასხვალი შვარცანობა** - (Шварцанъ) შიდეშის მდგომარეობის იდეა (Шварцанъ Е.А. 1927, იხ. სიბერობი ხედასხვალი შვარცანობა).

**შვარცანის შვარცანა დამბარებლობა** - (Шварцанъ) შიდეშის მდგომარეობის იდეა (Шварцанъ Е.А. 1927) აღწერილია დროში გვანხებრული რეპრადიკაციის დროს. ახალი გემის რეპრადიკული შვარცანობის აღმოცენება უკავშირებებს ან ვარკველი შიდეშების არსებობას, რომლებიც ახდენს შიდეშედალების ფსიქიკური ვანხებრების დასწრეებას. ან თითო ვანხებრების პროცესის შედეგების ეს რეპრადიკული შვარცანობის შიდეშის შესაბამისად ახალი რეპრადიკაციის ექლიყვით დასწრეებას (შვარცანაში) ან შიდეშის ვანხებრების შედეგად შეუცლია. პერიოდის ფსიქიკური და შიდეშის რეპრადიკაციის შიდეშის ხასიიდედა რომორც რეპრადიკაციის ინტროსექციური სედალია პროცესში შედარებით არაკვილიზაციული.

**შვარცანა** (ილიაშვილი). აქტიური ნერვული პროცესი, ან ვანხების სწეგორი მდგომარეობის გამომავალი ორგანიზმის მოციქული სისხტის მოციქულის შესჯებით ან შიდეშობით. ნერული ექვრების მოციქულის შეჯებით (შვარცანა ცენტრალურად) აღმოცენდება ხედასხვალი (Шварцанъ И.М. 1863) შიდე. **შ. შვარცანა** იწვევს მოციქული ორგანიზმის მოციქულის შეჯებით. არჩევენ ფორმული მოციქულის შიდეშის ორ ვანხ: ვანსკურებილი შვარცანებელი სტრუქტურების ოქლიყვით: ან ვარკველი ვანხების ვანხებრების დასწრეებას.

**შ. შვარცანა** - ი. ა. ილიაშვილი. ვარკველი შვარცანის გარდას, მოიყვანა შ-ს ან ვანხებრების, რომელი შიდეშის ფსიქიკურების ხედასხვალი გამორეული, და ზეგორიკულად (დამყვას), რომელი აღმოცენდება აცნებობის სტრუქტურით უკრის ცხოველურების შვარცანის აწვის შედეგად, რაც ვინააღმდეგება მედმგად ობიექტ ვანსიანსეხულზე ნერვის რეპრადიკაციის სიბრ: **შ. შვარცანა**.

**შ. შვარცანა** - ი. ა. ილიაშვილი. იხ. **შ. შვარცანა**.

**შ. შვარცანა** - ი. ა. ილიაშვილი. პრატობრეფლექტორი შ-ის სახე, აღმოცენდება მედეშობით აცნებობის კრის ოქლიყვით. უარყოფითი ინდექსის შეჯინებით.

**შ. შვარცანა** - ი. ა. ილიაშვილი. პრატობრეფლექტორი შ-ის სახე, გამორეული ბალის ვანხებრის ან ძირითადი სიყვიის პროცესების მოციქობით.

**შ. შვარცანა** - ი. ა. ილიაშვილი. აღმოცენდება პროცესით რეულექსის ვარგებში.

**შ. შვარცანა** - ი. ა. ილიაშვილი. იხ. **შ. შვარცანა**.

**შვარცანა შიდეშობი** - (Шварцанъ) შიდეშის მდგომარეობის იდეა (Шварцанъ Е.А. 1927) აღწერილია დროში გვანხებრული რეპრადიკაციის დროს. ახალი გემის რეპრადიკული შვარცანობის აღმოცენება უკავშირებებს ან ვარკველი შიდეშების არსებობას, რომლებიც ახდენს შიდეშედალების ფსიქიკური ვანხებრების დასწრეებას. ან თითო ვანხებრების პროცესის შედეგების ეს რეპრადიკული შვარცანობის შიდეშის შესაბამისად ახალი რეპრადიკაციის ექლიყვით დასწრეებას (შვარცანაში) ან შიდეშის ვანხებრების შედეგად შეუცლია. პერიოდის ფსიქიკური და შიდეშის რეპრადიკაციის შიდეშის ხასიიდედა რომორც რეპრადიკაციის ინტროსექციური სედალია პროცესში შედარებით არაკვილიზაციული.





დამსკდებელია რიგობრივ შიდაგონებლობაზე ასევე ტრეკინობზე შიდა სამკაცებზე რადიან პაციენტთა მკვამლობა აქვს შიდაგონებელი, მაგრამ თვით შ. თვის არაშეპრო. შ. შეიძლება აქვს მარდაბანი და ირბი (მსამსკელობა რიგობა ამ თუ ამ ხაზის, მთვლიანს; ამასში და დროის მტკიცებობისა: ვერბადური და მხედველობითი. რიგობრივ სპეციალურ მსამსკელობაზე გამოყენებულია აღმართი განმარტებული, ხაზობრი, სპეციალურ, სპ.მონის პრაქტიკის შ-ში შეიძლება გითვალისწინოს ბიფურგის განწყობა სპ.მონებრი სეანსის მესლეა პერიოდზე (შ. მასტრომონტონი). ხინარ: ხმამაზმა (ლ.ა. ადვანტი - შიდაგონებელი).

**შეიპრინტინი** - **სუფამინი** სხვა მარს ამ მარს ვეგუბს შრიდან ფსიქიკური შემოქმედების მღვდებს უნდა, შიდაგონებისა და მტკიცებობის ხარისხი. წარმოადგენს შიდაგონების ისტატიკალურ თვისებას. დამსკდებელია რიგობრივ ტრეკინობებზე (მაგ. ისტატიკური შიდაგონების შ. უნდა მხალდა, კიდრე ფსიქიკური კონსტრუქტის). ასევე (შ. მხალდა ხაზობრივში), შიდაგონი ავადმყოფურ მტკიცებობისაზე (შიდაგონებელი შ. გეპრიათ ად. კოსტლიანო და მტკიცებობის). ამ თუ ამ მომტკინი პრაქტიკის ფსიქიკურ მტკიცებობისაზე მის ესპეციალურ დადგენილობის ხარისხზე და ამ მსამსკელობაზე და მტკიცებობის კონსტრუქტული კონსტრუქტობაზე. ასე სპეციალურ ქვეყნის სხვა აღმართი მტკიცებობისაზე და მტკიცებობის გენდინობაზე (სპეციალურ მტკიცება განმარტებულია სპეციალურ ექსპერიმენტის). შ-ის სხვადასხვა ხარისხი და სხვა ხასიათი განმარტობის ფსიქიკური მტკიცება მთლიან მტკიცებას - მსამსკეობას, რაციონალური ფსიქიკობას, შ. სპ.მონებ შემოქმედებისაზე მსამსკეობის - მონებობისა. ამტკიცების სპეციალური სტრუქტურა შ-ზე მტკიცებობის (MONTAGU J. L. P.) ხაზზე - წარმხელა რეალის მხალდასა ქვეყნობისზე თლია რეალის შეხამების შიდაგონების მშენებ აწველი შ-ის და სპ.მონებობის პრაქტიკის აწველი ქვეყნობის მტკიცება. მღვდის (MONTAGU J. L. P.) ხაზზე - ავადმყოფი ხელში აბლერეს ბიფე და კიდრე ლინობის გეგმის, რიგობრივი ხინ კიდრეობის, ხინ ამორტებს ხინგან ავადმყოფი ხალხს ფორმის სპეციალურ მღვდელ მხალდასა, ავადმყოფის შიდაგონების მტკიცების ეფაბდება მსამსკეობის მშობელი გეგმისა გეგმისა. შიდაგონებელი მარტული გეგმისა მართლაც აწველი რიგობის მსოფელია მსამსკეობის იტბორებელი მობრატობის აღმოყენების მღვდელ.

**შეიპრინტინი** - **სუფამინი**: ფსიქიკობითი ფსიქიკობის გამოყენების შემთხვევაში, რიგობის მონარს ღრმად ნაწველი ავადმყოფური, განსაკუთრებით მღვდელი განდების მსამსკეობის. განსაკუთრებულ მსამსკეობის მტკიცება მღვდელი მსამსკეობის ფსიქიკობის დროს ხელს ვეგუბს ფსიქიკობის და ავადმყოფის მონარს კონსტრუქტის გეგმობისა.

**შეიპრინტინი** - **სუფამინი**: ფსიქიკობითი ფსიქიკობის გამოყენების შემთხვევაში, რიგობის მონარს ღრმად ნაწველი ავადმყოფური, განსაკუთრებით მღვდელი განდების მსამსკეობის. განსაკუთრებულ მსამსკეობის მტკიცება მღვდელი მსამსკეობის ფსიქიკობის დროს ხელს ვეგუბს ფსიქიკობის და ავადმყოფის მონარს კონსტრუქტის გეგმობისა.

**შეიპრინტინი** - **სუფამინი**: ფსიქიკობითი ფსიქიკობის გამოყენების შემთხვევაში, რიგობის მონარს ღრმად ნაწველი ავადმყოფური, განსაკუთრებით მღვდელი განდების მსამსკეობის. განსაკუთრებულ მსამსკეობის მტკიცება მღვდელი მსამსკეობის ფსიქიკობის დროს ხელს ვეგუბს ფსიქიკობის და ავადმყოფის მონარს კონსტრუქტის გეგმობისა.

**შეიპრინტინი** - **სუფამინი**: ფსიქიკობითი ფსიქიკობის გამოყენების შემთხვევაში, რიგობის მონარს ღრმად ნაწველი ავადმყოფური, განსაკუთრებით მღვდელი განდების მსამსკეობის. განსაკუთრებულ მსამსკეობის მტკიცება მღვდელი მსამსკეობის ფსიქიკობის დროს ხელს ვეგუბს ფსიქიკობის და ავადმყოფის მონარს კონსტრუქტის გეგმობისა.

**შეიპრინტინი** - **სუფამინი** (Pichon E.). ტერმინი აღნიშნავს შიდაგონების ცნობიერი და არაცნობიერი ვანწყობის დამსკდებელია. რიგობრივ გამოვლინება ფსიქიკური აქტივობის დაქვეყნებით. ამ ცნობის კიდრე და ლაფორე (Coté, Laforegue) ავარიობისზე ყველა ავადმყოფი ავადმყოფობის რიგობრივ უთბარება მსამსკეობის ევოლუციის დარღვევებისა და მტკიცებობის და აწველი მანსკეობის ქვეყნის. ამ თვალმონარსობა შ. განიხილება რიგობრივ ავარიობის აქტივობის მსამსკეობის კონსტრუქტული გენდინობა, რომელი აღნიშნება სხვადასხვა ნეკროზების და მსამსკეობის (E. Bleuler), ნაადრევ ქვეყნების (E. Kraepelin), დამკორდაციული მშობლობის (P.H. Chastin) დროს. მონარს (A. Porot, 1965) აზრით, შ-ის ცნობის ავარიობის მნიშვნელობა ღრმად ავარიობის მის მტკიცებელი ღრმადმყოფისა.

**შეიპრინტინი** - **სუფამინი** (Bohen G., 1930). მტკიცებელი გამოხატულია მსამსკეობის მნიშვნელობა ფსიქიკობითა.

**შეიპრინტინი** - **სუფამინი** (Bohen G., 1930). მსამსკეობის რიგობრივ ხასიათდება წერის დროს სპეციალური არარაციონალური ავარიობის ხარისხით. შიდაგონი წარმოადგენს კატაბორული სტრუქტურის გამოვლინებას.

**შეიპრინტინი** - **სუფამინი** (Bohen G., 1930). მსამსკეობის მნიშვნელობა მსამსკეობის, მაგრამ აღნიშნება კონსტრუქტის დროს, როცა ავადმყოფის სტრუქტურის მტკიცება მღვდელი არარაციონალური ბევრების - პარამიკობის.

**შეიპრინტინი** - **სუფამინი** (Kraepelin E., 1913). შიდაგონების მტკიცებობის ავადმყოფობის თვისებური გამოვლინება მსამსკეობის დროს. თვალმონარსობა გამოყოფილია თვით რიგობრივ მსამსკეობის განსაკუთრებული ფორმა, რომლის დროსაც მტკიცებობის გამოხატულია და სპეციალურ გეგმობისა მტკიცებობისა შესაძლებელია კონსტრუქტის განწყობის ღრმად მსამსკეობისზე და ინტელექტუალ და ავადმყოფი მდარებობის მსამსკეობისზე ავადმყოფობის აღმართობაზე და აღმართობაზე და მსამსკეობის მსამსკეობის მსამსკეობის ავარიობის, მტკიცებობის ნაადრევ. მონარსობის ხასიათის, რომელიც მსამსკეობის მსამსკეობის მსამსკეობის გამოვლინებას ვანგუბს და თანამსკეობის ავადმყოფობის ავარიობისა. ამანაშ და განმარტების რიგობრივ პრაქტიკული მსამსკეობის მსამსკეობის ევარიობის (Kraepelin E., 1940) მსამსკეობის, მსამსკეობის განმარტების ცნობისა, კლასიკური სტრუქტურის ფორმირებაში სპეციალური ფსიქიკობის კატაბორული

დახმარების რთვა. აღწერილია შემთხვევები, როცა შ. გამაყლინდა იხოლოდ წყნის დროს (შაზიგრაფია) (Levi-Valensy J., Migault P., Lacan J., 1931). შ-ის როგორც დევექსინდროზის, ფსიქოფარმაკოლოგიურ ადლექტიდობაზე ისეთივეა ა. ზურაბაშვილი (1955).

**შოხიშვილი** (ბერძ. schizo - გახლეჩა, დაყოფა, ქირი - გინება). ენდოგენური, პროგრადიენტული ფსიქიკური დაავადება, რომელიც ხასიათდება ფსიქიკური ფუნქციების დისოციაციით, მასდინარეობს ფსიქიკური დევექსიის აკუთლებული განვითარებით ემოციურ-რეზით სეგრეირი და სხვადასხვაგვარი პროდექტივილი ფსიქოპათოლოგიური ცვლილებებით (ბოლე, პოლენსიატია, დევექტური ანალიზობა, კატაონსარეო სიმპტომები და სხვა). შ-ის კლინიკურ სურათში გამოყოფენ ძირითად, ობლივიტური სიმპტომების გროპის - აუტანსში, გახლეჩა და ეპოკურნი ხანდუნეე, განქრსივლობა, დაავადების სხელწოდება წარმოადგება სიტყვიდან «ჩხლეტია». ეს უკანასკნელი ელანდება შ-ელ დისოციაციისთვის დამახასიათებელი ფსიქიკურ ფუნქციობა დისკორდანტობით. ავილობა ხსრათა ახალგაზრდა ასაკში (35 წლამდე, ხშირად 20-29 წლის ასაკში). არსებობს მონადეუბები გენეტიკური ფაქტორების ევოლუციური რილის შესახებ, რომლებიც მიღებულია როგორც კონსიკური, ასევე სექსუალური განვითარების სკიქებების კონკორდანტობის შესწავლა, თავიანთი ბავშუების სტრატეგიათა და სხვა) საფუძველზე. მათორენიული ფსიქიკის გადაცემის შესწავლდობის გიმი არ არის ვარკვეული; არსებობს შიპანდობა, რომ შ-ის სისივალისზე კლინიკური ფორმები გენეტიკურად განსხვავდება ერთმანეთისგან შუქვედრდობითი ფაქტორების დისკორდელ რაყის სიკადამბე კონსტრუქციუბით, რომელთა უნიკალურ კომბინაციათა ქნის დაავადების კლინიკური სურათის და მისი სიკადამბე ფარმის მონდარტობის თავისებურების (Harman M.F., 1943), სინონ: ბალნოლოგის დაავადება, ნალოზში შიპანსობა, დანსობრდული შუქვედლობა.

**შ. აბზოლატირონიული** - ილ. აბზოლატირონი (Zilboorg G., 1956). შედარებით კეთილთვისებიანად მიმდინარე შ., კლასიკური სურათი ხასიათდება ძირითადი სვერომისმატვარი სიმპტომატიკით, ავიდელოუბი უქვედებრეტიან რეგულირდობა, ელ შეისიქვლების, ცხება ახალგაზრდა აზნობითა შ-ისა.

**შ. პრინსპრინული** - ილ. ნიუნიკონი (Nyman A.K., 1978). თაღისებრი ფორმის, «შოხორენბა რეგრების ვარეშეო» - განვითარე რეგრესული ფსიქოზური სიმპტომატიკის ქვეშ იგულისხმება დევიის ბოლე, ბოლვის ექსიპანსირი ფორმები, სისიოსი პალესიაციები, კატატონური სიმპტომატიკა, პასურობა, დამახასიათებელი შრავალეფერობით და შოლანსორეული სიმპტომები - აქველი შვრინობლობა სხეობითა, შოვლეობითა და გაველიაღური აქქინიხალი, სიკუთარი სიკულის მონარობის აფექსი ანლა, შორინობის და უნთიების ავგომბიქმის დაკორევა, ყურადღების კონსტრუქციუბი, განსიქვლა, ამქრსიების დარღვევა, დეპრესილობა, ანქილოზია (ცხოვრებით სისორენების განსელ: ელანის ატარეცვა), დანსირეტიკობა, აკუთკეობა, რიგელები, უმრიაღვს შემთხვევებით დაავადების ხანგრძლივი მიმდინარეობის დროს ელანდება არეგრესული შ-ის სიმპტომატიკა, ხშირად დარგრესული სიმპტომატიკა აქქოსინებია ანასქქში, იშ პრიაღვს, რასიქლე წას უდლის არეგრესული შ-ის ხანიტეკაყის, განსიხლება როგორც შივრედმორედეტიენტული შ-ის ფარმა მათორენიული პროექსიების დამახასიათებელი თაქსიქურებიტობა, ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკით, მისდინარეობით და განსივალის (Mikhailovskii I.L., 1941).

**შ. სიმპტომური** - ილ. აბზოლატირონი (Nyman A.K., 1978). შიპორენიული პროექსის მიმდინარეობაში დეტანსიქტურე ფაზის ებთოფა, როცა დაავადების კლასიკური სიმპტომატიკა ვერ არ გამოვლინდა, თვქვა ევსიკურნი ვრეკანზე სიქველი სიქველი სიმპტომატიკით, ანგირად, კანხა (Kahn E.) მიერ განვითარული რეკტიკის მისილურნი გრის და შოქენბი (Popper E.) მიერ გამოყოფილი რეკტიკის შიპორენიული გრის განიხილება როგორც ვარკველ მიმდინარე შიპორენიული პროექსის რეკტიკის გამოქვლანბა ევსიქვილიბე ასამპტოკურნი ფარის დაქვედნილ მათორენიული შიპორენიული დაავადებულს რეკტიკა შესიბახებე იგვედებრე უქვედებრე გრის რეკტიკის, შიპორენიული სიმპტომების მანიქსიკეობა განსხვავდება როცაორც უქვე მიმდინარე შიპორენიული პროექსის ნონის, ასამპტურნი შიპორენიული ფაზის ცხება შეესიბახებე ბლოლეგრის წარმოადგენას ლატეტურე შ-ზე.

**შ. სიმპტომური** - ილ. ბოსტოერი (Borstean A., 1938). ეწ. შოხაზღვრე ფსიქიკების ერთ-ერთი ბიქური, ავიკურიბა ელანდება დაავადების მიმდინარეობის სიმპტომატიკით და ფორმებთან, ლევექვის ფორმირების თაქსიქურებიტობით, ავრეკტიკი განიხილება როგორც ექსიქვლი ფსიქიკის არაკეთილთვისებიანი სიმდინარეობის ეარიორეა.

**შ. ბირილი** - ილ. ბოსტოერი აბ პრინსპრინული.

**შ. ბიკვილია აბაქმე** - ილ. ბიკვილი ბიკვილი. ბავშვთა ასაკში (0-15/18წ.) განვითარებული შიპორენიის ვარეშეო არქვიბის არავინავარევიანი შივლობა, ავგორთა ნაწილი თელის, რომ სპირრა გამოიყოს იალკი ნონილოგად შიპორენიის შესახებრეებე ბავშვთა აბაქმე, ფსიქონანალიზურ შიპორენიებე შივლობა აბაქმე, ფსიქონანალიზური დაავადებულს ვარეშევილი აბაქმე შიპორენიული პროექსით, არანდ ბავეითა ასაკბიკის დამახასიათებელი სექსიუიკური რეკტიკობით, ბენდერის (Bender L., 1966) აბრით, დაავადების ეს ფორმები უნდა სიქვექვის «ონადიკორალ ექსიქვლობობის» აბ «ონიხალური გენისიანი დიქუნქციის» საფუძველზე აღმოქვედებულ მენიქვიქვის, აბაქმე დროს ავიკონი დიდი ნაწილი (Homburger A., 1926; ცხაკვილია I., 1933-1962; Lutz J., 1937; შესტაშვილი შ., 1966-1980; Eggers Ch., 1973; იქანი M., 1983 და სხვა) მიიწვეს, რომ გამოვრელი ბავშვთა (0-12წ.) ასაკის და ბავშვთა (12-16წ.) ასაკის შიპორენიული ფსიქიკები, ეს უკანასკნელი ვერი აბლუს დღის მონარეობის ასაკში განვითარებული შიპორენიული პროექსის ფორმების და მიმდინარეობის გეკვიბიან, რაც იქვიებდა ბავშვთა ასაკის ეპიკთარეტილ შიპორენიისა, მათი შივლობა, იგი უსიქვის შუბთხევილი მიმდინარეობს ექსიქვტად, მალალი პროექტივლიკობით, შედარებით თიქითაღ შეკვეთისმატვარი ფორმებით და რეკტიკური შიპორენიის გისით.

**შ. ბორსტოერი** - ილ. ბოსტოერი (Borstean A., 1938). შიპორენიული ფორმის ვაპაზღვრა, რომლის დროსაც ბიკვილია მიმდინარეობს ფსიქიკური დევექსიის სწრაფი აღმოქვევება (ბიკვილის ნაქრობა, ეპიკთარი სხლადევი), ასევე ბარე ქრება განიქვტიკული ფსიქიკოპათოლოგიური სიმპტომატიკა, სინონ: შ. შიპორენიული, შ. ბალნოლოგის.

**შ. ბორსტოერი** - ილ. ბოსტოერი (Borstean M., 1928; კიქვილი (Kikvidze M., 1943); იქანი (Ickan A.), 1937; ცხაკვილია I.L.; შიპილიკი (Shpilitskiy I.N., 1938) შევტეობა გ. 1974). აღწერილია როგორც დამოუკიდებელი (ატაბურე) ფორმა, ხასიათდება მიმდინარეობის ხელი პროგრადიენტობით და კლინიკურ სურათში სენსეობათური ბიქორდისული სიმპტომატიკის დომინანტობით. აბაქმად, განიხილება როგორც შივრედმორედეტიენტული შ-ის ვარიანტი, რომლის

ფარგლებსა გამყოფურ არამოვლადი ამოქმედებისა და სენტიტობათორ შინაორგანობა. რაიმეღუ გამოსინქურ  
ქანძიქლოპიან პროგრესიუტობიან. უკანასკნელს შესხიჯეუბო მტკადაა გამახიჯელუ აჯობიბადის გამხიჯდნებუბო.  
ინარად უქსიყურთ ვაღბობიბა, ფისიქურთ აქსიგობის და პროლეტკიულობის დაქვეითობა. დუქსინობადასამუქაურთ  
აწილდასობა. სამაგურთ ქალუქიანობა. დაიგადებს მისდნარუბობათან ერთად სენტიტობათორი დარღვეუბით  
რეუქსიონობა, მადურთ სრლად ამ ერება. ვადადს მესორე პასიქუ. სოციატური ვსოქიქური სამსოგობა, სდურთ  
ვადასიჯელუ.

2. კატარსონი 20-30 წლს ასაკის ზეგურ აღრუ. მუცევე ფსოქოლოტორი  
ამლოლობებთ მდგომარეობათ. ერთ მესხიჯეუბო ფისიქიონ ღებუღობს უწვევე ხასიათს და მისდნარუბობის  
აქსიქობისადა. სხვა შესხიჯეუბით. პირველ კატაგონურ სეგურთ მისდღეს რეხისთა შექველ კო პროქიქო მისდნარუბობის  
პურთადად. არარეკლადრედი გამხურებელი მუცევე კატაგონურთ ავთიქიქობის სხათს და ს.ქ. უკურთ ხანისკლე  
რეხისიქობათ. რაიმდს კლსიქო მეთოთაფის ფსიქურთ დექიქურთ გაღწეუბით. ხანთაა რეპროდუქსი და პარანობად უდს  
ხანთაფიქობ. დუქიქურთ და გამობიადელ მდგომარეუბებში ადსინიქებთ აუქიქურთ გამიჯდნებობათ კულუქობობა უქკურთ  
ვადასიჯელობათ აუქიქურთ სარღვეობთ არამოგურებულ უყაქიქობობად.

2. ლაბანტონი III. ბლერი (Bleuler E., 1911). შ-ის ფორმა, მიდნარუბობის მსუბუქე პათოლოგური  
ამლოლობებობათ. ფსიქიქურთ სამსოგობიქობის ვარემუ. მხოლად შესხიჯეუბობა ჩაწილმ, მრავალწლოთ ვარ დღს  
დამნარუბობის მუცევე მუცევედა სხვადასხვა არაკლასიქურული ვეტირებობის ვაღებურთ. ვაიმეღებულად  
სენტიტობადრედი დიფინიქიქობა მისდღეს ვარის კოსიქიქურთ ამობილურ ხასიათთან. გამყოფობის მართებლობათ  
არ არის საყოველთაოდ აღიარებელი. რიგი მუცევერეხისა ლ-შ-ს აქსიქობებთ დუნედ ხაზინარე შ-ის წაწლად  
ფორმების (Hoffmann 21. K. A. 1978).

2. მარტონი III. ბლერი კრებულის შიგრ გამოყოფილი შ-ის კლასიქურთ ფორმა. ხასიათობა სოციატური  
სამსოგობიქობის სავარობათ. პროდუქტილი დარღვეუბით მუცედა მუცედად ვეტირებობის კლსიქურ სერბათო ხანთაფობის ხასიათ.  
ქსიქურული პოტენციბობის დაქვეითობით. ემოქიქური სინდრეობათ. ვარანობადღეს ავთიქსიქობის მისოქურეხის ვარ-  
ის. რეს კლე სისტემატეკო მიაქიქებობის მდგომარეობებულ შ-ს.

2. შინაინაბი III. ბლერი (Bleuler M., 1943). შ-ის ფორმა. ვინორედა 40 წლს ასაკის მეჭიო და არსებობად  
სამსოგობიქობათ არ განსიქიქებლად მდგომარეობთ აღრულ ასაკში დაქველად ფორმებისაგარ. დამახასიათებელია  
ქუბის ირგებელი. კურსად, ამქსიქური დარღვეუბების არარეხობათ. არსებობათ გენდელია მუცევერეხის ასაკის  
უწიქურული ბოლიათ ფსიქიქობის - რეპროდუქსი მისოქურეხისა (Polomiu P., 1954). სოციატური მამოქურეხისა (Janzarik W.,  
1957) - მ-ს დის მუცევერეხისა. დამახასიათებელია ბოლიათ სამსოგობის აღრული ფორმობობა პარაფრენილი კლასით.  
მათს სავარობობათ დათავადებს მიმდნარეობის შედარებობთ მსხვილბული პროგრესიუტობის დროს. ფსიქოპათოლოგური  
სამსოგობიქობის სინდრეობათ. ვარანობადღეს ავთიქსიქობითი ასაკის ფსიქოქიქობის დამახასიათებელი  
სამსოგობიქობისა (ხანთა მარობის დექიქობ. ბოლიქ მურქიქობობობითი ხასიათით).

2. შინაინაბი III. ბლერი (Bleuler M., 1943). შ-ის ფორმა. ვინორედა 40 წლს ასაკის მეჭიო და არსებობად  
სამსოგობიქობათ არ განსიქიქებლად მდგომარეობთ აღრულ ასაკში დაქველად ფორმებისაგარ. დამახასიათებელია  
ქუბის ირგებელი. კურსად, ამქსიქური დარღვეუბების არარეხობათ. არსებობათ გენდელია მუცევერეხის ასაკის  
უწიქურული ბოლიათ ფსიქიქობის - რეპროდუქსი მისოქურეხისა (Polomiu P., 1954). სოციატური მამოქურეხისა (Janzarik W.,  
1957) - მ-ს დის მუცევერეხისა. დამახასიათებელია ბოლიათ სამსოგობის აღრული ფორმობობა პარაფრენილი კლასით.  
მათს სავარობობათ დათავადებს მიმდნარეობის შედარებობთ მსხვილბული პროგრესიუტობის დროს. ფსიქოპათოლოგური  
სამსოგობიქობის სინდრეობათ. ვარანობადღეს ავთიქსიქობითი ასაკის ფსიქოქიქობის დამახასიათებელი  
სამსოგობიქობისა (ხანთა მარობის დექიქობ. ბოლიქ მურქიქობობობითი ხასიათით).

2. შინაინაბი III. ბლერი (Bleuler M., 1943). შ-ის ფორმა. ვინორედა 40 წლს ასაკის მეჭიო და არსებობად  
სამსოგობიქობათ არ განსიქიქებლად მდგომარეობთ აღრულ ასაკში დაქველად ფორმებისაგარ. დამახასიათებელია  
ქუბის ირგებელი. კურსად, ამქსიქური დარღვეუბების არარეხობათ. არსებობათ გენდელია მუცევერეხის ასაკის  
უწიქურული ბოლიათ ფსიქიქობის - რეპროდუქსი მისოქურეხისა (Polomiu P., 1954). სოციატური მამოქურეხისა (Janzarik W.,  
1957) - მ-ს დის მუცევერეხისა. დამახასიათებელია ბოლიათ სამსოგობის აღრული ფორმობობა პარაფრენილი კლასით.  
მათს სავარობობათ დათავადებს მიმდნარეობის შედარებობთ მსხვილბული პროგრესიუტობის დროს. ფსიქოპათოლოგური  
სამსოგობიქობის სინდრეობათ. ვარანობადღეს ავთიქსიქობითი ასაკის ფსიქოქიქობის დამახასიათებელი  
სამსოგობიქობისა (ხანთა მარობის დექიქობ. ბოლიქ მურქიქობობობითი ხასიათით).

2. შინაინაბი III. ბლერი (Bleuler M., 1943). შ-ის ფორმა. ვინორედა 40 წლს ასაკის მეჭიო და არსებობად  
სამსოგობიქობათ არ განსიქიქებლად მდგომარეობთ აღრულ ასაკში დაქველად ფორმებისაგარ. დამახასიათებელია  
ქუბის ირგებელი. კურსად, ამქსიქური დარღვეუბების არარეხობათ. არსებობათ გენდელია მუცევერეხის ასაკის  
უწიქურული ბოლიათ ფსიქიქობის - რეპროდუქსი მისოქურეხისა (Polomiu P., 1954). სოციატური მამოქურეხისა (Janzarik W.,  
1957) - მ-ს დის მუცევერეხისა. დამახასიათებელია ბოლიათ სამსოგობის აღრული ფორმობობა პარაფრენილი კლასით.  
მათს სავარობობათ დათავადებს მიმდნარეობის შედარებობთ მსხვილბული პროგრესიუტობის დროს. ფსიქოპათოლოგური  
სამსოგობიქობის სინდრეობათ. ვარანობადღეს ავთიქსიქობითი ასაკის ფსიქოქიქობის დამახასიათებელი  
სამსოგობიქობისა (ხანთა მარობის დექიქობ. ბოლიქ მურქიქობობობითი ხასიათით).

2. შინაინაბი III. ბლერი (Bleuler M., 1943). შ-ის ფორმა. ვინორედა 40 წლს ასაკის მეჭიო და არსებობად  
სამსოგობიქობათ არ განსიქიქებლად მდგომარეობთ აღრულ ასაკში დაქველად ფორმებისაგარ. დამახასიათებელია  
ქუბის ირგებელი. კურსად, ამქსიქური დარღვეუბების არარეხობათ. არსებობათ გენდელია მუცევერეხის ასაკის  
უწიქურული ბოლიათ ფსიქიქობის - რეპროდუქსი მისოქურეხისა (Polomiu P., 1954). სოციატური მამოქურეხისა (Janzarik W.,  
1957) - მ-ს დის მუცევერეხისა. დამახასიათებელია ბოლიათ სამსოგობის აღრული ფორმობობა პარაფრენილი კლასით.  
მათს სავარობობათ დათავადებს მიმდნარეობის შედარებობთ მსხვილბული პროგრესიუტობის დროს. ფსიქოპათოლოგური  
სამსოგობიქობის სინდრეობათ. ვარანობადღეს ავთიქსიქობითი ასაკის ფსიქოქიქობის დამახასიათებელი  
სამსოგობიქობისა (ხანთა მარობის დექიქობ. ბოლიქ მურქიქობობობითი ხასიათით).







**ზოცენტრების რეჟიმების შექმნა** - იხილა ქართული იურიდიული (შეჯიბრება M.L., 1938) თეორიისწინაა  
სამკერდალწამალი რეჟიმისათვის თვის გარე: **ა** - არ არის დათვლებს ნიშნები, აღდგენილია ქრისტიანული დახმობა  
ჯვარედინისათვის. სუბილტრ-ნიშნისათვის შექმნილია შემარბნებელი: **ბ** - ესეცენტრული დევიაციის უნიშნული  
გამოსახული ნიშნები და ნარმინს ავალსოცენტრული ნიშნობაგარე ქონიშნულიად არ უნდა ავალსოცენტრული  
საქონიშნისაგან განიხილებული უსტრული დევიაციის წინაშე ნიშნის დაქვეითება: **დ** უნიშნული (პ.წ.  
მეცენტრული) გავლენისგან.

**ზოცენტრების სისტემების აღმკვეთება** - იხილა იურიდიული (შეჯიბრება M.L., 1938) თეორიისწინაა  
**სისტემური (გამარ) და არასისტემური (გამარ) ფორმები**. არასისტემური ახალი ცენტრული ფორმებისათვის  
საკვანძო ფორმების სისტემებისა სისტემური პარაფორმის. პეტეფორმის და კატაგორიის. ისინი განისაზღვრა წესი  
დახმობისათვის. განსაზღვრული ნიშნობაგარე და მამდინარეობით, სეკციური დევიაციის აღმკვეთებით. სისტემური  
ფორმის შენახვა ავალსოცენტრული მარტივ და კომპლექსურ ხასიათს. არასისტემური ფორმებისა - ავალსოცენტრული პარაფორმისა.  
მითითებისა და პარაფორმული კატაგორიისა. მამდინარეობის რეჟიმისთვის, მუხისმცენტრული ცენტრებისა ამ  
დროს საკვანძოა განსაზღვრული. ავალსოცენტრული პარაფორმის დროს განხილვის და დევიაციის წინააღმდეგ ავალსოცენტრული  
ავალსოცენტრული მამდინარეობის რეჟიმისთვის. მამის და განსაზღვრული ხასიათს. მითითებისა, დევიაციის  
მამდინარეობის. არ შექმნილია კრედიტის გავლენის. მისი სახელები უფრო ვარდობა ერთი მხრივ, იგი ახლავს ახლებს და  
ქვე. "ავალსოცენტრული - მამის" ესეცენტრული მარტივ მარტივ პარაფორმისათვის. მითითების დროს წინა მამდინარე  
ავალსოცენტრული და სეკციურად აღდგენილი. მარტივ შენახვა იურიდიული კატაგორიის და პარაფორმული ნიშნობისთვის.

**ზოცენტრების ფორმების სისტემების შექმნა** - იხილა იურიდიული (შეჯიბრება M.L., 1938) თეორიისწინაა  
**შ-ის ფორმების სისტემური**. რაბლის საუბრელი მათი მამდინარეობის პრინციპულიად განსხვავებული ხასიათს.  
სისტემური დევიაციის ერთიანობა, მითითებული პრინციპის დინამიკის ცენტრული. დათვლების განყოფილების  
სეკციური მამდინარეობის რეჟიმისთვის. ავალსოცენტრული და სეკციური მამდინარეობის რეჟიმისთვის.  
ეს ფორმის შენახვის სხვადასხვა კლასიკური ვარიანტების (იხ. **ზოცენტრების**).

**ზოცენტრების სანდრული ფორმების** - იხილა იურიდიული (შეჯიბრება M.L., 1938) თეორიისწინაა  
**რამდენიმე წელი** შეტყობის. რამდენიმე წლის განმავლობაში მითითებული პრინციპის ქვეყნული მამდინარეობის დროს  
არ რევივირება არცერთი სეკციური მამდინარეობის რეჟიმისთვის. ავალსოცენტრული მამდინარეობის დროს, კატაგორიული  
მამდინარეობის მუდმივად ავალსოცენტრული მამდინარეობის შედარებით სხვადასხვა და სისტემური კატაგორიის სისტემური  
საქონის, ამ მამდინარეობის კლასიკური შენახვის და პრინციპისთვის ვალსოცენტრული მითითებული აქვის არა დევიაციის  
სისტემური. არამდე ვერ კლავს ავალსოცენტრული მამდინარეობის (Mayer, 1955).

**ზოცენტრების რეჟიმები** - იხილა იურიდიული (შეჯიბრება M.L., 1938) თეორიისწინაა  
მითითებული პრინციპის მამდინარეობის დროს და მეთოდურ ნაშნის რეჟიმისთვის პერიოდში. დევიაციის მამდინარეობის  
გამოსახული მამდინარეობის უნარი მათი შენახვის, შექმნილი დარღვევების ხარისხი. შ-ის მითითებული  
სისტემური მამდინარეობის მამდინარეობის რეჟიმები, დევიაციის, დევიაციის, დევიაციის და დევიაციის. მისი  
დახმობის აღნიშნული რევივირება მისი ვალსოცენტრული, ავალსოცენტრული დარღვევების განხილვის ხარისხის შესახებ  
ხასიათს. დევიაციის შექმნა-დინამიკის, კომპლექსურის შესახებ და კომპლექსურის. ამბრუშოვა (სეკციური, **ა**)  
რამდენიმე წელი შეტყობის და დევიაციის მამდინარეობის რეჟიმების რევივირება დევიაციის მამდინარეობის. ავალსოცენტრული  
მამდინარეობის. სრული დევიაციის დროს დინამიკის **მამდინარეობის რეჟიმები** (იხ. **ზოცენტრების**). შ-ის მითითებული  
განსხვავების განსახილვის მამდინარეობის დროს არ უნარსახელების პრინციპული შექმნილია. შ-ის დროს დინამიკური და არა  
სეკციური ცენტრები. ხოლო განსაზღვრული მამდინარეობა - სეკციური გოგალური დევიაციის (სეკციური, **ა**).  
სისინ: **ნარმინს რევივირება** მამდინარეობის (Mayer - Gross W., 1955).

**ზოცენტრების რეჟიმები** - იხილა იურიდიული (შეჯიბრება M.L., 1938) თეორიისწინაა  
**მამდინარეობის რეჟიმები** - იხილა იურიდიული (შეჯიბრება M.L., 1938) თეორიისწინაა

**მამდინარეობის რეჟიმები** - იხილა იურიდიული (შეჯიბრება M.L., 1938) თეორიისწინაა  
მამდინარეობის რევივირება მამდინარეობის რევივირებისთვის და დევიაციის რევივირებისთვის. მამდინარეობის  
რევივირებისთვის და დევიაციის რევივირებისთვის. მამდინარეობის რევივირებისთვის და დევიაციის რევივირებისთვის.  
მამდინარეობის რევივირებისთვის და დევიაციის რევივირებისთვის. მამდინარეობის რევივირებისთვის და დევიაციის რევივირებისთვის.

**მამდინარეობის რევივირება** - იხილა იურიდიული (შეჯიბრება M.L., 1938) თეორიისწინაა  
დემდინარეობის რევივირებისთვის და დევიაციის რევივირებისთვის. მამდინარეობის რევივირებისთვის და დევიაციის რევივირებისთვის.  
დემდინარეობის რევივირებისთვის და დევიაციის რევივირებისთვის. მამდინარეობის რევივირებისთვის და დევიაციის რევივირებისთვის.

**მამდინარეობის რევივირების რევივირება** - იხილა იურიდიული (შეჯიბრება M.L., 1938) თეორიისწინაა  
მამდინარეობის რევივირებისთვის და დევიაციის რევივირებისთვის. მამდინარეობის რევივირებისთვის და დევიაციის რევივირებისთვის.









მის დამატებით, ეყრდნობა ამ ფაქტს, რომ ერთი და იგივე ეგზოციტიზმა შეიძლება (მაგ. აღკობაძის) ერთი და იგივე ავადმყოფში შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა ფაქტორული ცენტრების რეაქცია. ამგვარივე განმარტებით მიიხსიან ბოლო წლებში ჩვენს ქვეყანაში მოხდის შემთხვევები, როდესაც ანტიფურთხიანი საშუალებების გამოყენებით ახსნა-შეშლის მოსახლეობისთვის უსიამოვნო ადგილებზე დასახლება დასრულდა, რამაც აკანონიერებდა მათ. ამგვარივე ფაქტები შევსრულებთ ჩვენს ქვეყანაში, როდესაც მოხდება ადგილობრივი სიდიდის სანაპიროების განვითარება და სანაპიროების რეაქცია დასრულდება.

**შედეგები**: აღნიშნული ზომების მიზნით მიღებული აქტიური ღონისძიებების გამო, შესრულდა რამდენიმე, რომლებიც დასრულდა დასახლების მართვით. ამგვარად, აღნიშნული ღონისძიებების შედეგად დასახლების მართვის პრობლემა უმეტესწილად მოხსნა, რამაც აკანონიერებდა მათ.

**შედეგები**: აღნიშნული ზომების მიზნით მიღებული აქტიური ღონისძიებების გამო, შესრულდა რამდენიმე, რომლებიც დასრულდა დასახლების მართვის პრობლემა უმეტესწილად მოხსნა, რამაც აკანონიერებდა მათ.

**შედეგები**: აღნიშნული ზომების მიზნით მიღებული აქტიური ღონისძიებების გამო, შესრულდა რამდენიმე, რომლებიც დასრულდა დასახლების მართვის პრობლემა უმეტესწილად მოხსნა, რამაც აკანონიერებდა მათ.

ესაუბრება იმ ადგილებზე, სადა ადგილობრივი კეთილშინაობითი ანტიფურთხიანი საშუალებების გამოყენებით მოხდის სანაპიროების განვითარება და სანაპიროების რეაქცია დასრულდება. აღნიშნული ზომების მიზნით მიღებული აქტიური ღონისძიებების გამო, შესრულდა რამდენიმე, რომლებიც დასრულდა დასახლების მართვის პრობლემა უმეტესწილად მოხსნა, რამაც აკანონიერებდა მათ.

**შედეგები**: აღნიშნული ზომების მიზნით მიღებული აქტიური ღონისძიებების გამო, შესრულდა რამდენიმე, რომლებიც დასრულდა დასახლების მართვის პრობლემა უმეტესწილად მოხსნა, რამაც აკანონიერებდა მათ.

**შედეგები**: აღნიშნული ზომების მიზნით მიღებული აქტიური ღონისძიებების გამო, შესრულდა რამდენიმე, რომლებიც დასრულდა დასახლების მართვის პრობლემა უმეტესწილად მოხსნა, რამაც აკანონიერებდა მათ.

**შედეგები**: აღნიშნული ზომების მიზნით მიღებული აქტიური ღონისძიებების გამო, შესრულდა რამდენიმე, რომლებიც დასრულდა დასახლების მართვის პრობლემა უმეტესწილად მოხსნა, რამაც აკანონიერებდა მათ.

**შედეგები**: აღნიშნული ზომების მიზნით მიღებული აქტიური ღონისძიებების გამო, შესრულდა რამდენიმე, რომლებიც დასრულდა დასახლების მართვის პრობლემა უმეტესწილად მოხსნა, რამაც აკანონიერებდა მათ.

# ჩ

**ჩაკატიონი კაციბა სინდრომი** - "закрытая форма" (закрытая форма) (closed form) - იხილეთ **ჩაკატიონი სინდრომი**. იხილეთ **ჩაკატიონი სინდრომი** ( Locked-in Syndrome

**ჩაკატიონი** - მართლებების თავსებურება, აღინიშნება როგორც ნორმალში (აქვეყნურიველი პიროვნებები). ასევე ესაქმებიან პიროვნებებში (მიზილური ფსიქოპათია) და მოგიერთი ფსიქოზის (აუტიზმის სტრუქტურაში) დროს.

**ჩარმა** - მოქმედება (ინტერვენტი). ფსიქოანალიზში: ანალიტიკოსის ნებისმიერი კოტუნსკაცია პიციენტთან ანალიტიკოსის ჩარმების დროს. მოვალი გერმინი, რომელმაც შედის ახსნა, კონფრონტაციები, კითხვები, ნაყოლის მოვება, ინტერპრეტაცია და ა.დ.წ.

**ჩარმა სინდრომი** - "Charcot J.M.). თავზე გეწოლის შეგრძობა შეესაბამებული ნახევის სახით. გამოწვეულია რევეტორების, შგრძობლებლის მომავენითი ახთინური მღვიმარებების დროს და კნთიოვანი დასაბულობით.

**ჩინეის ლაპიშპა** - "ხეილი ჩინეის (Cheyne G., 1733). დიპლონდრის ძველი სახეა.

**ჩინეის სინდრომი** - "ხეილი ჩინეის (Cheyne G., 1733). დიპლონდრის ძველი სახეა.

**ჩინეის სინდრომი** - "ხეილი ჩინეის (Cheyne G., 1733). დიპლონდრის ძველი სახეა.

**ჩინეის სინდრომი** - "ხეილი ჩინეის (Cheyne G., 1733). დიპლონდრის ძველი სახეა.

**ჩინეის სინდრომი** - "ხეილი ჩინეის (Cheyne G., 1733). დიპლონდრის ძველი სახეა.

**ჩინეის სინდრომი** - "ხეილი ჩინეის (Cheyne G., 1733). დიპლონდრის ძველი სახეა.

**ჩინეის სინდრომი** - "ხეილი ჩინეის (Cheyne G., 1733). დიპლონდრის ძველი სახეა.

**ჩინეის სინდრომი** - "ხეილი ჩინეის (Cheyne G., 1733). დიპლონდრის ძველი სახეა.

**ჩინეის სინდრომი** - "ხეილი ჩინეის (Cheyne G., 1733). დიპლონდრის ძველი სახეა.

**ჩინეის სინდრომი** - "ხეილი ჩინეის (Cheyne G., 1733). დიპლონდრის ძველი სახეა.

**ჩინეის სინდრომი** - "ხეილი ჩინეის (Cheyne G., 1733). დიპლონდრის ძველი სახეა.

**ჩინეის სინდრომი** - "ხეილი ჩინეის (Cheyne G., 1733). დიპლონდრის ძველი სახეა.

**ჩინეის სინდრომი** - "ხეილი ჩინეის (Cheyne G., 1733). დიპლონდრის ძველი სახეა.

**ჩინეის სინდრომი** - "ხეილი ჩინეის (Cheyne G., 1733). დიპლონდრის ძველი სახეა.

**ჩინეის სინდრომი** - "ხეილი ჩინეის (Cheyne G., 1733). დიპლონდრის ძველი სახეა.

**ჩინეის სინდრომი** - "ხეილი ჩინეის (Cheyne G., 1733). დიპლონდრის ძველი სახეა.

**ჩინეის სინდრომი** - "ხეილი ჩინეის (Cheyne G., 1733). დიპლონდრის ძველი სახეა.

6

**(1) (101076) - სთუიკიასი** ენციკლოპედია გაიზიარებულა უპირატესად მარცხენა ხელის გამოყენება მისიანიზირიული მისირობების შესრულების დროს, მაგ. წერა, ხატვა, კოხის, ჩაქვის დაქერა, ხმარება და სხვ. ც. შეიძლება აყოს ფარული, ინტოაცენტის პრისეცში ინდელის უსუნადება ამ მოქმედებათა მარჯვენა ხელით შესრულების ჩვეულებრი. ფარული ც. ელისდება სინტაქსურად, მოყვარი აუტეტური მდგომარეობის დროს და მოცივრათა ქსუთათა ტესტის სარეალდობით. ც. მათათვის უმადლესი ტერქული უსტეციების (მაგ. ცვლება, კოხი, წერა და სხვ.) თავის გუნის მარჯვენა ჰემისფეროში ლოკალიზაციამე.

**(1) (101077) - თ. შ. 1977. თ. ბარბაქაძის რეზიტი.**

**(1) (101078) - ბრინჯაოს-ნაწილის-მედიცინის პრობლემატური საკითხები** - **ქ. ჯ. ჯ. ქაიხაძე-ქაიხაძე** (Zeller E.A., 1838; Griesinger W., 1865; Neumann H., 1859). გასული საუკუნის 40-60-იან წლებში გერმანიაში ქრონიკული ფსიქიკური დარღვევა, რომლის მიმდინარეობა ხასიათდება ითხი თანმიმდევრული სტადიათა: **მედიკალიზაცია, მანია, შეშლადობა და დეპრესია**. გრძელვადიანი აღნიშნავდა შემდგომი სტადიის მანიას შეშლადობა აუტეტურ-ბოლოა დარღვევების ცვლილა ქალკეინაყოფილი დარღვევებით. გრძელვადიანი მიხედვით, აუტეტური პერიოდის შექმნა რამდენიმე ამ სტადიამე, მეტქველი კი არის აუტეტურ და აუტეტურ-ბოლოთი დარღვევების სტადიატე-ქრონიკული ფსიქიკის კონკრეტული ურს ამზობდა ფსიქიკების შესწავლის სიმკომპლოკოტურ მიდგომებზე. თქვეა, ხელი შექვეა მათი მრავალმომლოგური და პათოფიზიოლოგიური საუფიციის შემუშავება და სთათე დელო ფსიქიკური დაიკადლებების დინამიკის ვაიკელების პირეფინარისციება შესწავლას. შემდგომ წლებში ერთიანი ფსიქიკის კონკრეტული ვარჯილი იქნა. თქვეა, ვაიონდნენ დაბეჭდვები, თანამლორეე უცხოურ ფსიქიატრიაში (Weyers J., 1956; Conrad K., 1959; Janzarik W., 1959) ქვედე ვითარდება კონკრეტული ერთიანი ენლოვესური ფსიქიკის შესახებ. რასის გრძი პოლესზე ვაიონყოფა დებრესული და მანიაკალური მდგომარეობები ცირკულარული ფსიქიკების დროს, მყოფები - პროგრესივად მადინარე მარტივი მბოყოფნია. შუალდე კვაიმე კი ენლოვესური ფსიქიკის ვაიურა მისიანარეობით, კლინიკურ სურათში ბოლეს და პირთეული ელოლებების არსეობის შეკრახებათ ამ შედეგისდავარი ფარსები დედეტითი სრული რევისის ვარემე. მავი შეკლევიარის შეხელებით, ერთიანი ფსიქიკის კონკრეტული ვარჯილის ანტანოლოგიკუმე, რომლეს მავალითა მათრას ვრეაზოლოგია. ფსიქიატრიაში ერთიანი ფსიქიკის კონკრეტული მინიშნელობა მხედველობაში მთილება მრავალმომლოგური კანონზომიერების ვაისიკელურად, რომლდე დამსახრათეულია ევლა ფსიქიკური დაავადებისთვის და ელინდა კლინიკური სიმპტომატიკის და მისიანარეობის ანალიზით. ფსიქიკური დაავადების აღმოყენების და ვანეითარების ეს კანონზომიერებები მხედველობაში ენდა აქნას მხედველი ფსიქიატრული სიმომლოგეების შემდგომი შემუშავების დროს (Ильинский, Л. Л. 1971; Лихачев А. И. 1971; 1975).

**(1) (101079) - ჰეილბრუნი (Zellweger, 1964)**. თანდაყოლილი ანომალიების კომპლექსი, ვადეუის ავტოსომორეცესიული გიხა. დამახასიათებელია: მიოგონია, ბრაქიკეფალია, მადლი მუხლი, ბრეტული ცხვირის ძვიდე, გრუფების დეფორმაცია; თავის ძვლებს და ძვლების შრატელობითი თანდაყოლილი ევლეებები, მარახილელი სანმეხა, თირკმლების და დვლის დამანება ელინდება დრეულ მამეში. მოყვარი აღნიშნება კრუნტიითი გულკრება, თანდაყოლილი გლაუკომა და მიოსპადია. ფსიქიკის მხრივ - ვინემბრაფი ვანეითარებლობა. პათოლოგანატომურად - ევლეებები თავის გუნში (კრონიკული სხეული, ნახებში, ვერდითი პარქიქვი) და თირკმლის ქსრქიკის შრემში. სინდრომი განპირობებულია პინმევიების ცელის დარღვევით. სინონ: **ცინტარეპარქიკულური სინდრომი**.

**(1) (101080) - ჰეილბრუნი (Zeller A.C.)**. კატაფილესია. დამახასიათებელია ავადყოფის სხეულის და მისი ევლეული ნაწილებისათვის მიყვებული პიხის ხანგრძლივი შენარჩუნება. კატაფილესიის სინდრომი აღნიშნება კატაფილესიის მიხედვით, ისევე (ავტარებს შედეგისდავარი ხასიათის) დროს და პინომორ მდგომარეობაში (ევლეს ევლეს კონკრეტული - ძველი რომელი შეყენიერი და მწერალი, ავტორი გრატეციის ანალიკანის შესახებ). რომლოც დარქრალია რეა წებნად, შეიყავს რევი დაავადების აღწერას).

















**წავალთრამოციდეგულეპის ტიპები** **ТИПИ РАЙОННОГО ТЕАТРАЛЬНОГО** აქ: სამკერძნაფრო სამუალებების (ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული) მოქმედება განსაზღვრება შემდეგი კრიტერიუმებით: ფსიქიკური და ფიზიკური დასაკლებებლების განვითარება და გოლერანგობის ცვლილებები. გამოხატულების ხარისხის მიხედვით არჩევენ წარსლოდამოკლებულების ან დამოკლებულების 8 ტიპს: 1) **მორფანული ტიპი** - აბსიათის მკეეთრად გამოხატული ფსიქიკური და ფიზიკური დამოკლებების სწრაფად განვითარება, გოლერანგობის სწრაფი ცვლილებები; და ჟერიღლი გოლერანგობის განვითარების უნარი სხვა ფსიქოპეტიურ ნეთიფერებთან; 2) **ბარბიტურატული ტიპი** - მკეეთრად გამოხატული ფსიქიკური დამოკლებულება, განვითარებული მიმდებელი ფიზიკური დამოკლებულების სწრაფი გამოხატულება, გამოხატული გოლერანგობა და ჟერიღლი გოლერანგობა სხვა ფსიქოპეტიურ ნეთიფერებთან; 3) **ფენამინური ტიპი** - მკეეთრად გამოხატული ფსიქიკური და უნიშნული ფიზიკური დამოკლებულების განვითარება, გამოხატული გოლერანგობა; 4) **კანაბისური ტიპი** - მიმდებელი და მკეეთრად გამოხატული ფსიქიკური დამოკლებულება, სუსტად ან ძალიან სუსტად გამოხატული ფიზიკური დამოკლებულება, გოლერანგობის წრდა ძალიან მაღალი დონეხას სწრაფის შედეგად; 5) **კოკაინური ტიპი** - მკეეთრად გამოხატული ფსიქიკური და ძალიან სუსტად გამოხატული ფიზიკური დამოკლებულება გოლერანგობის უნიშნული ცვლილებით; 6) **აღკობილური ტიპი** - მკეეთრად გამოხატული ფსიქიკური და ფიზიკური (ეთანოლის დიდი დოზების სისტემატური მოხმარების შემთხვევები); დამოკლებულება გოლერანგობის მიმდებელი ცვლილებებით და ჟერიღლი გოლერანგობის განვითარების უნარით; 7) **ნაოტინური ტიპი** - მიმდებელი ფსიქიკური და სუსტი ფიზიკური დამოკლებულება; 8) **ანაბლაციური ტიპი** - მკეეთრად გამოხატული დასაკლებებულება და მიმდებელი ფიზიკური დამოკლებულების არსებობა გოლერანგობის მიმდებელი ცვლილებების ფონზე.

**ვარშტეშენა** - **вопросный** (გერმ. Vorstellung). ფლოსოფიის და ფსიქოლოგიის კლასიკური ტრადიციის ეს არის ის, რასაც აღიზიან წარმოიღვეს, ის რაც ქნის აბროუნებით აქტის კონკრეტულ შინაარსს, განსაკუთრებით აღრე აღქმულას, ელავწარმოქმნა. ფრთიდე ერთხანის უპირისპირებს **წარმოიღვეს** და **აფექტებს**, და მიანიძა, რომ ფსიქიკის გამოყენების ამ ორ ხახეს აქტს თავისი "ზედი". მოგადფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, **წ.** არის საგნის ან მოუყენის თვალსაზრისით სახე, აღმოყენებული მოგონების ან პროდუქციული წარმოსახვის, ეკვე არსებულ მეგონების და აღქმის საუბრებულზე შემოყენებით მოქმედებამი **წ-ს** უპირაქს შეადღერი მდგომარეობა აღქმისა და აბსტრაქტულ-ლოგიკურ აბროუნების შორის. რადგან **წ.** ადაღვეს წინა გამოყენებას მესტიერებამი ან წარმოსახვამი, არჩევენ **მესტიერების და წარმოსახვის წ-ს**. არჩევენ აგრეთვე **წ-ს** მოდლობის მიხედვით - მხედველობითი, სმენითი, კონტაქტური და ა. შ. **წ.** არის ცალკეული ობექტის მრავალი აღქმის სფეროებული სახე. მოყფერთი ფსიქიკური დარღვევის დროს **წ.** შეიძლება იყოს შეგნაკლებად მყოფი, გრძნობადი.

**ვარშტეშენა** - **вопросный**. ფსიქიკური პროცესი, რომელიც გამოვილინდება: 1. სუბექტის საგნობრივი მოღვაწეობის შედეგად და მისი შეზღვეული ნაწილების ხატების შენებით; 2. მოქმედებების პროგრამის დასახებით, როცა პროდუქციური სარგავია გაურკვეველია; 3. მოღვენათა შექმნით, როცა ესა თუ ის საჭირო მოღვენა არ პროგნოზირდება, არამედ ყველგან განსხვავებული მოქმედებით; 4. საგნათა და მოღვენათა შექმნა შესაბამისი აღწერლობის მიხედვით. განსხვავებულ აქტებზე (ნებაყოფითი) და მახიურ (უნებლიე, მაგ. სიმძარი) წ-ს.

**ვარშტეშენა საწინააღმდეგობო რეაქციონა** - **вопросный** ფსიქოლოგიური თავდაცვის ფრამურით შექმნომი, როცა რაიმე მიღებულ მოგვის სუბექტი უმაღავეს საკეთარი თავს და ნიღავეს სრულიად უწინააღმდეგობით, მაგ. შტრული დამოკლებულება ეფირება მეგონებზე თავიშინობით. უარყოფის ისეთი შექმნომი ეფირდება ქვეტში, როგორიყაა მაგ. ისტეგია სიზღვევით - სიზნელის შიშის დროს სუბექტი სტვესს, თავს ირწმუნებს, რომ მას არაფრის ეშინია. დამახასიათებელია გრძნობების გამოხატვის, საკეთარი საქციულის ხახგვისა, სირისა ბარეშუ ხახს რეაქცია.

**ვარშტეშენა** - **вопросный** (ინგლ. Working through). ფსიქოანალიზზე გერმინი თავდაპირველად გამოიყენა ფროიდიმა ანალიტიკური სამუშაოს განგრძობითი ჩატარების აღსახინნებად ამ წინააღმდეგობის გაწვევითა დასაძლევად.

რომელიც დარჩა დაპრეზერვაციის ინსტიტუტის მსახურის საიდუმლოდ ინტერპრეტაციის შესაძლო ფორმაში ეს "ფორმის წინააღმდეგობის გაწევა" ახალი როლზე შეხებულ შესახებ პოეტურში მნიშვნელოვანი და მკვლევარ ცვლილებების გასწავლეთ ინსტიტუტის დრამების მეთოდებისა და მისების შეცვლის საშუალებით. ამასთან, საუბარია რა ანალიტიკური პროცესის ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილად. წყდომი შედეგია ძირითადი წინააღმდეგობის გაწევაში (რომელია დაბეჭდული ხაზითა და გამოვლენებით და თანდათან) ანალიზის გახორციელება, გაერეობის და გადამხედვისაგან. ამ ამოცანაში წვლილი შეიტყო როგორც პოეტურმა ასევე ანალიტიკოსმა.

**წინააღმდეგობის გაწევა** - (Widerstand) ფსიქოანალიზში ცენტრის გამოვლენების ერთ-ერთი ფორმა. არსებითად განიხილეთ, არ დაუშვას ცხოველები გამოვლენით არაინსტიტუტის სერვილური და ანტიკური. ფსიქოანალიტიკური სეანსის დროს ვლინდება წინააღმდეგობის გაწევა (ეესისის კრიტიკა, გადატანა, აღმოცენებული ამრების გადმოცემაზე უარის თქმა ამ შოკით, რომ ისინი "სრულად ვარსა" ან არ არის მნიშვნელოვანი და ა.შ.) და რჩება პოეტურებისთვის არაინსტიტუტის.

**წინააღმდეგობის გაწევა** - (Widerstand) ინდივიდის თანდაყოლილი ან შექმნილი ნიშნების (ხილვითური, პიროვნული) არსებობა, რომელიც განაპირობებს განსაზღვრული დავების აღმოცენებას.

**წინააღმდეგობის გაწევა** - (Widerstand) ფსიქოანალიზში ცენტრის გამოვლენის ერთ-ერთი ფორმა. არსებითად განიხილეთ, არ დაუშვას ცხოველები გამოვლენით არაინსტიტუტის სერვილური და ანტიკური. ფსიქოანალიტიკური სეანსის დროს ვლინდება წინააღმდეგობის გაწევა (ეესისის კრიტიკა, გადატანა, აღმოცენებული ამრების გადმოცემაზე უარის თქმა ამ შოკით, რომ ისინი "სრულად ვარსა" ან არ არის მნიშვნელოვანი და ა.შ.) და რჩება პოეტურებისთვის არაინსტიტუტის.

**წინააღმდეგობის გაწევა** - (Widerstand) ინდივიდის თანდაყოლილი ან შექმნილი ნიშნების (ხილვითური, პიროვნული) არსებობა, რომელიც განაპირობებს განსაზღვრული დავების აღმოცენებას.

**წინააღმდეგობის გაწევა** - (Widerstand) ფსიქოანალიზში ცენტრის გამოვლენის ერთ-ერთი ფორმა. არსებითად განიხილეთ, არ დაუშვას ცხოველები გამოვლენით არაინსტიტუტის სერვილური და ანტიკური. ფსიქოანალიტიკური სეანსის დროს ვლინდება წინააღმდეგობის გაწევა (ეესისის კრიტიკა, გადატანა, აღმოცენებული ამრების გადმოცემაზე უარის თქმა ამ შოკით, რომ ისინი "სრულად ვარსა" ან არ არის მნიშვნელოვანი და ა.შ.) და რჩება პოეტურებისთვის არაინსტიტუტის.

**წინააღმდეგობის გაწევა** - (Widerstand) ინდივიდის თანდაყოლილი ან შექმნილი ნიშნების (ხილვითური, პიროვნული) არსებობა, რომელიც განაპირობებს განსაზღვრული დავების აღმოცენებას.

**წინააღმდეგობის გაწევა** - (Widerstand) ფსიქოანალიზში ცენტრის გამოვლენის ერთ-ერთი ფორმა. არსებითად განიხილეთ, არ დაუშვას ცხოველები გამოვლენით არაინსტიტუტის სერვილური და ანტიკური. ფსიქოანალიტიკური სეანსის დროს ვლინდება წინააღმდეგობის გაწევა (ეესისის კრიტიკა, გადატანა, აღმოცენებული ამრების გადმოცემაზე უარის თქმა ამ შოკით, რომ ისინი "სრულად ვარსა" ან არ არის მნიშვნელოვანი და ა.შ.) და რჩება პოეტურებისთვის არაინსტიტუტის.

**წინააღმდეგობის გაწევა** - (Widerstand) ინდივიდის თანდაყოლილი ან შექმნილი ნიშნების (ხილვითური, პიროვნული) არსებობა, რომელიც განაპირობებს განსაზღვრული დავების აღმოცენებას.





**ბ.წიხისპირობა** - ც.წიხისპირა; ფსიქიკური, პირველ რიგში, ინტელექტუალური მოქმედების დონის შეცვლა, ნაკლებად შექცევადი დაქვეითება, არჩევენ ჭის თანდაყოლილს - ოლიგოფრენია, და შექცევადი - დემენცია, რაც შემოსივებებს დასაწყისად იან ერთეის თანდაყოლილ ჭკუასტგობას, მაგ., ენკეფალიტის დროს ოლიგოფრენებში.

**ბ. პიურონიზმი** - ც. პიურონიკი; იხ. **ბინდრევი პანკურ შიხობა** 1.

**ბ. ბინდრევი** - ც. ბინდრევი; იხ. **ბინდრევი**.

**ბ. ბინდრევი** - ც. ბინდრევი; მოხუცებულბითი ასაკის ფსიქიკური დაავადება, ეთარდება თავის გენის ქროსის ვარდების დადებურ აგროფიასთან დაკავშირებით, პისტოლოგური გამოკვლევით ელდება სრულბითი სენილური ფილბები, დაავადება იწყება 70-80 წლის ასაკში ხასიათობრივი ცვლილებებით, მიმდინარეობს სესიორების პროგრესული ცვლილებებით მოვადი პროგრესული აზნუბის გიპით, დემენცია აგარებს ცლობალურ ხასიათს, დასასიათრებელ ეტაებზე აღინიშნება შეცველების, გნობის, პრაქსისის კროფანი დარღვევები (აღკაპირბობა იხ. უკუბრუნობის ტკუასტგობისა), ბრავლობითი ეემზბური კონსტულაციებო სიტუაციის გააბაყლება წარსულში, ეამოსიკალ სტადამი - ფიქციური და ფიმიკური მარამბი, შ.ჭ-ის ძირითადი ფორმები: 1. შარტავი, აღინიშნება დაეილბის გარშრულბული მიმდინარეობის დროს (აღწერა მოცუბულია შემოთ); 2. ჭკუასტგობა ცნობარებას აბნევთ, აღინიშნება დასტებითი ეემზბური ფაქტორების თანდართის დროს (სინოს; დელირიუმი სენილური, არუბსიორენია); 3. ჭკუასტგობა აგზნებობი (სინონ: პრამბორბობა); აგრეთვე აღინიშნება შ. ჭ-ის ფსიქიკური უორსობი, რომელბათვისაც დამახასიათებელია 1-3 წელიწადში მიმდინარე აფექტური, პარანოსიკური, პალკუსიკური, კონფაბულაციური ფსიქოზები - ფსიქოზური სიმპტობატიკის რეღვირების მეშღვე ელსდება ცლობალური სენილური დემენციის სპეციფური სურათი, სინონ: ბინდრევი დემენცია.

**ბ. ბინდრევი** - ც. ბინდრევი; იხ. **ბინდრევი**.

**ბ. ბინდრევი** - ც. ბინდრევი; ენება აბლობა პოსტბილბითან, აღინიშნება ფსიქიატრიულ სტაციონარში ავადმყოფის ბინდრევი დაყოვნებისას და ხასიათდება ინტერესების წრის შეეწრობითი, ინტელექტის უკუბრუნობის დონის დაქვეითებით, გარე საბარბოსგან განდობობი, დებადაკაციის გაბღვირებით, შრე შემოხევეამიქიკის რეღვირება.

**ბ. ხალხური** - ც. ხალხური (Hoche A.E.); დაბალი ინტელექტუალური დონე, მებღბული ვარეველად იათიქოს კარგი, მაგრამ შახლობური შეცველებით, აღბრდის პროყესში ათვისებული მანერებით, დაბეწვილი განსაყმლბთ, გარკვეული სოყალური და სულიერი პროტენხებით, ძირითადად ელინდება დასწაველი ფრაგელოლოგიით მხარელობისას კრიტიკის უკმარისობის დროს, ენება აბლობა განუშტანს (Григорьев И.И., 1931) შიერ გამოყოფილ კონსტრუქციონალურ ჭკუითან.

**ბ. ხალხურის ნაყოფიერი შიხობა** - ხალხური ფიქსი (Сироткин) (ლბი: nevus - ხალი); იხ. **შამბატოვი**.

**ბ. ხალხური** - ც. ხალხური; მბროტგობითობისა კომუნაციის სპეციფიკური სხე, რომლის პროყესში რაიმე რეალური ან ეპსიკონილი მოღენების სიუევი ვრეველება ფართო აუღობობიბე, არჩევენ ემბრევილ-ემოციურ და ინფორმაციულ ჭ-ს.

**ბ**

**ხანანაშვილის ინფორმაციული წყაროები** - *Информационные источники информации* (ხანანაშვილი შ. 1974) ობ. *წიგნოვნები ინფორმაციული*.

**ხასიათი** - *характер* (ბერძნ. *character*-განმასტავებელი სამანი, თაყვისუქრება). **პაროცენტის სტადიური ინდივიდუალური თავისებურებების ერთობლიობა**. რამდენიმე ელნივება მოქმედებისა და ურთიერთობაში. **წარსოვალეცის კონსტრუქციული პაროცენტისთვის არსებული ქვევის ფორმების საკუთებელს**. **ხ.** - აღმნიშნის ესტიკური ინდივიდუალობა (*ხ. ხს. იმ. ავთ. АС - М. М. Мухомов [И. 1966]*). **ფორმირდება** გემპერამენტის თვისებების პიანაზე - პაროცენტის დანამოკური თავისებურებებით. რამდენიმე საუკუნედად უღვეს მისი ადექტურობის დინე. **ხ-ის** ურთიანგვება და გემპერამენტის განივლიზების პაროცის დამოკლებული არაერთგვაროვანია. შვავისი ტემპერამენტის მქონე პაროცენტების შეიძლება სასოციალურად უკანასკნელად თვისებების ხასიათი. რაე დამოკლებულია აღმრდად. განვლილი ცხოვრულის თაღისებურებებზე. სასოციალურებრივ-მორალურ, ინტელექტუალურ და ესთეტიკურ განვითარებებზე. გემპერამენტის განსხვავებულობა, **ხ-ის** თავისუქრება განპირობებ ულია პაროცენტის სამოვალუბრივი არსებობით და განაპირობებს. პაროცენტის სერვეტრის ასევე მინამსელური ფაქტორის, როგორცაა მისი მიმართულება. **ხ-ის** წმინდა გიკების გვხვდება ასეადად. გარდაობის შერეული ფორმები. სადაე შესაძლებელია **ხ-ის** მოვიერთა ხაზის შეკისმბეგი ვაბლივრება (*გემკოცრება*), რაე უღანილება პაროცენტის ამორნივეითად სუბტი ადგილით ვარკვეულ ფსიქოცენტურ სოციატების ამ სხვა ფაქტორების მინარა აწვეულ სასტიკისადი დაკემბრებით. ასეარად, აღმოცენდა **ხწვდება** აქცენტურებულ (*ლათ. accentus-მახვილი*) **ხ-ის** არჩეულ აქცენტურებულა **ხ-ის** შესდეგ გიკებს: ცოკლოდურა, ასოვიანრა, ხუნხიტური, შიხოდურა, პარანთოდურა, ვიბლივრებოდურა, ესტრიაურა, პიკეთიშიურა, დანთიშიურა, ეჭტრიაურებოდურა, ინტრავერსარებულა. **ხ-ის** აქცენტურება გამოშვებები მთხარდ პერიოდში. წლების განსვლისადი განსვლის განსვლისადი. მერანს შეძლები გამოვლინდეს რაეღ ფსიქოცენტურ საკუთებში. **ხ-ის** ხაზების შედარებით ხამიარე არ განივლივების მის დინამოსტრობის და ქასატეკრობის გარეშის, საკოლური აღმრდის გავლენით.

**ხ. პიპილუნსური** - *Хиппикультура* აღნიშნება ეპოლუესის ხინგრძლავად ქამდხარეობის დროს, პოპულარი აღსაქვებები შედარებით იმეითი ელურების დროსაე. ხმარად ხასიათობრივი ვადარები აღნიშნებათ ეპოლუესითად დათავებებლებს პაროცენტების გამოვლინებამდე თან ახლავს პროტესტორებელი დებეცია, ასოცების ხინდარეტიკური საზოგადოებრივი აქციების მოვლები აუტის შეფერხებით. უნდალობა, ექთანობა, აფექტური რეაქციების შეკისმბება მის გამოშვეტ მამებთან. ხშირად დევენშიურობა და ექსპლოზურობა აღენიშნება ერთი და იგივე აივალისთვის (*ობ. ტრანსპარენტ პროტესტანტ ტრანსპარენტობა, ტრანსპარენტობა*). დამახასიათებელია ექსპონსი, ექსპონსიონში, ვანერნელობა და ამავე დროს გარკვეული სეფიებისადმი მამილულობა ევოლუური ტენდენციები უღანილება თავისებური იპოქინდრიულითი, საკეთარ განმრთვლობაზე ვადებეცელი შრეული. შრომითა საქმანაბამაე - განსაკოტრებული შრომისმოყვარეობა, აქცენტულობა, პედანტულობა, პედანტულობა, სერველიტურობა.

**ხ. მატრეპედი** - *Матрица* მოიცავს აწვეულ მოთბეღლებთანობას, წარმოსახვის ხესხიველეს, შერასმებ მოთავისებობა და თვითმოთავიანობას, დემონსტრირებლობას, თვატრობობას, მინერტლობას, ესოცების ვრევენდეს განსაკოტრებულ ეტრირებულ ხასიათს, შათი ვანცდასთან შეუსაბამობას, ინვანტოლურ შეფერვლობას, ეროციკელიობას, ვირეველობას, ნებით არამეარობას (არავეტსპორი ნება) (*Kraepelin E.*) ხემვე (*Гослар И.И. 1988*) აგრეთვე აღნიშნავს განსაკოტრებულ პიროვნულ რეაქციას დათავებამდე - ვარემე ვრდადულის მამიარობის სურვილი და ასოციება. გამოთყვის არსებულ სოციატაში საკეთორე შესრულებული როლი თვის სინარგვილი.

**ხ. პათოლოგიური** - *Патология* ობ. *შხამრამიშხამი*.

**ხ. შხამრამიშხამი** - *Патология* ობ. *შხამრამიშხამი*.

**ხასიათის პატრნოტიპი** - *характерный тип* (ბერძნ. *τύπος* - წინააღმდეგობა კანონს), ხანწინააღმდეგო ტრევენტების დტრევენტის რეაქციების ამოცნობა, რაე გამოწვეულია ინდივიდის ხასიათში ურთავრისაწინააღმდეგო ხაზების არსებობით. **ხ. ა.** - პარადოქსული გამოვლინების მამებში, რაე დამახასიათებელია ამა თუ იმ ხასიათისთვის. ხასიათის პარადოქსულობა აღნიშნება ნორმასა და პათოლოგიაში, თუმცა მისი ნიშნები ხარისხობრივად განსხვავდება.



ჰ

**ჰადისი პერიდი** *Hadysia*. ფიქსიანლაზზე პროექტის ერთერთი ფორმა, რასლის დრისიე ხდება იმპულსის ან გრამისის ორიენტაციის შექცევა ერთი ობიექტიდან მეორეზე. საკლებად დაყუდზე. *ჰაჯ.* საზისიურებრსეუ ქსიანისქებების დროს, როცა არ ხერხდება ხელმძღვანელობისათი ქიწრღიქში შევლა, ობიექტი განიკრთიყის (საღვეუა საკქსიანი ოჯახის წევრებზე სიზის: **რეპრესია** ( ლათ. *repressio* - დაბრუნება).

**ჰაიკიმიონი სივლინი** - *Haikimion (Glecomin) (microcephalin vera)*. ფიქსიკური განუვითარებლობა ქვეყნულადიპათოლოგიის გიქური სეროლოგიური დაღვეუების (გიაღვეუა, ათეგობა, სისიეკური სისიგოსიტი).

**ჰაზუნი მენდილინი** - *Hazi Mendilini შრომის უნარის ან პროფესიული თვისებების დაქარგვის ხარისხის კატეგორია*. დაიღვება საექსი შრომითი სავსიქსიკო კომბისების მიერ ხანგრძლივად მასლიარე დაავადებების დროს და წარსიღვეუნი პესიის დანსიეზის და ცალკეულ შეღავათის სარგებლობის უღვეების სიქსიქსილს. *ჰ. ა. მისიება შრომის უნარის სრული დაქარგვების და აუღსიკოვის მოიღვეულის აუღვეულობის შესისიქსიეზის II - შრომისუნარო, მაგრად არ მოთბოვის მოიღვეულის III - ნაწილობრივ შრომისუნარო, რიშიღვეუნი მისიისიყის ძიეღი სავსიღვლობით შრომის სარბების შესიეუქსების (მაგ. სანქსიო დღის შესიქსიერება) ან შეღავათისა მს. ჰ. ექ. პროფესიისა.*

**ჰაინს-ლანგის შემოთხვევა პერიფერიული თმებისა** - *Hauns-Lange's Peripherischer Haarausfall* (James W., 1884; Lange C., 1885). ფსიქოფიზიოლოგიური თეორია, ქსიოციების აღმოღვევებას აუღსიქსიკებს რეღვეულისერ პერიფერიულ ცელსებების და არა უსადღვეუნი სრეღვეუნი ცენტრების რეღვეულის გარე განღვანისიქსიეზე. ქსიოციქსი განისიღვება რეღვორე პერიფერიული ორგანისიე ცელსებების შესიება - ფისიქრიალური, სისიღვლობილოგიის, კუნთოღვირი და ა.შ.

**ჰაინსონის მეთოდი სენიის პერიფერიული რეპარაციისა** - *Hainson's method of peripheral sensory reparation* (H. Hainson Jacobson E., 1928). ფსიქოთერაპიული მეთოდი, რომელიც დამყარებულა მოსიქსიერებულ სენიისიქსიეზის განისიქსიღვანის ცენტრების სიქსიო მისიქსიეზის (რეღვეუნი, ა მისიქსიე სავსიღვლობილი ვარდისიქსიე, რათიე იქსი განისიქსიეღვება შეღვეუნი ავტოგენური ვარდისიქსიე მეთოდიგან

**ჰასკინის სიმპტომი პირამიდული შრომის მრბინებისა** - *Haskin's pyramidic paresis symptom* (Haskin J.C., 1935). ი. სიმპტომი პირამიდული შრომის მრბინებისა.

**ჰასპინის მეთოდი** - *Hasspina's method* ი. სიმპტომის მეთოდი.

**ჰასპინის მეთოდი** - *Hasspina's method* (Jackson J.H., 1864) ნერველი სისიქსების ფუნქციების ლოკალიზაციის კონკრეტული, რამდლის თანისიქსიე, უღვეუნი პროფესიის მისიქსიეზისა "უზღვეუნი" - სისიქსი ერი და ციქსის დერი, "შეა" - თიების ციქსის ქერქის სიგორული და სენსორული არე, და "უზღვეუნი" - თიების ციქსის შეღვლის მისიქსი. ქსიქსიქსი, ცისიის დაავადებების დროს ხდება ფუნქციითი შრომის ინტეგრაციის დაღვეუნი, რის განსიქსი, ფისიქსიერი ქსიქსიქსი უზრუნდება განითარებულ უღვეუნი დახალ ლონქს ავტორი ანქიქსი ნეგატივი (სისიქსიისი განისიქსიერება) და მოსიქსიერ სისიქსიქსი, რაე განღვანისიქსიე თიების ციქსის სიღვი ავტების კონტრიალის სისიქსიო ქსიქსი.

**ჰასპინის მეთოდი რეპარაციის შემთხვევებისა** - *Hasspina's method of reparation* (Jackson L., 1952). პერიფერიული ცელსების პროექტიული მეთოდი განისიქსიერება 5-12 წლის ასისი პავიქსიების განსიქსიეღვეუნი განისიქსიეღვეუნი თანისიქსიეღვეუნი ცელსიე 8 სენიისი, რამღვეუნი განისიქსიეღვანის სისიქსიეზი ოჯახური სავსიქსი, სენიისიქსიის ინტეგრაციის მისიქსიეზის ხდება აღზრდის თიების ურგებლის და ოჯახის ინტეგრაციის დაღვეუნი ცელსების ანღვეუნი.

**ჰასპინის მეთოდი პერიფერიული პროექტივისა** - *Hasspina's method of peripheral projection* (Jackson J.H., 1976) აღნიშნება უსადღვეუნი აქსის ან უსადღვეუნი ავტოგენების დროს.

**ჰასპინის მეთოდი პერიფერიული მეთოდი** - *Hasspina's method of peripheral projection* (Jackson J.H., 1899). ი. მეთოდი პერიფერიული მეთოდი.

**ჰასპინის მეთოდი პერიფერიული მეთოდი** - *Hasspina's method of peripheral projection* (Jackson J.H., 1891). ი. მეთოდი პერიფერიული მეთოდი.

**ჯიბს-ლენოსის ფიქტურული გუნდები** - [ჯიბსი:ჯიბსი ინიციაციის ინიცი] (Gibbs F.A., Lenoxx W.G., 1937). იხ. **გუნდი კილენის ფიქტურული**.

**ჯოლიფის სტრუქტურა** [ჯოლიფი ინიცი] (Joliffe N., 1930). ნიკიტინის შიგნით გამოწვეული ექსტრემობა. გამოხატულია ცნობიერების შეცვლა (სილანობა, დემორიტივიზაცია). დაკვირვებული ბორისის ფიქტურული კლერისი. სიქერტიზმი. კანში და ლორწოვანში ელვაროიდი სიმპტომები. ნიკიტინის შიგნითი სქერნალითი მორცხა სწრაფი რეაქცია.

**ჯონსონის ინტენსი** - [ჯონსონი ინიცი] (Johnson W., 1944). გეგმული პროექტიანი პერსექუტაციის მანერებულ: ხასიათდება გამოსაკვლევის გეგმულებანი ხედასხვა სიგეების რაოდენობის შეზღუდვით სიგეითა საერთო რაოდენობისთან. დამალი ინტენსი მითითებს პერსექუტაციებისა და შიგნითი (მაგ. მითორენის დროს).

**ჯონსონის სტრუქტურა** [ჯონსონი ინიცი] (Johnson W., 1944). იხ. **ჯონსონის ინტენსი**.



დარღვევა. მხარე კენსიონის რეკლამა უქარაზირებელი გიჟით, პარასიული სიმპტომატურა, მკაცრების და დარღვევის მოხდადამისთ ვისითარება, დისფაგია. ხუნსიქის დარღვევა ქ. კიოვიჩის და პიუტინის გიჟის ვერსიე მდინარეებში. ეპიდემიოლოგიური გულყრება. ხანგრძლივობა 8-15 წელი. ხი, ცილა, ხი, ცილა მარამის მდინარეებში. ნეკროტიზირებული წელიწადი. 30 წელიწადი დაიგდება ატარებს თვებზე-შემკვდარობით სახალის (ავტობიომორფიკული ტიპი). მორფოლოგიურად - ქრონიკული ბერისა და შივი სხვაგვარის ბაქტერიული წარმოქმნის რეაგირება. პათოლოგიური მოქმედების რაღაც ასრულებს რკინისა და ლიმფის ცილის დათვლა.

**პალსტრემა პალსტრემა** - *Palustris (Kass)*. კანის ერთეულში ყვითელი ანუ მწიფე, დეკორატიული, დეკორატიული და მუდგობის მამოკლებული. ქვედაეული დერმატიტის სიმპტომი. ხინონ: **პალსტრემა ლენტი**.

**პალსტრემა** - *Palustris (L)*. (ლით. hallusitatio - ბოღა, ხევა), **პალსტრემა დარღვევა**, რომლის დროსაც მოიქცევათ სახეობის აღმოცენდება რეალური თბიერების გარეშე. შ-ს შინაარსი შეიძლება შეესაბამებოდეს სხვაგვარის ცხოველების ეპიდემიოლოგიის უნებლად და განსაზღვრებისთვის ასახება. 2. **პალსტრემა ვაკუელარობა**, უსაფრთხო აღქმა. 3. კანისათვის თრეანობის მერ შესაბამისი შეგრძნებების და ხატების აღქმა თბიერების არსებობის გარეშე.

**პ. ანტრამტრემა** - *P. antramtra*. იხ. **შინაარსი**.

**პ. ანტრამტრემა** - *P. antramtra*. (ბერძ. antros - ბუნდოანი, უნახი, antros - ფორმა, სიხე). **შედეგობითი** შ. ხანისადაც არამოკით, ბუნდოანი, წამლი, მოსიყვებთათი სახეობი.

**პ. ანტრამტრემა** - *P. antramtra*. (ლით. antramtra - იხ. **პალსტრემა**).

**პ. ანტრამტრემა** - *P. antramtra*. (ლით. antramtra - იხ. **პალსტრემა**).

**პ. ანტრამტრემა** - *P. antramtra*. (ლით. antramtra - იხ. **პალსტრემა**).

**პ. ანტრამტრემა** - *P. antramtra*. (ბერძ. antros - ბუნდოანი, უნახი, antros - ფორმა, სიხე). **შედეგობითი** შ. ხანისადაც არამოკით, ბუნდოანი, წამლი, მოსიყვებთათი სახეობი.

**პ. ანტრამტრემა** - *P. antramtra*. (ლით. antramtra - იხ. **პალსტრემა**).

**პ. ანტრამტრემა** - *P. antramtra*. (ლით. antramtra - იხ. **პალსტრემა**).

**პ. ანტრამტრემა** - *P. antramtra*. (ლით. antramtra - იხ. **პალსტრემა**).

**პ. ანტრამტრემა** - *P. antramtra*. (ლით. antramtra - იხ. **პალსტრემა**).

**პ. ანტრამტრემა** - *P. antramtra*. (ლით. antramtra - იხ. **პალსტრემა**).

**პ. ანტრამტრემა** - *P. antramtra*. (ლით. antramtra - იხ. **პალსტრემა**).

**პ. ანტრამტრემა** - *P. antramtra*. (ლით. antramtra - იხ. **პალსტრემა**).

**პ. ანტრამტრემა** - *P. antramtra*. (ლით. antramtra - იხ. **პალსტრემა**).

**პ. ანტრამტრემა** - *P. antramtra*. (ლით. antramtra - იხ. **პალსტრემა**).





2. **კონტრიბუტოზი** - 1. კონტრიბუტოზი; იხ. 2. **ანტიპროტოზოზი**.

3. **კონიოტროფი** - 1. კონიოტროფი; იხ. 2. **პროტოტროფი**.

4. **ლიტონიკალიზმი** - 1. ლიტონიკალიზმი (სტაქბოლი); შეფუთვითი სახეები ახობის სახით, რომელიც აქვს სიმბოლოებსა და სიმბოლოებს.

5. **მაკროპროტოზოზი** - 1. მაკროპროტოზოზი (ბერძ. makros - დიდი, optikos - მიკროსკოპის მხედველობის). პალეონოლოგიური სახეების გარდასახვა დიდი თავის რეალურ პროტოტიპებთან შედარებით. საწინააღმდეგო **მაკროპროტოზოზი** - 2. ა. ადამიანის ენციკლოპედიური ინტენსიური ფიქციების დროს. ხინთი: **მაკროპროტოზოზი** (106210220). **მალეპროტოზოზი** - 2.

6. **მიკროპროტოზოზი** **მაკროპროტოზოზი** - 1. მიკროპროტოზოზი (Segins J., 1888). წარმოადგენს ფსიქოლოგიური ავადმყოფობის სახეობის ერთ-ერთი განყოფილების. მათგან უფრო და სენსორული კომპონენტების ხასიათისა და განისაზღვრების ხასიათის მხედველი არის ფიქციური გენბალურ-მაკროტოზოზი. 2-ს, რომელიც ავადმყოფის მიერ აღიქმება როგორც მისი ანტიპროტოზოზი აქვს მიკროპროტოზოზი; გენბალურ-მაკროტოზოზი 2-ს, რომლის დროსაც აღინიშნება სენსორულ-სენსორული აქვს; გენბალურ-მაკროტოზოზი და გენბალურ-მაკროტოზოზი, რომლებიც წარმოადგენს მისივე მიკროპროტოზოზის სახეობის განყოფილებას.

7. **მიკროპროტოზოზი** - 1. მიკროპროტოზოზი (ბერძ. mikros - მცირე, optikos - მიკროსკოპის მხედველობის). აღინიშნება სენსორული ფიქციების ენციკლოპედიური მდგომარეობებისა და ინტენსიურობების დროს. პალეონოლოგიური სახეები წარმოადგენს მაკროპროტოზოზის მიკროპროტოზოზის შიშის აღინიშნებით, არსებითი. **მაკროპროტოზოზი** **მაკროპროტოზოზი** **წარმოადგენს დიდიპროტოზოზი** - 2. სხედველობის და რეკონსტრუქციის გ. ხედვების პერსონალების სახეობის, რომლებიც ენციკლოპედიური გამოყენებით ქვეყნის აღიქმის დროს. განსხვავდება იმეორეული მიკროსკოპის, აღწერილია **ლერის** (M. Leray, 1925) მიერ. ხინთი: **ლოპროტოზოზი**.

8. **მიკროპროტოზოზი** - 1. მიკროპროტოზოზი (ბერძ. mikros - მცირე, optikos - მიკროსკოპის მხედველობის). აღინიშნება სენსორული ფიქციების ენციკლოპედიური მდგომარეობებისა და ინტენსიურობების დროს. პალეონოლოგიური სახეები წარმოადგენს მაკროპროტოზოზის მიკროპროტოზოზის შიშის აღინიშნებით, არსებითი. **მაკროპროტოზოზი** **მაკროპროტოზოზი** **წარმოადგენს დიდიპროტოზოზი** - 2. სხედველობის და რეკონსტრუქციის გ. ხედვების პერსონალების სახეობის, რომლებიც ენციკლოპედიური გამოყენებით ქვეყნის აღიქმის დროს. განსხვავდება იმეორეული მიკროსკოპის, აღწერილია **ლერის** (M. Leray, 1925) მიერ. ხინთი: **ლოპროტოზოზი**.

9. **მიკროპროტოზოზი** - 1. მიკროპროტოზოზი; იხ. 2. **ანტიპროტოზოზი**.

10. **მიკროპროტოზოზი** - 1. მიკროპროტოზოზი; იხ. 2. **ანტიპროტოზოზი**.

11. **მიკროპროტოზოზი** - 1. მიკროპროტოზოზი; იხ. 2. **ანტიპროტოზოზი**.

12. **მიკროპროტოზოზი** - 1. მიკროპროტოზოზი; იხ. 2. **ანტიპროტოზოზი**.

13. **მიკროპროტოზოზი** - 1. მიკროპროტოზოზი; იხ. 2. **ანტიპროტოზოზი**.

14. **მიკროპროტოზოზი** - 1. მიკროპროტოზოზი; იხ. 2. **ანტიპროტოზოზი**.

15. **მიკროპროტოზოზი** - 1. მიკროპროტოზოზი; იხ. 2. **ანტიპროტოზოზი**.

16. **მიკროპროტოზოზი** - 1. მიკროპროტოზოზი; იხ. 2. **ანტიპროტოზოზი**.

17. **მიკროპროტოზოზი** - 1. მიკროპროტოზოზი; იხ. 2. **ანტიპროტოზოზი**.

18. **მიკროპროტოზოზი** - 1. მიკროპროტოზოზი; იხ. 2. **ანტიპროტოზოზი**.

19. **მიკროპროტოზოზი** - 1. მიკროპროტოზოზი; იხ. 2. **ანტიპროტოზოზი**.

20. **მიკროპროტოზოზი** - 1. მიკროპროტოზოზი; იხ. 2. **ანტიპროტოზოზი**.

21. **მიკროპროტოზოზი** - 1. მიკროპროტოზოზი; იხ. 2. **ანტიპროტოზოზი**.

22. **მიკროპროტოზოზი** - 1. მიკროპროტოზოზი; იხ. 2. **ანტიპროტოზოზი**.

23. **მიკროპროტოზოზი** - 1. მიკროპროტოზოზი; იხ. 2. **ანტიპროტოზოზი**.

24. **მიკროპროტოზოზი** - 1. მიკროპროტოზოზი; იხ. 2. **ანტიპროტოზოზი**.

25. **მიკროპროტოზოზი** - 1. მიკროპროტოზოზი; იხ. 2. **ანტიპროტოზოზი**.

26. **მიკროპროტოზოზი** - 1. მიკროპროტოზოზი; იხ. 2. **ანტიპროტოზოზი**.

27. **მიკროპროტოზოზი** - 1. მიკროპროტოზოზი; იხ. 2. **ანტიპროტოზოზი**.

28. **მიკროპროტოზოზი** - 1. მიკროპროტოზოზი; იხ. 2. **ანტიპროტოზოზი**.

29. **მიკროპროტოზოზი** - 1. მიკროპროტოზოზი; იხ. 2. **ანტიპროტოზოზი**.

30. **მიკროპროტოზოზი** - 1. მიკროპროტოზოზი; იხ. 2. **ანტიპროტოზოზი**.







2. **პალეოპოლური მწვერვალი** - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914). მწვერვალი პალეოპოლურია და მდებარეობს ნიდერლანდების პროვინციის შვედენ-კლავინის მწვერვალი პალეოპოლურია პალეოპოლურიაში განსხვავდება ხანძარიანი მინერალიზაციით (არაფსკიანი არა-არსებობს არ-ქვიშის). 1. პალეოპოლური პალეოპოლურია ხასიათდება ვერხალური სინკლიკური პალეოპოლურია, რომელიც განსაკუთრებით აღსანიშნავია დროის იდეებს შევარდნიკოვილი და შვედენის მინერალიზაციის სახით. 2. ტრანსპორტი პალეოპოლური პალეოპოლურია ხასიათდება სტრუქტურული ცვლილებებით - ინტეგრირებული განსაკუთრებული დროის ხანძარიანი და წყდება განვითარების შევარდნიკოვილი (კერძოდ) პალეოპოლურია თან-ქროსის მწვერვალი ხაგივანი ბოლოდ დროს. განსაკუთრებული მნიშვნელობის იდეებს ფორმის). ტრანსპორტიული ფორმისთვის დახასიათებული მწვერვალი განვითარებული აფექტური დაბნელება, შინი, შუილი, გამოსავალი - ამასთან, ქვიშის სწრაფი აღდგენით. ავალპოლური განვითარების ანტიპოზის გარეშე.

3. **პრეპროპოლური ტრონიკალი** - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914). პრეპროპოლური ტრონიკალი - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914).

4. **პროპოლური** - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914). პროპოლური - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914).

5. **დრონიკალი** - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914). დრონიკალი - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914).

6. **პროპოლური** - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914). პროპოლური - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914).

7. **პროპოლური** - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914). პროპოლური - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914).

8. **პროპოლური** - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914). პროპოლური - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914).

9. **პროპოლური** - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914). პროპოლური - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914).

10. **პროპოლური** - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914). პროპოლური - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914).

11. **პროპოლური** - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914). პროპოლური - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914).

12. **პროპოლური** - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914). პროპოლური - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914).

13. **პროპოლური** - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914). პროპოლური - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914).

14. **პროპოლური** - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914). პროპოლური - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914).

15. **პროპოლური** - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914). პროპოლური - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914).

16. **პროპოლური** - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914). პროპოლური - ე. ანთონიუსი (Antonius) (P. van der Meulen) (1914).





სასილვე და გაცილებადი ეფექტულობის ხაზგასმით. უკანასკნელ დროს დიდი გავრცელება აქვს ნარკოტიკული...

საბავშვო პათოლოგია (Colles S., 1969) მანკურებით, მანძიკისა მომზადებულია 10% იწყებს სასტატუსი გრ...
საბავშვო პათოლოგია (Colles S., 1969) მანკურებით, მანძიკისა მომზადებულია 10% იწყებს სასტატუსი გრ...
საბავშვო პათოლოგია (Colles S., 1969) მანკურებით, მანძიკისა მომზადებულია 10% იწყებს სასტატუსი გრ...

საბავშვო პათოლოგია (Colles S., 1969) მანკურებით, მანძიკისა მომზადებულია 10% იწყებს სასტატუსი გრ...
საბავშვო პათოლოგია (Colles S., 1969) მანკურებით, მანძიკისა მომზადებულია 10% იწყებს სასტატუსი გრ...

საბავშვო პათოლოგია (Colles S., 1969) მანკურებით, მანძიკისა მომზადებულია 10% იწყებს სასტატუსი გრ...
საბავშვო პათოლოგია (Colles S., 1969) მანკურებით, მანძიკისა მომზადებულია 10% იწყებს სასტატუსი გრ...





















რაცა შექმნილად ამბულატორული მეურნეობა (ახლობლების თანხმობით); და **მეფლებითი** - რიცა ავადმყოფი სოციალურად სასამა საკუთარი თავისთვის და გარემოთხოვითაჲს. უკანასკნელ შემსახვევანი პ-ის საკითხი წყდება კანონურად. პირველი დღე-ღამის განმავლობაში ავადმყოფი ხელმოორედ უნდა იქნას ვადამისწვებელი კონსულურად (არანაკლებ 3 ღმის ფიქიატრის შერ). რამის უნდა დადასტუროს მისი საავადმყოფოში იძულებითი მისაყვების კანონიერება.

**პრობატორატში** - **ინფორმალ ფსიქიატრიაში** ფიქიკური მდგომარეობის გაუარესება სტიკონარში ხანგრძლივ მითავებობთან დაკავშირებით (სოციალურ დამადატაციის მოვლები, შრომისა და მეუყების მისარი ინტერეყების დაკარჯი, სისტიკური უნობის დაქეუთება, გარემოთხოვებთან კონტაქტის გაუარესება, დაავადების ქრონიკიკიკისადმი კუნილქება, პათოხასიათობრივი გამოვლისებების ვადამოვება). სინონ: **სინფროზი** **სახლში** **მეყვერება**.

**პროფანის დავალება** - **ქარხანი** **ნაქი** (Hoffmann F., 1894). **მეყვედრებითი დავალება**, ხასიათება მშარდი სექსოლოგიკური სიმტომიკით და პროტრეული ჰეხასტობით. დასწყისი - 10 წლის ასაკში, მამინარეობის ხანგრძლივობა - 9-21 წელი. ხშირია ბავშეებში. რიმლებიყ დაიბადენ ბიბამეილებს შორის ქორწინებადან. მექმლდრეობის გიბი ატეფისიპურეყესიული. სინონ: **მეხანდი** **პროფროზი** **პროტროფი** **სახლში** **სახლში** **ჭიქის** **სტობით**.

**პროფანის მიილფობიური ეპიფალენტები** - **ქარხანი** **ინფორმალნი** **ინფორმალნი** (Hoffmann F., 1862). ი. **მეხანდი** **ნაქი** **მეყვერება**.

**პროფანის ბავშეობის კონფროზი** - **ნაქი** **ინფორმალნი** **ინფორმალნი** (Hochsinger K., 1904). ი. **პროფანის ბავშეობის**.

**პროფანის ხალქობის ჭიქის** **სტობითი** - **ნაქი** **ინფორმალნი** **ინფორმალნი** (Hoche A.E.). ი. **პროფანის** **სახლში** **სახლში**.

**პროფანის ღმინობის სინფროზი** - **ნაქი** **ინფორმალნი** **ინფორმალნი** (Hoche A.E., 1912). ი. **სინფროზი** **ღმინობის**.

**პროფანის პანფროზი** - **ნაქი** **ინფორმალნი** **ინფორმალნი** (Hoch P., Polatin P., 1948). ი. **სინფროზი**.

**პროფანის (პროფანის) პანფროზის სინფროზი** **პროფანის** **სახლში** **სახლში** - **ნაქი** **ინფორმალნი** **ინფორმალნი** **ინფორმალნი** **ინფორმალნი** **ინფორმალნი** (Huber G., Glatzel G., Lungershausen E., 1969). ი. **სინფროზი** **ინფორმალნი** **ინფორმალნი** **ინფორმალნი**.

**პროფანის (პროფანის) სინფროზი** - **ნაქი** **ინფორმალნი** **ინფორმალნი** **ინფორმალნი** (Huber G., Gross G., 1959). ი. **სინფროზი** **ინფორმალნი**.

**პროფანის (პროფანის) სინფროზი** - **ნაქი** **ინფორმალნი** **ინფორმალნი** **ინფორმალნი** (Huber G., 1971). ი. **სინფროზი** **ინფორმალნი** **ინფორმალნი** **ინფორმალნი**.

**პროფანის სტობითი დავალების სინფროზი** - **ნაქი** **ინფორმალნი** **ინფორმალნი** (Hoodenough F.L., 1926). **ფსიქოლოგიკური მეოდიკი** II წელმე წეითი ბავშეობა ინტელექტუალური ღმის ვადამისწვებელი. ბავშის შერ დაბაველი აბამანი უნდა დაფრეყირებულობის ხარისხით.

**პროფანის დავალება** - **ნაქი** **ინფორმალნი** (Hurter G., 1919). ი. **პროფანის**.

თავი II

ბერძნულშია ორივენი ღვაწლი

Absentiu (ლათი). ყრუბუნების ხანმოკლე გამოხატვა.

Abuse (სიტყვა). 1. რაიმეს ზოროვად გამოყენება; 2. მანქანა ან უსამართლო შემოქმედება.

Acting out (ინგლ). ფსიქოანალიზში აღნიშნავს მოქმედებას. უპირატესად იმპულსურს, რომელიც გამოვარდნილია სებასტისის ბევრი მოტივით, სისტიმულიდან. Acting out — "გათამაშება" გამოხატავს აღნიშნულ გუნდურ ციხეებს, ფიქსის ცნობიერი აღიარების და გაამრების ვარემუ აღიარების დიფერენციალური მოტივები და კონფლიქტის მოქმედების (და არა სიკვდილის) ხანმოკლეობა. გათამაშება ხელს უწყობს დიფერენციალური გრამული შემთხვევის ან ცხოვრების პერსონალის გახსენებას. სექსუალური და ავტორიტული სურვილები ან ამ სურვილების წინააღმდეგ თავდაცვითი განსაკუთრებული გათამაშების სიყრით.

Addiction (სიტყვა). ბევრი უსაქონლოვანი ან ფობოლოგიური დამოკიდებულება (ნივთოვებისადმი - drug addiction ან რაიმე მოქმედებისადმი).

Ad Hominem (ლათი). აღნიშნავს მიმართულებას.

Adipositas (ლათი. adiposus -- ცხიმოვანი) სიმსუქნე.

Ad usum (ლათი). გამოყენებისთვის.

Aficus (ლათი). - სხვაზე დამოკიდებული, იმპარტობა სულით ავადმყოფის აღნიშნულებად.

Alter Ego (ლათი). სხვა "შე"

Anaesthesia dolorosa psychica (ლათი). იხ. *ანესთეზია პსიქიკური მდგომარეობის*.

Anorexia mentalis (ლათი). იხ. *ანორეზია მენტალის*.

Aqua (ლათი). წყალი.

Aqua vitae (ლათი). არაკი.

Arcus hystericus (ლათი). ისტერიული რკალი.

Arcus senilis (ლათი). მოხუცებულობითი რკალი.

Ataxia locomotoria progressiva (ლათი). იხ. *ატაქსია ლოკომოტორია პროგრესიული*.

Athremia (ლათი). სიარულის, დეგონის და ჯდომის შექმნის ხანმოკლეობა ისტერიის დროს. ყველა მოძრაობა აღიარად სრულდება ხანმოკლეობისა.

Attitude (ფრანგ. პოზა). იხ. *ანესთეზია*.

Bad trip (სიტყვა). ცუდი ვესერის. იხ. *ანორეზია მენტალის პროგრესიული*.

Bombus (ბერძნი). ყურბში შეყლის. ხმაურის მეტონიმია.

Carus (ბერძნი. karos - ძლიერი სისუსტე). კომპარტიული მდგომარეობის (იხ. *მწვა*) გამოხატულების უკიდურესი ხარისხი. აღნიშნავს რეალურად რეალურების სრული გაქრობა და სისხლძარღვთაშორებელი და სუნთქვის უხეში დარღვევით.

Catalonia tarda (ლათი). კატალონია მოვიანებითი.

Circulus vitiosus (ლათი). მანკური წრე.

Cito (ლათი). ხანმოკლეად. გამოყენება რეუკურამში

Clonus hystericus (ლათი). ისტერიული ღერსმანი.

Combined addiction (ინგლ). კომბინირებული ნარკოზია (Goodman L.S., Gilman A.). ოპიუმის და ბარბიტურატების ერთდროული გამოყენება.

Comotio cerebri (ლათი). თავის გონის შერყევა.

Contusio cerebri (ლათი). თავის გონის შერყევა გონის ქსოვილების დაზიანებით.

Déjà cadendu (ფრანგ). *ფეკვე მოსმენილია*, *ფეკველია* უფრო მეტი ავადმყოფობა ამაჟამად რეალურად მოსმენილს აღიქვამენ როგორც მანამდე უკვე მოსმენილს, თუმცა, ეს შეცდომა უწინააღმდეგობა ფეკვებს.

Déjà éprouve (ფრანგ). *ფეკვე განცდილია* უფრო მეტი ავადმყოფობა ანგეცეპტზე, რომ მოქმედებებს ან მოუღებებს, რომლებშიც ისინი სინამდვილეში არასოდეს არ მონაწილეობდნენ, მათ მიერ განცდილია. ეს განცდები შეიძლება ატარებდეს ბოლომდე ხასიათს.

Déjà fait (ფრანგ). *ფეკვე შექმნილია* უფრო მეტი. გერმანი გამოყენებულა პიერ მარის (P. Marie) მურ პარანოზის სახის აღნიშნულებად, რომლის დროსაც ავადმყოფი დარწმუნებულია, რომ მოცემულ მომენტში მის თავს მოხმადარი უკვე იყო დასრულებული.

Déjà pense (ფრანგ). *ფეკვე აჩვენებულია* უფრო მეტი ავადმყოფობა აღიქვამენ რწმენა მისი, თითქოს ამაჟამად იგი წარმოქმნის წარსული საკუთარი განცდის, აზრების მომართულებას. ეს უფრო მეტი, სიტყვა როგორც Déjà vs. შედის

ფსიქოსიკოლოგ ავტორების სტრუქტურაში, რაც იძლევა მის საექსპლ. ეფექტში, რომ მათ წარმოიშობა რალი ექსტრა თავის გუნდის საექსპლ. წლებს (De Long R. N., 1951).

**Deja vu (ფრანგ.) «უკვე მონათხრობა»** ფენომენი. მორელი წარსულს, ისეთს უკვე დავიწყებულ მოვლენების მსგავსების ავადმყოფი აქვს შეგრძობა, თითქმის მას უკვე უამბავს მის შესახებ. ზღვრობაში შესული ეს გერმანიის ისტ. აღმასწავლებელი რომ მივინჯოს უკვე უამბო ფსიქონალიტიკოსს რადაც ებოძის შესახებ. სინამდვილეში კი ამის აღიარება არ შეიძლება.

**Deja vu (ფრანგ.) «უკვე არსებული სახერხეულობა»** ფენომენი. გერმანიის სოფლებული პიერ მარის მარკ პარამენიის აღმასწავლებელი რომის დროსაც ავადმყოფი დარწმუნებულია, რომ მისი მსგავსი ფენომენი სრულად აღნიშნულია მისი. რაც მისი თვალში ვიწროდა.

**Deja vu (ფრანგ.) «უკვე ნანახი»** ფენომენი. რაიმეს პირველად დაინახვის ავადმყოფი ამტკიცებს, რომ ეს მისთვის საყრდენია წარსულიდან. ისე, იგი ამბობს რომ იყო რომელიღაც ქალაქისადაც სინამდვილეში იგი არასოდეს ყოფილა. ეს ბერძენული სტრუქტურები მოჩვენებითი ნაყინის სტრუქტურის გრძობის ზღვრობაში მოცემულ ფენომენის განხილვაზე უფროდ ფსიქოლოგიურ დახედვას მუცხობის გამოვლინებას (გრე ევმონი, მენ უკვე იყო ამ სტრუქტურის და დადგინა მისთვის კარგად დასაბუთება) და ყოლისმემდობის ფრანკის რეგრესულ გატკიცებებს (სამაილის წინასწარსტრუქტურების ფორმით). ეგრეზულ ფსიქიატრიაში აღნიშნული ფენომენი განხილვა როგორც აღმასწავლებელი პარამენიის სინომი.

**Delinquens notis (ლათ. delinquens - დაზარადა, notis - დახადებული).** გერმანიის სოფლებული დომბროზის (C. Lombroso). 1876 მარკ ათანდეროლი დაზარადა გიპის ატორის მიერ ანთროპოლოგიურად გასოკოვლი ადამიანის განსაკუთრებული ქვეხების (homo delinqueas) აღნიშნავდა. ნამორჩევა დახასიათებული აღნიშნებით, აღმასწავლებელი ნამების არსებობით და რიცხვითი ფსიქიკური დადავებებისადაც წინაგანწყობით. ეს კონსტრუქცია იწვევდა აქვითი სოფლების არასწორ ბოლოვებისადაც, როგორც არის დაზარადა, მის სოფლებული ფსიქიკის ავტორიტეტის.

**Delirium acutum (ბერძნ.). დელირიუმი აკუტუმი.**

**Delirium tremens (ბერძნ.). დელირიუმი კანკალა. სინონ: შიმშირი (საზღვარი).**

**Demence precoce (ფრანგ.) (Morel B., 1852). ნაადრევა ქუეახუტობა.** შიმშირების გამოყოფის პირველი ცდა დასიკვლევები ნომოლოგიური ფორმის სახით. მორელის წარმოდგენით, ადრეული ან ნაადრევა ქუესუსტობა მოსოკის მართადაც პეხურენსულ სიმპტომთა წარმოშობას. ნაადრევი ქუესუსტობის ნომოლოგიური დასიკვლევების საექსპლ. დროს იგი მის უნდოვრობის და ავტოტური სიმუცხის ნომიციხი.

**Dementia infantilis Helleri. ის. უმწერ-საპაპრატ მტკიცება.**

**Dementia praecox (ლათ.) (Kraepelin E., 1898). ნაადრევა ქუესუსტობა.** ენდოტური ფსიქიკის გამოყოფა, რომელიც აქვს ქუესუსტობის, რანდას შეზღვევობაშიც თავდაპირველად შეიღობა მარტო. უბეგრებითუა, კატატონური და პარასიდაული ქუესუსტობა. ყველა ეს ფორმა გაერთიანებული იყო ნომოლოგიურად და ცენტრიკრად, აგრეთვე გასაბუთალი მდგომარეობების ერთობას კრიტერიუმებს შესაბამისად შემდგომში ადრეული ან ნაადრევი ქუესუსტობის ფორმების რანკი გაიმარდა. D.პ. ის გამოყოფა წარმოადგენდა მინიმალურად უკმაშ მდგომარეობის კონსტრუქციის მიქსინი.

**Diagnostic criteria for Alcohol intoxication 303.00 - DSM IV-00** **პარამენიუმი ინტოქსიკაციის სარეგისტრაციო კრიტერიუმები (ადატრებული).** ა) ალკოჰოლის მიღების შესახებ მონაცემები. ბ) კლინიკურად შიმშირულია ან ანადატრებულია ქუესუსტობა და ფსიქოლოგიური ცვლილებები (მაგ. გაქუეაბრებული სექსუალური ქუევა და აგრეთვე, ეურება-განწყობის მგრეყობა, ამროსების დარღვევები, სოციალური და მოქმელებითი ქუესუსტობა ან აღიარება). განეითარებული ალკოჰოლის მიღების დროს არ მის შემდეგ, ეს ქუესუსტობა ნომოლოგიურად დასიკვლევებისადაც ერთობაშია დასიკვლევების ალკოჰოლის მიღების დროს არ მის შემდეგ: 1. დამარტოვული სტრუქტურები 2. კონსტრუქციის დარღვევები; 3. მოძრაობითი (საარტული) დარღვევები; 4. სისტემური; 5. მესსერების და ყურადღების მოშლა; 6. სიპირი ან კონს. და სიმპტომები არ არის დაკავშირებული ჯანმრთელობის საერთო მდგომარეობისადაც ან რაიმე სხვა ფსიქიკურ დადატრებისადაც. ის. **პარამენიუმი ინტოქსიკაციის სარეგისტრაციო კრიტერიუმები.**

**Diagnostic criteria for Alcohol withdrawal 291.8 - DSM IV-00** **პარამენიუმი სარეგისტრაციო კრიტერიუმები (ადატრებული).** ა) ალკოჰოლის ხანგრძლივი და დიდი რაოდენობით მიღების შემდეგ მისი მიღების შეწყობა ან შეწყობის შემდეგ, ეს ქუესუსტობა ნომოლოგიურად დასიკვლევებისადაც ერთობაშია დასიკვლევების ალკოჰოლის მიღების შემდეგ, განეითარებული ა. კრიტერიუმების გამო რანკინსული საბაისის ან დღის შემდეგ 1. ავტონომური სისტემების პირეპრეპტოლომა (ოფეიანობა, უღლის ანქარება 100-ზე მეტით წუთში); 2. კოორდინაციის გრეყობა; 3. იმსინაბა; 4. ეულსტრუქცია ან დენისება; 5. მდგომარეობითი, სინამდვილე და დასიკვლევების დასიკვლევების და ქალაქობისადაც ა. ფსიქომოტორული მოუხერხება; 7. შოკობა; 8. უსიკვლევებელი ეკლერეზია. ეს სიმპტომები ნამოთილილი ბ. კრიტერიუმში იწვევს შიმშირულია პარამენიუმი ინტოქსიკაციის სარეგისტრაციო კრიტერიუმებისადაც ერთობაშია დასიკვლევების ალკოჰოლის მიღების დროს არ მის შემდეგ: 1. დამარტოვული სტრუქტურები 2. კონსტრუქციის დარღვევები; 3. მოძრაობითი (საარტული) დარღვევები; 4. სისტემური; 5. მესსერების და ყურადღების მოშლა; 6. სიპირი ან კონს. და სიმპტომები არ არის დაკავშირებული ჯანმრთელობის საერთო მდგომარეობისადაც ან რაიმე სხვა ფსიქიკურ დადატრებისადაც. ის. **პარამენიუმი ინტოქსიკაციის სარეგისტრაციო კრიტერიუმები.**

**Diagnostic criteria for Amphetamine intoxication 292.89 - DSM IV-00** **პარამენიუმი ინტოქსიკაციის სარეგისტრაციო კრიტერიუმები (ადატრებული).** ა) ამფეტამინის ან შტაგის ნივთიერების (მაგ. მდგომარეობა) მიღების შემდეგ, ეს ქუესუსტობა ნომოლოგიურად დასიკვლევებისადაც ერთობაშია დასიკვლევების ალკოჰოლის მიღების შემდეგ, განეითარებული ა. კრიტერიუმების გამო რანკინსული საბაისის ან დღის შემდეგ 1. ავტონომური სისტემების პირეპრეპტოლომა (ოფეიანობა, უღლის ანქარება 100-ზე მეტით წუთში); 2. კოორდინაციის გრეყობა; 3. იმსინაბა; 4. ეულსტრუქცია ან დენისება; 5. მდგომარეობითი, სინამდვილე და დასიკვლევების დასიკვლევების და ქალაქობისადაც ა. ფსიქომოტორული მოუხერხება; 7. შოკობა; 8. უსიკვლევებელი ეკლერეზია. ეს სიმპტომები ნამოთილილი ბ. კრიტერიუმში იწვევს შიმშირულია პარამენიუმი ინტოქსიკაციის სარეგისტრაციო კრიტერიუმებისადაც ერთობაშია დასიკვლევების ალკოჰოლის მიღების დროს არ მის შემდეგ: 1. დამარტოვული სტრუქტურები 2. კონსტრუქციის დარღვევები; 3. მოძრაობითი (საარტული) დარღვევები; 4. სისტემური; 5. მესსერების და ყურადღების მოშლა; 6. სიპირი ან კონს. და სიმპტომები არ არის დაკავშირებული ჯანმრთელობის საერთო მდგომარეობისადაც ან რაიმე სხვა ფსიქიკურ დადატრებისადაც. ის. **პარამენიუმი ინტოქსიკაციის სარეგისტრაციო კრიტერიუმები.**

**Diagnostic criteria for Amphetamine withdrawal 292.0 - DSM IV-00** **პარამენიუმი სარეგისტრაციო კრიტერიუმები (ადატრებული).** ა) ამფეტამინის ან შტაგის ნივთიერების ხანგრძლივი მიღების შემდეგ მისი მიღების შეწყობა ან შეწყობის შემდეგ, ეს ქუესუსტობა ნომოლოგიურად დასიკვლევებისადაც ერთობაშია დასიკვლევების ალკოჰოლის მიღების შემდეგ, განეითარებული ა. კრიტერიუმების გამო რანკინსული საბაისის ან დღის შემდეგ 1. ავტონომური სისტემების პირეპრეპტოლომა (ოფეიანობა, უღლის ანქარება 100-ზე მეტით წუთში); 2. კოორდინაციის გრეყობა; 3. იმსინაბა; 4. ეულსტრუქცია ან დენისება; 5. მდგომარეობითი, სინამდვილე და დასიკვლევების დასიკვლევების და ქალაქობისადაც ა. ფსიქომოტორული მოუხერხება; 7. შოკობა; 8. უსიკვლევებელი ეკლერეზია. ეს სიმპტომები ნამოთილილი ბ. კრიტერიუმში იწვევს შიმშირულია პარამენიუმი ინტოქსიკაციის სარეგისტრაციო კრიტერიუმებისადაც ერთობაშია დასიკვლევების ალკოჰოლის მიღების დროს არ მის შემდეგ: 1. დამარტოვული სტრუქტურები 2. კონსტრუქციის დარღვევები; 3. მოძრაობითი (საარტული) დარღვევები; 4. სისტემური; 5. მესსერების და ყურადღების მოშლა; 6. სიპირი ან კონს. და სიმპტომები არ არის დაკავშირებული ჯანმრთელობის საერთო მდგომარეობისადაც ან რაიმე სხვა ფსიქიკურ დადატრებისადაც. ის. **პარამენიუმი ინტოქსიკაციის სარეგისტრაციო კრიტერიუმები.**

სიღებოს შექცევით ან შეწყვეტა. ბ) დისორიული გუნება-განწყობა და ქვემოთ ჩამოთვლილი სიმპტომებიდან ორი ან მეტი, განვითარებულია ა. კრატერუმის შემდეგ რამდენიმე საათის ან დღის განმავლობაში: 1. მოღუქება; 2. ნაოჯღი, მკაფიო კონსტრუქციის ხანგრძლივობა; 3. ამბიონია ან პიქურეზია; 4. უმადობელი შავი; 5. ფიზიოლოგიური აგზნება ან შეკრება; 6) სამსკომები ჩამოთვლილი ბ. კრატერუმში აწევს კლინიკურად მნიშვნელოვან დარღვევებს სოციოლოგიური და სხვა ფუნქციების მხრივ; დ) სიმპტომები არ არის დაკავშირებული განმრთვობის საერთო მდგომარეობასთან ან რაიმე სხვა ფიზიკურ დაავადებასთან. იხ. **ბარშვანასა გამწვანებელი კარტინა**

**Diagnostic criteria for Caffeine Intoxication 292.90 - DSM-IV-00 (კლინიკური მნიშვნელობის საფუძველზე) კრიტერიუმები**

(ავადმართება). ა) კოეფიციენტი მუცელებზე დღის რაოდენობით (250 მგ (მაგარი მოხარბული ყავი 2-3 ჭიქა დღეში) განთავსების შესახებ მონაცემები. ბ) ქვემოთ ჩამოთვლილი 5 ან მეტი სიმპტომი. განვითარებულია სოციოლოგიური და სხვა ფუნქციების მხრივ; 1. მოღუქება; 2. უფროსობა; 3. განლაშობილობა; 4. უძლიერა; 5. სახის პიქურეზია; 6. ეპიზოდული დიურეზია; 7. ფადარითი; 8. ექსოციტი კრუნებები; 9. დაკავშირებული სტევენოჯი. ამრთო ჩამოთვლება; 10. გაქცარდია და ამბიონია; 11. დაუღლებლობის პერიოდები; 12. ფსიქოლოგიური აგზნება; 13) სიმპტომები ჩამოთვლილი ბ. კრატერუმში აწევს კლინიკურად მნიშვნელოვან დარღვევებს სოციოლოგიური და სხვა ფუნქციების მხრივ; დ) სიმპტომები არ არის დაკავშირებული განმრთვობის საერთო მდგომარეობასთან ან რაიმე სხვა ფსიქიკურ დაავადებასთან. სპეციფიკურად განსაზვრულია პერეუციული დარღვევების არსებობა. იხ. **ბარშვანასა**

**Diagnostic criteria for Cannabis intoxication 292.89 - DSM-IV-00 (კლინიკური მნიშვნელობის საფუძველზე) კრიტერიუმები**

(ავადმართება). ა) კანაბისის მოხმარების შესახებ მონაცემები. ბ) კლინიკურად მნიშვნელოვანი არადადაკრებული ქვეყვიანი და ფსიქოლოგიური ცვლილებები (მაგ. გუფარტებული მოგონება კონსოლიდაცია, ეფორია, მოთვლია, დროის აღქმის და შექცევების შექცევა, არასწორი მხეულობა, სოციოლოგიური განლაშობა), განვითარებულია კანაბისის ძალის შესდეგ მოქლე დროში. გ) ქვემოთ ჩამოთვლილი სიმპტომებიდან ორი ან მეტი, განვითარებულია კანაბისის ძალისა და ორი საათის შემდეგ; 2. პარის სიმბაღე; 3. გაქცარდია; 4. კონტრეციების ინეკონტროლი და სიმპტომები არ არის დაკავშირებული განმრთვობის საერთო მდგომარეობასთან ან რაიმე სხვა ფსიქიკურ დაავადებასთან. სპეციფიკურად განსაზვრულია პერეუციული დარღვევების არსებობა. იხ. **ბარშვანასა კანაბისის მრთვა**

**Diagnostic criteria for Cocaine intoxication 292.89 - DSM-IV-00 (კლინიკური მნიშვნელობის საფუძველზე) კრიტერიუმები**

(ავადმართება). ა) კოკაინის მოხმარების შესახებ მონაცემები. ბ) კლინიკურად მნიშვნელოვანი არადადაკრებული ქვეყვიანი და ფსიქოლოგიური ცვლილებები (მაგ. ეფორია ან აგეიტური მხეულობა, დარღვევები სოციოლოგიური, აწეული ყვადლება და აღქმა, ინტროსპექციული სენსიტივობა, შიში, დაბადებისა, ბრამბინობა, სეკონდარული არადადაკრების წვეულება, არასწორი მხეულობა, არასწორი სოციოლოგიური და ქვეყვიანი მოქცევები), განვითარებულია კოკაინის გამოყენების შემდეგ მოქლე დროში. გ) ქვემოთ ჩამოთვლილი სიმპტომებიდან ორი ან მეტი, განვითარებულია კოკაინის გამოყენების შემდეგ მოქლე დროში: 1. გაქცარდია ან ზრადიკარდია; 2. რეგების გუფარტობა; 3. მოხმარებული ან დაქვეყვილებული არადადაკრების წვეულება; 4. შეშინების ან ოფლიანობა; 5. უფლებიანა და ეფორია; 6. წონის დაკარგვა; 7. ფსიქოლოგიური აგზნება; 8. ექსოციტი მოღუქება, სენსიტივის დაორტუნება, ტიეტივი ველეკრის აგზნება; 9. დემორტივაცია, დისტიბია, დისტონია, გულეები ან კომა; დ) სიმპტომები არ არის დაკავშირებული განმრთვობის საერთო მდგომარეობასთან ან რაიმე სხვა ფსიქიკურ დაავადებასთან. სპეციფიკურად განსაზვრულია პერეუციული დარღვევების არსებობა. იხ. **ბარშვანასა გამწვანებელი კარტინა**

**Diagnostic criteria for Cocaine withdrawal 292.0 - DSM-IV-00 (კლინიკური მნიშვნელობის საფუძველზე) კრიტერიუმები**

(ავადმართება). ა) კოკაინის ხანგრძლივი და დღის რაოდენობის მოხმარების შემდეგ, მისი მიღების შექცევით ან შეწყვეტა. ბ) დისორიული გუნება-განწყობა და ქვემოთ ჩამოთვლილი სიმპტომებიდან ორი ან მეტი, განვითარებულია რამდენიმე საათის ან დღის განმავლობაში კოკაინის მიღების შეწყვეტის ან შექცევების შემდეგ; 1. მოღუქება; 2. ნაოჯღი, კომპარტივი სიხრბე; 3. ინსომბია ან პიქურეზია; 4. უმადობელი შავი; 5. ფსიქოლოგიური აგზნება ან შეკრება; 6) სამსკომები ჩამოთვლილი ბ. კრატერუმში აწევს კლინიკურად მნიშვნელოვან ქვეყვიანი და სოციოლოგიური დარღვევებს; დ) სიმპტომები არ არის დაკავშირებული განმრთვობის საერთო მდგომარეობასთან ან რაიმე სხვა ფსიქიკურ დაავადებასთან. იხ. **ბარშვანასა გამწვანებელი კარტინა**

**Diagnostic criteria for Hallucinogen Intoxication 292.89 - DSM-IV-00 (კლინიკური მნიშვნელობის საფუძველზე) კრიტერიუმები**

(ავადმართება). ა) პერეუციების მოხმარების შესახებ მონაცემები. ბ) კლინიკურად მნიშვნელოვანი არადადაკრებული ქვეყვიანი და ფსიქოლოგიური ცვლილებები (მაგ. განზობაგული შვროვა ან ეფორია, დაბოკლებების უღებობა, შეშინების შიში, პარანორმული ამრები, არასწორი მხეულობა, არასწორი სოციოლოგიური და ქვეყვიანი მოქცევები), განვითარებულია პერეუციების მდგომარეობის შემდეგ მოქლე დროში. გ) პერეუციული ცვლილებები აღმოცენდება ფიზიკურ მდგომარეობაში აწეული აღქმის და განზობაგული ყვადლებების რიგში (მაგ. უფრების განსაკვირვებელი სიაქსიმი, დერეგულირება და დეტრონობაბილია, ეფორია ან დაბუნებობი, სიმქცეობები) პერეუციების მდგომარეობის შემდეგ მოქლე დროში. დ) ქვემოთ ჩამოთვლილი სიმპტომებიდან ორი ან მეტი, განვითარებულია პერეუციების გამოყენების შემდეგ მოქლე დროში: 1. გაქცარდია; 2. ეგების გუფარტობა; 3. ოფლიანობა; 4. უფრების უძლიერა; 5. მოღუქება და ბრამბინობა; 6. გრებობა; 7. კონტრეციების დარღვევა; 8) სიმპტომები არ არის დაკავშირებული განმრთვობის საერთო მდგომარეობასთან ან რაიმე სხვა ფსიქიკურ დაავადებასთან. სპეციფიკურად განსაზვრულია პერეუციული დარღვევების არსებობა. იხ. **ბარშვანასა გამწვანებელი კარტინა**

**Diagnostic criteria for Inhalant intoxication 292.89 - DSM-IV-00 (კლინიკური მნიშვნელობის საფუძველზე) კრიტერიუმები**

(ავადმართება). ა) სწრაფად აქრობადი ინჰალანტების (საანბნებო ბარები და სწრაფი მოქცევის ეთილალკოგოლები) თხევადი სასიკლე დროითი მაღალი დოზებით მოხმარების შესახებ მონაცემები. ბ) კლინიკურად მნიშვნელოვანი არადადაკრებული ქვეყვიანი და ფსიქოლოგიური ცვლილებები (მაგ. აგრესიულია და პარანორმა, ამათია, არასწორი მხეულობა, ორენგეობის დარღვევა), განვითარებულია ინჰალანტების მოხმარებისთანავე. გ) ქვემოთ ჩამოთვლილი სიმპტომებიდან ორი ან მეტი, განვითარებულია ინჰალანტების მოხმარების შემდეგ მოქლე დროში: 1. აგზნება; 2. ნიბრება; 3. დისკორდინაცია; 4. შექცევების განწვევა; 5. ხარბობა და წონისკომების დარღვევა; 6. ლეოარგია; 7. რეულეების დაორტუნება; 8. ეფორია; 9. გრებობა; 10. უმადობელი კონტრეციების სიხრბე; 11. შეშინების დაბინება ან დიკლია; 12. სეპორია ან კომა; 13. ეფორია. დ) სიმპტომები არ არის დაკავშირებული განმრთვობის საერთო მდგომარეობასთან ან რაიმე სხვა ფსიქიკურ დაავადებასთან. იხ. **ბარშვანასა გამწვანებელი კარტინა**



**Diagnostic criteria for Substance dependence - DSM IV-00 ნივთიერებაზე დამოკიდებულება** (სადაბნურსტომო ძრძინარქიზმში) (ფლავტარუხლი). ნივთიერების არასამუდომოდ მიწინაი გასოყენება. რის შედეგადაც ჩამოყალიბდა კლასიფიკაცია მნიშვნელოვანი დარღვევები, გამოვლენილი ქვეითი ნიშნობილი სიმპტომებიდან ერთი ან მეტი. 12 თვის განმავლობაში: 1. გოჯერანგობის არსებობა. ა) ნივთიერების მნიშვნელოვან გაზრდილი რაოდენობის მიხიბნალება ინტერსუკრიის ან სხიურული ვუქვის მიხიბწვეად. ბ) ნივთიერების ვუქვის მნიშვნელოვანი შექერება სხიი ვროთ და იგივე რაოდენობის ხანგრძლივი გამოყენების შემდეგ. 2. აღკვეთის სიბრძნის არსებობა. ა) ნივთიერებისაბილი სტეიტიკურად დამახასიათებელი აკკეთის სიბრძნის აღსოყენება (იხ. Diagnostic criteria for Substance withdrawal a. და b. კრიტერიუმები); ბ) იგივე ან სხივავი ნივთიერების მიღება აღკვეთის განსწვევილი სიმპტომებისაგან გახსნათი ვუქვებობად; 3. ნივთიერება მიღება ვურო დილი რაოდენობით და (ან) ვურო ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. ვიდრე იყო განმარტა; 4. აღივლი აქვს ნივთიერების მიღების შედეგით სურვილის არსებობის და (ან) მიღლებობა. შექვეყნის მიხი მიღება ან აკონტროლის მიხი რაოდენობა. ვუქვეყნობა. 5. დიდი დრო და ძალიანხივეი სხიარკება ხსიურული ნივთიერების მიხიბნეხლად და შემდგომ მისი გამოყენების ვუქვეყნებას განასიიავს ვუქვებობად. 6. შექვეყნებულება ან ხიურთობ არ არის ინდივიდისთვის მნიშვნელოვანი სოყიადური. პროყვასული და ვარსობის მიხიიი განსხივული აქვებობა. 7. ნივთიერების გამოყენების ვარსებულება შექვეყნებობს იმისა. რომ ვიოვირობიერებულება მის მიერ განსწვევილი ვიბიურერი და ფსიქოლოგიურა პრობლებები. იხ. ნარკოქიზმში, ნარკოქიზმში სხიურებაზე დამოკიდებულება შექვეყნის სინდრომი.

**Diagnostic criteria for Substance intoxication - DSM IV-00 ნივთიერების ინტოქიკაციის სადაბნურსტომო კრიტერიუმები** (ფლავტარუხლი). ა) ახს აკი ნივთიერების არსამედიკინური მიზნით გამოყენების ვაბი ავტომატურული შექვეყნელი ნივთიერების-სეკოიკური (სხივადსხივი ნივთიერებები იბიღება მსივებს ან განსხივებულ სინდრომებს) სინდრომების კოყვარობა. ბ) ქვეყნა და ფსიქოლოგიური გამოვლენების მხრივ მნიშვნელოვანი ცვლადობები. გამოწვეული ცხიბი ნივთიერების მიქმელების შედეგად (მაგ. ავზებობა). ავრეხილობა. ვარსებულების ცვლადობები. აღსიის ვარსებობა. ამროყენებითი დარღვევები. სოყიადური და სამოვადიოტიკური დარღვევები. ვ) სიმპტომები არ არის აღკვეთილებული ვანსიარობის ხიურთი მდგომარეობისაგან ან რაბივე სხევა ფსიქიკურ დიავებებისაგან. იხ. ვიბიერებაზე დამოკიდებულება შექვეყნის სინდრომი.

**Diagnostic criteria for Substance intoxication Delirium - DSM IV-00 ნივთიერების ინტოქიკაციის ვირობა კავშირებში დამოკიდებულება სადაბნურსტომო ძრძინარქიზმში** (ფლავტარუხლი). ა. ცხიბიერების აბი (ვარემოქვეყნელი სიმპტომები აღსიის შექვეყნა. ვერადლები კოყვარობები და მისი ვარადობის ვრანის დიქვიებები). ბ. ცვლადობები კოყვარობის ხიურთობის მიქსიერების დიქვიებობა. შექვეყნების მოხდა) ან პირეუტიული დარღვევების ვარსებობა. რივ არ ვ. კოყვარობა ვანსიარობად არსებულ ან ვარსებობად დარღვევების ვარსებობა. გ. დარღვევები კოყვარობის დროის მიხივე პერიოდში (სექვეყნობი. სახიბი ან დღებში) და ახსიბიების ვერეობა. დ. ანაწმეხობა. კლინიკური და დამორავრობული ვარსებობები ვინდებია 1 ან 2. 1. ა. და ბ. კრიტერიუმებს სიმპტომები ვარსებობა ნივთიერების ინტოქიკაციის დროს; 2. დარღვევები ვიოლოგიურად დაკვირვებულ გამოყენებულ ნივთიერებისაგან.

**Diagnostic criteria for Substance-induced Anxiety disorder - DSM IV-00 ნივთიერების ბავრეხივული ვირობითი ცხილადობების სადაბნურსტომო ძრძინარქიზმში** (ფლავტარუხლი). ა. შეკვირვებული ცხილადობა. პირიკური ახლადობები ან დამორავრობული რისკიერი და (ან) სიმპტომური შექვეყნის კლინიკურ სურათში. ბ. ანაწმეხობა. კლასიკური და დამორავრობული მონაყენებითი ნივთიერების ინტოქიკაციის ვინდებობა 1. ან 2. 1. ა. და ბ. კრიტერიუმებს სიმპტომები ვარსებობა ნივთიერების ინტოქიკაციის ვინდებობა; 2. დარღვევები ვიოლოგიურად დაკვირვებულ ნივთიერებისაგან. გ. ფსიქოლოგიური ცვლადობები არ შეესაბამება ფსიქოქურ ახლადობებს. რისკიერი არ არის გამოწვეული ნივთიერების გამოყენებით. დ. აღსიწმეხი ახლადობები არ ვარსებობს იხილად და დარღვევების დროს. ე. სიმპტომები იწვევის კლინიკურად მნიშვნელოვან ცვლადობებს სოყიადურ და მოღვეყნობის სხევა ხიურებობა.

**Diagnostic criteria for Substance-induced Mood disorder - DSM IV-00 ნივთიერების ბავრეხივული ვანსიბ-ბავრეხობის ცხილადობების სადაბნურსტომო კრიტერიუმები** (ფლავტარუხლი). ა. ვანსიბ-ბავრეხობის შეკვირვებული ცხილადობა და იქირო ცვლადობები. რომელიც ხსიბათობა 1. ა (ან) 2. 1. დიქვიებელი ვანსიბ-ბავრეხობა ან მნიშვნელოვანდ შექვეყნებულ აქვიერობა და დროვად: 2. აწველი. ყუბახსიური ან ვაბიბინებელი ვანსიბ-ბავრეხობა. ბ. ანაწმეხობა. კლასიკური და დამორავრობული გამოყენების შეკვირა 1. ან 2. 1. ა. კრიტერიუმს სიმპტომები ვანსიბ-ბავრეხობის ინტოქიკაციის ვინდებობა ან აღკვეთიდან 1 თვის ვანსიბ-ბავრეხობა; 2. ცვლადობები ვიოლოგიურად დაკვირვებულ ნივთიერებისაგან. გ. ფსიქოლოგიური ცვლადობები არ შეესაბამება ფსიქოქურ ახლადობებს. რომელიც არ არის გამოწვეული ნივთიერების გამოყენებით. დ. აღსიწმეხი ახლადობები არ ვარსებობს იხილად და დარღვევების დროს. ე. სიმპტომები იწვევის კლინიკურად მნიშვნელოვან ცვლადობებს სოყიადურ და მოღვეყნობის სხევა ხიურებობა.

**Diagnostic criteria for Substance-induced persisting Amnesic disorder - DSM IV-00 ნივთიერების ბავრეხივული ვანსიბ-ბავრეხობის სადაბნურსტომო ძრძინარქიზმში** (ფლავტარუხლი). ა. მესიერების დიქვიებობა ყუქიკაციის და რეკოლექციის ხარჯებ. ბ. კოყვარობის დარღვევები. მიყვანობა ა. ა. და ა. 2. კრიტერიუმებს. იწვევის სოყიადურ და მროსიი ვროვირობების მნიშვნელოვან ვადახრის მანებულ არსებულ ვუქვეყნობის დროს. ვ. დიქვიებელი სიმპტომები არ ვინდებია მოკლე დროის ვანსიბ-ბავრეხობა და იწვევობა ვ. ვარსებობა შექვეყნის ვიოლის შემდეგ; ბ. ანაწმეხობა. კლინიკური და დამორავრობული მონაყენებითი ანკარიად კლასიკური. როდ დარღვევები დაკვირვებულა ნივთიერების მიღებისაგან.

**Diagnostic criteria for Substance-induced persisting Dementia - DSM IV-00 ნივთიერების ბავრეხივული პანსიბ-ბავრეხობის სადაბნურსტომო ძრძინარქიზმში** (ფლავტარუხლი). ა. მრავალწრივი კოყვარობის ცვლადობების ვანსიბ-ბავრეხობა. ვინსივებული 1. ან 2. 1. მესიერების დარღვევა (ფსიქიკობი) და რეკოლექციისაგან. 2. ვროთ ან შეკვირვებული ცხილადობის დარღვევა; ბ) აბიბი; აბრქიბი; ავინობი; ქვეითი-მოქმედების დემორვანობი (დავებობა. ირვანისება. აბსტაქიბობა). 3. კოყვარობის დარღვევები. მიყვანობა ა. ა. და ა. 2. კრიტერიუმებს. იწვევის სოყიადურ და მროსიი ვროვირობების მნიშვნელოვან ვადახრის მანებულ არსებულ ვუქვეყნობის დროს. ვ. დიქვიებელი სიმპტომები არ ვინდებია მოკლე დროის ვანსიბ-ბავრეხობა და იწვევობა ვ. ვარსებობა შექვეყნის ვიოლის შემდეგ; ბ. ანაწმეხობა. კლასიკური და დამორავრობული მონაყენებითი ანკარიად ვინდებია. რომ დარღვევები დაკვირვებულა ნივთიერების მიღებისაგან.

Diagnostic criteria for Substance-induced psychotic disorder - DSM IV-00 ნივთიერებაში გააოფხავებული უსამართლო ანალიზის ხარისხის დასადგენად (ადატრებული). ა. მკაცრი ეპისოდური ძალადობრივი ან ბოლოვანი ანაბრები, კლინიკური და ლაბორატორული მონაცემებით ნათელია 1. ან 2. 1. ა. კრიტიკული სიმამრები ექსპლანატორული ანტიპსიქოტიკების დროს უნდა იყოს აღკვეთილი 1 თვის განმავლობაში; 2. დარღვევა უკლონოგურად დაკავშირებული გამიყენებულ ნივთიერებისთან. გ. ფსიქოპათოლოგიური ეტიოლოგიები არ შესაძლებელია უსამართლო ანალიზის, რომელიც არ არის გამოყენებული ნივთიერების გამოყენებით. დ. აღნიშნული ანალიზები არ უნდა იყოს მხოლოდ დედინების დროს.

Diagnostic criteria for Substance-induced Sexual dysfunction - DSM IV-00 ნივთიერებაში გააოფხავებული სქესობრივი დარღვევის ხარისხის დასადგენად (ადატრებული). ა. კლინიკურად შენიშნულია სქესობრივი დარღვევა, რაც განიხილება დეტალურად და პროვინციებისა ურთიერთობის განმარტების. ბ. ანაბრებიდან, კლინიკური და ლაბორატორული მონაცემებით ნათელია სქესობრივი დარღვევის კავშირი ნივთიერების გამოყენებისთან და უნდა იყოს 1. ან 2. 1. სიმამრები, განვითარებულია ა. კრიტიკული, ეტიოლოგიები ნივთიერების გამოყენებისთან და უნდა იყოს 1 თვის განმავლობაში ან უნდა იყოს 2. დარღვევა ეტიოლოგიურად დაკავშირებულია გამოყენებულ ნივთიერებისთან. გ. ფსიქოპათოლოგიური ეტიოლოგიები არ შესაძლებელია უსამართლო ანალიზის, რომელიც არ არის გამოყენებული ნივთიერების გამოყენებით.

Diagnostic criteria for Substance-induced Sleep disorder - DSM IV-00 ნივთიერებაში გააოფხავებული ძილის დარღვევის ხარისხის დასადგენად (ადატრებული). ა. ძილის დარღვევა ეპისოდური ხასიათისაა, რომელიც უნდა იყოს დასაძლავებელი კლინიკური კრიტერიუმები. ბ. ანაბრებიდან, კლინიკური და ლაბორატორული მონაცემებით ნათელია 1. ან 2. 1. ა. კრიტიკული სიმამრები ეტიოლოგიები ნივთიერების გამოყენებისთან უნდა იყოს აღკვეთილი 1 თვის განმავლობაში; 2. დარღვევა ეტიოლოგიურად დაკავშირებულია გამოყენებულ ნივთიერებისთან. გ. ფსიქოპათოლოგიური ეტიოლოგიები არ შესაძლებელია უსამართლო ანალიზის, რომელიც არ არის გამოყენებული ნივთიერების გამოყენებით. დ. დარღვევა არ უნდა იყოს მხოლოდ დედინების დროს. ეტიოლოგიური ეტიოლოგიები უნდა იყოს მხოლოდ დარღვევა იწყებს შენიშნულია ეტიოლოგიური სიყვარული და მძივების სხვა სფეროებში.

Diagnostic criteria for Substance withdrawal -DSM-IV-00 ნივთიერებაში უსამართლო ანალიზის ხარისხის დასადგენად (ადატრებული). ა) ნივთიერების აღმოჩენის სპეციფიკური სინდრომის განვითარება მისი ბოლოების ან შეწყვეტის ვიზუალური მონიტორინგის შემდეგ. ბ) ნივთიერების აღმოჩენის სინდრომი იწყებს კლინიკურად მონიტორინგის დარღვევის დამოუკიდებელი სოციალურ და ქვეყნულ მოქმედებებში. გ) სიმამრები არ არის დაკავშირებული ნივთიერების ხანგრძლივად განვითარების ხანგრძლივად განვითარებისთან ან რაიმე სხვა ფსიქიკურ დაავადებისთან. დ. უსამართლო ანალიზის ხარისხის დასადგენად (ადატრებული).

Diagnostic criteria for Substance withdrawal Delirium -DSM IV-00 ნივთიერებაში უსამართლო ანალიზის ხარისხის დასადგენად (ადატრებული). ა. ეტიოლოგიები ანალიზის (ვარსებობს სპეციფიკური სინდრომი აქტის სიყვარული, კრიტიკული კონცენტრაციის და მისი გადატანის უნარის დარღვევა). ბ. ეტიოლოგიები კონსტანტური სინდრომი (სიმამრების დაქვეითება, შეცვლების სიძლიან ან ქვეყნული დარღვევების განვითარება, რაც არ უკავშირდება ნივთიერების არსებულ ან განვითარებად დემენტაციას. გ. დარღვევები ეტიოლოგიურად დროს მკურნალობის (სეკუნდარული, ტაიპის ან დარღვევის) და ანალიზის შემდეგ. დ. ანაბრებიდან, კლინიკური და ლაბორატორული მონაცემებით ნათელია 1. ან 2. 1. ა. კრიტიკული სიმამრები ეტიოლოგიები ნივთიერების აღმოჩენისთან უნდა იყოს აღკვეთილი 1 თვის განმავლობაში; 2. დარღვევა ეტიოლოგიურად დაკავშირებულია გამოყენებულ ნივთიერებისთან. გ. ფსიქოპათოლოგიური ეტიოლოგიები არ შესაძლებელია უსამართლო ანალიზის, რომელიც არ არის გამოყენებული ნივთიერების გამოყენებით.

Differentia specifica (ლათ.). განსხვავების ნიშანი.

Double addiction (ინგლ.). ორმაგი ნარკოზიზმი (Kole L.). შორების, კოქაინის და ბარბიტურატების ერთდროული გამოყენება. Drop attack (ინგლ.). უკუბრუნება პოსტურალური ტონუსის მკვეთრი დაქვეითების შედეგად თავის ტვინის რეგულაციური უარსებობის შედეგად მოხდის მიმოქცევის მომდის დროს. ცნობიერება არ არსებობს. თან ახლავს ასთენიის, იდენიისა და სინდრომის. მღრმე მკურნალობა. სინდრომი.

Drug abuse (ინგლ.). წმლის ბოროტად გამოყენება ნარკოზიზმის და ტოქსიკომანიის დროს. Drug dependence (ინგლ.). საუკრინალწამლო დამოკიდებულება.

DSM I Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). ფსიქიკური ანალიზების დიფერენციური და სტატისტიკური სისტემის დროს. ანალიზის ხარისხის დასადგენად (ადატრებული).

DSM IV. ფსიქიკური ანალიზების დიფერენციური და სტატისტიკური სისტემის დროს. IV გამოცემა.

Ebrietas (ლათ.). სიმამრული. არაფორმული მდგომარეობა.

Ebrietas psychotica (ლათ.). პათოლოგიური (ფსიქოტური) ალკოჰოლური თრობა.

Ebrietas vulgaris (ლათ.). მარტივი ალკოჰოლური თრობა.

Ego (ლათ.). "მე"

Ejaculatio praecox (ლათ.). სპერმის ნაადრევი გამოყოფა შამაქაის სისტემის ასოს სამომი მოთავსებამდე ან მოთავსების შემდეგ.

Ex juvenilis (ლათ.). სკერნალობის შემდეგ.

Exophthalmia (ლათ.). მამაკაცის პათოლოგიური ლოკალიზებული ბოქსისებრი.

Flashbacks (ინგლ.). უკუბრუნება. ანალიზის ხარისხის დასადგენად (ადატრებული).

Folie à deux (ფრანგ.). შეზღუდული ორმაგი. ინტელექტუალური ფსიქოზის ფორმა, რომლის დროსაც ბოლოვანი განცდილი ალკოჰოლიზის ორ ადამიანს - ინტელექტის და ინტელექტუალური.

Folie à double forme (ფრანგ.). შეზღუდული ორმაგი ფორმაში). ფსიქოზის ფორმაში ეტიოლოგიური ფაქტორი.

Folie à trois (ფრანგ.). შეზღუდული სამომი. ინტელექტუალური ფსიქოზის ფორმა, რომელშიც მონაწილეობს სამი პირი.

Fuga idearum (ლათ.). fuga - გაქცევა, ბერძნ. idea - სხვა, იმრი, იდეა). სინონ: მდგომარეობა შიშის დროს.

Furor epilepticus (ლათ.). ეპილეფიური შფოთი). ანალიზის ხარისხის დასადგენად (ადატრებული).

Furor manicus (ლათ.). მანიკური შფოთი). ანალიზის ხარისხის დასადგენად (ადატრებული).

Globus hystericus (ლათ.). სტერეოტიპული გუნდა.

Guam ALS-PDC (Guam - კესელი წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილი; ALS - amyotrophic lateral sclerosis. PDC - parkin-











**სომეხობა** - დიქციონარი (ს-ს), უმოთხილვა (ს-ს)  
**სინქრონი** - დიქციონარი (წ.ს.)  
**სიპირება** - აბი (წ.ს.), თეთრი წყალი (წ.ს.), მინის წყალი (წ.ს.), სიყვითლე (წ.ს.)  
**სურამი** - ენო (ი.დ.)  
**სამსოვარი** - მოხინავე (წ.ს.), ხენილე (წ.ს.), ჯიხიჯიხი (წ.ს.)  
**სამსოვარი** - კაქობა (ი.დ.)  
**სამი** - მალა (წ.ს., უ.ს.), მუღამი (ი.დ.)  
**სამისი** - ანტიპროტი (წ.ს.), მახდარი (წ.ს.), ხინაღა (წ.ს.), ჯემოდი (წ.ს.)  
**სამისი** - სარსამი (ი.დ., წ.ს., უ.ს.)  
**სამისი** - თაღის გაგება (კ.), გენის დარევა (კ.), ბილიერი (ს-ს)  
**სამისი** - გამზავება (წ.ს.), დამუშავება (ს-ს), უბილი (უ.ს.), რეგად ყოფნა (კ.), რეგი (ს-ს), ხარი (ი.დ.), სინაგე (წ.ს.), გენის დანება (კ.), გენის ნილი (კ.), გენის მემოლობა (კ.), ფეთიანს (ს-ს), ევტრები (წ.ს.), შიკი (წ.ს., კ., ს-ს), შგერი (ს-ს), ცნობა მოხილვას (ს-ს)  
**სამისი** - კიფა (წ.ს.)  
**სამისი** - თაღის კედელი (ი.დ.)  
**სამისი** - ფარდაიანი (წ.ს.)  
**სამისი** - ბლავანი (ი.დ.)

**სამისი** - ქვეთა არეულობა (კ.)  
**სამისი** - ალის დარევა (ი.დ.), ფუთი (ს-ს)  
**სამისი** - თხევა (უ.ს.)  
**სამისი** - მოსმური (ს-ს), მწველი (ს-ს)  
**სამისი** - ანკანა (ს-ს)  
**სამისი** - გელის ყური (ი.დ.)  
**სამისი** - შიკი (კ.), შიკი (წ.ს.)  
**სამისი** - ელა (ს-ს)  
**სამისი** - ელა (წ.ს.), ემინის (ს-ს), შიკი (კ.)  
**სამისი** - შიკი (წ.ს.)  
**სამისი** - აფრული (ი.დ.), შიკი (კ.), ცხრო (უ.ს.), შიკი (ი.დ.)  
**სამისი** - ცნობის დარევა (კ.), ცნობის შიკი (კ.)  
**სამისი** - მღვი (ს-ს), ცნობის კლება (კ.), შიკი (უ.ს.)  
**სამისი** - შიკი (კ.)  
**სამისი** - შიკი (ს-ს), ცნობის კლება (კ.), შიკი (უ.ს.)  
**სამისი** - ბელი (წ.ს.), ბოროგი (წ.ს.), ბრამი (ი.დ.), ენება (წ.ს., უ.ს.), დამუშავება (ს-ს), შიკი (წ.ს.), შიკი (გამორეგება) (ს-ს), შიკი (ს-ს), შიკი (თავსობა) (ს-ს), სილიბრე (თავსობა) (ს-ს), სიფილტვი (წ.ს.), უნური (წ.ს.), უნური (წ.ს.), უნური (ი.დ.)  
**სამისი** - დამი (წ.ს.), საბი (შეწინე ქამისი) (ი.დ.)  
**სამისი** - აფრული (ს-ს)

ი. დ. - ილიგარ დავი

კ. - კარაბაღინი

ს-ს - სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონი ქართული

უ.ს. - უსწორი კარაბაღინი

წ.ს. - წიგნი საბილი

თავი IV

ნაკობიკული სპუალეგებისა და ნიმიიკიგების  
ნიგლისუკენიანი ჰიკონული სსმლნოღეგები

Acapulco gold - კანაბისი\*  
 acid - ლაზერგინის შეგეა  
 Adam - ანსეკრაინის და მეთამეგამინის ანალოგი  
 Afghanistan black - ჯაბიში  
 amys - ახლსეგრაგე  
 angel dust - ჟესეკლიდინი  
 angel hair - ჟესეკლიდინი  
 A's - ანსეკრაინის სულეგეი  
 barbs - ბარბიგურაგეი  
 barf tea - მესეკლიდინი  
 baseball - კოკანი  
 base - ეასეგრაგეული კოკანი  
 beans - ანსეკრაინის სულეგეი  
 bennies - ანსეკრაინის სულეგეი  
 bernies - კოკანი  
 bhong - კანაბისი  
 big chief - მესეკლიდინი  
 big C - კოკანი  
 big H - ჰერონი  
 black beauties - ანსეკრაინი  
 black tar - ჰერონი  
 blotters - დეილიამილი ლიზერგინის შეგეასი  
 blow - კოკანი  
 blue angels - ანსეკრაინი  
 bluebirds - ანსეკრაინი  
 blue devils - ანსეკრაინი  
 blue heaven - დეილიამილი ლიზერგინის შეგეასი  
 blue microdot - დეილიამილი ლიზერგინის შეგეასი  
 blues - ანსეკრაინი ან ჰერონი  
 blue velvet - კოკანის შეგეევი ხეღეების სანინაღმღევი  
 სანიღეგეები  
 bolt - ანსეკრაინი  
 bombit - იქთამეგამინის პიღროქლორიდი  
 boy - კოკანი  
 brownies - ლესეგრაგეამინის სულეგეი  
 brown sugar - ჰერონი  
 bullet - ანსეკრაინი  
 bumblebees - ანსეკრაინი  
 business man's acid - ფილოგინი, ფილოგინი  
 buttons - მესეკლიდინი  
 cactus - მესეკლიდინი  
 candy - ბარბიგურაგეი  
 cartwheels - ანსეკრაინის სულეგეი  
 Chiaa white - ფესეკრაინის ანალოგი  
 chras - კანაბისი  
 Christmas trees - ანსეკრაინი, სეკობარბიგალი ან  
 ლესეგრაგეამინის სულეგეი  
 CSBA's - ელესეკრაინი  
 climax - ჰესეკრაინი

coke - კოკანი  
 Colomblin - კანაბისი  
 copilots - ანსეკრაინი  
 crack - კოკანის ნახეარკოქეი  
 crank - მეთამეგამინის პიღროქლორიდი  
 crystal meth - მეთამეგამინის პიღროქლორიდი  
 dogga - კანაბისი  
 DET - დეილიამილი ლიზერგინის ანალოგი  
 dexies - დესეგრაგეამინის სულეგეი  
 DL's - ჰერონი  
 DMT - დეილიამილი ლიზერგინის ანალოგი  
 DOB - ანსეკრაინის და მეთამეგამინის ანალოგი  
 dolls - ბარბიგურაგეი  
 dollys - მესეკლიდინი  
 DOM - ანსეკრაინის და მეთამეგამინის ანალოგი  
 done - მესეკლიდინი  
 dope - კანაბისი ან ჰერონი  
 double crosses - ანსეკრაინი  
 double trouble - ანსეკრაინი ან სეკობარბიგალი  
 Dover's powder - ჰერონი  
 downers - ბარბიგურაგეი  
 DPT - დეილიამილი ლიზერგინის ანალოგი  
 dust - ფესეკრაინი  
 ecstasy - ანსეკრაინის ან მეთამეგამინის ანალოგი  
 essence - ანსეკრაინის ან მეთამეგამინის ანალოგი  
 fairy dust - ფესეკრაინი  
 fender bender - ბარბიგურაგეი  
 flake - კოკანი  
 flower power - დელის ელორის თესღეები  
 fly - მესეკრაინი  
 fooballs - ანსეკრაინი  
 freebase rocks - კოკანი  
 gag - ჰერონი  
 ganja - კანაბისი  
 girl - კოკანი ან ჰერონი  
 goonballs - ბარბიგურაგეი  
 goofers - ბარბიგურაგეი  
 grass - კანაბისი  
 green dragon - დეილიამილი ლიზერგინის შეგეასი  
 greenies - ანსეკრაინის სულეგეი  
 happy dust - კოკანი  
 hard stuff - ჰერონი  
 hardware - ბეღლ - ანსეკრაინი  
 hashish - კანაბისი  
 hash oil - კანაბისი  
 hash - კანაბისი  
 Hawaii - კანაბისი  
 hay - კანაბისი  
 hearts - ანსეკრაინის სულეგეი, ლესეგრაგეამინის სულეგეი  
 heavenly bliss - დეილიამილი ლიზერგინის შეგეასი, დელის  
 ელორის თესღეები

\* აქ და შემდეგ ფიღმსებები სესეგრაგეების დაწმინღეების  
ტესეგრაგეების სესეგრაგეების

- ხიროქოი - მკუთაი უკრაინის პიდროქლორიდი  
 bog - ფრეიკლდინი  
 homegrown - კანაბისი  
 horse - პეროანსი  
 II - პეროანსი  
 ice - მკუთაი უკრაინის პიდროქლორიდი  
 jelly beans - ამუცეპანის სუღუფაი  
 joek - ბეკოლ ან იმხოვგოლ ნიგრაგი  
 joim - კანაბისი  
 juak - პეროანსი  
 kif - კანაბისი  
 killer weed - ფეჩეკლდინი  
 lady - კოკანისი  
 Latin lettuce - კანაბისი  
 laughing gas - ნიგრაგის ოქსიდი  
 Lebanese red - კანაბისი  
 licorice - ოსიკის ნაყენი |  
 itilly - ამსიარისიგალი  
 locker room - ბეკოლ ნიგრაგი  
 lords - მადროქლორიდი  
 loveboat - ფეჩეკლდინი  
 lovely - ფეჩეკლდინი  
 LSD - ლაილილამიდი ლიბერეკანის შეკეპისი  
 ludes - მერეკლდინი  
 maconha - კანაბისი  
 magic mushrooms - ფილოკოინისი  
 magic - ფილოკოინისი ან ფილოკოინი  
 marijuana - კანაბისი  
 Mary Jane - კანაბისი  
 MDMA - ამუცეპანის ან მკუთაი უკრაინის ანალიგი  
 MDMA - ამუცეპანის ან მკუთაი უკრაინის ანალიგი  
 meze - მერეკლდინი  
 meth - მკუთაი უკრაინის პიდროქლორიდი  
 microdot - ლაილილამიდი ლიბერეკანის შეკეპისი  
 Miss Enima - მაროქინი  
 morpho - მორფინი  
 NPPP - მკუთაი უკრაინის ანალიგი  
 NPTP - მკუთაი უკრაინის ანალიგი  
 NI - მაროქინი  
 mud - პეროანსი  
 mushrooms - ფილოკოინისი ან ფილოკოინისი  
 nebbies - პერეკლდინიგალი  
 nitrous - ნიგრაგის ოქსიდი  
 nose candy - კოკანისი  
 orange sunshine - ლიბერეკანის შეკეპისი  
 packs - კოკანისი  
 Panama red - კანაბისი  
 PCE - ფეჩეკლდინის ანალიგი  
 PCP - ფეჩეკლდინი  
 PCPy - ფეჩეკლდინის ანალიგი  
 peace pills - ფეჩეკლდინი  
 peaches - ამუცეპანის სუღუფაი  
 peanuts - ხარბიგრაგი  
 pearly gates - ღლის ელორის ოსიკეპი  
 pearls - მისიგრაგი  
 pep pills - ამუცეპანი  
 Peres - ოქსიკლდინი  
 PG - ოსიკის ნაყენი  
 phenales - ფენობარბიგალი  
 pbno - ფენობარბიგალი  
 plink lady - სკოპარბიგალი  
 plink - სკოპარბიგალი  
 plink wedges - ლიბერეკანის შეკეპისი  
 PMA - ამუცეპანის ან მკუთაი უკრაინის ანალიგი  
 peppers - მისიგრაგი  
 pet - კანაბისი  
 purple hearts - ფენობარბიგალი  
 purple microdot - ლიბერეკანის შეკეპისი  
 rainbows - ამობარბიგალი სკოპარბიგალი  
 red devils - სკოპარბიგალი  
 red dragon - ლიბერეკანის შეკეპისი  
 red - სკოპარბიგალი  
 reds - სკოპარბიგალი  
 reefer - კანაბისი  
 Robby - კოკანისი მუცეკლი ხეღუფის სიწინაილმეკო  
 სკოპარბიგალი  
 rock - კოკანისი ნიბერეკანის  
 rope - კანაბისი  
 roxane - კოკინი  
 rush - ბეკოლ ან ოქსიგრაგი  
 Salmon River Quiver - კანაბისი  
 sands - ლიბერეკანის შეკეპისი  
 schoolboy - კოკანისი მუცეკლი ხეღუფის სიწინაილმეკო  
 სკოპარბიგალი  
 scrubwoman's kick - ნაყენი  
 secky - სკოპარბიგალი  
 shebu - მკუთაი უკრაინის პიდროქლორიდი  
 sisemilla - კანაბისი  
 skag - პეროანსი  
 Skunk Number 1 - კანაბისი  
 sleeping pills - ხარბიგრაგი  
 smack - პეროანსი  
 smoke - კანაბისი  
 snappers - ამსიგრაგი  
 snow - კოკინი  
 snow birds - კოკინი  
 snowflake - კოკინი  
 sopors - მერეკლდინი  
 speedballs - კოკანისი და პეროანის სიმბიგალი  
 speed - ამუცეპანის ან მკუთაი უკრაინის პიდროქლორიდი  
 STP - ამუცეპანის ან მკუთაი უკრაინის ანალიგი  
 strawberry hill - ლიბერეკანის შეკეპისი  
 sugar cubes - ლიბერეკანის შეკეპისი  
 sugar daddy - ამუცეპანი  
 sweat - სკოპარბიგალი  
 synthetic heroin - ფენობარბიგალი ან მკუთაი უკრაინის ანალიგი  
 TCH - კანაბისი  
 TCP - ფეჩეკლდინის ანალიგი  
 tea - კანაბისი  
 Thai - კანაბისი  
 Thai sticks - კანაბისი  
 TMA - ამუცეპანის ან მკუთაი უკრაინის ანალიგი  
 tooles - ამობარბიგალი ან სკოპარბიგალი  
 toot - კოკინი  
 tops - კანაბისი  
 truth serum - სკოპარბიგალი  
 Turkish green - კანაბისი  
 uppers - ამუცეპანი  
 ups - ამუცეპანი  
 updown - კოკინი  
 wakeups - ფეჩეკლდინის სუღუფაი  
 weed - კანაბისი  
 whippets - ნიგრაგის ოქსიდი  
 white lightning - ლიბერეკანის შეკეპისი  
 white - კოკინი  
 whites - ამუცეპანის სუღუფაი  
 white stuff - მაროქინი  
 window panes - ლიბერეკანის შეკეპისი  
 XTC - ამუცეპანის ან მკუთაი უკრაინის ანალიგი  
 yellow beRets - პერეკლდინიგალი  
 yellow dolls - პერეკლდინიგალი  
 yellow jacket - ხარბიგრაგი  
 yellow - ხარბიგრაგი  
 zombie dust - ფეჩეკლდინი







# თავი VI

## ფსიქიატრიული კლასიკური გიგანტობრუნა

- აბაშაი-კონსტანტინოვსკი აბრაამ** Абашаи-Константиновичи А.И. (1902-1977), რუსი ფსიქიატრი. **თბზ:** მიკროკული ღარღვევები შიშოფრენის დროს, 1939; გენის პეროფენი კონტრუბიტი, 1945; ფსიქოპათოლოგია თიუის რეპის სახარეგების დროს, 1973.
- აბრაამივილი თენგიზ** (1934-1995), ქართული ფსიქიატრი. **თბზ:** პროგრესული დამზღის ფსიქოპათოლოგიისათვის, 1966.
- აბულაზივილი გიორგი**, ქართული ფსიქიატრი. **თბზ:** ალკოჰოლიზმის კლინიკა, მიკრონილიზა და საექსიო შრომისა ექსპერტაზა, 1977; სექციო შრომითი ექსპერტაზის საკითხები შიქიერიოი ფსიქიკურს დააქედების დროს, 1962, 1967 (თანაავტ., ბ. ცხომელიძე).
- ადლერი ადლერ** - Adler A. (1870-1937), ავსტრიული ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპეუტი. **თბზ:** სერეული სახათა, 1912; არაფსიქიკის როლი სეფრამში, 1913; ინდივიდუალური ფსიქოლოგის თეორია და პრაქტიკა, 1927; დამასნის ბექების გეგმა, 1928.
- აკერსანს კლადიმერ** - Аккерман И.И. (1890-1972), რუსი ფსიქიატრი. **თბზ:** შიშოფრენის მოქლეობა სასახარადოფსიქიატრიულ კლინიკაში, 1933; პროგრესული შიშოფრენის შიქიერიოი ფორმები და შათი სასახარადოფსიქიატრიული შიშოფრენა, 1933; შიშოფრენის შეფრთხების საკითხისათვის, 1935; პირველადი შიშოფრენული შიშოფრენის შეფრთხობა, 1936.
- ალექსანდროვსკი ანატოლი** - Александровский А.И. (1899-1961), რუსი ფსიქიატრი. **თბზ:** შრომითიურობის შიქიერიოი თეორიული საკითხები, 1923; შიშოფრენული სინდრომი და შიშოფრენა, 1936; შიშოფრენის გენების შიქიერიოი საკითხები, 1936; შიშოფრენის რევიდეტების კლინიკური გარანტები, 1957; შიშოფრენის რევიდეტები და შათი პროფილაქტიკის გეგმა, 1964.
- ალკაიმიზმი ალკაიზმი** - Alzheimer A. (1864-1915), გერმანული ფსიქიატრი, ნეუროპათოლოგი, ნეიროფიზიოლოგი. **თბზ:** პროგრესული დამზღის ადრეული ფორმები, 1896; პიზოლოგიური გამოკლევეები პროგრესული დამზღის დეფრენციულ გრ დიფრენციკაში, 1904; თივის გენის ქერების თივისებური დააქედებისათვის, 1906; შიქიერიოიული აბაგის თივისებური დააქედება, 1911.
- ანდრეი პიროვი** - Андрусов П.К. (1898-1974), რუსი ფიზიოლოგი, ნეიროფიზიოლოგი. **თბზ:** ცენტრისა და პერეფერიის პროფიციები, 1935; პირიბათი რეფლექსის შიოლოგია და ნეიროფიზიოლოგია, 1972.
- ანდრეივილი ბიკოზ** Андрусов И.А. (1852-1930), რუსი ფსიქიატრი. **თბზ:** შიქიელეების ფსიქოფიზიოლოგია, 1896; პერიოდული დაღლილობა, სინდრამიკი, აბათია და პერიოდული ფსიქოზები, 1898.
- ანასიანის შიქილი** (1881-1938), ქართული ფსიქიატრი. **თბზ:** რეპროდუქციული გენელების შთოდი ფსიქიკურიოების მიკრონილიზაში და ფსიქიკურიოების ე.წ. სასიგნალო სიგეგმების როლი, 1926; ფსიქიკურიოების, 1932; გეგმა და შიქილი, 1936.
- ანატოლივილი მიხაილი** Анатольевичи М.И. (1877-1936), რუსი ნეუროპათოლოგი და ფსიქოთერაპეუტი. **თბზ:** შიქიელეებისა ექსპერიის კლინიკური და ექსპერიმენტული-ფსიქოლოგიური გამოკლევეები, 1908; ფსიქოთერაპია და ფსიქიანალიზა, 1928; ნერული დააქედებითა სიხელმძღვანელო, 1939.
- ანს ნარისი** Ачч N. (1871-1946), გერმანული ფსიქოლოგი. **თბზ:** ნება და ამოთენება, 1905; ნიბითი აქტი და ექსპერიმენტი, 1910; პერეფერიაციის სწავლებისათვის, 1926; ნების ანალიზი, 1935.
- ბაშაივილი გიმი**, ქართული ფსიქიატრი, **თბზ:** შიშოფრენა, 1966; ფსიქიატრის საშკერნალო ცნობარი, 1970; სარეკლამა, 1971, 1974; სარეკლამა და მასთან ბრძოლა, 1981.
- ბაილი ანტონი** Bayle A. (1799-1858), ფრანგი ფსიქიატრი და პათოლოგანათომი. **თბზ:** გამოკლევეები სულით ავანსიციების შესახებ, 1822; აბადი სწავლება სულით ავანსიციების შესახებ, 1825; გრაქტატი გენისისა და შათი ავანსიციის დააქედების შესახებ, 1826; ლექსები ფსიქიატრიაში, 1858.
- ბენიკოვივილი ბიანი** (1884-1974), ქართული ფიზიოლოგი. **თბზ:** კენტოფენისა და ნერული სისეკმის შიქიელე უბათოლოგია, 1940, 1948, 1955, 1997; ნერული და ფსიქიკური შიქიელეების ძირითადი ფორმები, 1947; შიქიელეები დასახარის ბექების შესახებ საქართველოში ძველი დროიდან შიქიელეები საქუნებლუ, 1957; უბალღის ხერხეშლიან ცხოველის სერეული რევიდეტის რევიდეტის ნერული შექანისებების შესახებ, 1959; უბალღის ხერხეშლიან ცხოველთა ქუევის სერეული რევიდეტის შესახებ, 1961; ხერხეშლიან ცხოველთა შექიერება, შათი დაბათოთება და წარმოშობა, 1968; და სხუ.
- ბენიკოვივილი ალექსანდრე** - Бенковский А.И. (1870-1922), რუსი ფსიქიატრი. **თბზ:** სულით ავანსიციოთა ფსიქოლოგიური გარეკლეები, კლინიკური ხერხები, 1911; კლინიკური ლექსები სულით დააქედებებზე, 1912.
- ბენიკოვივილი კლადიმერ** - Бенковский К. რუსი ფსიქიატრი. **თბზ:** ალკოჰოლიზმის ნოზოლოგიკული ფორმები, 1986.



- განსერი ზმპსერ** Ganser S. J. M. (1853-1931), გერმანელი ფსიქიატრი. **ოხა**: ცნობიერების ისტერიული დარღვევის ერთი ფორმის შესახებ, 1898; ცნობიერების ისტერიული დარღვევების სწავლების შესახებ, 1904.
- გაუპი რაიხერტ** - Gaupp R. (1870-1953), გერმანელი ფსიქიატრი. **ოხა**: ლეუსმინია, 1901; პარანოალი წინაგამწყობის შესახებ, 1910; ისტერიის ცნების შესახებ, 1911; მასობრივი შეკვლეობების ფსიქოლოგიის შესახებ; მასწავლებლები დაბნეული დასრულებადი, 1914; ვაგნერის შემთხვევა, 1920.
- გაბრიელ რებინე** Габриел Т. А. (1875-1955), რუსი ფსიქიატრი. **ოხა**: ალექსანდრის დაჯილდების შესახებ, 1912; პრუსიულენი ფსიქიკების საკითხების შესახებ, 1925; ფსიქოპათიის სიმპტომოლოგიური დასაბუთების შესახებ, 1930.
- გაიშინგოვიჩი ალექსანდრე** - Гайшингович А. И. (1882-1958), რუსი ნევროპათოლოგი და ნევრომორფოლოგი. **ოხა**: მახვილებელთა ახემური ფსიქოზების სისჯების შესახებ, აგრეთველი ქრებთი თავის გვისში, 1916 (თანაავტ. ქ. ვაგნერის).
- გაიშინგოვიჩი ალექსანდრე** - Гайшингович А. И. (?-1920), რუსი ფსიქიატრი. **ოხა**: ეპილეფია, 1917 (თანაავტ. პ. სარაჯშილას); ეპილეფიის მილატისტიკური მკურნალობის მეთოდური მოძღვრები სპიხი, 1927.
- გაიშინგოვიჩი ალექსანდრე** - Гайшингович А. И. (1876-1959), რუსი ფსიქიატრი. **ოხა**: მესიერების დარღვევების გენეზის შესახებ კონსტრუქციის სამკომოთა კომპლექსის დროს, 1909; ფსიქიკური ცვლილებების შესახებ პარანოიკიანი გოისის დროს და მისთანა კემბრში, 1920; მსავალი ფსიქოზების ინტეგრირ მუწავლადი, 1921; ფსიქიატრია, 1931; ფსიქიატრია, ძალი და ახალი პრობლემები, 1946; სწავლება პალეოკინატიების შესახებ, 1949; რჩეული შრომები, 1973.
- გალაჩივიჩი ალექსანდრე** - Галахович А. А. (1898-1972), რუსი ფსიქიატრი. **ოხა**: შიშოფრენია, 1965.
- გამბატიანი ვაჰან** (1903-1988), ქართველი ფსიქიატრი. **ოხა**: შიშოფრენიის ინსულბნობიერება, 1950; ქრონიკული ალკოჰოლიზმის ფსიქიოტრიატია, 1963.
- გამბატიანი ალექსანდრე** - Гамбагани А. А. (?-1920), რუსი ფსიქიატრი. **ოხა**: სული დაავადების სიმულაცია და პათოლოგიური თერაპიისკება, 1894; გრძილვადური მოლის ფსიქოლოგია, 1912.
- გამბატიანი ვაჰან** - Гамбани В. А. (1885-1953), რუსი ფსიქიატრი. **ოხა**: მესიერების დარღვევების შესახებ, 1935; შეცვლელის ვარეულის და გუეხეუების ხანდროში, 1940; დიენცეფალიოპათიური ფსიქოზები პერსიადული მსახლარებათი, 1941.
- გაიშინგოვიჩი ვარან** - Гайшингович В. А. (1897-1964), რუსი ფსიქიატრი. **ოხა**: ფსიქიკური ანალიზები სწავლე თეორეტიკის და ინტელექტუალის დროს და სწავლება ევზოგენური გაის რეაქციების შესახებ, 1941; ცნობილებში ბარანოვიჩი გაიშინგოვიჩი ფსიქიკების შიგნითი სიმპტომის აღმსუქება, 1957; ფსიქიკური ანალიზების შესახებ თანამედროვე დაავადებების დროს, 1961.
- გაიშინგოვიჩი კარლ** - Goldstein K. (1878-1956), გერმანელი ფსიქიატრი, ნევროპათოლოგი და ფსიქოლოგი. **ოხა**: ლოკალიზაცია თავის გენის ქერქში, 1910; გენის დაავადებები, 1925; ავბანი, 1927; შიშის ფსიქიკების შესახებ, 1929; შიშოფრენია, 1938; კონტრეული და აბსტრაქტული ქიქია, 1941; შიოლოლოგიური მიღობა ბარანოვიჩის შიშოფრენიული დარღვევის მუწავლადში, 1944; მუგეველება და მუგეველებითი დარღვევები, 1948.
- გაიშინგოვიჩი ვარან** (1896-1954), ქართველი ფსიქიატრი. **ოხა**: Callaisis ფსიქიოტრიატიაში, 1929; ფსიქიკური ვაგნერისკებათი, 1929; ფსიქიკური და ბარანოვიჩი სრულ და ფსიქოლოგიკულ დაავადებები, 1929.
- გარსი იოსებ** - Grasset J. (1849-1919), ფრანგი ნევროპათოლოგი და ფსიქიატრი. **ოხა**: სული დაავადებების ლოკალიზაცია, 1878; სრულვადი ცენტრების კლინიკური ანატომია, 1900.
- გარსიანიანი ვიქტორ** - Гисгарин В. (1817-1868), გერმანელი ფსიქიატრი. **ოხა**: ფსიქიკური დაავადებების პათოლოგია და თერაპია, 1845.
- გარსიანიანი ვიქტორ** - Grubbe H. W. (1880-1958), გერმანელი ფსიქიატრი. **ოხა**: ფსიქიატრია ექსპიბისიუსი, 1918; ფსიქიკური ავადებების და ხისხლის ხანარიალი, 1923; შიშოფრენიის ფსიქოლოგია, 1929 (თანაავტ. ზერეხე); შიშოფრენიის ფსიქიკოპათოლოგია, 1932; შიშოფრენიის თეორია, 1932; დემსციის პრობლემა, 1932; სარკევი ფსიქიატრიაში, 1937; თეორიკულიკებათი, 1940.
- გარსიანიანი ვიქტორ** - Гисгарин В. О. (1878-1953), რუსი ფსიქიატრი. **ოხა**: ეპილეფიური შემლილობის დიფერენციული დაავადების შესახებ, 1912; ფსიქიკოპათიური ეპილეფიოლოგიური მდგომარეობების შესახებ და მათი გამოსევა ეპილეფიისათებ, 1913; ბავშვთა ასაკის ფსიქიკოპათოლოგია, 1927; ფსიქიატრიის სახელმძღვანელო, 1929 (თანაავტ. ზარეხე); ასაკის ფსიქიკური ანალიზების ენციკლოპიკის დროს, 1940; სრულვადი და ფსიქიკური დარღვევები თავის ქლასის დახვრული გრავემების დროს, 1948; ფსიქიატრია, 1949.
- დუჟინიანი იულია** - Dejerine J. J. (1849-1917), ფრანგი ფსიქიატრი, ნევროპათოლოგი და ფსიქოთერაპევტი. **ოხა**: ფსიქიკურიკების უნებლბნებები და მათი მკურნალობა ფსიქოთერაპიით, 1910 (თანაავტ. ვიკლერი).
- დუჟინიანი იულია** - Дюжинян Ю. Ю. (1898-1973), რუსი ფსიქიატრი. **ოხა**: დანარება ფსიქიკური ავადებების მკურნალობაში, 1943; ნევროზების და ფსიქოზების მკურნალობა, 1955; ფსიქოზები და ფსიქიკური ანალიზები ფსიქიკური ენციკლოპიკის დროს, 1960.
- დუჟინიანი იულია** - Dubois P. (1848-1918), შვეიცარიელი ნევროპათოლოგი, ფსიქიატრი და ფსიქოთერაპევტი. **ოხა**: ფსიქიკურიკების და მათი ფსიქიკური მკურნალობა, 1904.
- დუჟინიანი იულია** - Dupre E. (1862-1921), ფრანგი ფსიქიატრი. **ოხა**: განსაკვირვებული ფსიქიკოპათოლოგიური ხანდრობა ფსიქიკური მკურნალობაში, 1903; სერეკოპათიები, 1907 (თანაავტ. კამუ); წარმოსახვის და ფსიქიკური პათოლოგია, 1925.
- დიდუჟინიანი ანტონ** - Дидухинян А. Г. (1897-1968), რუსი ფსიქიატრი. **ოხა**: შიშოფრენიის გამოსავალი მკურნალობები, 1938; ს. ს. კორსაკოვა, 1948; ნახევარსაკურონიანი ფსიქიკური ცვლილებები და სიმულაცია, 1948.
- დიდუჟინიანი ანტონ** - Ewald G. (1888-1963), გერმანელი ფსიქიატრი. **ოხა**: გემპერამენტი და ხანათი, 1924.
- დიდუჟინიანი ანტონ** - Ey H. (1900-1977), ფრანგი ფსიქიატრი. **ოხა**: პალეოკინეტი და მოლეა, 1934; ვაქსონის დანასაკური კონსტრუქციის პრინციპების გამოვლენების ცდა ნევროფსიქიატრიაში, 1938 (თანაავტ. რეიარი); ფსიქიატრული ენციკლეპია, 1946-1954; სხვამსღვანელო ფსიქიატრიაში, 1960 (თანაავტ. ზერნარი და ბრისე); ცნობიერების შესახებ, 1963; პალეოკინეტიკის შესახებ, 1965; ვაქსონის იდეებიდან ფსიქიატრიაში თრანსლაციონის მკურნალებს, 1975.
- დიდუჟინიანი ანტონ** - Edoardo C. (1876-1931), ავსტრიული ნევროპათოლოგი და ფსიქიატრი. **ოხა**: ლეიარეული ენციკლოპიკა, 1917; ახალი ლეიარეული ენციკლოპიკის შესახებ, 1917; სუბქრონიული ლეიარეული ენციკლოპიკა, 1920; ძალი, 1925; ძილის პათოლოგია, 1926; შიშოფრენიის ავბანის თავის გენის ქერქის ციგოპიკეტიკონია, 1926.



**კანაბიბი ოზრი** Kanabibi Ozi (1872-1939), რუსი ფსიქიკარი, ფსიქოთერაპევტი. ომხ.ა. ციკლოთიმია, ისრა ხანკოპოლიტი და მიმდინარეობა, 1914; ფსიქოთერაპია, 1914; ფსიქოქინეზიკის მკვნიდალობა, 1926; ფსიქიკარის სკოლა, 1929.

**კანდოხიძე ვიმტორ** Kanadokhidi V. (1849-1889), რუსი ფსიქიკარი. ომხ.ა. სიკოლოგიური აღიარებულ ფსიქოლოგიური ეტიკლება, 1881; თანამედროვე შინაში, 1882; ფსევდოპალეონიკების შესახებ, 1890; შერვახვადობის საკითხის შესახებ, 1890.

**კანტორი-ლიბინი ნიკოლოზ** - Kantor-Libinski (1901-1969), რუსი ფსიქიკარი. ომხ.ა. ფსიქოგენეზი, 1967; სამედიცინო ფსიქოლოგია, 1971.

**კანინსკი ანტონ** - Karpinski A. (1918-1972), პოლონელი ფსიქიკარი. ომხ.ა. შიშოფრენია, 1972; ცხოვრების რაიში, 1972; მლანქოლო, 1974; ნეკროზების ფსიქოპათოლოგია, 1972; შიში, 1975.

**კანინსკი ილია** - Karpinski I. (1907-1965), რუსი ფსიქიკარი. ომხ.ა. შერვაე შიშოფრენია, 1949; ლექსები ფსიქიკარიაში, 1955; ფსიქიკარია, 1958 (თანაავტ. ე. შიშოვი, ა. სიქსეციკი და ნ. ობერეციკი); ფსიქოპათოლოგია და პათოლოგიური განვითარების დინამიკა, 1965; რჩეული შრომები, 1971.

**კლიბერტ კარლ** - Kleiber K. (1879-1960), გერმანელი ფსიქიკარი. ომხ.ა. სულით ავალქყოფთა ფსიქოპათოლოგიური დაზარების გამოკვლევა, 1908; ინტელექტური პარანოია, 1913; ფსიქოზების ინტელექციონალური და პათოლოგიური ფორმების შესახებ, 1920; დეპრესიის ავტოქონიური ფსიქოზები, 1921; თანამედროვე მსლმდინარეები ფსიქიკარიაში, 1924; ეპიზოდური ბინდისებური მდლოინარეები, 1926; გენის პათოლოგია, 1934; გრატულია, 1943.

**კლემანტე გავტანო** - Clerambault G. (1872-1934), ფრანგი ფსიქიკარი. ომხ.ა. ვრძინალი ბოლუა, 1921; ფსიქოზები ავტოქონიური და კლემანტე, 1927; ფსიქიკური ავტოქონიზმი, 1927; ავტოქონიის როლი ქრისტიკული პალეოპათოლოგიური ფსიქოზების აღმოცენებაში, 1927; ქრონიკული პალეონიკური ფსიქოზები, 1931; ფსიქიკარული შრომები, 1942.

**კლოდი პერი** Claude H. (1869-1945), ფრანგი ფსიქიკარი. ომხ.ა. ნაღრევი ტუპისეგობა და შიშოფრენია, 1926; შიშოფრენიის და პალეონიკების, 1932 (თანაავტ. ა. ვი); პალეონიკების, ფსევდოპალეონიკების და ომსისები, 1932 (თანაავტ. ა. ვი).

**კონოლი ჯორჯ** - Conolly J. (1794-1866), ინგლისელი ფსიქიკარი. ომხ.ა. ცხოვრების მდლოინარეობის შესახებ მსლმდინარეობის და მდლანქოლოს დროს, 1821; სულით ავალქყოფთა მკვნიდალობა მქესნიკური მსლმდინარეების გრევი, 1846.

**კონრად კონრად** - Conrad K. (1905-1961), გერმანელი ფსიქიკარი და ნეკროპათოლოგი. ომხ.ა. მქესნიკური ფსიქოპათოლოგია, 1937; ქრონიკული გრატული პალეონიკები, 1954 (თანაავტ. ნ. გენსი); ქრისტიკული გრატული პალეონიკების პრობლემისტიკა, 1955; საქყის შიშოფრენია, 1958.

**კონსტანტინე სიმონ** - Konstantin S. (1890-1950), რუსი ფსიქიკარი და ფსიქოთერაპევტი. ომხ.ა. ნეკროზების შინაშიაი თერაპიის შესახებ, 1927; სანაგროველი მეთოდის შესახებ, 1927; შიშოფრენიაში პათოლოგიური და პათოლოგიური შერვახვადობის შრომითი თერაპიის შესახებ, 1930; საკითხის დამსა ფსიქოთერაპიის გრატულიკული თერაპიის შესახებ, 1930; ფსიქოთერაპია შიშოფრენიის დროს, 1935; შიშოფრენიის იპოქონიკური ფორმა, 1936, 1938 (თანაავტ. ს. ხარბაკი და ე. ოქუნევი); შიშოფრენია ავტოგენეზობით, 1937 (თანაავტ. ს. ხარბაკი და ე. ოქუნევი); პათოლოგიური ფსიქოთერაპიის გამოკვლევა, 1959.

**კონსტანტინე კლემენტ** - Konstantin K. (1836-1902), რუსი ნეკროპათოლოგი და ფსიქიკარი. ომხ.ა. აუქია და შიშოფრენიის გრატულიკური ფორმა, 1874; სრული სრულიკანი და ფსიქიკარია, 1883; სრული სრულიკანი კრისტიკული, 1889; პალეონიკური დაზარების შესახებ, 1892; კრატულიკული ფსიქიკის განსაკუთრებული ხახე, 1894; სრულიკული და პალეონიკური ფსიქიკური მდლოინარეობის გრატულიკების შესახებ, 1895.

**კონსტანტინე სიმონ** - Konstantin S. (1854-1900), რუსი ფსიქიკარი. ომხ.ა. შერვახვადობის საკითხის შესახებ, 1887; ქრისტიკური ეტიკრატულიკების შიშოფრენია შერვახვადობით ნეკროზების დროს, 1889; მსლმდინარეების ავტოქონიური დაზარებების და შიშოფრენიის, 1890; შერვახვადობის მქვევი ფორმების საკითხის შესახებ, 1891; ფსიქიკარის კრისტიკული, 1893; შერვახვადობის ფსიქოპათოლოგიისათვის, 1894.

**კოტარდი ვილი** - Cotard J. (1840-1887), ფრანგი ფსიქიკარი და ნეკროპათოლოგი. ომხ.ა. გენის დაავადება, 1890. **კრატელიკი ვინსენტი** - Krappelin E. (1885-1951), რუსი ფსიქიკარი. ომხ.ა. შიშოფრენიის დაზარების თანამედროვე მკვნიდალობა, 1925; ფსიქოგენეზის შესახებ, 1929; ფსიქოპათოლოგიის დინამიკისა და ცვლადობის პრობლემები, 1949; რჩეული შრომები, 1960.

**კრამერ-მებინგ რისტარ** - Krafft-Ebing R. (1840-1902), გერმანელი ფსიქიკარი. ომხ.ა. ფსიქიკარის სახლმდინარეული, 1869; სიქყიკული ფსიქოპათოლოგია, 1886; სანამართლო ფსიქოპათოლოგია, 1892.

**კრამპელიკი ვინსენტი** - Krappelin E. (1856-1926), გერმანელი ფსიქიკარი. ომხ.ა. ფსიქიკარია, 1910-1915; ფსიქიკური დაავადებების გრატულიკების ფორმების შესახებ, 1920; შერვახვადობის ფსიქიკარული კლინიკები, 1921.

**კრამპელიკი ვინსენტი** - Krappelin E. (1888-1964), გერმანელი ფსიქიკარი, ფსიქოლოგი და ფსიქოთერაპევტი. ომხ.ა. დამსჯელიკების სენსიტივიტი ბოლუა, 1918; აღნაგობა და ხანითაი, 1921; სამედიცინო ფსიქოლოგია, 1922; ომსისების შესახებ, 1923; ფსიქოთერაპიული გამოკვლევა, 1949.

**კრამელიკი ვინსენტი** - Krappelin E. (1879-1939), რუსი ნეკროპათოლოგი. ომხ.ა. პარანოიური დაზარებების კლინიკისა და კრამელიკური დაავადების კლინიკის, 1911; გონური რეველუციები პიქოპათოლოგიის დროს, 1927; ნეკროპათოლოგიური სინდრომი, 1933; სრულიკული სრულიკანობის სინდრომი, 1939 (თანაავტ. შ. შერვახვადობის და ნ. კრამელიკის); მართალი ნეკროპათოლოგიური სინდრომი, 1966 (თანაავტ. ე. ვილროვა).

**კუე ვინსენტი** - Coue E. (1857-1926), ფრანგი ფსიქოთერაპევტი. ომხ.ა. შიში მეთოდი, ავტოქონიკული მთავრადებების თანამედროვეობა, 1923; ომსისების შესახებ, რა ვევიკეთ, 1926; ომსისების შესახებ, რა მთავრად, 1926; თანამედროვეობის სკოლა ქრისტიკულიკული თანამედროვეობის გრატულიკების, 1938.

**კუსსმაული კუსსმაული** - Kussmaul A. (1822-1902), გერმანელი ექიმი. ომხ.ა. სრულიკანობის დაავადების შესახებ, 1874; მსლმდინარეების დინამიკა, 1885.

**ლასეგი ვინსენტი-შარლ** - Lasague E. Ch. (1816-1883), ფრანგი თერაპევტი, ნეკროპათოლოგი და ფსიქიკარი. ომხ.ა. სიქყიკული ეტიკლება სულით დაავადების შესახებ, 1844-1845; მართალი მკვნიდალობა, 1846-1847.

- ლაჩინაძის ამონადირი** (1922-1999). ქართველი ნევროპათოლოგი. **ობზ.** კრის ტრეფლექციის დინამიკის პოეტიკური სარკობა. 1957.
- ლაპინსკის ბერი** - Липинский М.С. (1895-1980). რუსი ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი და ფსიქოთერაპევტი. **ობზ.** მკვლევარობით დარღვევის საკითხისათვის შიშობურებით დაავადებულებში. 1938; აფრია, აფრია, აზრასია, 1941; ფსიქოთერაპიის ნარკოტიკები, 1959, 1970; შესავალი სამედიცინო ფსიქოლოგიაში, 1960 (თანაავტ. ვ. შაიხმეიჯი).
- ლანცეტისი ალბერტი** - Ланцетти А.Л. (1903-1979), რუსი ფსიქოლოგი. **ობზ.** სტიხორების განვითარება. 1931; ბავშვთა ფსიქოლოგიის ნარკოტიკები, 1950; ფიქციის განვითარების პრობლემები, 1959; მიღწევა, ცნობიერება, სინთეზი, 1973.
- ლაჰმეისი ჯეზ** Lhermitte J. (1877-1959), ფრანგი ნევროპათოლოგი, ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი. **ობზ.** სურვილით წარმოშობის დარღვევა და აზრასია, 1925; ფსიქოლოგიის ბიოლოგიური საფუძვლები, 1928; მუცლის წილი, 1929; ენა და მკვლევარობა, 1938.
- ლიპინსკი ნაუმ** - Липинский Н.М. (1919-1983), რუსი ფსიქიატრი. **ობზ.** ალკოჰოლიზმის სოციალური და კლინიკური პრობლემები, 1975 (თანაავტ. ვ. ბარბაკი); კვლის ვადვიან ფსიქოპათოლოგიაში, 1979 (თანაავტ. თ. ფრ.ქოსი).
- ლიპინსკი ლიპი** Liepmann H. (1863-1925), გერმანელი ფსიქიატრი, ნევროპათოლოგი. **ობზ.** ალკოჰოლური დელირიუსი და ხელფერბრუნე მექანიზმი ალკოჰოლით მიხრობის დროს, 1895; ადვია ჯონათან [შრომებისათვის მრავალმხრივად აღნიშნა], 1904; შრატხის დარღვევების შესახებ, 1905; მოკირული აფრია და აზრასია, 1913; აზრასია, 1921.
- ლიონი პლენტი** - Лион А.Г. რუსი ფსიქიატრი. **ობზ.** შიშობილი ნარკოლოგია, 1991.
- ლომბროსო ლომბროსო** - Lombroso C. (1835-1909), იტალიელი ფსიქიატრი და კრანოსალუსტი. **ობზ.** მკვლევარების ენოლოგია მკვლევარებში დასაძინების შესახებ, 1892; ვენალთა და შენობობა, 1895.
- ლენინი ალექსანდრე** - Ленин А.П. (1902-1977), რუსი ფსიქოლოგი. **ობზ.** გრაველი აფრია, 1947; წერის ფსიქოლოგიის ნარკოტიკები, 1950; აღნიშნის უმადლები ქერული ფურცლები, 1962; აღნიშნის გუნთა და ფსიქოლოგიური პროცესები, 1963-1970; მუხბორების სენოფსიქოლოგია, 1973; ნეროფსიქოლოგიის საფუძვლები, 1973.
- ლენინი ბრიჯინი** - Ленин В.А. (1874-1944), რუსი თერაპევტი. **ობზ.** ექსი და შიშობილი თრავირების მკვლევარი დაავადების ფსიქოტიკები, 1928; დაავადების შიშობილი სურათი და ატროფიული დაავადებები, 1935.
- ლენინსკი ბერი** - Мазуркiewicz J. (1871-1947), პოლონელი ფსიქიატრი. **ობზ.** შიშის დარღვევები, 1901; ექსიკლავირენი აფრია, 1901; გუნთის მუხბორებითა შიშობილის შიშობობა, 1913; ფსიქიის და შიშის დარღვევების ატროფიული სურათები, 1918; ენოტიკური სურული ხსენება და ფსიქიკური ანდოლოგია, 1925; ფსიქიკური ენოტიკების დოკუმენტა, 1945; შესავალი სინთაურ ფსიქოპათოლოგიაში, 1959; მსკავალი პათოლოგიური ფსიქოპათოლოგიაში, 1958.
- მაიერი ბლერი** - Mayer A. (1866-1959), ავსტრიელი ფსიქიატრი. **ობზ.** რეველი შრობები, 1930-1952; ფსიქოლოგია, 1957.
- მაიერი-ბერი პილერი** - Mayer-Gross W. (1894-1961), გერმანელი ფსიქიატრი. **ობზ.** პათოლოგიური ენოტიკების ექსიქილოგია, 1914; შიშობილის სინთაურ მდგომარეობების ფსიქიპათოლოგიისათვის, 1921; შიშობილი დაავადებების პრობლემებისათვის, 1922; ათვის გუნთის თრავირული დაავადებების მკვლევარის სინთაურის შესახებ, 1932; ნიქოტიკური აფრია, 1963-1970; მუხბორების დროს მუდგობის დევქციის საკითხისათვის, 1936; არტოტიკოლოგიაში, სენილური და პრეპილური ფსიქიკები, 1944; 60 წელს გავიდავებულ ავადმყოფთა ენოტიკური კვლევის შედეგები, 1945; კლინიკური ფსიქიატრია, 1954 (თანაავტ. ვ. სლავიკი და მ. როტი).
- მაინერი მილერი** - Meinerth Th. (1833-1892), ავსტრიელი ფსიქიატრი. **ობზ.** შენობობის მკვლევარი (პალეონოტიკური) გუნთები და მათი მამდინარეობა, 1881; ფსიქიატრია. წინა გუნთის დაავადების კლინიკა, დამარჯული მიხ აღნიშობამ, განსაკუთრებულ და კვებამ, 1884; კლინიკური ფსიქიკები ფსიქიატრიაში, 1890.
- მაინერი ამონადირი** (1911-1990), ქართველი ფსიქიატრი. **ობზ.** შიშობილი გოქიკოსის შესახებ, 1961; ნარკოტიკები, 1964; ალკოჰოლიზმი და გოქიკოსი, 1971.
- მალინსკი ბერი**, ქართველი ნევროპათოლოგი. **ობზ.** კლინიკური ნევროლოგიის განმარტების ლექსიკონი, 1969 (თანაავტ. თ. ლენიკი, მ. შაიხმეიჯი, ე. მიხეიმილი, ვ. ჯანაბანი); ათვის გუნთის მკვლევარი ბარბაგი, 1968; იაქტივობის სინთის ურდლების მქსიკომპეგენია სინთისა და სურული სინთის დაავადებების დროს, 1990 (თანაავტ. ვ. ვერტიკი).
- მალინსკი ბერი** - Малинов Н.В. (1903-1971), რუსი ფსიქიატრი. **ობზ.** ენოტიკური გუნთის რეველები შიშობილი აფრიალის დროს, 1935; შიშობილი აფრიალის მედეგები და პრობლემები ფსიქოტიკების თრავირების აფრიალის მოკვლევარებისათვის, 1941; განსაკუთრებული შიშობილობის ფსიქიკური დაავადების კლინიკა და თრავირა, 1956, 1959; კლინიკური ფსიქიატრის ავადმყოფური საკითხები, 1971.
- მაგანი ვი** - Magain V. (1835-1915), ფრანგი ფსიქიატრი. **ობზ.** ალკოჰოლიზმის ექსიქიპეტილი და კლინიკური ფსიქოლოგია, 1871; ალკოჰოლიზმი, ალკოჰოლი და დელირიუსის ფორმები და მათი მკურნალობა, 1874; კლინიკური ექსიქიპეტილი ფსიქიკური დაავადების შესახებ, 1890.
- მაიუსი ბერი** - Mobius P.J. (1853-1907), ცერმანელი ნევროპათოლოგი და ფსიქიატრი. **ობზ.** ნევროლოგიური შრობები, 1894; სურული ავადმყოფების მკურნალობა და მათთვის სამკურნალო დაწესებულების თრავირებისათვის, 1896; ქალის ფსიქოლოგიური კვებისათვის შესახებ, 1900.
- მედუნა ლადისკი** - Medina L.J. (1896-1964), ესპანელი წარმოშობის ამერიკელი ფსიქიატრი. **ობზ.** მკვლევარის სინთაურილოგია, 1927; ენოტიკების სინთაურილოგია, 1932; შიშობილის კონველსური თრავირა, 1938; შიშობილისათვის მათიკონველსური კონველსი, 1845; თრავირებისათვის, 1950.
- მელინიკი ბერი** - Мелиник Л. В. (1899-1979), რუსი ფსიქიატრი. **ობზ.** შრომათრავირა და შრომათა მოქმეობა ფსიქიატრული დაზიანების თრავირებისათვის სინთაში, 1939; შიშობილის დროს დევქციის მკვლევარი შიშობილებისათვის აღნიშნა, 1941; ფსიქიკური ავადმყოფის შრომათა მოქმეობის შესახებლის მართობი კლინიკური მკვლევარი, 1947; კლინიკური პათოფიზიოლოგიური დაზიანების საკითხისათვის ათვის გუნთის ანუ სურული გრავების მკურნალობის სინთაურილოგია, 1959; შიშობილის დროს შრომათრავირებისათვის შრომათის კლინიკური სურულილოგია, 1963.
- მედიკონი ბერი** (1905-1968), ქართველი ფსიქიატრი. **ობზ.** ენოტიკური-სინთური სინთის მკვლევარი ათავიკონველსური შიშობილობის დროს, 1948; შიშობი, 1958; ძილი, სინთი და შიშობილი მკვლევარობა, 1958; სინთი ახათიანი, 1952; ფსიქოლოგია, 1958.
- მელინიკი ბერი** - Мелиник И.И. (188-1908), რუსი ფსიქიატრი. **ობზ.** მკვლევარი ავადმყოფთა კლინიკური ექსიქიპეტილი, 1879.

- პროსტრუქციის მონიშვნა** ქართული ფსიქიატრი. **ახლა** ეპსლეების მიკრონალიზისა და პრეპროცესის საკითხები. 1962; ბავშვთა ფსიქოლოგიის საკითხები. 1975; ბავშვთა ფსიქიატრიის აქტუალური საკითხები. 1977.
- პროსტრუქციის მონიშვნა** - Монахов А.И. (1893-1973), რუსი ფსიქიატრი, ფსიქიატრიკული და ფსიქოლოგი.
- ახლა** - ადამიანის ფსიქიკური თავებუებებები, ხასიათი, ენაობა, 1957-1960 (თანაავტ. ა. კოპოლოვი); მარაყენებ და სეროტონინი, 1960; შერეული სიმპტომური ფსიქოლოგიაში, 1966 (თანაავტ. მ. ლევიტსკისი).
- პროსტრუქციის მონიშვნა** (1911-1985), ქართული ნეურნოლოგი. **ახლა** - მისიერ ქორეოლენისა და მიკრონალიზის საკითხობათვის, 1942; წის დაქვეა, 1949; ალკოჰოლიზმის შესახებ, 1956; სერეული დაავადებები, 1976, 1984; ნეურნოლოგია, 1977; გრავიტი ეპსლეების, 1980 (თანაავტ. ა. მოსიქი თავის გენიის მსებრე და დაველდობა, 1954 (თანაავტ. ა. მოსიქი თავის გენიის გრავიტი და მისიერები, 1960 (თანაავტ. ა. მოსიქი ნეურნოლოგია, 1970 (თანაავტ. ა. მოსიქი სერეული სიმპტომების განვიკვლივის მეთოდები და შიდად სემპლოვია, 1964 (თანაავტ. ა. მოსიქი პერსონული სერეული სიმპტომების განვიკვლივის მეთოდები, დამიანების სემპლოვია და გონიკური დავნისიკა, 1966 (თანაავტ. ა. მოსიქი ეპსლეების სერეული სიმპტომების დამიანების სემპლოვია და გონიკური დავნისიკა, 1965, 1985 (თანაავტ. ა. მოსიქი სერეული სიმპტომების დამიანების სემპლოვია და გონიკური დავნისიკა, 1956 (თანაავტ. ა. მოსიქი).
- პროსტრუქციის მონიშვნა** - Монахов А.И. (1897-1966), მოსკოვული ფსიქიატრი. **ახლა** - შიშოფრენის ფორმები და მისი მიკრონალიზი, 1948; მალარიული სერეული ფსიქიკური ანალიზობები, 1953; ქრონიკული ალკოჰოლიზმი, 1959 (თანაავტ. ა. ნახალკისი); ვანკოლიტური ფსიქიატრიის სარევივები, 1962.
- პროსტრუქციის მონიშვნა** - Monakov С. (1853-1930), რუსი წარმართის მედიკინული ნეურნოლოგი, ანარქიზმი და ეპსლეები. **ახლა** - გენიური პათოლოგია, 1905; თავის გენიში ლოკალიზაცია და კნობიანი დამიანების დანის ეპსლეები დამიანები, 1914; პათოლოგიური შესაბამისი ნეურნოლოგიაში და ფსიქიატრიის შესწავლაში, 1930.
- პროსტრუქციის მონიშვნა** - Moniz A.C. (1894-1955), პორტუგალიელი ფსიქიატრი, ნეურნოლოგი, სურსათქონებელი. **ახლა** - სექსუალური ცხოვრება, 1901; სამხრეთი სეროლოგია, 1917; სერეული დაავადებითა კლასიკა, 1925; აბიკვი გართა და პანკოპიისი სიკვდილი, 1925; თავის გენიის სამხრეთების დავნისიკა ანტიკონსერვატიული მეთოდით, 1931; მათემატიკური ფორმისი თანაკრავიული მიკრონალიზობი ქვა, 1936; იურებრული ანტიკონსერვატიული მეთოდითა და ეპსლეობათა, 1940.
- პროსტრუქციის მონიშვნა** - Morel B. (1809-1872), ფრანგი ფსიქიატრი. **ახლა** - გრავიტი სული დაავადებულთა შესახებ, 1859.
- პროსტრუქციის მონიშვნა** - Morrell E. (1852-1929), იტალიელი ფსიქიატრი. **ახლა** - სემპლოვიაში, 1881; დამიანობათობა და კოპოლოვი, 1886; სიმპტომული ფსიქიკური დაავადებების სემპლოვია შესახებ, 1894.
- პროსტრუქციის მონიშვნა** (1908-1968), ქართული ფსიქიატრი. **ახლა** - სიმპტომური მუდამილობა, 1960; ფსიქიატრიის განმარტება ლექსიკონი, 1977 (თანაავტ. ბ. სენაი); ფსიქიატრია, 1955, 1961 (თანაავტ. ა. კობახიანი).
- პროსტრუქციის მონიშვნა** (1920-1993), ქართული ფსიქიატრი. **ახლა** - თავის გენიის პათოლოგიკული საკითხები, 1946; ფსიქიატრიის საკითხები, 1966; მისიერ სერეული დაავადებები, 1982 (თანაავტ. ა. გუბანი და სხვ.); ლათინი და ალკოჰოლიზმი, 1988.
- პროსტრუქციის მონიშვნა**, ქართული ნეურნოლოგი. **ახლა** - კლასიკური ნეურნოლოგია, 1997 (თანაავტ. რ. ხაჯა, ეპსლეობათა).
- პროსტრუქციის მონიშვნა** - Neumann H. (1814-1884), გერმანელი ფსიქიატრი. **ახლა** - ფსიქიატრიის სიმპტომული, 1859.
- პროსტრუქციის მონიშვნა** - Nonne A. (1861-1959), გერმანელი ნეურნოლოგი. **ახლა** - ლექსიკონი ფრანკული განვიკვლივის ეპსლეობათა, ლექსი დაავადებულებში და სერეული სიმპტომების ფუნქციური და მორფული დაავადებების დანისიკა, 1907; სიმპტომი და სერეული სიმპტომები, 1924.
- პროსტრუქციის მონიშვნა** - Ортман И.И. (1894-1955), რუსი ფსიქიატრი. **ახლა** - ბავშვები და მოზარდების მათემატიკის შესახებ, 1928; მსგავსადამიანული ბავშვები, ქრონიკული დამიანობის ბავშვებისა და მათემატიკის, 1932; ბავშვთა მათის ფსიქიატრიული, 1938; ფსიქიატრია, 1958 (თანაავტ. კონსიკიცი, ე. კობახი და ა. სიმეიკისი).
- პროსტრუქციის მონიშვნა** - Oppenheim H. (1858-1919), გერმანელი ნეურნოლოგი და ფსიქიატრიკული. **ახლა** - სერეული სიმპტომების სიმპტომული, 1894; წერილები სერეულ ავადობებს, 1908; ერთი თავისებური კონსიკიცი დაავადების შესახებ ბავშვთა და მოზარდთა მათემატიკა, 1911.
- პროსტრუქციის მონიშვნა** - Ортман И.И. (1871-1947), რუსი ფსიქიატრი. **ახლა** - კლასიკური კავადობა, 1907; სული დაავადების სერეული სიმპტომები, 1941 (თანაავტ. ვროსიკი); ეპსლეების სერეული კლასიკური, 1931.
- პროსტრუქციის მონიშვნა** - Ортинсон А.А. (1868-1949), რუსი ფსიქიატრი. **ახლა** - შიშის ფორმები, 1911; ამიციკისი კლასიკობათა, 1925.
- პროსტრუქციის მონიშვნა** - Ортинсон А.А. (1844-1908), რუსი თერაპევტი. **ახლა** - კლასიკური ლექსიკონი, 1884-1885.
- პროსტრუქციის მონიშვნა** - Ортинсон И.И. (1849-1936), რუსი ფიზიოლოგი. **ახლა** - სიმპტომული სრული კონსიკიცი, 1951-1952.
- პროსტრუქციის მონიშვნა** - Parkinson J. (1755-1824), ინგლისელი ექიმი. **ახლა** - ნარკოტიკული დამიანის შესახებ, 1817.
- პროსტრუქციის მონიშვნა** - Penfield W. (1891-1976), კანადელი ნეურნოლოგი და ნეიროქირურგი. **ახლა** - ეპსლეობა და კონსიკიცი ლექსიკონი, 1941 (თანაავტ. ვროსიკი); ეპსლეობა და თავის გენიის ფუნქციური დავნისიკა, 1954 (თანაავტ. ვროსიკი); სიმპტომები და გენიური მათემატიკა, 1959 (თანაავტ. ვროსიკი).
- პროსტრუქციის მონიშვნა** - Икурякин А.А. (1889-1960), რუსი ფსიქიატრი. **ახლა** - მალარიული ფსიქიატრია, 1923; შესაბამისი ფუნქციონალი და მისი დამიანობები, 1927; მათემატიკა, 1944; ნარკოტიკული სიმპტომების დამიანობის შესახებ, 1957.
- პროსტრუქციის მონიშვნა** - Икурякин И.И. (1924-1970), გერმანელი ფსიქიატრი. **ახლა** - ავადობების შესახებ სერეული სიმპტომების დამიანობის სემპლოვია, 1956; სემპლოვია სერეული ფსიქიატრიის შესახებ, 1958; მათემატიკული დამიანობა, 1960; ხანმოკლე ფსიქოლოგიის პრობლემები, 1964; ფსიქიატრული სერეული დამიანობის შესახებ და ფსიქიკური განვიკვლივაობა, 1966.
- პროსტრუქციის მონიშვნა** - Икурякин И.И. რუსი ფსიქიატრი. **ახლა** - ალკოჰოლიზმის კლასიკა, 1973 (თანაავტ. ა. კობახიანი); კლასიკური ნარკოლოგია, 1975; ალკოჰოლის ბოროტი განვიკვლივის და ალკოჰოლიზმის სემპლოვია სერეული, 1988; ნარკოზიზმი, 1994.





- ხუბინი სანდო** - Хубин С.А. (1867-1915), რუსი ფოთბურთე. **თბზ.** სულთა დაჯილდებების სერიატიკა და დაჯილდების, 1914-1915; პათოლოგიური ხანძარი, 1912; სულთა დაჯილდებები, 1914.
- ხუბინი პეტრო** - Хубин П.К. (1891-1951), რუსი ფოთბურთე. **თბზ.** შიშოვრების კლასიკა ბავშვებსა და მოზარდებს, 1937; კლასიკური ლექციები ბავშვთა ასაკის ფოთბურთეში, 1940, 1955, 1959, 1965; ლექციები ბავშვთა ასაკის ფოთბურთეში (ბავშვთა თავი), 1974.
- ხუბინი რეზინო** (1887-1950), ქართველი ფოთბურთე. **თბზ.** ბავშვის ფოთბურთე, 1947; განწყობის ფოთბურთის ფიზიოლოგიური საფუძვლები, 1961; ფოთბურთეში გამოკვლევები, 1966.
- ხუბინი ნიკოლაი** - Хубин Н.С. (1904-1971), ბელარუსელი ფოთბურთე და ნეკროპათოლოგი. **თბზ.** აგრესიული ფოთბურთის შესახებ, 1961 (თანაავტ. ვ. თინიოვი); სიმპტომური ფოთბურთე, 1963.
- ხუბინი ვასილი** - Хубин В.К. (1921-1981), რუსი ფოთბურთე. **თბზ.** პალეონომიების ნეკროპათოლოგია და ქალაქის ფოთბურთის საფუძვლები, 1969; ბავშვთა ფოთბურთე, 1973; დამხმარე ხისულმსდენელი ხამუდის ფოთბურთეში, 1976 (თანაავტ. ნ. დავისონა); წარმოსახვის პარანომალური ქალაქის ფოთბურთის შესახებ პარანომალური მდგომარეობების დრო, 1976; მოსამდრე ნერვულ-ფოთბურთე და რეფლექტი, 1978.
- ხუბინი პეტრო** - Хубин П.А. (1875-1942), რუსი ფოთბურთე. **თბზ.** თხილქაბა კრებულ, 1945-1951.
- ხუბინი ვასილი** - Furet J.-P. (1794-1870), ფრანგი ფოთბურთე. **თბზ.** ფოთბურთე დაჯილდებები, 1838; ბილი, 1939; კარკულიანი მემდლობა, რეალურ ფოთბურთე დაჯილდების ფორმა მანასა და მუდამისთვის აღკვეთილური უკლასი, 1851.
- ხუბინი ვოტი** - Vogt O. (1870-1959), გერმანელი ნერვული სისტემის პათოლოგი, ნეკროპათოლოგი, ფოთბურთე, ფოთბურთეტიკი. **თბზ.** დიდი გვირის ქერქის დაჯილდებები გომბურთის, პათოლოგია და პათოანატომიკური კლასი, 1922 (თანაავტ. ვ. ყოვტი).
- ხუბინი ვასილი** - Forel A. (1848-1931), შვეიცარიელი ფოთბურთე და ნეკროპათოლოგი. **თბზ.** მუხურთა და მისი პათოლოგია, 1885; პარანომალური, 1889; გვირ და სული, 1894; ნერვულური სარკომა, 1905.
- ხუბინი ფრედი** - Freud S. (1856-1939), ავსტრიელი ნეკროპათოლოგი, ფოთბურთე, ფოთბურთეტიკი. **თბზ.** კრებულნი სიგურის შესახებ, 1895 (თანაავტ. შრომერი); სიმბოლოები განმარტება, 1900; ყოველდღიური ცხოვრების ფოთბურთეტიკა, 1904; მახვილურთა და მისი დამოკლებულნი არანომალური, 1905; გოგონა და გოგონა, 1913; ლექციები ფოთბურთის შესახებ (ფოთბურთეტიკა), 1917; „სუ“ და „სუ“, 1923.
- ხუბინი ნიკოლაი** - Хубин Н.И. (1902-1078), რუსი ფოთბურთე. **თბზ.** მასალა ფოთბურთის კლასიკური კლასიკური საკონსტრუქციის, 1936; ფოთბურთეტიკური გერმანიოლოგია, 1939; რეალური ფოთბურთე დაჯილდების შესახებ ლექციური კურსი, 1950; სახელმწიფო ავღანი ფოთბურთეში, 1963 (თანაავტ. ვ. ვინიკოვი); ფოთბურთეტიკა, კრებულნი და სქემები, 1978 (თანაავტ. ვ. ვინიკოვი და ი. მუხურტი).
- ხუბინი ვასილი** (1921-1998), ქართველი ნეკროპათოლოგი. **თბზ.** ფოთბურთეტიკა, 1963 (თანაავტ. ა. ვინიკოვი).
- ხუბინი ვასილი** (1889-1966), ქართველი ნეკროპათოლოგი. **თბზ.** ნეკროპათოლოგიის სახელმწიფო, 1931, 1936, 1941, 1944, 1949, 1953, 1956; ფოთბურთეტიკის კურსი, 1934; ნეკრო ფოთბურთეტიკის კურსი, 1937; ფოთბურთეტიკური ინტეგრირება, 1948; ბავშვთა დამბლა (პათოლოგია) და მასთან პრევენცია, 1950; ნეკროპათოლოგია, 1956 (თანაავტ. ნ. ქავთარაძე).
- ხუბინი ხარკოვი** (1887-1953), ქართველი ნეკროპათოლოგი. **თბზ.** ნერვების სხეულები ხიმამისოლოგია, 1931, 1933; ნერვული სისტემის სხეულები, 1941; ნერვული სხეულები, 1961 (თანაავტ. ა. რუხაძე).
- ხუბინი ვასილი** (1912-1966), ქართველი ფოთბურთე. **თბზ.** ფოთბურთე (სახელმწიფო), 1955, 1961 (თანაავტ. ვ. ხარკოვი); ფოთბურთეტიკა, 1963 (თანაავტ. ნ. ქავთარაძე).
- ხუბინი შაროტი** - Charcot J.M. (1825-1893), ფრანგი ნეკროპათოლოგი. **თბზ.** კლინიკური ლექციები, 1872-1892.
- ხუბინი ვასილი** (1912-1966), ქართველი ნეკროპათოლოგი. **თბზ.** ფოთბურთეტიკური კურსი თაყის გვირის ხიმამისოლოგია დაჯილდების დროს, 1986 (თანაავტ. ვ. კახაშვილი, ვ. შრომერი).
- ხუბინი ვასილი** - Хубин В.А. (1878-1946), რუსი ფოთბურთე. **თბზ.** პარანომალური ანომალიების შესახებ, 1930; დაჯილდებულ რეპეტელების შესახებ, 1935; დემენციის ცნების ანალიზი, 1937; სპალიტიკური ანომალიების შესახებ ფოთბურთე დაჯილდებების დროს, 1937.
- ხუბინი შაილი** - Schilder P. (1886-1940), ავსტრიელი წარმოსახვის ანომალიური ფოთბურთე, **თბზ.** პარანომალური ფოთბურთეტიკური ფოთბურთეში, 1928; გვირ და პრევენცია, 1931; ანალიზი სხეულის სიყრდელი, 1935; ფოთბურთეტიკა, 1938.
- ხუბინი ვასილი** - Хубин В.А. (1906-1976), ბელარუსელი ფოთბურთე. **თბზ.** ნეკროპათოლოგია და მემდლობა, 1938; კლასიკური ფოთბურთე, 1956; ავსტრიული და განმარტებული ფოთბურთეტიკა, 1965.
- ხუბინი ვასილი** - Хубин В.А. (1901-1961), რუსი ფოთბურთე. **თბზ.** ნეკროპათოლოგიური სიმპტომები თაყის საფუძვლის წილების დამხმარების დროს, 1940; თმის პერიოდის ნერვული და ფოთბურთე დაჯილდებები, 1948; ნერვული პათოლოგია და ფოთბურთე, 1949.
- ხუბინი ვასილი** - Schneider K. (1887-1967), გერმანელი ფოთბურთე. **თბზ.** ფოთბურთეტიკური პრევენცია, 1923; მხარული რეალური ფოთბურთეტიკაში, 1928; კლინიკური ფოთბურთეტიკა, 1931; ფოთბურთეტიკური დაჯილდებები და ფოთბურთეტიკური დაჯილდებები, 1939.
- ხუბინი ვასილი** - Horan A.I. (1913-1967), რუსი ფოთბურთე და ფოთბურთეტიკი. **თბზ.** ნერვულ-ფოთბურთე დაჯილდებების ფიზიოლოგიური-ანატომიკური გამოკვლევების პრინციპები და მეთოდები, 1960; ფოთბურთეტიკური ანალიზი და ფიზიოლოგიური-ანატომიკური გამოკვლევების მნიშვნელობა თაყის გვირის კერძო დაჯილდებების შესახებ, 1964; კონსტრუქციული დარღვევების შესახებ შიშოვრების და თაყის გვირის სინხმარულიანი დაჯილდებების დროს, 1965; კონსტრუქციული მოქმედების ფოთბურთეტიკის შესახებ, 1966; ფოთბურთეტიკური პრევენცია და პარანომალური ფოთბურთეტიკური მემდლობა, 1966.
- ხუბინი შპეტი** - Speit K. (1899-1970), პოლონელი ფოთბურთე. **თბზ.** სიმპტომები ანომალიური ფოთბურთეტიკის ჯგუფი, 1949; პათოლოგიური ანომალია, 1956; ფოთბურთეტიკური დაჯილდების სიმულაცია და დინამიკა, 1957; ნაშრომულიანი ინტერპრეტაციის დამხმარე შიშოვრების კლინიკაში, 1958.



## თავი VII

### ენციკლოპედიები მოყვანილ ავტორთა ჩამონათვალი

- აბულაშვილი გ. 442.  
 აბრაშაშვილი თ. 442.  
 ამხარაშვილი ა. 338.  
 ასათიანი მ. 47, 371, 442.  
 ბეგაშვილი გ. 371, 442.  
 ბეჟანიშვილი ბ. 338, 425.  
 ბერიტაშვილი ა. 442.  
 ბოსტოლიანაშვილი ნ. 443.  
 ბუღალაია ი. 150, 338, 371, 443.  
 გაბაშვილი ვ. 443.  
 გაბაიანი ა. 443  
 გამყრელიძე ა. 25, 33, 71, 137.  
 გამყრელიძე შ. 68, 72, 79, 111, 113, 119, 322, 338, 357, 367, 371, 395, 443.  
 გობრონიძე ე. 67, 164, 356, 361, 371, 444.  
 გოცარიძე ა. 40, 87, 166, 371, 444.  
 გელაძე თ. 74, 350, 444.  
 დარჩია ნ. 173.  
 ელაია ე. 272.  
 ენუქიძე ს. 49.  
 ექვაშვილი ნ. 92.  
 ზოიძე ა. 445.  
 ზურაბაშვილი ა. 49, 147, 154, 164, 195, 259, 328, 371, 382, 433, 445.  
 ზურაბაშვილი ზაგ. 173.  
 ზურაბაშვილი ზურ. 63.  
 ზურაბაშვილი ე. 68.  
 თარხნიშვილი ა. 299.  
 თევზაძე დ. 349.  
 თაყაიშვილი ვ. 150, 371.  
 კავთაძე ე. 25.  
 კაშაურა ტ. 349.  
 კაკაბაძე ა. 371.  
 კანდელიანი ა. 236.  
 კაშია ვ. 113.  
 კონტრძე ფ. 49, 371.  
 ლაზარაშვილი ვ. 323.  
 ლაჭყვიანი ა. 446.  
 მაკარიძე ა. 371, 447.  
 მალაშვილი ა. 447.  
 მაშარაშვილი ა. 371.  
 მენთეშვილი ა. 16, 154, 361, 371, 384, 447.  
 მესტაშვილი მ. 338, 371, 382, 447.  
 მესხი რ. 371.  
 მინდაძე ა. 296, 448.  
 მიქელაძე ლ. 248.  
 მოსიძე ა. 74.  
 ნაკაშიძე ე. 110, 279, 322, 361, 371, 448.  
 ნანუაშვილი ბ. 371, 448.  
 ნინუა ნ. 449.  
 რუხაძე ნ. 150, 395.  
 საგანელი ა. 371.  
 საგანელი ნ. 371, 449.  
 სარაჯიშვილი ბ. 449  
 სენა ბ. 164.  
 სილაგაძე თ. 395.  
 უზნაძე დ. 81, 89, 157, 337, 338, 450.  
 ქავთარაძე ნ. 450.  
 ქავთარაძე ბ. 450.  
 ყიფშიძე ს. 31, 450.  
 ყუბანიშვილი ა. 108, 259, 356, 450.  
 შაქარიშვილი რ. 450.  
 შენგელაია გ. 110, 371, 382.  
 ჩხეიძე ნ. 71, 371.  
 ჩხენკელი ს. 350.  
 ჩხიკვიანი ი. 451  
 ციციშვილი შ. 113, 363.  
 წოწორია მ. 164.  
 წულაძე ს. 338.  
 ჭიათავა თ. 371, 395.  
 ხანანაშვილი მ. 237, 403.  
 ჯიმშელაშვილი ვ. 352.  
 Абаншв-Константиновский А. П. 9, 105, 248, 442.  
 Абрамович Г. В. 248.  
 Аируцкий Г. Я. 15, 50, 133, 160, 254, 306, 328.  
 Аккерман В. И. 198,  
 Александрова Л. А. 198.  
 Александровский А. В. 24, 284.  
 Александровский Ю. А. 24, 442.  
 Амбрумова А. Г. 37, 79, 386.  
 Аменицкий Л. А. 155.  
 Аносов П. П. 434.  
 Анохин П. К. 40, 43, 253, 442.  
 Анохина И. П. 63.  
 Анфимов Я. А. 45, 48, 442.  
 Анфимов В. Я. 76.  
 Ангер И. М. 238.  
 Аристов Р. А. 66, 305.  
 Архангельский Г. В. 73.  
 Астахов С. П. 381.  
 Аствацатуров М. И. 49, 127, 209, 442.  
 Ачкаш М. 311, 349.  
 Бабенкова С. В. 56.  
 Бажиц Е. Ф. 50.  
 Баканова Л. П. 286.  
 Балинский И. М. 57, 73.

- Башников В.М. 25,248.  
 Баряк С.Ю. 382.  
 Барышев В.В. 249.  
 Баскин Ф.В. 350.  
 Бахур В.Т. 411.  
 Башина В.М. 59,73.  
 Беляк И.И. 286.  
 Белевская П.Я. 52.  
 Белен Б.С. 380,385.  
 Белен Г.С. 59.  
 Бернштейн А.П. 60,246, 442.  
 Берштейн Г.И. 131.  
 Беспалко И.Г. 286.  
 Бестель Э. 442.  
 Бехтерев В.М. 39,61,72, 257, 258,270,318,411, 422,442.  
 Бирман Б.Р. 63.  
 Бирюкович П.В. 63,270, 298,307,369.  
 Блейсер В.М. 22,49,64,68, 108,139,140,151,164, 167,203,246,258,273, 300,313,369,389,425.  
 Блюмина М.Г. 222.  
 Бобрюва И.П. 143.  
 Боголюбов П.К. 50,66,305, 360,443.  
 Богомолец А.А. 66.  
 Божнов С. 303,338.  
 Бокон С.П. 140,203.  
 Болдырев А.И. 188,248.  
 Борисов И.В. 203.  
 Борляк Т.А. 195.  
 Боткин С.П. 73,253.  
 Болджиев М. 311.  
 Брагин Р.В. 228.  
 Бродский Ф.И. 75.  
 Брусилловский Л.С. 224.  
 Бруханский Н.П. 175,274.  
 Булатов П.К. 76.  
 Булахова Л.А. 76.  
 Буль Н.И. 76,381.  
 Бунев А.П. 68,154,238, 258.  
 Бурлачук Л.Ф. 273,286.  
 Бурно М.Е. 76,286.  
 Бухановский А.О.  
 Бунин М.И. 74,76,201,274, 379.  
 Вартанов М.Е. 139,382.  
 Васильченко Г.С. 199,263, 334.  
 Вассерман М.А. 299.  
 Владенский И.П. 80,154, 274.  
 Владенский Н.И. 139,445.  
 Вейн А.М. 196,236,422.  
 Вейн Э.С. 258.  
 Веселовский И.З. 61,140.  
 Вертоградова О.П. 67,72, 259.  
 Виш И.М. 61,143.  
 Волин Р.Я. 328.  
 Волыерг И.Е. 143.  
 Воробьев С.П. 143.  
 Воронков Г.Л. 9,51,143, 394.  
 Воруков В.А. 107.  
 Вроно М.Ш. 51,143,175, 299,381,382.  
 Выготский Л.С. 55, 142, 445.  
 Гаккебуш В.М. 78, 443.  
 Гаккебуш П. 443.  
 Гаккель Л.Б. 49.  
 Гашунович П.Б. 51,70,81, 111,119,126,137,154, 182,183,257,279,315, 353,366,368,395,402.  
 Гаржави Н.Т. 82.  
 Гейер Т.А. 78,444.  
 Гейманович А.И. 78,83,444.  
 Георгиев И. 303,338.  
 Гербацкий В.К. 425.  
 Ги.тронский В.А. 68,70,85, 107,154,255,301,353, 382,385,409,412,444.  
 Гиндикин В.Я. 265,266, 272,334,366,367.  
 Глазов В.А. 86,398,444.  
 Голосев А.А. 86,303,444.  
 Голант Р.Я. 86,93,358, 409,444.  
 Гольденберг М.А. 86,390, 424,444.  
 Гордова Т.И. 84,305.  
 Горник В.М. 131,224.  
 Грейсер А.Е. 87.  
 Григорьев Э.Т. 88,410.  
 Громов С.А. 130.  
 Гулимов М.Г. 16,72,88,89, 270,299,300,409,410, 414.  
 Гурев А. 155.  
 Гуренич М.О. 50,79,93,99, 107,129,132,213,282, 312,367,396,444.  
 Гуронит И.Я. 93,133.  
 Гурьша В.А. 265,266,366, 367.  
 Гуськов П.С. 346,417.  
 Лавилов И.В. 248.  
 Давыловский И.В. 253, 304.  
 Дворкина П.Я. 196, 358, 362.  
 Дезюжов В.В. 164.  
 Деметриева Н.Ф. 72.  
 Досаггиков В.Ф. 110,113.  
 Детенгов Ф.Ф. 113,129, 444.  
 Джалисти А. 301.  
 Доброхотова Т.А. 306.  
 Друбижев Ю.З. 369.  
 Дружинина Т.А. 185,411.  
 Дубровский К.М. 121.  
 Дукаевский В.В. 331.  
 Е.пазиев Л.М. 207,384.  
 Ефимов С.Ф. 130.  
 Жабленский А. 386.  
 Жариков Н. 449.  
 Желиховский С.М. 301.  
 Жислин С.Г. 10,28,29,32, 36,37,48,101,103,257, 275,301,305,449.  
 Жмуров В.А. 39,81,299, 334,353,368.  
 Замишиская Л.И. 22,145, 151,255,300,305.  
 Замишиский И.Я. 22,52, 145,222,272,351,382, 445.  
 Займов К. 19,99,145,280.  
 Заиров Г.К. 81.  
 Закинд Э.М. 414.  
 Залиман Г.И. 304,357.  
 Заченицкий Р.А. 216.  
 Зейгарник Б.Р. 18,49,146, 191,445.  
 Зеневич Г.В. 61,268,321.  
 Зиновьев П.М. 206.  
 Иванец Н.Н. 33.  
 Иванов В. 157.  
 Иванов И.Ш. 157,200,279, 445.  
 Иванов Ф.И. 356.  
 Иванов-Смоленский А.Г. 48,49,76,157,253.

- Пиктова А.Я. 157.  
 Пиктова Л. 361.  
 Пимерман К. Л. 274.  
 Писенко П.М. 165.  
 Пожен П. 143,162,302.  
 Норданов Н. 162.  
 Нойлов М. 303,338.  
 Кабанов А.М. 99,151,166,  
 241,277,278.  
 Каран В.Е. 51,166.  
 Каванина Л.А. 120.  
 Каванина П.П. 167,308.  
 Кавита П.К. 425.  
 Каменица Е.П. 66,72,146,  
 167.  
 Кандинский В.Х. 68,155,  
 168,353,446.  
 Канев В.В. 176,177.  
 Кашабин Ю.В. 112,125,  
 164,168,211,445.  
 Кашторощин П.В. 25,154,  
 169,446.  
 Каранджеев С.И. 169.  
 Карагазарский Б.Д. 184,236,  
 238,251,373.  
 Каратаев Е.В. 130.  
 Касаткин В.И. 413.  
 Качаев А.К. 222.  
 Кербиков О.В. 81,172,173,  
 188,270,279, 334,366, 446.  
 Кичигас Г.И. 71.  
 Кирякова З.А. 85.  
 Кирюк К. 326.  
 Климан М.П. 175.  
 Кошачев В.В. 177,236,237,  
 267,279,280,281,329,  
 387.  
 Коган Я.М. 259.  
 Кожевников А.Я. 185,377,  
 446.  
 Колдун Т.А. 329.  
 Коконкарова А. 179,416.  
 Кол Н.М. 351.  
 Колпачков П.И. 19,200.  
 Коношатов П.В. 118.  
 Консторум С.И. 51,98,183,  
 382,446.  
 Кошелоу В.А. 185,411.  
 Кошловский А.Д. 31.  
 Косыг П.Я. 177.  
 Коркина М.В. 108,117,185, 302.  
 Короленко П.П. 248.  
 Коротченко А.И. 366.  
 Корсаков С.С. 30,52,116, 140  
 185,379,446.  
 Красик Е.Д. 192.  
 Краснов В.П. 39,188,298.  
 Краснушкин Е.К. 70,94,  
 154,188,268,369,395, 446.  
 Крестников П. 189.  
 Кроль М.Б. 46,191,446.  
 Кронфельд А.С. 191.  
 Крутецкий В.Ф. 164.  
 Крук И.В. 108,164,313,187  
 Кулинов А.И. 66,167.  
 Кудринев И.А. 313.  
 Кузнецов М.Т. 192,415.  
 Куимов Д.Т. 192.  
 Кутиковский Л.С. 29.  
 Курашев С.В. 207,384.  
 Куршев В.А. 128.  
 Кутанин М.П. 178, 193.  
 Кушенок Б.М. 235,301.  
 Лаурецкая Э.Ф. 194,300.  
 Лазурский А.Ф. 76,150.  
 Лакосина П.Д. 265.  
 Ларионов В.П. 143.  
 Лебедева Н.Д. 329.  
 Лебединский М.С. 195,196,  
 403,447.  
 Левитов В.М. 196,352.  
 Леонтьев А.П. 197,253,447.  
 Либих С.С. 61,85,198,268, 321.  
 Ливинцев Н.М. 85.  
 Лишниц С.М. 351,356,385,  
 447.  
 Лийметс Х.И. 39.  
 Лионгер С.А. 168.  
 Лисицин Ю.П. 73.  
 Лихтенштейн Е.И. 130,200.  
 Личко А.Е. 43,54,114,190,  
 200,209,279,309,323,  
 328,358,362,367,385, 447.  
 Лозанов Г. 380.  
 Лукачев Г.Я. 222.  
 Лукомский И.И. 379.  
 Лулев Д.К. 434.  
 Лушанин В.М. 175.  
 Лурин А.Р. 46,49,52,125,  
 142,200,202,203,253,313,  
 447.  
 Лурин Р.А. 94,447.  
 Малкин П.Ф. 206,306,447.  
 Маргулис Г. 79.  
 Матвеев В.Ф. 239.  
 Меграбин А.А. 53,89,108,  
 185,210,217,360.  
 Мелехов Д.Е. 309, 385,386,  
 447.  
 Мельников Ю.В. 286.  
 Мельничук П.В. 336.  
 Мерлин В.С. 266.  
 Мержеевский И.П. 131,212  
 224,447.  
 Мирзухин И.А. 351,356.  
 Милев В. 217,356,409,412.  
 Милор Л.С. 218.  
 Миrowsкий К.И. 388.  
 Молохов А.П. 221,248,280,  
 360,384,448.  
 Молчанова Е.К. 383.  
 Морозов В.М. 222,293,305.  
 Морозов Г.В. 33,79,95,220,  
 222,399.  
 Москаленко В.Д. 45,84,382  
 Мохов Л.А. 387.  
 Мулк Э. 124.  
 Муртазов М.С. 422.  
 Мучник Л.С. 224.  
 Милков И.Ф. 423.  
 Мисицев В.П. 184,216,238,  
 266,364,403,448.  
 Наджаров Р.А. 143,235,  
 367,383,385.  
 Надточий А.А. 249.  
 Нарбутович И.О. 409.  
 Насонов Б.А. 235,301.  
 Нелюрова Т.А. 369.  
 Нелуца А.А. 50,160.  
 Немлихер Л.Я. 170.  
 Немчин Т.А. 327.  
 Николаев Ю.С. 67,81,242.  
 Николаева И.И. 61.  
 Нумер Ю.Г. 108,114,115  
 Омарова П. 45.  
 Оганесян В.О. 360.  
 Озерский П.И. 246,448.  
 Озерниковский Л.С. 85,93,  
 125,246.  
 Окунца Э.Г. 382.

- Озбинов В.П. 18,50,79,119,  
251,300,352,448.  
 Осташков П.А. 18,61,251,  
270,300,301,448.  
 Осташевская Н.Т. 249.  
 Остроглазов В.К. 313.  
 Остроумов А.А. 251,448.  
 Остроумова М.П. 114.  
 Павликов И.П. 40,160,185,  
237,253,267,315,328,  
339,448.  
 Папугин Л. 255,299.  
 Папугинская Г.И. 380,385.  
 Паниндолюков Т.Ф. 67,72,  
112,259,360,364,425.  
 Перлюмайский В.Б. 262.  
 Перельман А.А. 258,261,  
385,386,448.  
 Перельмуттер М.М. 261.  
 Петелин Л. 421.  
 Петрякович П. 448.  
 Петров М.И. 192.  
 Петрова Л.С. 259.  
 Пинас С.П. 317.  
 Писагонов К.И. 115,266,  
268,449.  
 Писнев Д.Д. 110,268,395.  
 Пискунов А.И. 268.  
 Подлинкова С.П. 52,53,257  
269.  
 Подланинский А.С. 164.  
 Полищук И.А. 63,270,449.  
 Полищук Ю.И. 81.  
 Подгайский В.Т. 270.  
 Попов Е.А. 270,298,408,  
415,449.  
 Попова С.П. 304,357.  
 Портнов А.А. 26,270,309.  
 Посыпский П.Б. 334,351.  
 Потанов А.И. 192.  
 Протопопов В.П. 253,274,  
313,449.  
 Прохорова И.С. 133.  
 Пугачикова И.Н. 26,134,  
231,263,270,312,417,448.  
 Ракин И.Г. 276,411,449.  
 Радолюнский И.Я. 276,311,  
449.  
 Райчев И. 45.  
 Рамуль К.А. 203.  
 Рапопорт А.М. 276.  
 Рачев И. 167,195,335.  
 Решеток А.Д. 281,413.  
 Решетник Ю.А. 199.  
 Рижов И.В. 130.  
 Роговин М.С. 241.  
 Рожнова М.А. 351.  
 Рожнов В.Е. 286,351.  
 Ромащенко В.А. 70.  
 Роман А.С. 286,295.  
 Россомимо Г.И. 286.  
 Рубинштейн С.Г. 49,104,  
161,185,191,214,266,273.  
 Руднев В.И. 286,353.  
 Румищев Г.Г. 146.  
 Рушкенич Е.А. 55.  
 Рыбалский М.И. 88,213,  
284,353,409,412,413,  
414,415,449.  
 Саарма Ю.М. 288,326.  
 Сахаров А.С. 142.  
 Сидлов А.М. 116,216,236,  
237,243,294,295,325,  
335,350,359,373,391,392.  
 Сегаль Ю.Е. 85.  
 Семенов С.П. 412.  
 Семичов С.Б. 94.  
 Семке В.Я. 114,207,219,  
403,404.  
 Серьбский В.П. 53,293,449.  
 Серейский М.Я. 130,293,  
386,449.  
 Сеченов И.М. 378.  
 Сидоров П.И. 177.  
 Сидоров С.С. 414.  
 Симанов С.С. 89.  
 Симонов П.В. 293.  
 Симон Т.П. 247,449.  
 Симицин В.И. 67.  
 Скворцова Б.К. 196.  
 Славина Л.С. 169.  
 Случевский И.Ф. 45,107,  
305,317,449.  
 Случевский Ф.И. 18.  
 Смирнов В.М. 24,224,300,  
317.  
 Смулевич А.Б. 68,328,367,  
385.  
 Слежневский А.В. 52,66,  
107,108,168,184,303,  
317,318,385,386,393.  
 Соколов Е.Т. 219,273.  
 Соколов-Эмилианский И.М.  
169.  
 Сорокина Т.Т. 110,369.  
 Станиславский К.С. 146.  
 Станкушев Т. 306.  
 Стоиценов И. 167,195,335.  
 Стоябин Л.Г. 46.  
 Стрельчук И.В. 28,35,66,  
312,449.  
 Стрибман К.И. 322.  
 Стужкин В.Д. 331.  
 Сумбасев И.С. 72.  
 Суханов С.А. 68,99,137,  
282,324,367,413,449.  
 Сухаревский Л.М. 303.  
 Сухарев Г.Е. 162,238,  
307,324,367,382,385,449.  
 Сырд Ю.Г. 39.  
 Таницкая М.Д. 326.  
 Тарасов Ю.К. 222.  
 Тарханов И.Р. 150.  
 Ташев Т. 308,309,311,  
327,346.  
 Ташинков В.А. 199.  
 Телешкицкий М.Э. 327.  
 Тененицкая Г.И. 282.  
 Тенюв Б.М. 191.  
 Тиганов А.С. 171,384.  
 Тичков И. 326.  
 Тимкофеев П.Н. 329,424.  
 Тоим К.Ю. 39.  
 Точнев В.А. 115.  
 Турова З.Г. 274.  
 Узунов Г. 303,338,450.  
 Ухтомский А.А. 339,450.  
 Ушаков Г.К. 238,278,339,  
410,412,415,450.  
 Федотов Д.Д. 164.  
 Фелинская Н.И. 154,173,  
220,383.  
 Фотынов М.И. 260.  
 Фрейеров О.Ф. 28.  
 Фридман Б.Л. 94.  
 Фрумкин Я.П. 52,164,222,  
246,259,272,281,305,351,

- 353,356,382,413, 450.  
 Хайлова П.М. 336.  
 Халицкий А.М. 259.  
 Халин Ю. I.389.  
 Харитонов Р.А. 50.  
 Хвильовицкий Т.И. 306,  
 357,404.  
 Хестин П.И. 48.  
 Хорощко В.К. 366.  
 Хохлов А.И. 336.  
 Хутик В.А. 64.  
 Целибаев Б.А. 358.  
 Цыбулькова М.Я. 175,  
 380,385.  
 Черешневич А.Т. 139.  
 Чиж В.Ф. 347,392,451.  
 Числов А.С. 49,253.  
 Чолаков К. 392.  
 Чуриков А.М. 343.  
 Шанько Г.Г. 336.  
 Шапошиков А.М. 198.  
 Шахматов П.Ф. 414.  
 Шахматова-Шаполюк И.В.  
 259,360.  
 Швабман Е.А. 154,303,342,  
 378,450.  
 Шерешневский П.А. 379.  
 Шикаренко И.И. 387.  
 Шиковенский П.С. 128,  
 132,155,219,387,450.  
 Шкловский В.М. 121.  
 Шварцман А.С. 86,450.  
 Шмидт Е.В. 434.  
 Шнейдер В.Г. 248.  
 Шодам А.И. 307,388,350.  
 Штерман Л.В. 389.  
 Штерберг Д.Я. 82,129,  
 143,159,300,362,363,  
 372,383,389,390,393,  
 413,451.  
 Шумков Г.Е. 391.  
 Шумский П.Г. 169, 207,  
 362,384.  
 Шербак А.Е. 185,391,412,  
 451.  
 Эдлингс И.Р. 95,123,311.  
 Эдельштейн А.О. 79,107,  
 124,444.  
 Эппин Г. 444.  
 Эпштейн А. I. 133,422,445
- Юдин Т.И. 70,164,272,  
 383,445.  
 Яковлева Е.К. 216.  
 Яронский А.И. 47,154.  
 Яхно П.И. 422.  
 Aarskog D. 251  
 Abadie J. 9,47.  
 Abely P. 9, 301  
 Abram H.S. 86.  
 Ach K. 55 442.  
 Achard E.CH. 55  
 d'Acosta J. 22.  
 Adams B.D. 39,60.  
 Adams R. 31,221.  
 Addison Th. 14.  
 Adler A. 14,46,180,239,  
 241,442.  
 Ahlenstiel H. 23,411.  
 Ajuriaguerra J.46,300,310  
 Albrecht F. 23,259.  
 Albright F. 308.  
 Alexander F. 369.  
 Alexander G. 413.  
 Alexander W.S. 24.  
 Allan J. 23.  
 d'Allon R. 36,269.  
 Allsop J. 30  
 Alpers B. J. 36.  
 Mc'Alpine D. 197.  
 Alzheimer A. 37,242,414,  
 442.  
 Amen E. 120.  
 Amthauer R. 39.  
 Angelman H. 129.  
 Angst J. 198, 360.  
 Anton G. 45, 162, 195.  
 Apert E. 23,45.  
 Appelt F. 243.  
 Ara k. 326.  
 Arakawa T. 46.  
 Argyll Robertson D. 47.  
 Arnold O.H. 47,360.  
 Aschaffenburg G. 55.  
 Aschner 55  
 Asher M. 219.  
 Asperger H. 49,51.  
 Aström K.E. 49.  
 Athanassio A. 20.  
 Austin 164.  
 Babinski J. 14, 45,49,56,  
 118,170,268.  
 Baelz E. 42, 59.  
 Baillarger J. 57,412.  
 Balard 57.  
 Balint M. 57.  
 Balint R. 57.  
 Balo J. 57.  
 Bamberger H. 57.  
 Barahona-Fernandes G.N.  
 57, 425.  
 Bard L. 58.  
 Bardenat Ch. 42,260,306.  
 Barnes F.M. 59.  
 Baron D.N. 416.  
 Barre M. 58.  
 Barre J.A.58  
 Baruk H. 58,59.  
 Basedow C. 87.  
 Bassen H.A. 9,59.  
 Bateman 51,336.  
 Batesson G. 82,251.  
 Batten F.E. 59,156.  
 Bauer A. 346.  
 Bay E. 201.  
 Bayer W. 57,68,184.  
 Bayle A. 96,273,442.  
 Bayley P. 207, 268.  
 Beard G.M.63,236,346,443  
 Beck A.T. 59.  
 Beckmann D. 59.  
 Behn-Eschenberg H. 60.  
 Behr C. 60.  
 Bell L.V. 59,70,102.  
 Bellak L. 59.  
 Bellak S.S. 59.  
 Bender L. 60,382.  
 Bender M.B. 39,60.  
 Benedek 60.  
 Benedikt M. 24,60.  
 Benjamin E. 60.  
 Benjamin H. 129, 334.  
 Bennet J. 100.  
 Benton A.L. 60.  
 Berg J. H. 43.  
 Berger H. 21,60,257.  
 Bergeron E.J. 60.  
 Bernes F.M. 424.  
 Bernreiter R.G. 60.  
 Bergmann B. 60.  
 Bers N. 60.

- Berze J. 61,66,396,410.  
 Bianchi L. 61,347.  
 Bickelman A.G. 263.  
 Biedl A. 201.  
 Biemond S. 62.  
 Bielschowsky M. 62,156, 443.  
 Biermann G. 185.  
 Bignami A. 30,208.  
 Bilikiewicz T. 62,183, 353,  
 404,418, 443.  
 Bilz 62.  
 Binet A. 48,62,343,443.  
 Bing 62.  
 Bini L. 392.  
 Binswanger O.L. 42, 62,  
 106, 122, 443.  
 Biot C. 323.  
 Birnbaum K. 40,63,68,73,  
 146,153,256,362,364,  
 435,443.  
 Blanc-Vontenille H. 126.  
 Blankenhorn M. 31.  
 Bleuler F. 18,29,37,51,52, 64,  
 65, 72, 83,99,107, 117,119,  
 125,155,170,182,235,246,  
 263,265,268,279,300,  
 312,369,379,383,409,443.  
 Bleuler M. 65,72,162,217,  
 364,368,369, 383.  
 Blitzstein 40.  
 Block P. 49,65.  
 Bloch J. 335.  
 Blum G.S. 65.  
 Blundele J.D. 43.  
 Bobon G. 65,381.  
 Böcker F. 59.  
 Bodamer J. 13,66,274.  
 van Bogaert L. 23,65,156,  
 217,414.  
 Bonhoeffer K. 73,184,185, 254,  
 278,279,316,390, 408, 443.  
 Bönisch 60.  
 Bonnet Ch. 408.  
 Bonnet J. 175.  
 Börjesson M. 60.  
 Bornstain M. 73,382,443.  
 Borremans P. 65,156.  
 Boström A. 73,206,224,382  
 Botcazo 115.  
 Boudoursque 75.  
 Bourdon B. 76.  
 Bourneville D.-M. 317.  
 Bouttier R. 207,268.  
 Boyer J. S. 51.  
 Bowlby J. 337.  
 Brachman W. 194.  
 Brain W. R. 13, 46,74,425.  
 Bratz E. 52,74.  
 Braütigam W. 75,312.  
 Bravais L.F. 74.  
 Brem-Gräser L. 74.  
 Breuer E. 180.  
 Breuer J. 75,166,278,423.  
 Bright R. 74,357.  
 Brissaud E. 75,254,313.  
 Bristow 75.  
 Briquet P. 50, 74.  
 Broca P. 52, 75, 200.  
 Brodie 167.  
 Brodmann K. 75, 443.  
 Brown G.W. 45,74.  
 Brown J. 74.  
 Bruns L. 75,222.  
 Bruyn G.W. 216.  
 Brzezicki E. 73,74,255,316  
 Buck J.N. 76.  
 Bucy P. 177.  
 Buge 170.  
 Bühler Ch. 196.  
 Bumke O. 76,141,154,155, 443.  
 Burges A. 434.  
 Burgeois M. 260.  
 Bürger-Prinz H. 63,109.  
 Burman J. 269.  
 Burwell C.S. 263.  
 Buscaino V.M. 77.  
 Busemann A. 75,107.  
 Busow G. 24.  
 Buquerell 296.  
 Caccione A. 291.  
 Cahen R. 127,312.  
 Cairns H. 173,224.  
 Callieri B. 412.  
 Calmeil L. F. 9,167,320.  
 Cameron N. 167.  
 Camp C.D. 261.  
 Campbell D. 172.  
 Campbell R. J. 41,74,384.  
 Camus P. 119, 293.  
 Cannon W.B. 172.  
 Capgras J.M.J. 72,169.  
 Carp E. 169.  
 Carpas M.J. 169,259.  
 Carpenter G. 169.  
 Carrie J. 175.  
 Carroll 376.  
 Carpan B. 42,169.  
 Carpan P. 169.  
 Casper 170.  
 La Cassaque 175.  
 Cassirer R. 170.  
 Castaigne 170.  
 Casworth D.C. 23.  
 Cattell R.B. 173.  
 Ceilier 292.  
 Celsus A.C. 393.  
 Cerletti U. 392.  
 Chareot J.M. 38,49,172,  
 239,248,377,392,450.  
 Charpentier 377.  
 Chaslin P.H. 116,212,358,  
 377,381.  
 Chavani J.A. 375.  
 Cheine J. 221.  
 Cherington C. 433.  
 Cheyne G. 323,392.  
 Christian H.A. 191.  
 Christian P. 312.  
 Citelli S. 392.  
 Claparede E. 174.  
 Claude H. 176,281,306,  
 409,446.  
 Clerambault G. 71,168,  
 175,446.  
 Cleckley H. 106,175.  
 Clippel M. 176.  
 Cockaine E.A. 178.  
 Cogan D. 177.  
 Cohn R. 243.  
 Colet 381.  
 Condas O. 364.  
 O'Connel D.N. 251,422.  
 Conolly J. 182,446.  
 Conrad K. 60,73,81,117,  
 123,182,281,393,446.  
 Conte O. 36.  
 Cooper J.E. 142.  
 Cordes E. 185, 344.  
 McCormick M. 140.  
 Corville C. 30.



- Cosins 177.  
 Cotard J. 69, 186, 446.  
 Cotoni 434.  
 Couc E. 192, 446.  
 Courbon P. 41, 68, 193, 350.  
 Courtois A. 336.  
 Creutzfeldt H.G. 154.  
 Crichton-Browne J. 191.  
 Critchley C. 191, 224.  
 Crouzon L.E.O. 191.  
 Cullen W. 236.  
 Cushing H.W. 165, 193.  
 Dagnini 55.  
 Dalby A. 390.  
 Dalby M. 390.  
 Duna 97.  
 Dandy W. 107, 269.  
 Daumezon G. 68, 193.  
 Davenport C.D. 372.  
 Davitson G.M. 99, 246.  
 Dax M. 201.  
 Day R.L. 22.  
 Degen 57.  
 Dejerine J. J. 112, 141, 444.  
 Dejong U.J. 216.  
 Delay G. 100, 173, 190, 307, 359.  
 Delbrück A. 71, 100, 352, 364.  
 Delius 23.  
 de Long R. N. 428.  
 Dembo T. 104.  
 Deniker P. 100, 307, 359.  
 Denny-Brown D. 49, 107.  
 Dent C.E. 23, 416.  
 Derkum F.X. 113.  
 Deschartrette A. 51.  
 Despert L.J. 119.  
 van Deussen E.H. 236.  
 Dewhurst K. 251.  
 Dide M. 20, 68, 115.  
 Dietrich H. 246, 376.  
 Dudson G. 156.  
 Dölken A. 102, 104.  
 Domarus E. 19, 118, 120.  
 Donath G. 41, 120.  
 Doose H. 90, 120.  
 Dorkey M. 120.  
 Dosuzkov Th. 120, 253.  
 Down L. 98.  
 Downing R.W. 285.  
 Drey- Fuchs Ch. 370.  
 Dubini A. 121.  
 Dubois P. 119, 366, 444.  
 Dubowitz V. 121.  
 Ducostae 119, 296.  
 Dugas L. 108.  
 Dunlop K. 97.  
 Dunton W.R. 97, 395.  
 Dupre E. 71, 72, 98, 119, 146, 182, 217, 274, 293, 303, 412, 444.  
 Dupuytren G. 119.  
 Duret 177.  
 Duss L. 119.  
 Dutton 98.  
 Dyken 146.  
 Earl 317.  
 Ebbecke H. 122.  
 Ebbinghaus H. 95.  
 Economo C. 126, 129, 196, 444.  
 Edwards J.H. 124.  
 Eggers Ch. 382.  
 v.Ehrenfels Ch. 85.  
 Eisenmann G. 21, 110.  
 Ekblom K.A. 67, 125, 143, 310.  
 Elliot J. 263.  
 Ellis H.H. 127, 175, 334.  
 Emil-Weil P. 127, 312.  
 Epstein E. 65.  
 Erhardt A. 330.  
 Erickson T.C. 133.  
 Esdaile 341.  
 Esquirol J.E.D. 134, 199, 221, 288, 445.  
 Eulenburg 263.  
 Ewald G. 124, 404, 423, 444.  
 Exner S. 136, 305.  
 Ey H. 72, 125, 444.  
 Eysenck H.J. 21, 199, 267.  
 Eysenck S. 21, 116.  
 Fahr T. 341.  
 Fail G. 350.  
 Farlet J.-P. 132, 195, 340, 380, 450.  
 Falta W. 340.  
 Fanconi G. 341.  
 Faust C. 341, 363.  
 Feil G. 176, 350.  
 Feldman H.F. 292.  
 Felici F. 412.  
 Fenichel O. 356.  
 Fere Ch. 17, 242, 343.  
 Fiamberti 343.  
 Fiedler C.L.A. 343.  
 Finkelnburg A. 48, 344.  
 Fischer C.M. 39, 60.  
 Fischer O. 75, 122.  
 Flatau E. 281, 344, 349.  
 Fleischer R. 167.  
 Fleming K. 116, 344.  
 Flügel T. 302, 344.  
 Foelkel H. 110, 237, 342.  
 Foelling J.A. 342.  
 Forel A. 423, 450.  
 Forrer C. 50, 349.  
 Forrest F. M. 349.  
 Forrest G. S. 349.  
 Forssman H. 60.  
 Frank L.K. 39, 273.  
 Frankl V.E. 186, 200, 236, 346, 350.  
 Frederichs H. 30.  
 Freyhan F.A. 389, 350.  
 Freud S. 38, 41, 46, 79, 155, 166, 180, 181, 202, 213, 236, 239, 266, 278, 280, 281, 308, 323, 324, 326, 331, 334, 450.  
 Friedreich N. 350.  
 Friedrichs H. 238, 350.  
 Friedmann A.P. 350.  
 Friedmann M. 264, 307, 350.  
 Froeschels E. 350.  
 Froin G. 350.  
 Frölich A. 56, 118.  
 Froment A. 56.  
 Fromm E. 156, 241, 369.  
 Fucho M. 161.  
 Fulton I.F. 310, 370.  
 Funkelstein 370.  
 Furst J. B. 335.  
 Fürstner 344, 361.  
 Gall F.J. 78, 350.  
 de Gantier J. 73.  
 Ganzer S.J.M. 79, 443.  
 Garland 208.  
 Gartfield D.A. 300.  
 Gastaut H. 82, 91, 102, 130, 163, 187, 190, 191, 197, 215, 218, 224, 242, 351.

- Gattaz W. 411.  
 Gaucher F.Ch. 87.  
 Gaupp R. 83,363, 444.  
 Gawin F. 228.  
 Gayet Ch. J. A. 29.  
 Gayral L. 175.  
 Georgy W. 145.  
 Gerstmann G. 84.  
 Gelineau J.B.E. 170, 226.  
 Giacomini 405.  
 Gibbs F.A. 92,405.  
 Gilford H. 140,416.  
 Gilles A. 275.  
 Gilles de la tourette G.E.A.B. 336.  
 Gillespi R.D. 85.  
 Gilman A. 427.  
 Gilman S. 85.  
 Giraud P. 20,68,115.  
 Gjessing K. 134,171,310, 445.  
 Glaus A. 274.  
 Glatzel G. 302,426.  
 Glinski J.K. 171.  
 Goelnitz O. 246.  
 Goldscheider A. 86,94.  
 Goldstein K. 87,444.  
 Golles S. 417.  
 Gonlon M. 179.  
 Goodman L.S. 427.  
 Gorham R.P. 246.  
 Gowers W.R. 86.  
 Grace W. 312,320.  
 Graefe A.F.W.E. 87.  
 Graham 377.  
 Grasset S. 87,444.  
 Gräter K. 88.  
 Graves R.J. 87.  
 Green R. 335.  
 Greenfield G. 88,338.  
 Griesinger W. 70,88,195, 393.  
 Griffiths R. 88.  
 Gross G. 349,426.  
 Grosveld F.M. 389.  
 Grotjahn 224.  
 Gruhle H.W. 70,88,155, 311,444.  
 Guiraud P. 86,310.  
 Grünberger J. 88,312.  
 Grzywo-Dabrowski W. 87, 353.  
 Gudden B.A. 89.  
 Guilford J.P. 85.  
 Guiraud P. 306.  
 Guislain J. 393.  
 Gull W. 78.  
 Gutheil T.G. 300.  
 Guye Y. 46,89.  
 Haase H.-J. 240,309,407.  
 Habeck D. 407,415.  
 Haddenbrock S. 114,407.  
 Häufner H. 109.  
 Häft 420.  
 Hagen F.W. 39,379,407, 451.  
 Haenel H. 419.  
 Hallen O. 92.  
 Hallervorden J. 407.  
 Hallopeau T.H. 15,36.  
 Hamilton M. 415.  
 Hand M. 191.  
 Hanratty J.F. 419.  
 Harris H. 416.  
 Hart E.W. 416.  
 Hartenberg P. 61.  
 Hartmann 416.  
 Hashkovec L. 21,418.  
 Hass S. 411.  
 Hasselman 224.  
 Hataway S. 419.  
 Haufmann A. 416.  
 Haufmann E. 55.  
 Häufner H. 420.  
 Haug K. 108.  
 Hausner M. 124.  
 Hauptmann A. 413.  
 Head H. 52,127,209,264, 377,418.  
 Hecaen H. 46,310.  
 Hecker E. 167,385,418,451  
 Heidenhein A. 407.  
 Heilbronner K. 45,94,199, 264,270,407,451.  
 Heim M. 408.  
 Heinrich K. 407.  
 Heiss R. 274.  
 Heller F. 419.  
 Hellpach W. 40,254,419.  
 Hennerberg 196.  
 Henry P. 260.  
 Henschen S.E. 21,419.  
 Henschl R. L. 270,419.  
 Herman F. J. 129,243,419.  
 Herz E. 191,198,384,385, 420.  
 Hesnard A. 260.  
 Hess E. 418.  
 Heusinger 84,425.  
 Higier H. 163,420.  
 Hilgard E.R. 138,422.  
 Hilgard G. 313.  
 Hirsch S.P. 82.  
 Hirschfeld M. 44,141,334.  
 Hippel E. 420.  
 Hoch P. 255,426.  
 Hoche A.E. 185,312,390, 402,426.  
 Hochsinger K. 191,426.  
 Höck K. 418  
 Hodges J. 433.  
 Hoff H. 131,224,269.  
 Hoffmann F. 125,426,  
 Hofstätter R. 251.  
 Hoigne R. 337.  
 Holmes G. 13,284,425.  
 Holstrom L. 433.  
 Holtzman W.H. 425.  
 Homburger A. 162,280, 382,425.  
 Homen E.A. 310,425.  
 Hoodenough F.L. 426.  
 Hoppe F. 425.  
 Horenstein S. 85.  
 Horney K.14,241.  
 Houdart 170.  
 Huber G.302,310,349,385, 426.  
 Hudden H. 153.  
 Hugeland 288  
 Huguenar P. 187.  
 Hunt R.J. 90,416.  
 Huntington G.S. 416.  
 Huot 171.  
 Hurler G. 426.  
 Husserl E. 343.  
 Hutchinson J. 140,176,416  
 Ingwar D.H. 130,158.  
 Jächansen W. 84.  
 Jackobson F. 405.  
 Jackson J.H. 74,90,92,218, 297,405,451.

- Jackson L. 405.  
 Jacob A. 154.  
 Jaensch F.R. 124,338,445.  
 Jahrreiss W. 75.  
 Jakubik A. 96,154,181,425  
 Janz D. 91,92,130.  
 Janzarik W. 98,273,383, 393.  
 Janzen R. 89,154.  
 James W. 405,451.  
 Janet P. 46,190,275,289,  
 354,449.  
 Jansky J. 62, 156.  
 Jarosz M. 312,347.  
 Jaskin J.C. 298,405.  
 Jaspers K. 68,70,72,108,  
 154,158,162,167,260,  
 368,379, 445.  
 Jastrowitz P. 75,222.  
 Jellinek E.M. 25,126,127.  
 Jensen J. 157,251,433.  
 Jerek R. 157.  
 Jirasek J. 157.  
 Jochansen W. 84.  
 Joel F. 178.  
 Joffroy A. 218, 275.  
 Johnson W. 406.  
 Johnstone F.A.C. 23.  
 Joliffe N. 31,406.  
 Jones E. 180, 277.  
 Jones K.L. 29, 406.  
 Jones M. 151.  
 Jonescu C. 271.  
 Juhert M. 173.  
 Jung C. 38,49,161,165,180,  
 241,267,268,445.  
 Kagan J. 166.  
 Kahlbaum K. L. 140,167,  
 170,184,256,260,  
 272, 394,408,411,  
 418,445.  
 Kahn E. 41,168,299,281.  
 Kanner L. 51,128,168.  
 Karliner W. 125,169.  
 Karsten A. 169.  
 Karp E. 318.  
 Kasal 408  
 Kasanin J. 55, 166,363.  
 Kaufmann F. 171.  
 Kayser B. 167.  
 Keddie M.E. 212.  
 Kehrer F.A. 67,171,173,  
 192,372.  
 Keiser H. 70,142.  
 Keller M. 140.  
 Keller V. 158.  
 Kelly G.A. 171.  
 Kennedy F. 172.  
 Kent G.H. 172.  
 Kepinski A. 172,446.  
 Kern A. 157.  
 Kernberg O. 308.  
 Kerry R.J. 173, 348.  
 Ketty S.S. 386.  
 Kielak L. 118,173.  
 Kielhoiz P. 108,109,173.  
 Kiernan G.C. 175.  
 McKinley J. 419.  
 King 146.  
 Kirn L. 173.  
 Klaesi J. 398.  
 Klages W. 173,308.  
 Kläsy J. 175,206.  
 Klein D. 309.  
 Klein R. 174.  
 Kleine W. 174.  
 Kleiner S. 317.  
 Kleinsorge N. 174.  
 Kleist K. 45,46,135, 164,  
 174,183,191,194, 200,  
 257,308,311,340,341,  
 357,358,361,396,414,  
 418,446.  
 Klinefelter H.F. 174.  
 Klippel 176.  
 Klumbies G. 174.  
 Kloos G. 176.  
 Klüver H. 177.  
 Knauer A. 196.  
 Knight P.P. 226.  
 Koch K. 187.  
 Kochen 187.  
 Kocova Z. 124.  
 Koehler K.G. 171,183,302.  
 Koffka K. 85.  
 Kohs S.C. 185.  
 Kole L. 433.  
 Kolle K. 395.  
 Kondas O. 181  
 Kornzweig A.L. 9,59.  
 Kos M. 185.  
 Krabbe K.H. 41,187,320.  
 Krnepelin E. 70,71,97,103,  
 108,110,111,119,131,  
 155,163,170,185,188,  
 200,202,207,237,256,  
 258,270,274,297,379,  
 381,395,403,407,418,  
 425,428,435,446.  
 Kramer A. 414.  
 Krafft-Ebing R. 67,146,  
 188,212,261,446.  
 Krammer M. 224.  
 Krammer T. 187.  
 Krause A.C. 188.  
 Kreindler A. 242.  
 Kreiz H. 191.  
 Kretschmer E. 40,48,53,  
 71,87,155,170,183,189,  
 190,197,218,220,235,  
 240,256,280,288,357,  
 361,395,422,423,424, 446.  
 Kreutzfeldt H.G. 15,146.  
 Krisch H. 191,384.  
 Kritchley 317.  
 Kronfeld A. 292,353,381,  
 384.  
 Krüger V. 194.  
 Kübler-Ross E. 297.  
 Kucera O. 193.  
 Kufs H. 156, 193.  
 Kullenkampf C. 192,346.  
 Kussmaul A. 24,60,73,193,  
 194,323,446.  
 Labhardt F. 358.  
 Laborit H. 187.  
 Lacan J. 382.  
 Lafforgue 381.  
 Lafora G.R. 195.  
 Laing R.D. 127  
 Lambert P.N. 170.  
 Lanceraux 30.  
 Landolt H. 195,310,350.  
 de Lange C. 194,405.  
 Lange J. 110,194.  
 Langfeldt G. 194,217,344.  
 Larsson T. 377.  
 Lasegue E.Ch. 43,137,162,  
 195,446.  
 Laurence J.Z. 201.  
 Laurent J.L. 222.

- Lauter H. 109,195.  
 Lavallee 221.  
 Lavaret J.K. 343.  
 Lawrance J.K. 43.  
 Leary T. 199.  
 Lechner K. 117,198.  
 Legrand du Sauffle. 196.  
 Lehman O. 60.  
 Lejeune J. 166,197,308.  
 Lemke R. 110,183,197.  
 Lemkin J. 166.  
 Lemli L. 317.  
 Lémpp R. 82.  
 van Lennep D.J. 92, 197.  
 Lennox W.G. 92,197,406.  
 Lenz H. 197.  
 Leonhard K. 54,110,111,  
 112,,135,170,171,182,  
 197,238,267,274,280,  
 341,343,354,356,357,  
 360,361,363,366,367,  
 368,386,395.  
 Leroy M. 410.  
 Lesh M. 198.  
 Leubuscher P. 52,74.  
 Levin M. 174.  
 Levi-Valensy J. 172,196,  
 306,382,410.  
 Levy-Bianchini 196,236.  
 Levy-Bruhle L. 254.  
 Levy E. 119,146.  
 Levy G. 307.  
 Levy S. 145.  
 Lewin B.D. 196,301.  
 Lhermitte J. 30,176,197,  
 209,414,447.  
 Ljunberg L. 125,310.  
 Lichtheim L. 52,97,112, 200.  
 Liepmann H. 45,199,447.  
 Lindau A. 420.  
 Lindeman E. 199,309.  
 Lindholm A. 125,310.  
 Lindsley O.R. 199.  
 Lissauer H. 13,199.  
 Little E.G.G. 199.  
 Littmann E. 199.  
 Livadon M.P. 139.  
 Lombroso C. 201,216,254,  
 428,447.  
 Longre I.B. 71,72,119.  
 Lopez-Ibor J.J. 74,109,143  
 170, 201.  
 Lowe Ch.U. 201  
 Lövenberg K. 261.  
 Lövenfeld M. 196.  
 Loyeses H. 176.  
 Luciani L. 203,291.  
 Lundberg P.O. 202.  
 Lundborg H.B. 202,218.  
 Lungershausen E. 302.  
 Lüscher M. 203.  
 Lutz J. 382.  
 Machover K. 209.  
 Magnan V. 47,72,130,207,  
 248,377,408,411,447.  
 Maier H.W. 68,72,170,205  
 Main T. 211.  
 Malamud N. 154.  
 Maller O. 64,211,304.  
 Mancicar G.D.  
 Mannkorf E.W. 207.  
 Marburg O. 207.  
 Marchand L. 129,208,336.  
 Marchiafava E. 30.  
 Marc C.C.H. 208.  
 Marie P. 50,75,207,208,  
 268,307,427.  
 Marinescu G. 208.  
 Marro A. 380.  
 Martin E. 208.  
 Martland 208  
 Mascioni A. 246.  
 Masserman J.H. 208.  
 Matussek A. 350.  
 Matzdorff 209.  
 Maury A. 413.  
 Mauz F. 83,113,182,209,  
 363,381,384.  
 Mayer -Gross W. 164,204,  
 205,207,247,248,299,  
 302,358,386,447.  
 Mayer M. 241.  
 Mayer A. 42,205,447.  
 Mayon 59.  
 Mazurkiewicz J. 204,299,  
 447.  
 McKinley J. 420.  
 McMenemy W.H. 129,338  
 McMillan M. 116.  
 McQuarrie 423.  
 Mears A.R. 31.  
 Meduna L.J. 169,210,248,  
 447.  
 Medow-W. 109,210.  
 Meige H. 211,348.  
 Meili R. 139,210.  
 Meinert Th. 38,205,447.  
 Melkersson 286.  
 Melmon K.C. 420.  
 Meninger-Lerchenthal C.  
 211,418.  
 Menkes J.H. 211.  
 Menzel P. 212  
 Merzbacher L. 261.  
 Mesmer F.A. 212.  
 Messing S. 242.  
 Meyard 210.  
 Meyer A. 115,122,133,153,  
 212,246,260,343.  
 Meyer J. 167.  
 Meygnant 129.  
 Meynet 210.  
 Michaelis 119.  
 Migault P. 382.  
 Mignart 218.  
 Mindenet M. 170.  
 Mingazzini G. 218,269,363  
 Minkowska F. 39,86,183,  
 218.  
 Minkowski E. 108,122,218  
 Minkowski M. 218,419.  
 Mira-y-Lopez E. 219.  
 Mitchel R.A. 311.  
 Mittenecker E. 219.  
 Möbius P.J. 22,122,128,  
 210,358,447.  
 Moelli K. 220.  
 Moersch 434.  
 Molaret P. 179.  
 Moll A. 219.  
 v. Monakov C. 21,115,180,  
 221,448.  
 Money J. 330, 335.  
 Moniz A.C. 196,221,448.  
 Monrad-Krohn G.H. 118,  
 221.  
 Monroe M. 221.  
 Moon R.C. 201.  
 Moore M.T. 224.  
 Moorg 21.

- Morel B. 221.  
Morel F. 30,221.  
Moreno J.L. 120,221.  
Morgagni G.B. 221.  
Morgan C.D. 219.  
Morgan W.P. 115.  
Morgner J. 408.  
Morita S. 222.  
Morsier G. 212.  
Morselli E. 117,222,347, 447.  
Morvan A.M. 222.  
Mourgne R. 190,221.  
Müller G.F. 179.  
Müller M. 127,219.  
Müller-Hegemann D. 237.  
Mundi Ch. 310.  
Muncie. 372.  
Murrey H.A. 219.  
Nasse Ch. F. 235.  
Nayrak 226.  
Neel 62.  
Negro 235.  
Neisser C. 23,71,226,262,  
298.  
Nelson R. 241.  
Neumann H. 243,393,421,  
448.  
Neuman M.A. 243.  
Nevin S. 235.  
Nielsen J.M. 49,201.  
Niemann A. 242.  
Nilson L. 242,360.  
Nissl F. 242.  
Noguchi H. 273.  
Nonne M. 243,350,448.  
Noonan J.A. 244.  
Nordlander N.143  
Norman R.N. 144,156.  
Norric G. 244.  
Nyhan W.L. 198.  
Nyman A.K. 242,382.  
Nyman G.E. 130,158.  
Nyssen R. 65.  
Oatman 252.  
Odier Ch. 62,246.  
Oldfield R.C. 173,224.  
Olszewski J. 390.  
Opitz J.M. 317.  
Oppenheim H. 188,217,  
222,238,248,346,404, 447.  
Ord N. 78.  
Orne M.T. 251,422.  
Osgood Ch. 251.  
Overall J.E. 246.  
Papadaki 101,255.  
Parkers C. 337.  
Parkinson J. 260,448.  
Pary R.J. 262,302.  
Pascal C. 260.  
Patau K. 261.  
Paterson A. 13,261.  
Patterson D. 265.  
Payne R. S. 261, 307.  
Pelez 352.  
Pelicaeus F. 261.  
Pende N. 183.  
Pentfield W. 51,91,261,448.  
Pennybacker J.P. 173,224.  
Perris C. 360.  
Perry R.G. 156.  
Perse G.173.  
Peters U.H. 53,67,74,109,  
177,208,263,267,353, 414.  
Pethö B. 372  
Petrilowitsch N. 263,311,  
367.  
Pfaundler M. 82.  
Pfeifer E. 309.  
Pfister M. 274.  
Phillipson H. 343.  
Piaget J. 275.  
Picard 263.  
Pichon E. 268,381.  
Pichot P. 173.  
Pick A. 17,46,75,94,135,  
137,254,256,263,264,  
304,410, 448.  
Pick L. 242.  
Pickford R.W. 264.  
Pierson 254,268.  
Pinel Ph. 264,379,449.  
Pintner R. 265.  
Pitres A. 168,268.  
Piotrowski L.A. 37,131, 224.  
Plaut F. 268,414.  
Plum 433.  
Poiaten P. 255.  
Poie 57.  
Polatin P. 426.  
Pollnow H. 187.  
Polonio P. 270,363,383.  
Polzien R. 269,310.  
Porot A. 21,62,171,207,  
218,236,260,268,275, 313.  
Posher 433.  
Poppelreiter W. 13,270.  
Popper E. 270,281,382.  
Pötzl O. 213,263,269.  
Prader A. 271.  
Predescu V. 271.  
Prevoust 271.  
Prichard J.C. 132,221,272,  
380,449.  
McQuarrie 423.  
Quidu M.M. 139.  
Quinard Ch.E. 172.  
Rabardel M.J. 139.  
Racamier P. 425.  
Raskin A. 277.  
Radovici A. 208,301.  
Ramon 55.  
Ranheim B. 390.  
Rank O. 334.  
Ranschburg P. 276.  
Ransom 146.  
Ranvier L. 173.  
Raskin A. 277.  
Raven J.C. 276,282.  
Redlich E. 281.  
Recklinghausen F.D. 282.  
Regis E. 70,73,184, 247,  
248,283.  
Reichardt M. 276,449.  
Reiter P.J. 276.  
Reivich M. 434.  
Resnikoff 282.  
Rett A. 310.  
Rett E. 283.  
Ribot Th. 168,449.  
Richardson J.390.  
Richtel Ch. 285.  
Richter H.E. 59.  
Rickels N.K. 285,305.  
Riddoch G. 284.  
Rieger H. 263,267.  
Riley C.M. 276.  
Rinderknecht G. 418.  
Ringel E. 285.  
Robert J. 222.  
Roberts B. 434.

- Robin P. 285.  
 Robin S.D. 263.  
 Rogers C. 206.  
 Rorschach H. 67,268,286,449.  
 Rosanoff J. 172.  
 Rosen S.W. 420.  
 Rosenberg M. 285.  
 Rosenthal D. 386.  
 Rosenthal C. 285,286.  
 Rosenthal S.A. 285,415.  
 Rosenzweig S. 285.  
 Roth B. 286,422.  
 Roth M. 259,286.  
 Rothenberg A. 19.  
 Rotter J. 184.  
 Roy J.E. 350.  
 Rubell 286.  
 Rubinstein G. 286.  
 Rud E. 247,287.  
 Rümke H.C. 285,353.  
 Rush B. 38,277.  
 Russul W.R. 201.  
 Rutherford M.E. 282.  
 Rycroft Ch. 167,196,301.  
 Sabin A.B. 292.  
 Sachs B. 156,327.  
 Sachs H. 145.  
 Sachs J.M. 145.  
 Sakel M. 145,160,445.  
 Salfield 289.  
 Salton A. 289,399.  
 Salvatori 288.  
 Sandhoff K. 145.  
 de Sanctis C. 291.  
 Sanfilippo S.J. 291.  
 Sanguineti L.R. 291.  
 de Sansurre R. 180.  
 Sante de Sanctis C. 291.  
 Sartorius N. 142.  
 Satomura A. 291.  
 Sattes H. 110,145.  
 Sawyers J.L. 277.  
 Scharfetter Ch. 362,377.  
 Scheid K.F. 70,169,171,  
 375,384.  
 Scheid W. 299,387.  
 Schenk V. 264.  
 Scherer H.J. 65.  
 Schilder P. 15,84,213,264,  
 386,450.  
 Schindler R. 387.  
 Schlesinger B. 46,341.  
 Schmieschek H.G. 199,387.  
 Schmuttermayer R. 388.  
 Schneider K. 67,70,72,89,  
 110,111,117,246,256,  
 299,302,362,367,386,  
 388,395,450.  
 Schneidman E.C. 388.  
 Schenk V. 264.  
 Scholz 388.  
 Schrenk-Notzing 23,389.  
 Schroeder K. 323,389.  
 Schroeder P. 174,358,389,  
 414,415,451.  
 Schule H. 247,391.  
 Schüller A. 191.  
 Schulte W. 90,118,391,451  
 Schultz J.H. 239,391,451.  
 Scott H.W. 277.  
 Scott J.-C. 322.  
 Seckel 292.  
 Sedillot 292.  
 Seglas J. 66,241,292,408,  
 410.  
 Seitelberger F. 145,156.  
 Selye H. 14,292,321.  
 Serieux P. 72.  
 Serko A. 146,259.  
 Seweringhaus J.W. 311.  
 Shastin P.H. 311.  
 Sheehan H.L. 387.  
 Sheerer M. 87.  
 Sicard J. 297,326.  
 Siefert S. 73,146.  
 Sifneos P. 24.  
 Siemerling E. 15.  
 Silboorg G. 146.  
 Simmonds M. 171.  
 Simon Th. 48,62.  
 Simon H. 319.  
 Simon R.J. 312.  
 Sittig O. 135,263.  
 Sivadon M. P. 296,319,411  
 Sjogren H. 263.  
 Sjogren T. 87,208,263,377.  
 Smith D.W. 29,317,406.  
 Sommer K. 71,100,146,  
 358,363,364,445.  
 Sotos J.E. 318.  
 Soulif M. 417.  
 Souques M.A. 75,254.  
 Spatz H. 50,388,407.  
 Specht G. 66,73,389,450.  
 Speer E. 281.  
 Spett K. 27, 389,450.  
 Spielberger C.D. 389.  
 Spiegelberg U. 21,110.  
 Spiegelberg W. 170,201,  
 450.  
 Spitz R. 108, 112.  
 Spoerri Th. 115,389.  
 Spielmeyer N. 390.  
 Spielmeyer W. 59,156,389.  
 Staabs G. 389.  
 Staehelin B. 312.  
 Staehelin J.E. 358,389.  
 Stainhals 39.  
 Stam E.C. 389.  
 Stauder K. 70,171,389.  
 Stears G. 105,106.  
 Stears J. 433.  
 Steele J. 390.  
 Steigerwald F. 302.  
 Steinhals 389.  
 Stelck 175.  
 Stellwag K. 389.  
 Stengel E. 302,386,389.  
 Stephenson W. 320.  
 Stern F. 9,89,142,390.  
 Stern R. 390.  
 Sternberg M. 297.  
 Stertz G. 312,390.  
 Stewart R.M. 221.  
 Stiller B. 48, 390.  
 Stock 389,390.  
 Stockert F. 343,390.  
 Stokes W. 221,323.  
 Stokvis B. 169,318,321.  
 Stone D.R.M. 321.  
 Störing G. 53,237.  
 Stork J. 390.  
 Storring G. 52.  
 Strachan 322.  
 Stransky E. 16,50,104,117,  
 390,451.  
 Strömgren E. 165,390.  
 Strümpel A. 118,304.  
 Stunkard A. 312,320.  
 Sturge W.A. 41,320.

- Sulestrowska H. 185.  
 Sullivan H. 241.  
 Sultz-Heneke H. 240.  
 Sutter J.-M. 176,291.  
 Sutton Th. 291.  
 Sydenham T. 296.  
 Symonds J.A. 334.  
 Szondi L. 318.  
 Takata M. 326.  
 Tamtamy S.A. 169.  
 Tarnov G. 192.  
 Taybi H. 286.  
 Tay W. 156,327.  
 Taylor A.T. 327.  
 Taylor J. 327.  
 Tellenbach H. 159,211,283,  
 327,345.  
 Tennon J. 328.  
 Terman L.M. 62.  
 Tertian H. 177.  
 Thiele W. 312.  
 Thomas A. 112.  
 Thurzo F. 298,336.  
 Tiers J. 55.  
 Todd J. 251,304.  
 Todd R. 96,330.  
 Tomán V. 219.  
 Tomas M. 330.  
 Toulouse E. 285,336.  
 Tourette G.E.A.B. 336.  
 Tramer M. 272,334.  
 Trammer H. 349.  
 Trautmann E.C. 305.  
 Troussseau A. 51,336.  
 Turner J. 328,379.  
 Tusques J. 68,193.  
 Unfferricht H. 218.  
 Urbach F. 338.  
 Urbantschitsch 124,338.  
 Uscher 339.  
 Vaquers L.H. 56.  
 Varendonek Z. 20,341.  
 Vaughan E.D. 277.  
 Veraguth O. 140.  
 Verger H. 141.  
 Vessie R.P. 416.  
 Vexhüle Th. 312.  
 Victor M. 30.  
 Vie J. 169.  
 Wieser S. 31.  
 Villneuve A. 142.  
 le Vine S. B. 324.  
 Viovenet 171.  
 Vogt H. 59,156,390.  
 Vogt O. 349,422,450.  
 Volgyesi F.A. 139.  
 Volpe J. 199.  
 Wagner-Jauregg J. 138, 445.  
 Wald W. 263.  
 Waldenström J. 138.  
 Walter-Büel H. 78,135,138 272.  
 Warburg H. 244.  
 Wartegg E. 139.  
 Wartenberg R. 74,139.  
 Wasserman A. 139.  
 Watson J. 63.  
 Weber F.P. 41,320.  
 Weber R. 131,244.  
 Webers H. 102.  
 Wechsler D. 141.  
 Weidner K. 398.  
 Weil A.A. 127.  
 Weinschenk C. 87.  
 Weiss E. 113.  
 Weitbrecht H.J. 109,139,  
 237,299,362,395,445.  
 Weitzenhoffer A.M. 138, 422.  
 Weizsäcker V. 138,212,  
 238,445.  
 Welt L. 140,222,306.  
 Wermut W. 246.  
 Werner O. 140.  
 Wernicke C. 17,29,52,135,  
 140,141,155,200,243,  
 263,264,271,292,352,  
 414,421, 445.  
 Wertheimer E. 85.  
 Westphal A.K.D. 141.  
 Westphal C. 118,141,257,  
 322,334,344,445.  
 Whaley R.O. 263.  
 Whitebridge D. 173,224.  
 Wichmann B. 139,143,309  
 Wiidmark E.M. 142.  
 Wieck H.H. 82,114,142,364  
 Wiese K. 416.  
 Wieser S. 70,142.  
 Wicthe C. 338.  
 Wigboldus J.M. 389.  
 Willi H. 271.  
 Willi G. 364.  
 Williams H. 338.  
 Wilson S. 118.  
 Wilson V.K. 23.  
 Wimmer A. 142.  
 Windscheid 142.  
 Wing J.K. 142.  
 Wingate P. 55.  
 Wischer A.L. 143.  
 Witebsky E. 145.  
 Wittmaak T. 143.  
 Wolf H. 312.  
 Wolff 376.  
 Wolpert J. 13,270.  
 Woltemann 434.  
 Wood N. 144,156.  
 Woodworth R. 116.  
 Worster-Drought C. 338.  
 Wulff 395  
 Wundt W. 194.  
 Wyrsh J. 393.  
 Zangwill O.L. 13,46,261.  
 Zapotocky H.G. 88,312.  
 Zappert J. 419.  
 Zazzo R. 145.  
 Zec N. 285.  
 Zeller E.A. 393.  
 Zellwegers 393.  
 Zeman 146.  
 Zerssen D.V. 207.  
 Ziegler F.J. 425.  
 Ziehen Th. 126,161,170,  
 179,182,451.  
 Ziewe L. 394  
 Zihen Th. 347,357,394.  
 Zilboorg G. 382.  
 Zlotow M. 317.  
 Zulliger H. 397.

## ბაპოყენებელი ლიტერატურა

- ასათიანი მ., გეგმა და მეთოდოლოგია, ტფ., 1936.
- ბაგრატიონის დაკითხვა, იაღივარ დაული, თბ., 1985.
- გამყრელიძე მ., ლეპრეზიის სიმკურნალო გედეკამენტები, თბ., 1996, მისივე, ფსიქონერველ დაედეკათა მკურნალობა თანამედროვე ფსიქოფარმაკოლოგიური მეთოდებით, თბ., 1968.
- დაედეკათა საერთაშორისო კლასიფიკაცია, მე-10 გადასინჯვა (ფსიქიატრია), (ე ნანტიშულის რედაქციით), თბ., 1997.
- ევერლადიშვილი ე. ნინუა ნ., სიგუა რ., კლინიკური ნეუროლოგია, თბ., 1997.
- ესტეფანოვი ნარკოტიკების გარემოში ცხოვრება, თბ., კლინიკა "ბემონი", 1997.
- მურაბიშვილი ა., ფსიქიატრია, თბ., 1948.
- კასინელი, უსწორო კარაბადინი, თბ., 1940.
- ნათაძე რ., ფსიქოლოგიის მოკლე კურსი, თბ., 1969.
- ნასიქიშვილი ბ., ლოთობა და ალკოჰოლიზმი, თბ., 1948.
- საერთაშორისო ანატომიური ნომენკლატურა (ლათინურ-ქართულ-რუსულ ენებზე), თბ., 1976.
- სეიანი ნ., ნაკამიე ლ., ფსიქიატრიის განმარტებითი ლექსიკონი, თბ., 1977.
- სულხან-საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული, თბ., 1991.
- უშინაძე ლ., შიგადი ფსიქოლოგია, თბ., 1998.
- ფანასკერტელი-ეცხმიელი შაბა, სამკურნალო წიგნი, კარაბადინი, თბ., 1939, 1988.
- ფსიქოსიალაციკერ გერმანია და ცნებათა ინვლსურ-ქართული განმარტებითი ლექსიკონი, რედაქტორი ნუშინაძე, თბ., 1997.
- ურსული შიგმენდ, ფსიქოანალიზი (ე.კაკაბაძის თარგმანითა და რედაქტორობით), თბ., 1995.
- ლდოსკა თ., შიქ-მეუღლიე მ., მხიკიშვილი ც., შალაშხია ი., ჯიბუტი ე., კლინიკური ნეუროლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი, თბ., 1969.
- წიგნი სააკშიანი, ლადო კოტეგიშვილის რედაქციით, თბ., 1936.
- Аврцкий Г. Я., Недува А. А., Лечение психических больных: руководство для врачей, 2-е изд., М., 1988.
- Алкоголизм (Руководство для врачей) Под ред. Г. В. Морозова, В. Е. Рожнова, Э. А. Бабаяна, М., 1983.
- Англо-русский медицинский энциклопедический словарь, М., 1995.
- Бадалян Д. О., Детская неврология, 3-е изд. М., 1984.
- Бехтель Э. Е., Дозологические формы злоупотребления алкоголем, М., 1986.
- Блейхер В. М., Эпонимический словарь психиатрических терминов, Киев, 1980.
- Блейхер В. М., Эпонимические термины в психиатрии, психотерапии и медицинской психологии, Киев, 1984.
- Блейхер В. М., Крух И. В., Толковый словарь психиатрических терминов, Воронеж, 1995.
- Боконжич Р., Головная боль; Пер. с сербского., М., 1984.
- Большой толковый медицинский словарь, Оксфорд, в двух томах, М., 1998.
- Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М., Словарь-справочник по психологической диагностике, Киев, 1989.
- Вейнер Г., Левитт Л., Неврология, М., 1998.
- Габиани А., Наркотизм, 1977.
- Гасто А., Терминологический словарь по эпилепсии, ВОЗ, Женева, 1975.
- Гилларовский В. А., Психиатрия, 4-е изд., М., 1954.
- Глосарий, стандартизированные психопатологические симптомы для унифицированной клинической оценки алкоголизма и алкогольных психозов, М., 1976.
- Гонопольский М. Х., Практикум по наркологии, Алма-Ата, 1988.
- Горбач И. Н., Гурленя А. М., Эпонимический словарь в невропатологии (Под ред. Минюка Н. С.), Мн., 1983.
- Губа Г. П., Справочник по неврологической семиологии, 2-е изд, Киев, 1983.
- Гуревич М. О., Серейский М. Я., Учебник психиатрии, М., 1932.



- Гуськов В.С., Терминологический словарь психиатра, М., 1965.
- Двадцатый доклад комитета экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости, Женева, 1975.
- Жариков Н.М., Морозов Г.В., Хритинин Д.Ф., Судебная психиатрия, М., 1997.
- Завилянский И.Я., Блейхер В.М., Крух И.В., Завилянская Л.И., Психиатрический диагноз, Киев, 1988.
- Зейгарник Б.В., Патопсихология, М., 1984.
- Каннабих Ю.В., История психиатрии, 1928.
- Каплан Г.И., Сэдок Б.Дж., Клиническая психиатрия (перевод с английского Б.В. Стрелец), М., 1994.
- Карвасарский Б.Д., Медицинская психология, Л., 1982.
- Карвасарский Б.Д., Неврозы, М., 1980.
- Кербиков О.В., Коркина М.В., Наджаров Р.А., Снежневский А.В., Психиатрия, М., 1968.
- Клиническая психиатрия, под ред. Г. Груле, Р.Юнга, В. Майер-Гросса, М.Мюллера, М., 1969.
- Клиническая психиатрия, перевод с англ. (Гл. ред. Т.Б. Дмитриева), М., 1998.
- Клиническая фармакология и фармакотерапия, под ред. Г.Ф. Ольгриффа и Д. Пальма, 1996.
- Краткий психиатрический словарь, под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского, М., 1985.
- Корсаков С.С., Курс психиатрии, М., 1901.
- Крафт-Эбинг, Учебник психиатрии, Санкт-Петербург, 1881.
- Лагланш Ж., Попталис Ж., Словарь по психоанализу, пер. с франц., М., 1996.
- Лазовскис И.Р., Справочник клинических симптомов и синдромов, М., 1981.
- Лайбер Б., Ольбрих Г., Клинические синдромы, М., 1974.
- Лебединский М.С., Мясичев В.Н., Введение в медицинскую психологию, Л., 1966.
- Лечение нервных болезней, под ред. Видерхольта, М., 1984.
- Маккьюсик В.А., Наследственные признаки человека, М., 1976.
- Меграбян А.А., Общая психопатология, М., 1972.
- Медицинская терминология латинский - русский - французский - английский - немецкий, София, 1979.
- Менделевич Д.В., Психиатрическая пропедевтика, М., 1997.
- Морозов Г.В., Шумский Н.Г., Введение в клиническую психиатрию, М., 1998.
- Наркология, Л. С. Фридман, Н. Ф. Флеминг, Д. Г. Робертс, С. Е. Хайман, М., 1998.
- Наследственные болезни человека, Справочник под ред. Л.О. Бадаляна, Ташкент, 1980.
- Неврология, под ред. Самуэльса, пер. с англ., М., 1997.
- Неотложные состояния в клинике внутренних болезней, Киев, 1985.
- Нервные болезни, под ред. Яроша А.А., Киев, 1985.
- Общая сексопатология, под ред. Г.С. Васильченко, М, 1977.
- Осипов В.П., Курс общего учения о душевных болезнях, Берлин, 1923.
- Осипов В.П., Частное учение о душевных болезнях, Вып. I, Петроград, 1923; Вып. II, М.-Л, 1926.
- Попеску О., Синдромы в педиатрии, Бухарест, 1977.
- Практический справочник врача психиатра, Киев, 1981.
- Психологический словарь, М., 1996.
- Психологический словарь, под ред. В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, Ф.Б. Ломова и др., М., 1983.
- Пятницкая И.Н., Наркомания, М., 1984.
- Редкие синдромы и заболевания нераной системы, пер. с болг., М., 1981.
- Руководство по лекарственной зависимости, ВОЗ, Женева, 1976.
- Руководство по психиатрии, в двух томах, под ред. А.В. Снежневского, М., 1983.
- Руководство по психиатрии, в двух томах, под ред. Г.В. Морозова, М., 1988.
- Руководство по психиатрии, под ред. В.Е. Рожнова, 3-е изд, Ташкент, 1985.
- Руководство по судебной психиатрии, под ред. Г.В. Морозова, М., 1977.
- Сандригтайло Л.И., Анатомо-клинический атлас по невропатологии, Минск, 1988.
- Сепп Е.К., Аксяпцев М.А., Мельников С.А., Павлодская Е.В., Топическая диагностика нервной системы, М., 1952.
- Словарь-справочник симптомов и синдромов заболеваний, под ред. М. Фейгина, Варшава, 1965.
- Словарь-справочник по психологической диагностике, Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов, Киев, 1989.
- Словарь Физиологических терминов, под ред. Газенко О.Г., М., 1987.
- Справочник ВИДАЛЬ АстраФармСервис, М., 1997.
- Справочник по неврологии, изд. 3-е, М., 1989.
- Справочник по психиатрии, изд. 2-е, М., 1985.
- Терапия, Руководство для врачей, пер. с англ., под ред. А.Г. Чучалина, М., 1996.

- Фрейд З., Введение в психоанализ, М., 1989.
- Фрейд З., Психология бессознательного, М., 1989.
- Фридман Л.С., Флеминг Н.Ф., Робертс Д.Г., Хайман С.Е., Наркология, М., Санкт-Петербург, 1998.
- Фрумкин Я.П., Психиатрическая терминология, Киев, 1939.
- Фрумкин Я.П., Воронков Г.А., Шевчук И.Д., Психиатрия, Таблицы и схемы, Киев, 1977.
- Харкевич Д.А., Фармакология, М., 1987.
- Шабанов П.Д., Руководство по наркологии, Санкт-Петербург, 1998.
- Частная сексопатология, 2-е изд., под ред. Г.С. Васильченко, М., 1983.
- Этинг Г.М., Лечение алкоголизма, М., 1990.
- Alan F. Schatzberg, Jonathan O. Cole, Manual of Clinical Psychopharmacology, The American Psychiatric Press, Inc. Washington, 1991.
- Campbell R.J., Psychiatric Dictionary, Sed. - New York - Oxford: Oxford University Press, 1981.
- Common Psychiatric Terms in 4 Languages, Sandoz, Basel, 1971.
- Comprehensive Textbook of Psychiatry - II, A.M. Freedman, H.J. Kaplan, B.J. Sadock, The Williams Wilkins Company, Baltimore, 1975.
- Drever J.A., Dictionary of Psychology, Harmondsworth, Penguin Books, 1952.
- Fischer R.B., The Dictionary of Mental Health, Granada, London - Toronto - Sidney - New York, 1980.
- Handbook of Emergency Psychiatry, Nancy Hanke, The Collamore Press, Toronto, 1984.
- Hiltmann H., Kompendium der Psychodiagnostischen Tests, Bern - Stuttgart - Wien, Huber Verlag, 1977.
- James H. Scully, Donald W. Bechtold, Jon A. Bell, Steven L. Dubovsky, Gordon L. Neigh, Janice L. Peterson, Psychiatry 2nd edition, A Williams S Wilkins publication, 1990.
- Jaspers K., Allgemeine Psychopathologie, VIII Auflage, Berlin - Heidelberg - New York, Springer Verlag, 1965.
- Kretschmer E., Medizinische Psychologie/Herausgeb. von W. Kretschmer, XIV Auflage. - Stuttgart, Georg Thieme Verlag, 1975.
- Leonhard K., Aufheilung der endogenen Psychosen und ihre differenzierte Ätiologie, VI Auflage, Berlin, Akademie Verlag, 1986.
- Lexicon of Psychiatric and Mental Health Terms, Geneva, 1994.
- Marc Galanter, Herbert D. Kleber, Textbook of Substance abuse Treatment, The American Psychiatric Press, Inc. Washington, 1994.
- Mayer-Gross W., Slater E., Roth M., Clinical Psychiatry, London, Cassel and Co Ltd, 1960.
- Müller Chr. (Herausgeg.), Lexicon der Psychiatrie, Berlin - Heidelberg - New York, Springer-Verlag, 1973.
- Multilingual dictionary of Narcotic drugs international control, United National, New York, 1993.
- Mumenthaler M., Neurology, Georg Thieme Verlag, Stuttgart - New York, 1983.
- Noyes A.P., Kolb L.C., Modern Clinical Psychiatry, VI Edition, Philadelphia - London, W.B. Sander's Company, 1963.
- Porot A., Manuel, Alphabétique de Psychiatrie clinique et thérapeutique, 5-e édit, Paris, Presse universitaire de France, 1975.
- Robert I Dupont, Avram Goldstein, John O'Donell, Barry Brown, Handbook on drug abus, National Institute on drug abuse, Washington, 1979.
- Rudzitis K., Terminologia Medica, Latinu - Krievu - Latviesu, Medicinas Terminu Vardnica, Riga, Liesma, 1973.
- Rycroft Ch., A Critical Dictionary of Psychoanalysis. - Harmondsworth: Penguin Books, 1979.
- Scharfetter Ch., Allgemeine Psychopathologie, Stuttgart, Georg Thieme Verlag, 1976.
- Schneider K., Klinische Psychopathologie, Stuttgart, Georg Thieme Verlag, 1962.
- Takurdas H., Takurdas L., Dictionary of Psychiatry, MTP Press Limited, 1979.
- Tuce D.H., A Dictionary of Psychological Medicine, 1892, vol. 1-2.
- Weilbrecht H.J., Psychiatrie im Grundriss, III Auslage, Berlin - Heidelberg - New York, 1973.
- Wolman B.B. (ed.), Dictionary of Behavioral Science, London - Basingstone, Macmillan Press Ltd, 1975.

**აკაკი გამყრელიძე, ნანა ნიკოლაიშვილი**

**ფსიქიატრიული ენციკლოპედია**

*რედაქტორი*

*ა. ცინცაძე*

*კორექტორი*

*რ. კანდელაკი*

*მხატვარი*

*ა. სარჩიმელიძე*

**კომპიუტერული უზრუნველყოფა**

**რ. ნიკოლაიშვილი**

**ქ. გოგინაშვილი**

**მ. აღდგომელაშვილი**

**თ. თხელიძე**

**ქ. ღამბაშიძე**

**ე. სამხარაძე**

**დ. აგეიანი**

მკვ "მერანი-3"-ის სტამბა, თბილისი, რუსთაველის ქ. N 42

ტელ: (+ 995 32) 92 29 92; (+ 995 32) 93 53 96

E-mail: merani3@geo.net.ge