

საბჭოთა ენდოკრინოლოგია

2

ი. ასლანიშვილი

ენდოკრინოლოგიური სადგურის დირექტორი

აჭარისტანის კურორტები ჩიუვთან ბაოლაში

F 5-892/4

P 711/1935


СОВЕТСКАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

2

И. А. Асанишвили

Курорты Абхазистана в борьбе с зобом

ბზილისის საბაოს ჯანაყნოვსკის ენდოკრინოლოგიური სადგური



ტფილისის საბჭოს ჯანმრთელობის განყოფილების

ენდოკრინოლოგიურ სადგურთან

1935 წლის ივნისიდან სისტემატიურად და დროგამოშვებით გამოდის

საბჭოთა ენდოკრინოლოგია

რომელიც გააშუქებს ყოველგვარ ენდოკრინოლოგიურ საკითხებს.

„საბჭოთა ენდოკრინოლოგია“ ში უახლოეს მონაწილეობას მიიღებენ: პროფ. მ. ასათიანი (ტფილისი), პროფ. მ. ბრეიტმანი (ლენინგრადი), პროფ. ვ. ვარაზი (ტფილისი), პროფ. გ. ვაჭაძე (ტფილისი), აკადემიკოსი ბ. ზავადოვსკი (მოსკოვი), დოც. ე. ზაქარაია (ტფილისი), პროფ. ი. თიკანაძე (ტფილისი), პროფ. ვ. კოგან-იასნი (ხარკოვი), პროფ. ე. კორჩიცი მინსკი, პროფ. პ. კუჩერენკო (კიევი), პროფ. ვ. ლევიტი (მოსკოვი), პროფ. ა. მაჭავარიანი (ტფილისი), პროფ. გ. მუხაძე (ტფილისი), პროფ. ზ. პრიხოდეკოვა (ხარკოვი), პროფ. ა. სმირონოვი (მოსკოვი), აკადემიკოსი მ. ტუშნოვი (მოსკოვი), პროფ. ვ. შიპაჩოვი (ირკუტკი), პროფ. პ. შუშანი (ტფილისი), პროფ. ა. წულუკიძე (ტფილისი).

პასუხისმგებელი რედაქტორი ი. ასლანიშვილი.

რედაქციის მდივანი ა. აბაშიძე.

რედაქციის მისამართი: ტფილისი, წინანდალის 9. ქალაქის პირველი საავადმყოფო.
ენდოკრინოლოგიური სადგური.



საბჭოთა ენციკლოპედია
ქართული ენციკლოპედია

К37.943
4

ი. ახლანიშვილი

აჭარისტანის კურორტები ჩიუშთან გარშემო

(მოხსენებულია აჭარისტანის ჯანსაღკომის რესპუბლიკანურ საკურორტო პირველ კონფერენციაზე
ქ. ბათუმში 1933 წლის 19 დეკემბერს).

მხოლოდ უკანასკნელი ათი წლის განმავლობაში შესაძლებელი შეიქნა საქართველოში ჩიუშის საკითხი უფრო ნათლად დაყენებულიყო. ის გაძლიერებული ინტერესი, რომელიც გამოიწვია ჩიუშის საკითხმა, უეჭველად მხედველობაშია მისაღები. მართლაც და საქართველო თავისი ავტონომიური რესპუბლიკებით და ოლქებით, თუ კი დავეყრდნობით უკანასკნელი სამეცნიერო ექსპედიციების მასალას, განსაკუთრებულად დიდ რიცხვს იძლევა ჩიუშის გავრცელების მხრივ; ეს რიცხვი კი 60,000-ს აღემატება. ცხადია რომ საქართველოს პირობებში სავსებით გამართლებულია ის დებულება, რომელიც დაჟღერებს ჩიუშის შესახებ, როგორც სოციალურ სწეულებათ.

ის მოსაზრება, რომ ჩიუში განსაკუთრებულად სვანეთში მძვინვარებს, შემცდარი აზრია, რადგან საქართველოს ფარგლებში იგი ყველა მის კუთხეებში თითქმის ერთგვარადაა გავრცელებული ორტა თუ მეტო სიძლიერით. ავიღოთ ამ შემთხვევაში აჭარისტანი, სადაც დაჩიუშვანებას ერთი უპირველესი ადგილი უჭირავს, თუ გნებავთ სვანეთთან შედარებით. თუ დავეყრდნობთ 1927 წლის სამეცნიერო ექსპედიციის მუშაობას ქვემო და ზემო აჭარაში—ქედის და ხულოს მიდამოებში, აჭარისტანისთვის ჩვენ გვყავს 7,000 დაჩიუშვანებული (იხ. ი. ახლანიშვილი. ჩიუში აჭარაში).

ცხადია რომ, როდესაც აჭარისტანისათვის გვაქვს ნაგარაუდვეი ასეთი დიდი რიცხვი, ისმება საკითხი, ღრთა თუ არა დღეს მაინც, ვიზრუნოთ და შეძლებისდაგვარად გავშალოთ ბრძოლა ჩიუშის წინააღმდეგ აჭარისტანის ფარგლებში და განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციოთ ამ სოციალურ სწეულებას, რომელიც დიად სოციალისტური მშენებლობის და სოციალისტური მეურნეობის დიდი ეტაპების ხანაში განსაკუთრებით კოლმეურნე გლეხობის შორის შრომის უნარიანობას ამცირებს და აქვეითებს.

აუცილებლად აღსანიშნავია, რომ ჩიუშის გავრცელების მხრივ თავისი მრავალრიცხოვნობით დღესდღეობით უეჭველად ეჯიბრებიან ერთმანეთს სვანები და აჭარლები.

მართლაც ფრიდლანდის მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ მაშინ როდესაც სვანეთში მთელ მოსახლეობაზე მისი ზუსტი გამოკვლევის მიხედვით სოფელ-სოფელ ოჯახ-ოჯახ ჩვენ გვაქვს 29%, აჭარისტანში აჭარლებს შორის ხულო-ქედის მიდამოებში ეს პროცენტი 29,7; თითქმის განსხვავება არაფერია. მაშასადამე სვანეთთან ერთად აჭარასაც იგივე ადგილი უკავია, მხოლოდ მას ამ მხივ ნაკლებ იცნობენ.

ზოგიერთი ადგილების მიხედვით აჭარა უსწრებს სვანეთს; და თუ კი ჩიყვიანობის გავრცელებას მიუღწევით ადგილმდებარეობის მიხედვით, სადაც დასახლებული არიან სვანები და აჭარლები, უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ პირველ ადგილს დაჩიყვიანების მხრივ დიქტის ქვემო სვანეთი, მეორეს ქვემო აჭარა, მესამე ადგილს ზემო აჭარა, მეოთხეს ზემოსვანეთი და მეხუთეს აფხაზეთის სვანეთი.


უკვე ასეთი გარემოება ნათელყოფს ჩიყვიანობის გავრცელების სიძლიერეს აჭარლებსა და სვანებს შორის. პროცენტების მიხედვით შემოხსენებული აზრი შემდეგნაირად გამოიხატება:

ქვემო სვანეთში	5972	გამოკვლეულზე დაჩიყვიანებული იყო	2671	ანუ	44,7 ⁰ / ₀
ქვემო აჭარაში	4777	გამოკვლეულზე დაჩიყვიანებული იყო	1508	ანუ	32,9 ⁰ / ₀
ზემო აჭარაში	3207	გამოკვლეულზე დაჩიყვიანებული იყო	864	ანუ	25,4 ⁰ / ₀
ზემო სვანეთში	10766	გამოკვლეულზე დაჩიყვიანებული იყო	2362	ანუ	22,1 ⁰ / ₀
აფხაზეთის სვანეთში	1856	გამოკვლეულზე დაჩიყვიანებული იყო	363	ანუ	19,5 ⁰ / ₀

შემოხსენებული რიცხვები აშკარა მაჩვენებელია იმისა, თუ სვანებსა და აჭარლებს შორის მათი ბინადრობისა და ადგილმდებარეობის მიხედვით ჩიყვიანობას როგორი მკაცრი საფუძველი აქვს და ორივე მთელ მცხოვრებთა შორის გავრცელებული ჩიყვიანობა როგორ საშინელ პირობებს ქმნის. უნდა შეგვეხსენებოდნენ მხედველობაში მავილთა ჩიყვის ნიადაგზე არსებული კრები-ნების საკმარისი რაოდენობაც.

როდესაც ვლაპარაკობთ ჩიყვის გავრცელების შესახებ აჭარისტანში, ჩვენ მხედველობაში გვაქვს ჩვენი გამოკვლევების მიხედვით მხოლოდ ხუთი თემი ქვემო აჭარისა და ზემო აჭარისა, რაც ხულოსა და ქედის მიდამოებს ეხება. ესენი არის ქვემო აჭარაში ქედის, მერისის და ცხმოროსის თემები, მხოლოდ ზემო აჭარაში ხულოსი და სხალთის თემები. ამ ზემოაღნიშნულ თემებიდან გამოკვლეული გვაქვს მთლიანად 82 სოფელი ოჯახ-ოჯახ სულ 3404 კომ-ლით. მხოლოდ იმ 82 სოფელში მცხოვრებ 21583 სულიდან გამოკვლეული გვყავს 7984 სული, რომელთა შორის დაჩიყვიანებულია 2372 სული, აქედან მამრობითი 913, დედრობითი სქესის 1459. მხოლოდ მათ შორის თუ გამოვყავით ბავშვები, უკანასკნელთ შორის და-ჩიყვიანებულია 561. ამრიგად დაჩიყვიანებულია მამაკაცი 616, ქალი 1195, ბიჭი 296, გო-გონა 265. ცალკალკე თემების მიხედვით კი შემოხსენებული შემდეგში გამოიხატება:

თ ე მ ი	მამაკაცი	ქალი	ბიჭი	გოგონა	მამრობ.	დედრობ.	სულ	%/0
ქედის	187	416	68	64	255	480	735	29,8
მერისის	82	177	28	24	110	201	311	38,3
ცხმოროსის . .	117	220	61	64	178	284	462	30,6
ხულოს	55	112	26	35	81	147	228	20,5
სხალთის . . .	176	270	113	77	289	347	636	30,3
5	617	1195	296	264	913	1459	2372	29,7



ამრიგად ზემოთმოყვანილი რიცხვები ნათელი მაჩვენებელია იმის, რომ ჩიყეთან ბრძოლაში აჭარისტანში როგორი განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს. აღნიშნული პირობების მიხედვით უნდა მივიღოთ მხედველობაში ის გარემოებაც, რომ ზემო აჭარიდან გამოუყვლეველი დავგრჩა კიდევ ხუთი თემი — ღორჯომის, რიყეთის, ყარადღეს, ჟრჩამუხის და ჭვანახის. ამასთანავე აღსანიშნავია უწყველად ის მდგომარეობაც, რომ ექსპედიციის სრულიად გამოუყვლეველი დარჩა აჭარის წყალის, ბათუმისა და ქაბულეთის მიდამოები, თუმცა მხედველობაში უნდა ვიქონიოთ მომავალში მათი შესწავლაც. ეს გამოუყვლეველი მიდამოები როგორც ზღვისთან უფრო ახლო მდებარენი აღბად ქვემო და ზემო აჭარის მიდამოებთან, რომელნიც აჭარის ქედს იქით მდებარეობენ და ზღვის ნაპირებსაც დაცილებული არიან, შედარებით ნაკლებ დამოუკიდებელს მოგვცემენ, იპისათვის, რომ ზღვისპირა მიდამოებში უნდა ვიგულისხმოთ იოდით გაფლენილი ჰაერი, რომელიც საერთოდ ჩიყვის გავრცელებას ანელებს. ყოველ შემთხვევაში ეს ჩვენი მოსაზრებაა და აღბად ახლო მომავალში ეს აზრი დაგვიდასტურდება, თუ კი ამ გამოუყვლეველ მიდამოებსაც შევისწავლით უკვე არსებულ ექსპედიციო მოგზაურობით სათანადო კვლევა-ძიების წარმოებით.

ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით ჩვენ შვევიძლია ვიმსჯელოთ მხოლოდ არსებული მასალების მიხედვით, რაც უწყველად საკმარის საბაბს გვაძლევს ვთქვათ რომ ჩიყეთან ბრძოლის საკითხი აჭარისტანში დროულია და ეს საკითხი აჭარისტანში აუცილებლად უნდა დაუკავშიროთ მის კურორტებს. კურორტები ჩიყეთან ბრძოლაში — შეიძლება ეს ახალი საკითხი იყოს, მაგრამ ამ მიდგომით საკითხის დაყენება ჩვენ მიზანშეწონილად მიგვაჩნია სწორედ აჭარისტანის კურორტების მიმართ, რომელნიც ზღვის პირად გადაშლილია და მათი მიდამოები განსაკუთრებით ჩიყვის საწინააღმდეგო გამოსაყენებელი ჰაერითაა გაფლენილი. ამის მიხედვით რასაკვირველია აჭარისტანის ზღვის სანაპირო კურორტები უნდა გამოყენებული იქნეს პროფილაქტიური მიზნით ჩიყვის საწინააღმდეგო. ამ მხრივ აუცილებელ საკიროებას წარმოადგენს, რათა პირველ რეგში აჭარისტანის ჯანმრთელობის სახალხო კომისარიატმა და აჭარისტანის საკურორტო სამმართველომ გაშალონ მუშაობა და ჩიყეთან ბრძოლის საკითხს სათანადო ყურადღება მიექციონ. აჭარისტანშიც ისე, როგორც ეს უკვე ხორციელდება ზემო სვანეთში, ჩიყეთან ბრძოლაში უნდა ჩაებას მთელი საბჭოთა საზოგადოებრივობაც.

აქ მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, სანამ გადავიდოდეთ აჭარისტანისათვის სათანადო ზომების მითითებებზე, მოკლედ შევხვით, თუ რა განსხვავებითი მუშაობის ჩატარებას მოითხოვს ზემოსვანეთი შედარებით აჭარისტანის პირობებთან.

შედარებით ზემოსვანეთთან, სადაც საკითხი დაყენებულია მინერალური წყლების გამოყენების მიხედვით წყალსადენების საშვალბით, მათი გადაყვანით უჩიყვო ადგილებიდან ჩიყვან ადგილებში, აჭარისტანში ამ მხრივ ვერ მიუღებთ საკითხს, რადგან აჭარისტანში მინერალური წყაროები მარტო რკინა-იოდის შემადგენლობით, რომელიც ჩიყვის საწინააღმდეგოთაა გამოსაყენებელი, შედარებით ნაკლებ მოიპოვება, თუმცა საერთოდ მინერალური წყაროები არის უფრო სხვა შემადგენლობით (კუბცისი).

ზემოსვანეთში 40 — 50 კილომეტრის მანძილზე მოიპოვება 150-მდე მინერალური წყაროები, უმთავრესად მარტო რკინა-იოდის შენაერთით, რაც თავის თავად ჩიყვის საწინააღმდეგოდაა გამოსაყენებელი. ზემოსვანეთის ადგილმდებარეობა გვაძლევს საშვალბას იქ არსებული

მინერალური წყლები სავსებით გამოვიყენოთ ჩიყვის საწინააღმდეგოთ. ჩვენ განვიზრახეთ და კიდევ შეუდევით მის პრაქტიკულ განხორციელებას, რათა იმ სოფლებიდან და მიდამოებიდან, სადაც მოსახლეობას სასმელად აქვს სწორედ ასეთი მინერალური წყაროს წყალი და სადაც ჩიყვიანები სრულიად არ მოიპოვებიან, ეს მინერალური წყლები მივეცით აგრეთვე მეზობელ დაჩვიანებულ სოფელს.

როდესაც ჩვენ ასეთი აზრის განხორციელება განვიზრახეთ სწორედ რომ ზემოსვანეთის მიდამოებში, იქ, სადაც მდინარე ენგურის ვიწრო ხეობა მკაცრი მთიანი ბუნების მიხედვით კავკასიონისა და სვანეთის ქედის შორის მომწყვდეულია, ჩვენ მხედველობაში გვქანდა უეჭველად მისი ადგილმდებარეობა, სადაც სოფლები ერთი მეორესაგან ძლიერ მცირე მანძილით არიან დაცილებული; ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ იქ არსებული მინერალური წყლების მიხედვით ჩიყვიანი სოფლები უჩიყვო სოფლების მაღლობლად მდებარეობენ დაახლოებით $1\frac{1}{2}$ —1—2 კილომეტრის მანძილზე.

მაშასადამე მინერალური წყლების გადაყვანას უჩიყვო ადგილებიდან ჩიყვიან ადგილებში უეჭველად, ასე გგვონია ჩვენ, უნდა მოყვეს ჩიყვის შემცირება და თანდათანობით მისი გაქრობა და მოსპობა; არსებული ჩიყვის გაქრობასთან ახალი ჩიყვიც არ უნდა გაჩნდეს და ამის მიხედვით არ უნდა გაჩნდეს კრეტინიზმიც.

ყოველივე ზემოხსენებული მოსაზრებათა მიხედვით მინერალური წყლის გადაყვანა უჩიყვო ადგილებიდან ჩიყვიან ადგილებში ჩვენ ვცადეთ ხის მილების საშვავლებით, რომელიც ადგილობრივი ხე-ტყის მასალიდან იქნა დამზადებული და ეს ხის მილები ჩაწყობილი იქნა მიწაში საგანგებოდ გაყვანილ არხში ერთი მეტრის სიღრმით. თვით ხე-ტყის მასალა გამოყენებული იყო სოკის, ფიჭვის და ნაძვისაგან, მხოლოდ მათი გამძლეობის შესახებ ლაპარაკობს თვით ხის შემადგენელი ფისოვანი ნივთიერება და შემდეგ მისი გაფლენთვა მინერალური წყლის შემადგენელი ნივთიერებიდან, რომელიც შესდგება რკინა-იოდ ნაჩვევ მარილებისაგან. ზემოსვანეთში მინერალურ წყაროებში ჩადგმული ხის კოდები, რომელნიც სრულიად დაუზიანებელიც რამოდენიმე ათეული წლების განმავლობაში შენახული არიან, ამას გვიმტკიცებენ.

ზემოსვანეთში 1933 წლის შემოდგომათ ბერძნულ ფეშში სოფელ უშვანარის მშრომელი გლეხობის დახმარებით გაყვანილი ჩიყვის საწინააღმდეგო საკავშირო მაშტაბით პირველი წყალსადენი მოწმობს ზემოსვანეთის მიდამოებში ჩიყვთან ბრძოლის გადამწყვეტი ნაბიჯების გადადგმას, მხოლოდ 1934 წლისათვის კიდევ დამატებით ხუთი ახალი წყალსადენის გეგმის შედგენა ბერძნულ, ცხუშარისა და მესტიას თემებისათვის იმ გარემოებას დასტურებს და ამტკიცებს, რომ ჩიყვიანობა ახლო მომავალში ზემოსვანეთში სრულიად უნდა გაქრეს და მომავალი სვანეთი—კურორტი და მოგზაურობა-მთავრობის მხარე თავისუფალი უნდა იქნეს ამ საშინელ სოციალური სნეულებისაგან.

აჭარისტანში კი ბრძოლა ჩიყვის წინააღმდეგ სრულიად სხვა მიმართულებით უნდა გაიშალოს. რასაკვირველია სავსებით გამოყენებული უნდა იქნეს ჩიყვიან მიდამოებში როგორც მინერალური, ისე ჩვეულებრივი, არა მინერალური კარგი წყაროები, რაც საერთოდ აჭარაში შედარებით ნაკლებია. ხულოს თემი ამ შემთხვევაში უკეთეს პირობებშია. მაშინ როდესაც ჩვენი მასალის მიხედვით ჩიყვის გავრცელების მხრივ უფრო გამოსახულია მერისის თემი—

30,30%, მხოლოდ ცხმარისის, სხალთის და ქედის თემები ჩიყვის 30%-ის იძლევიან, ხულოს თემში ეს დაჩიყვიანება 20,50%-ს უდრის.

ამის მიზეზია ის გარემოება, რომ ხულოს თემში აქა-იქ მინერალურ წყლებსა და კლდოვან წყაროებს მაინც შეხვდებით. ამისათვის უეჭველად შეძლების დაგვარად სენიებისებურად უნდა იქნეს იქაური კარგი წყლები გამოყენებული.

მაგრამ ჩიყვთან ბრძოლა აჭარისტანში უმთავრესად და განსაკუთრებით ზღვის სანაპირო კურორტების საშვალბით უნდა იქნეს წარმოებული; მოგვსენებათ რომ საერთოდ ზღვის სანაპირო მდამოები გაუღწეოილია იოლით, უფრო სწორედ რომ ესთქვით ამ მდამოების ჰაერში მოიპოვება იოლის ნივთიერება, რომელიც მრავლადაა შიგ ზღვაში იქ არსებულ ფიკაში— წყალმცენარეში. იოლი კი ყველამ იცის ჩიყვის საწინამდგო საუკეთესო საშვალბა; სწორედ ამის გამოა, რომ ჩვენ ჩიყვიან ავადმყოფებს ურჩევთ ხოლმე ზღვის პირად წასვლას, იოლოვან ატმოსფერაში; მასვე ურჩევთ უხვად ზღვის თევზის ხმარებას, რომელიც გაღწეოილია იოლოვანი ნივთიერებით, და ამ იოლოვან ნივთიერებას თევზი საერთოდ ბლომად შეიცავს, პირდაპირ შედარებაც არ შეიძლება სხვა საკვებ მასალასთან ამ მხრივ. იოლი კი ჩიყვის საწინამდგო მთავარი საშვალბაა. მას აძლევენ მარილში სხვადასხვა ქვეყნებში პროფილაქტიური მიზნით დაჩიყვიანებულ მდამოებში და შესამჩნევ შედეგებსაც იღებენ. განსაკუთრებით ეს ითქმის შვეიცარიასზე.

ცხადია რომ შვიი ზღვის სანაპირო კურორტები, —ამ შემთხვევაში ჩვენ ვხვებით აჭარისტანის კურორტებს, —უეჭველად გამოსაყენებელია ამ მხრივ და ამაღავარი მოსაზრებანი ჩიყვთან საბრძოლველად ფრად მიზანშეწონილი იქნება.

მნიშვნელოვანია ამ მხრივ სენების გადასვლა ზემოსენიტიდან აფხაზეთის მთიან მდამოებში, ვგრედ წოდებულ დალში, რომელსაც დღეს დღეობით ახალ სენათს, აფხაზეთის სენათს ეძახიან.

მიწის მხრივ შევიწროებულნი ზემო სენიტიდან სენები გადასახლდენ 3000 სულის რაოდენობით აფხაზეთის მდამოებში და აღნიშნული გადასახლებით მოსცილდენ რა თავის მამაპაპათა მკაცრი ბუნების მდამოებს, ზღვის მიმართულებით ჩასვლით დაუახლოვდენ აფხაზეთის ნახი ბუნების მიწაწყალს.

სწორედ ასეთ გარემოებაში — ზღვასთან დაახლოვების მიხედვით მათ შორის არსებული ჩიყვის გავრცელება შესამცირა და აფხაზეთში დასახლებულ სენებს შორის ჩიყვი თანდათან კლებულობს და ერთი ათეული წლის განმავლობაში მისი პროცენტი 19,5-მდე დავარდა.

რაც შეეხება აჭარისტანის პირობებს, აქ უნდა ითქვას შემდეგი. ქვემო და ზემო აჭარა მაინცა და მაინც არც ისე ძალიან არიან დაცილებული ზღვის სანაპიროებს, მაგრამ ქედი, აჭარის ქედი ვით მძლავრი ზღუდე ამართული აჭარასა და ზღვის სანაპიროებს შორის, საცხებით სპოზს ზღვის იოლოვან ჰაერისათვის მიმავალ გზებს დაჩიყვიანებულ მდამოებისაკენ. ეს აღნიშნა პროფ. ლეიტერმაც. მაშასადამე საჭიროა სხვა გზების გამოძახება.

აჭარისტანის კურორტები: ბათომი, მახინჯაური, მწვანე კონცხი, ციხის ძირი, ქობულეთი და აგრეთვე მათ შორის არსებული ზღვისპირა მდამოები გამოყენებული უნდა იქნეს ჩიყვის საწინამდგო. მთელი ეს არე, ბათომ-ქობულეთის ზღვის პირა რვალი მაშასადამე საუკეთესო აღგილი იქნება, სადაც უნდა მოეწყოს ჩიყვის პროფილაქტიკურიუმები, ჩიყვის საწინამდგო.



დგეო მებრძოლი წერტები. ამდაგვარ პროფილაქტორიუმებში კი დაჩიყვიანებულ ადგილებიდან, განსაკუთრებით ზემო და ქვემო აპარდან გადმოსროლილი უნდა იქნეს ჯანმრთელობის ბავშვები, რომელთაც ჩიყვი მის საწყის მსვლელობაში უკვე განვითარებული აქვთ. ამდაგვარი ჩიყვის პროფილაქტორიუმები აპარისტანში დარწმუნებული უნდა ვიყავთ კარგ შედეგებს მოგვითანს.

აპარისტანში ზღვის სანაპირო კურორტებზე და საერთოდ მთელს მის მიდამოებში არსებული ყველა სასწავლებლები უეჭველად გამოყენებული უნდა იქნეს ამგვარივე მიზნით, რადგან ეს სასწავლებლებიც არსებობს იოლით გაქვნილი ჰაერიან მიდამოებში. აღნიშნულ სასწავლებლებშიც ჩამოყვანილი იქნებიან დაჩიყვიანებული ადგილებიდან ბავშვები როგორც უკვე წამოწყებული ჩიყვით, აგრეთვე ჩიყვისადმი განწყობილი, ე. ი. ისეთები, რომელთაც მშობლები ჰყავთ ჩიყვიანები, ან არა და განსაკუთრებით ძლიერ დაჩიყვიანებულ ადგილებში იმყოფებიან. ბავშვების ასეთ გადმოყვანას ცხადია ექნება დროებითი ხასიათი და ამგვარი გადმოყვანა შეძლებისდაგვარად უნდა მოეწყოს და ცხადია, რომ აპარისტანის ზღვის სანაპირო მიდამოებში და კურორტებზე არსებული სასწავლებლები თავისთავად ჩიყვის პროფილაქტორიუმის დანიშნულებას შეასრულებენ.

სასწავლებლებთან დაკავშირებით ზაფხულის ხანაში ამავე პროფილაქტიკის თვალსაზრისით უნდა გამოვიყენოთ პიონერთა ლაშქრობანი. ზღვის სანაპირო კურორტების მიდამოებში უნდა მოეწყოს უეჭველად პიონერ-ბანაკები, სადაც შეკრებილი იქნებიან ბავშვები დაჩიყვიანებული მიდამოებიდან. პიონერთა ჰასაკი ხომ ჩიყვის აღმოცენების ხანაა. მაშასადამე ეს პიონერთა ბანაკებიც გადაიქცევა საუკეთესო პროფილაქტორიუმებათ ჩიყვის საწინააღმდეგოთ, ვინაიდან ასეთი ბანაკები ორი სამი თვე იმოქმედებენ და ჩიყვის აღმოცენების ლიკვიდაციას ხელს შეუწყობენ.

შესაძლებელია ამავე მიზნით მოვაწყოთ დაჩიყვიანებული ადგილებიდან მოსახლეობის გადმოყვანა ზღვის სანაპირო მიდამოებში. ეს გადმოყვანა კი უნდა მოეწყოს შემდეგ პირობებში. მოგვხსენებათ აპარისტანის ზღვის სანაპირო მიდამოები სოციალისტური მეურნეობის საუკეთესო ნაწილად არის გამოცხადებული საბჭოთა კავშირში. საქმარისია აღვნიშნოთ ჩიის და ციტრუსიან კულტურათა ძლიერი და ფრიალ მნიშვნელოვანი განვითარება აპარისტანში, რომ ჩვენ თვალწინ გადაიშლება ისეთი დიდი პერსპექტივა ჩვენი მოსაზრებათა განხორციელებისათვის, რომ ჩიყვის საწინააღმდეგო ბრძოლა აქაც შესაძლებელი იქნება სავსებით მოეწყოს. ჩიის პლანტაციებსა და ციტრუსიან კულტურათა საბჭოთა მეურნეობებში, სადაც ცხადია მუშა ხელი ფრიალ საქირაა, გამოყენებული უნდა იქნეს დროებითი გადმოსახლების სახით ჩიყვისადმი განწყობილი და აგრეთვე დაჩიყვიანებულ მოსახლეობის გადმოყვანა, უფრო სწორედ რომ ესთქვათ ჩამოყვანა აღნიშნულ საბჭოთა მეურნეობებში. მოსახლეობასთან ერთად შესაძლებელია საწარმოო პრაქტიკის სახით მოზრდილ მოწაფეთა ჩამოყვანაც ზემოაღნიშნულ საშუალებებზე.

ამდაგვარია საერთოდ ჩვენი მოსაზრებანი ჩიყვთან ბრძოლის გაშლის შესახებ აპარისტანში და სათანადო ცდების ჩატარების მიზნით დღესვე მიზანშეწონილად უნდა იქნეს ცნობილი ერთერთ კურორტზე აპარისტანში ჩიყვის საწინააღმდეგო პირველი პროფილაქტორიუმის გახსნა, რომელიც პირველი იქნება არამც თუ აპარისტანში, არამედ მთელი საბჭოთა კავშირის

ზომსადართავ. და თუ კი ეს დასახული მიზანი განვახორციელებთ, სულ ახლო მომავალში შეუდგებით უკვე ამ ფრიად მნიშვნელოვანი მუშაობის წამოწყებას.

ყოველივე ზემოხსენებულის მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნათ შემდეგი:

1. საქართველოში გავრცელებული დაჩივიანება იმდენად მნიშვნელოვანია თავისი რაოდენობით, რომ მისი რიცხვი 60,000-ს აღემატება; ამ საერთო რიცხვიდან 7,000 აჭარისტანისათვის უნდა ვივარაუდოთ, თუ დავეყრდენით 1927 წლის სამეცნიერო ექსპედიციის მუშაობას და გამოკვყენებულ მასალებს ქვემო და ზემო აჭარიდან.

2. საქართველოში გავრცელებული ჩიყვის მიხედვით თავისი მრავალრიცხოვნობით უქველად ერთმანეთს ეჯიბრებიან სვანები და აჭარლები.

3. სვანებს შორის მთელი მოსახლეობის მიხედვით გვაქვს დაჩივიანების 29%, მხოლოდ აჭარლებს შორის 29,7%.

4. თუ ჩიყვიანობის გავრცელებას მიუდგებით ადგილმდებარეობის მიხედვით, სადაც დასახლებული არიან სვანები დი აჭარლები, უნდა აღინიშნოს ის გარემოება რომ პირველ ადგილს დაჩივიანების მხრივ დაიჭერს ქვემო სვანეთი, მეორე ადგილს ქვემო აჭარა, მესამე ადგილს ზემო აჭარა, მეოთხე ადგილს ზემოსვანეთი და მესუთე ადგილს აფხაზეთის სვანეთი.

5. პროცენტების მიხედვით ზემოხსენებული აზრი შემდეგ ნაირად გამოიხატება:

ქვემოსვანეთი	44.7% —	5972	გამოკვლეულზე	2671
ქვემო აჭარა	32 9% —	4777	"	1508
ზემო აჭარა	25.4% —	3207	"	864
ზემო სვანეთი	22.1% —	10776	"	2362
აფხაზეთის სვანეთი	19.5% —	1856	"	363

6. როდესაც ვლაპარაკობთ ჩიყვის გავრცელების შესახებ აჭარისტანში, ჩვენ გვაქვს მხოლოდ მხედველობაში ჩვენი გამოკვლევების მიხედვით ქვემო აჭარაში ქედის, მერისის და ცხმო-რისის თემები, მხოლოდ ზემო აჭარაში ხულოსი და სახლთის თემები; ამ ხუთი თემიდან გამოკვლეული გვაქვს 82 სოფელი 3404 კომლით, მხოლოდ 21583 სულიდან გამოკვლეული გვყავს 7984 სული, რომელთა შორის დაჩივიანებული აღმოჩნდა 2372 სული, აქედან მამრობითი სქესის 913, დედრობითი სქესის 1459. მხოლოდ მათ შორის თუ გამოვყავით ბავშვები, უკანასკნელთ შორის დაჩივიანებულია 561. ამგვარად გამოკვლეულთ შორის დაჩივიანებულია მამაკაცი 616, ქალი 1195, ბიჭი 296, გოგონა 265.

7. თუ მივიღებთ მხედველობაში, რომ ზემო აჭარიდან გამოუკვლეველი დავგრაჰ კედეს ხუთი თემი — დორჯომის, რიყეთის, ყარადერეს, უჩამფის და ქეანასი, არეთვე არ შეგვხვიათ აჭარისწყლის, ბათომისა და ქაბულეთის მიდამოებს, მაგრამ ამისდა მიუხედავად ზემოხსენებული მასალაც საკმარის საბაბს გვაძლევს ვიმსჯელოთ ჩიყვისა და ჩიყვიანობის საწინამდებო ბრძოლის შესახებ აჭარისტანში.

8. საკითხი: ჩიყვიან ბრძოლა აჭარისტანში — დროულია და ეს საკითხი უქველად უნდა დაუკავშიროთ აჭარისტანის კურორტებს, რომლებიც პროფილაქტიური მიზნით უნდა გამოვიყენოთ ჩიყვის საწინამდებო.



9. აჭარისტანშიც ისე, როგორც ეს უკვე ხორციელდება ზემოსვანეთში, ჩიყვთან ბრძოლის საკითხს მთავარი ყურადღება უნდა მიექცეს; აჭარისტანის ჯანსახკომმა და საკუთრება სამართველომ პირველ რიგში უნდა გაშალონ ამ მხრივ სათანადო მუშაობა.

10. შედარებით ზემოსვანეთთან, სადაც საკითხი დაყენებულია მინერალური წყლების გამოყენების მიხედვით წყალსადენების საშვალებით მათი გადაყვანით უჩიყვო ადგილებიდან ჩიყვთან ადგილებში, აჭარისტანში ამ მხრივ ვერ მიუღდებათ საკითხს, რადგან აჭარისტანში მინერალური წყაროები მარტივ რკინა-იოდის შემადგენლობით, რომელიც ჩიყვის საწინამდევოთაა გამოსაყენებელი, შედარებით ნაკლებ მოიპოვება.

11. აჭარისტანში ბრძოლა ჩიყვთან უნდა გაიშალოს სწორედ ზღვის სანაპირო კურორტების საშვალებით, რადგან აჭარისტანის ზღვის სანაპირო მიდამოების ჰაერი გაჟღენთილია იოდით, რომელიც მრავალადაა შიგ ზღვაში მის ნაპირებზე არსებულ წყალმცენარეებში. იოდია კი ჩიყვის საწინამდევო მთავარი საშვალეობაა.

12. მნიშვნელოვანია ამ მხრივ სვანების გადასახლება ზემოსვანეთიდან აფხაზეთში, სადაც ზღვასთან დაახლოების მიხედვით ჩიყვი შედარებით პროცენტულად შემცირდა.

13. აჭარისტანის კურორტები: ბათომი, მახინჯაური, მწვანე კონცხი, ციხის ძირი, ქობულეთი და აგრეთვე მათ შორის არსებული ზღვისპირა მიდამოები გამოყენებული უნდა იქნეს ჩიყვის საწინამდევო პროფილაქტორიუმების მოწყობით, სადაც გადმოსროლილი იქნება უმთავრესად ბავშვები დაჩიყვიანებულ ადგილებიდან — ქვემო და ზემო აჭარის მიდამოებიდან.

14. აღნიშნულ კურორტებზე არსებული ყველა სასწავლებლები უფველად გამოყენებული უნდა იქნეს ამ მიზნით, რადგან თუ კი იოდით გაჟღენთილ ჰაერიან მიდამოებში არსებულ სასწავლებელში ჩამოყვანილი იქნებიან დაჩიყვიანებული ადგილებიდან ბავშვები ჩიყვისადმი განწყობილნი და უკვე წამოწყებული ჩიყვითაც, ცხადია ამგვარი სასწავლებლები თავისთავად პროფილაქტორიუმის დანიშნულებას შეასრულებენ.

15. ზაფხულობით უნდა მოეწყოს ბიონერ-ბანაკები, სადაც უმთავრესად თავს მოიყრის დაჩიყვიანებული მიდამოებიდან ჩამოყვანილი ბავშვები.

16. შესაძლებელია ამავე მიზნით გადმოყვანილი იქნენ დროებით სამუშაოდ მოზრდილი მოწაფეობა და მოსახლეობაც აჭარისტანში ზღვის პირად არსებულ კოლმეურნეობებში და საბჭოთა მეურნეობებში.

17. სათანადო ცდების ჩატარების მიზნით დღესვე მიზანშეწონილად უნდა იქნეს ცნობილი ერთერთ კურორტზე აჭარისტანში ჩიყვის პირველი პროფილაქტორიუმის გახსნა და უახლოეს პერიოდში ამ ფრიად მნიშვნელოვანი მუშაობის წამოწყება.

ექიმი ი. ასლანიშვილის მოხსენების „აჭარისტანის კურორტები ჩიყვთან ბრძოლაში“ მიხედვით აჭარისტანის ჯანსაზღვრის რესპუბლიკანური საკურორტო პირველ კონფერენციაზე 1933 წლის 20 დეკემბერს მიღებული იყო შემდეგი რეზოლუცია:

მოისმინა რა ექიმი ი. ასლანიშვილის მოხსენება „აჭარისტანის კურორტები ჩიყვთან ბრძოლაში“, აჭარისტანის ჯანსაზღვრის რესპუბლიკანური საკურორტო პირველი კონფერენცია საჭიროდ სთვლის:

1. ჩიყვთან ბრძოლის მიზნით აჭარისტანის ერთ-ერთ სანაპირო კურორტზე მოეწყოს ჩიყვის პროფილაქტიკური.

2. გატარდეს ჩიყვისადმი განწყობილი და დაჩიყვიანებული ბავშვების გადაყვანა ზემო და ქვემო აჭარის დაჩიყვიანებულ ადგილებიდან და ამის მიზნით მოეწყოს პიონერ-ბანაკები; გამოყენებული იქნეს ამ მიმართულებით სასწავლებლები.

3. აჭარისტანის ტოპოგრაფიული პირობების მიხედვით, სანაპიროებზე გაყვანილი იქნეს ჩიყვის საწინააღმდეგო ერთ პროფილაქტიკური წყალსადენი, რისთვისაც გამოყენებული იქნეს ლერწამის მიწები.

4. მიღებული იქნეს ზომები აჭარისტანის დარჩენილი მიდამოების გამოკვლევისათვის ჩიყვის გავრცელების მხრივ, განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევით აჭარისტანის საკურორტო ზღვისპირა რაიონისადმი.

И АСЛНИШВИЛИ

КУРОРТЫ АДЖАРИСТАНА В БОРЬБЕ С ЗОБОМ.

(Выводы)

1. Распространение зоба в ССР Грузии настолько значительно, что количество его переваливает за 60.000; из этого общего количества 7.000 приходится на Аджаристан, судя по опубликованным материалам научной экспедиции, работавшей летом 1927 года в районах Нижней и Верхней Аджарии.

2. По распространению зоба в Грузии по количеству безусловно соревнуются между собою сваны и аджарцы.

3. Среди сванов по отношению всего населения имеем 29% зоба, среди же аджарцев 29,7%.

4. Если в отношении распространения зоба будем подходить с точки зрения месторасположения, где расселены сваны и аджарцы, необходимо отметить то обстоятельство, что на первое место по распространению зоба выйдет Нижняя Сванетия, на второе место Нижняя Аджария, на третье место Верхняя Аджария, на четвертое — Верхняя Сванетия и на пятое Абхазская Сванетия.

5. Вышеозначенное положение в процентах можно выразить следующим образом:

Нижняя Сванетия	на	5972	обследованных	даёт	2671	зобатых	44,7%
Нижняя Аджария	на	4777	"	"	1508	"	32,9%
Верхняя Аджария	на	3207	"	"	864	"	25,4%
Верхняя Сванетия	на	10776	"	"	2362	"	22,1%
Абхазская Сванетия	на	1856	"	"	363	"	19,5%

6. Когда говорим о распространении зоба в Аджаристане, мы имеем в виду на основании своих исследований в Нижней Аджарии районы Кеды, Мериси и Цхмориси, а в Верхней Аджарии Хуло и Схалту. Из означенных пяти районов нами обследовано 82 деревни с 3404 дымов, где из 21583 душ обследовано 7984, среди которых у 2372 обнаружен зоб; отсюда мужчин 913, женщин 1459. Но если среди них выделить детей, то среди последних зобатых оказалось 561. Таким образом среди обследованных зобатых аджарцев мужчин 616, женщин 1195, мальчиков 296, девочек 265.

7. Если иметь в виду что в Верхней Аджарии осталось еще пять необследованных районов — Горжоми, Рикеты, Карадере, Учампа и Чвана, а также совершенно не касались мы районов Аджарисхали, Батума и Кобулет, но несмотря на это вышеприведенный материал все же даёт нам право обсуждать вопрос о борьбе с зобом и зобатостью в Аджаристане.

8. Вопрос о борьбе с зобом в Аджаристане вполне своевременен и вопрос этот необходимо увязать с Аджаристанскими Курортами, которые нужно использовать с профилактической целью по борьбе с зобом.

9. В Аджаристане также, как это сейчас осуществляется в Верхней Сванетии, вопросу по борьбе с зобом необходимо уделить главное внимание; Наркомздрав и Курупр Аджаристана в первую очередь должны развернуть работу в этом направлении.

10. По сравнению с Верхней Сванетией, где вопрос по использованию минеральных источников при посредстве водопроводов переводом вод из незобатых местностей в зобатые местности практически нами уже поставлен, в Аджаристане не можем таким же образом разрешить этот вопрос, ибо там отсутствуют источники, содержащие соли с примесью железа и иода, источники, которых можно было бы использовать по борьбе с зобом.

11. В Аджаристане борьба с зобом должна развернуться при посредстве приморских курортов Аджаристана, ибо в приморском районе Аджаристана мы имеем атмосферу, насыщенную иодом, который в большом количестве содержится в морских водорослях. Иод же является наилучшим средством против зоба. Тут же можно применить питание морской рыбой, содержащая в большом количестве иод.

12. Большое значение имеет в этом отношении переселение сванов из Верхней Сванетии в Абхазию, где в связи с приближением к морю зоб сравнительно идет на убыль.

13. Курорты Аджаристана: Батум, Махинджаури, Зеленый мыс, Цихисдзири, Кобулеты, а также меж ними существующая приморская полоса должны быть использованы по борьбе с зобом устройством зобных профилакториев, куда главным образом должны быть сосредоточены дети из зобатых местностей—из районов Нижней и Верхней Аджарии.

14. Существующие все учебные заведения на вышеозначенных курортах обязательно должны быть использованы в этом направлении, ибо если в районы, где воздух насыщен иодом, направить предрасположенных к зобу и уже с начинающими зобами детей из зобатых районов, то само собою разумеется означенные учебные заведения будут выполнять роль зобных профилакториев.

15. В летние месяцы должны быть организованы пионер-лагери, куда главным образом будут направлены дети из зобатых местностей.

16. Вполне возможно с этой же целью перевести временно и взрослых учащихся, а также часть населения горных районов в приморские районы, там в существующие колхозы и совхозы.

17. С целью проведения специальных опытов необходимо признать сегодня же целесообразным открытие первого зобного профилактория на одном из курортов Аджаристана и в ближайшем будущем уже приступить к этому имеющему весьма большое значение начинанию.

ი. ახლანდროშვილის სხვა შრომები.

1. ესპანური სენი. გაზ. „ხალხის მეგობარი“ №№ 293, 294. 1918. ქუთაისი.
2. ინფლუენცასთან საწინააღმდეგო მუშაობა ერობის საეპიდემიო რაზმში. გაზ. „ხალხის მეგობარი“ №№ 340, 348, 372. 1918, ქუთაისი.
3. აღამიანის სხეული და ფიზიკური ვარჯიშობანი. ჟურ. „შეფარდენი“ № 1. 1920 ქუთაისი.
4. სამეცნიერო ექსპერიმენტული კონტროლი ტანვარჯიშობაზე. ჟურ. „შეფარდენი“ № 1. 1922. ტფილისი.
5. ენდემიური ჩიყვი საქართველოში. „თანამედროვე მედიცინა“ № 1—2. 1924. ტფილისი.
6. მთის სნეულება. „თანამედროვე მედიცინა“ № 4. 1924. ტფილისი.
7. ჩიყვი სვანეთში. პროფ. ა. მაჭავარიანის წინასიტყვი. 1926. ტფილისი.
8. Зоб в Сванетии. С предисловием проф. А. Г. Мачавариани. 1926. Тифлис.
9. სამეცნიერო ექსპედიცია სვანეთში. პროფ. ალ. ჯავახიშვილის წინასიტყვი. 1926. ტფილისი.
10. აპარისტანის ჯ. ს. კ. სამკურნალო-სამეცნიერო ექსპედიციის მუშაობა 1927 წლის ზაფხულში ქვემო და ზემო აპარაში ჩიყვის, ჩიყვიანობისა და ქირურგიული ტუბერკულოზის შესასწავლად. „თანამედროვე მედიცინა“ № 5—12. 1928. ტფილისი.
11. ჩიყვის ახალი კერები საქართველოში. „თანამედროვე მედიცინა“ № 2. 1929. ტფილისი.
12. ჩიყვი აპარაში. „საქართველოს ექიმთა მეხუთე კონგრესის შრომები“ წ. 5, 1929. ტფილისი.
13. სამეცნიერო-ქირურგიული ექსპედიციის მუშაობა მთის რაჭაში. „კომუნისტი“ XI. 1929. ტფილისი.
14. ექიმის მუშაობა ტურიზმისა და ალპინიზმის დარგში. 1933. ტფილისი.
15. აფხაზეთის სვანეთი. 1926 წლის სამეცნიერო ექსპედიციის მუშაობის მიმოხილვა. 1933. ტფილისი.
16. ტურიზმი კოროტ შამშოვის მიდამოებში. „კურორტოლოგიის ინსტიტუტის შრომები“ № 15. 1934. ტფილისი.
17. ზემო სვანეთის მინერალური წყაროები. „ენდოკრინოლოგიის საკითხები“ № 1. 1934. მესტია—ზემო სვანეთი.
18. Эндемический зоб в ССР Грузии. „Протоколы XXII Всесоюзного съезда хирургов“. 1934. Москва.
19. წარმოებაში ჩიყვის გამოკვლევის პირველი ცდა. „საბჭოთა ენდოკრინოლოგია“, № 1. 1935. ტფილისი.

38 - K 37. 943
4

0000000000
0000000000